






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5897/A






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5897/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5897/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5897/A

5897/A

N.

Florence
les Jumeaux

1818

(voir à la fin)

Proctor - Isaac 13376

5850
Simonides

LIBRI DERE RVSTICA

A NICOLAO Angelio uiro consumatissima nuper
maxima diligentia recogniti et typis excusi, cum in
dice & expositione omnium dictionum. Ca-
tonis. Varronis. Columellae. Palla-
dij quae aliqua enucleatione
indigebant.

M. Catonis. LIB. I.

M. Terentij Varronis. LIB. III.

L. Iunij Moderati Columellae. LIB. XII.

Eiusdem de arboribus Liber separatus ab alijs.

Palladij. LIB. XIII.

De duobus dierum generibus, simulq; de umbris
& oris, quae apud Palladium.

*Effrenioris et ex legis dementia
extremum Infelicitas occupat
12 May 1590*

MIRABITVR fortasse quispiam Franciscæ optime, q̄ ego, qui abhinc annos circiter decem libris noua impressione cudendis operam totam impēderim, nec ex eis aliquem sub cuiuspiam nomine ediderim, modo hos quatuor de agricolatione authores tuo potissimum nomini dicarim. Cui quidem, si ea, q̄ in te bonarū artiū fulgent ornamenta, præter ea, q̄bus domi, forisq̄ splēdes uirtutis emblemata perspexerit, facile obuiam est ire. prætereo nāq̄ illud uetus familiari tatis et clientelæ uinculum, quo maiores mei domui uictoriæ iā tum ab ipso exordio archissimo fuere coniuncti, quod unum uel me satis ad id hortari debuisset. Iure igitur cogitanti mihi iamdiu cui maxime hos de agroꝝ cultu libros dicarē, tu solus in primis occurristi, qui à Senatu Flor. missus maximis de rebus orator Cæsareum imperatoris numen tam graui, ac dulci oratione ad tuæ Reip. uota ipulisti, ut re bene gesta merito te eadē ad Iulium prius, tum ad Leo Pont. Max. rursus legatum miserit, nuperq̄ Roma rediens magna cū tuorū ciuium admiratione, ad Christianissimum Gallia regē orator iteꝝ crearis. Vnde quantū te tua Resp. indigeat, cuiq̄ facile est conijcere, quando negotioꝝ molem in quē uertat te solum tanquam phœnicem unicūm delegerit. Tu igitur, qui ut Vlysses Homericus regiones multas, & urbes peragrandō, agrorū etiā cultus non asymbolos perspexisti, totum hoc rei rusticæ corpus bene compactū, & ad amūssimū formatum, munus quidē tua dignitate minus protegendū suscipies, ipsumq̄ cū eris ab occupationibus serijs, magnisq̄ negocijs, quibus iugiter distineris, feriis, currenti saltem oculo leges. Vbi quantum curæ, ac laboris, ne una qdē mala inesset, impenderimus, cum ex nouis typis, tum ex aliorū exemplariū mendis facile erit dignoscere. Accedit præterea Nicolai Angelij Buccinē. tui quondam præceptoris accuratissima castigatio, qui quidem uir de utraq̄ lingua nemeritis suis lucubrationibus multa turgida refecuit, hiantia suppleuit, caiosa poliuuit, tumentia complanauit. Adiecto item uocum indice, ubi uberime, ac elegantissime, q̄ pertinent ad uillæ positionem, fundi instrumenta, statumina, pomaria, ichthyotrophia, melitturgia, salgama, oxygara, oxipora, aliāq̄ id genus rusticationis corpore complexa ad unguē citra aliorū desyderium exponūtur. Accipe igitur nostræ Reipu. decus opus te dignū, siquidē Reges Cyrus, Archelaus, Atthalus, necnon & Xenophon rusticationem excoluerunt, quam deniq̄ Mago Pœnus octo & uiginti uoluminibus expoliuit, quæ quāuis extera et barbarā. S.C. in latinum conuersa sunt sermonem. Suscipe inq̄ illuc deferendos autores, unde tu felici legatione nomen grande reportasti, ut si qui rhinocerontes in tam longo itinere ipsos inuasērint, tuo audito nomine nasum aculeatum compriment, me tu interea ut fidum clientē cum noua prole hac oblata p̄soue. Vale.

ENARRATIONES NICOLAI ANGELII BYCINENSIS
 SIS uiri doctissimi super nonnullis dictionibus, quæ in his uoluminibus sciens
 dignissima leguntur.

- A**nniculus unius anni quo utitur Cato. s. b. & Varro lib. iij. sed annotis
 nus usus est Col. lib. 4. hornus & hornotinus p aspirationem. q. sit ab
 hoc & anno usus est Co. ibidē, tū dicimus binus siue binulus trimus
 & quadrimus duorū trium & quatuor annorum, & non solum ad res ani-
 matas, sed etiam inanimatas referri possunt.
- Aulla uel olla Cato usus est cōuersa au in o longum, unde Plau. aullulariam co-
 mœdiam suam de olla auri plena inscripsit. car. 11. a
- Acus ris frumenti purgamentū utitur Ca. et Co. li. iij. acus ē quartæ flexiōis
 paleæ frumētī dñr ad similitudinē acus quæ sumus Co. li. ij. car. 11. b
- Acetabulum uasis genus quod quartam heminae partem. i. dragmas quindecim
 continere quidam scribunt alij totam heminam. car. 15. b
- Acinum. M. Cato neutro genere usurpat pro uia grano, quem alij acinū mas.
 ge. protulerunt. car. 16. b
- Aceo acorem sapio Ca. nam inde acor & acidus. car. 21. a
- Autumnitas pro autumnī tpe a Catone usurpatur. car. 22. a
- Ager restibilis q. restituitur & reseritur, ueruactū terra q. alternis annis regeuit
 q. uere actū, & est qñ uere primum agri proscinduntur auctore Var. lib. 11.
 noualis se. ge. siue nouale. ne. aruum tunc primum ad sementem proscissum. li.
 cet alij uelint nouæ sementi relictum usi Maronis patrocinio, qui scripsit Al-
 ternis idē tonsas cessare nouales, & segnē patiēre situ durefcere cāpñ. car. 33. b
- Actus duplex minimus & quadratus, minimus est latitudinis pedum quatuor
 longitudinis centum uiginti auctore Col. lib. y. quadratus undiq. finitur pedi-
 bus centū. xx. ut scribit Co. ibidē. & Va. li. i. actus itē qua cuiq. uehiculū tra-
 here licet, & iter quo quis pedes uel eques cōmeare potest, de quo latius in di-
 ctione iugeri. car. 33. b
- Aruum quod aratum nec dum satum est. Var. li. ij. car. 40. b
- Arista ab arendo inquit Varro. lib. ij. car. 38. b
- Aceruus minutarū rerū pgeries, cumulus, idē et meta a Va. dicitur li. ij. c. 45. b
- Apica ouis quæ non sit uillis alīs & densis toto corpore, maxime circa ceruicem
 & uentrem. Var. li. iij. car. 53. a
- Aborto as pro immaturum fœtum edo usurpat. Var. li. iij. Co. uero abortio is
 pro eodem est, et abortior deponens. car. 56. b
- Appēdix qd alij adiunctū ē quasi ex alio pēdeat. Var. li. iij. car. 30. & 71. b
- Aluens siue aluus alueare & alueariū pro eodē intellectu. i. apum iuguriolo ab
 alimonijs mellis usurpari a Varrone & Co. s. p. cōperies. car. 76. b
- Apotheca pro cella uinaria et proprie i q. uinū pseruatur et uēditur. Co. li. i. 92. b
- Atlantides absconduntur altero & trigesimo die post autumnale æquinoctium
 ante nonū Kal. nouembris auctore Col. lib. ij. 100. b

Collu. Repertoriū.

AA ij

Abolescere pro evanescere. i. ad nihilū redigi usus est. Col. li. iij.	112. b
Annotinus in dictione anniculus.	136. a
Agna in dictione ingeri.	
Amera apud Col. semen ulmi significat, licet Pli. samariā uocet.	130. a
Alumen falsugo terræ dictū a lumine q̄ lumen coloribus tingēdis p̄stet.	163. b
Auia herbæ nomen apud Col.	164. a
Alānum urbs olim in littorē Venetiæ florentissima fuit.	
Alaternus genus fructus apud Col. lib. yij.	179. a
Acras siluestrem pirum apud Col. significat lib. yij.	181. a
Anserculus anseris pullus. Col. lib. yij.	194. a
Amarātus non modo flos, sed arboris genus apud Col. legitur lib. ix.	199. b
Asphodelus a nostris ferula dicitur. Col. li. ix.	199. b
Acrimonium alij & cæparum uocauit. Co. li. ix. quanquam acrimonia ē ue-	
hementia quædā animi acumen & mētis seueritas.	205. b
Autūni eqnoctiū circa octauā ptē libræ auctore Co. li. ix. licet rō hypparchi eo.	
auctore doceat primis signorū ptibus nō octauis solstitia et eqnoctia p̄fici.	206. a
Andrachne herbæ species quā portulacā dicimus. Co. li. x.	213. b
Arborator, is est qui arbores curat. Col. li. x.	215. b
Adoreum far uernaculum dicitur. Col. lib. xi.	218. a
Acida uua quæ acorem sapit. Col. lib. xi.	222. b
Amigdalus & amigdala pro arbore legitur in Col. lib. xi. pro fructu uero &	
amigdala & amigdalum ne. ge. hæc eadē dicitur nux græca, siue thasia, si-	
ue longa. auctore Macrobio lib. saturnaliū tertio.	225. a
Atrienfis cui atrij cura credebatur. Co. li. xi.	233. b
Amylum fit ex triticeo lacte expresso cum triticū per aliquot dies in aqua pur-	
gatū est dictum ab a dictione priuatiua & μύλου mola. q. sine mola factum	
amidum uulgius appellat. Col. lib. xij.	253. a
Admiculo, siue admiculor in utraq; uoce pro sustento. Co. li. ult.	260. a
Ablaqueare ab italīs excodicare dicitur. i. circa uitis radicem dolabra terrā ape-	
rire. Pal. lib. primo.	278. a
Auellana nux ab auella oppido campaniæ ubi abundat, cuius arbor corilus di-	
citur eadem nux pontica, q̄ in Asiam græciamq; primo e ponto uenit dicitur	
& prænestina q̄ prænestini his abundant. Pa. li. i.	294. a
Amites, pertica aucupatoriæ, sup̄ q̄bus rete uolucris tēditur. Pa. li. yij.	311. b
Atinia gallica ulmus uulgo forcerago. Col. li.	
Althæa hybiscus dicit̄ auctore Pa. li. xi. siue agrestis malua, ut alij uolūt.	326. a
Ante pagmenta ualuarū ornamenta, q̄ antibus appin guntur. i. affiguntur. Ca. 5. a	
Alica fit ex ζέα & σιτάι græci speltam dicunt.	13. a
Auerunces auertas, depellas. Ca.	19. b
Apiana ab Apio brassica, quā græci σελιναδæ uocant. Ca.	23. b
Aedimius is dicitur, qui sacras ædes curat, prisci tñ dixere ædīmū. Va.	28. a
ἀποδύτηςιον apoditerion locus ubi deponebant uestes ante ingressum bal-	

rei. Var.	49.4
ἑατῆς ἰδ' ἰοῦ græce latine exemplar. Var.	69.4
Adycialis, cœna erat adipalis & opipara ab adiyciendo. Va.	70.4
Amphibium dicitur duplicis uitæ. Var.	73.4
Asini, pisces qui per diminutiōem aselli dicuntur. Var.	79.4
Artrare, est aratrare, & est quando sata inarantur postq̃ & nata sunt & exi crescunt. Col.	
Apyrenum malum granatum proprie dulce uocauerunt prisci medici, uerum si græcam dictionem latine ex ethymologia explanare uoluerimus apyrenum dicitur, cui nulla est granorum duritia uel minor q̃ alijs. Col.	
Allobrogica & biturica a gente nomen habuerunt. Col.	113.6
Albuelis, uitis genus, sicut item uisula. Col.	114.4
Allopecis a cauda uulpium dicta. Col.	112.4
Amelus, flos est quem eleganter Virg. in. iij. georg. describit. Col.	204.6
Altera genitrix Cretæ Prometheæ alludit ad fabulam, q̃a Prometheus ex creta terra hominem formauit. Col.	209.6
Asyrio semine radix, hæc syriaca radix uocatur, q̃ ex hortis syrorum sit trans lata.	210.6
Æacij flores, hyacinthus, quem e sanguine Æaci natum dicunt. Col.	211.4
Acheloides nymphæ a fluuio Acheloo dictæ.	212.4
Amythaon Melampodis pater fuit, qui inter medicos præclarus habitus est, si militer & Chiron. Col.	213.6
Attæi himeti. i. actici mellis quod optimum nascebatur in himeto monte Athenarum.	214.4
Amula uas ad aquam gestandam. Col.	214.4
Armenia cereola, & damascena, prunorum genera.	214.4
ἀμυγδαλωτάις uitis plenam.	28.6
Armonium coloris genus tendentis in subruffum. Var.	66.4
Asiatica psica frigoribus proueniebant, cōtra gallica tepestina fiebāt. Co.	214.4
Armeniaca præcocia persica quidam putant. nam tuberes & armeniaca proxi me ab amygdala florent.	225.4
Numerorum quorundam nomina, quæ item mensuris & ponderibus accomo dantur ascripta sunt.	
As erat libra duodecim continens in se uncias.	
Dupondius a duobus ponderibus. i. libris duabus.	
Tressis a tribus assibus, & sic deinceps usq; ad nonus ses. i. ad nouē asses.	
Decussis ab decem assibus dictum, quæ dictio in omni denario numero mensu ra & ponderis ualet.	
Aeris minima pars sextula dicitur, q̃ sit sexta pars uncia.	
Semiuncia, q̃ sit dimidia pars uncia.	
Sextans, q̃ sexta pars assis.	11.6
Quadrans q̃ tertia pars assis.	111.

Triens, quarta pars.	4.
Quincunx, a quinq; uncis. i. partes quinq;	5.
Semis, dimidium est assis.	6.
Septunx, a septem & uncia conclusum. i. uncia septem.	7.
Bes olim des dempto triente, idest octo, & declinatur beffis.	8.
Dodrans dempto quadrante nouem uncia.	9.
Dextans dempto sextante uncia decem.	10.
Deunx dempta uncia uncia undecim.	11.
silicum dictum est, qd semunciam fecet.	
sextertius dupondus & semis.	

Bipalium fossoris instrumentum altitudinis duorum pedum, auctore Columella libro undecimo, quod rustici eodem auctore libro ultimo sextertium uocant dictum forte a duabus palis, ut bipennis a duabus pinnis.

Bubile dictum ut ouile, equile, caprile, hoc est ubi bones, oues, equi, capra stabulantur. Var. lib. primo.

Bela ouis. q. mela, inde belare. Var. lib. iiij.

Bones cerebrosi in dictione cerebrosus.

Bumastos, genus uuae crassioris, qd bouis mammam inuitetur. Columella libro tertio.

Brachia in uite uetusta durameta uocantur. Co. li. iiij.

Bigemmis in dictione palmes.

Branchiae sunt partes piscium iuxta ceruicem more folium hiantes. Columel. libro octauo.

Bulbus capitata, omnis radix, adeo ut & bulbus croci, & cannae oculus a Co. dicatur lib. ix. & ultimo.

Bruma conficitur circa octauum Kal. Ianuarias. auctore Col. li. ix.

Balausus herba est non multum dissimilis a narcisso. Col. li. x.

Battis herba aculeata sponte nascens, & est marina, & hortensis, battis satius a quibusdam dicitur holus cordi. Col. li. xi. & xij.

Brisa uua dicitur cum pedibus ad exprimendum uinum calcatur. Columella libro duodecimo.

Blitus, siue blittus herba satia, quam nos betam dicimus. Pa. li. iiij.

Basterna uehiculi genus. Pal. li. yij.

Badius color ex castanea colore qualem in quibusdam equis cernimus. Palladius lib. quarto.

Bulbi megarici, quod Megaris ciuitate graeciauenirent, & genus est caepae. Cato.

Bosphorus bouis transitus, ratio tamen exigit, ut bosporus dicamus. Va.

Basculi populi Hispaniae. Var.

Βούβρυον magnum puerum.

Βούβρυα magna fames.

ΒΟΥΛΙΜΟΥ magnos oculos habens.	
ΒΟΥΩΤΙΥ magnam mammam habens. Var.	17.b
Biturici, populi Gallie, inde biturica uitis. Co.	113.b
Brutij populi sunt ultimi habitatores Italiae Siciliam uersus. Col.	210.b
Beta herba nigra & candida, quæ blea dicitur. Col.	212.a
Bionias herba est, quæ pampinor amoenitatem præstat & alligat quicquid oliuam habet. Columel.	212.b
C ordum est, quod post tempus nascitur hinc hædi et sues cordi a Var. nuncupantur. Col. uero autumnale fœnum cordum uocat.	175.b
Colum siue qualum uas uimineum, quo de lacu fluens mustum ex cepum guttatim defluit a colado dictum. Ca. libro primo. Virgilius autem quæ los dixit.	4.a
Capisterium uas ligneum amplum a capiendo dictum, quo rustici maxime uiuuntur. Cato libro primo.	
Clostrum a claudendo, hostiorum est instrumentum ferreum. q. claustrum cõuersa au in o longam, ut qualum colum. Ca. li. i.	4.b
Ceterus in prima positione apud Ca. li. i. legitur.	7.a
Codicillus pro paruo codice. i. ex igno ligni globo. Ca. li. i.	9.a
Crates sicaria quæ siccantur fici. Ca. li. i.	11.a
Congius sextariorum sex. Ca. li.	11.b
Capulare est transfundere, idest mutare laticem de uase in uas inde capulator. Ca. li. & capula ansata uasa.	12.b
Corina plumbeum uas, in quod detorculari oleum fluit, ut uult Cato. uerum cortina uas æneum, in quo coquuntur colores tingendis lanis uel serico.	12.b
Cremor, lac expressum ex grano aqua macerato. Ca. li.	14.a
Conuoluolus a conuoluendo uermiculi genus, qui se pampino inuoluit, unde & inuoluolus. Ca. li.	15.a
Colluere apud Catonem identidem lauare significat.	15.b
Celiaci, qui fluxum uentris patiuntur. Ca. li.	17.b
Collucare est decussis ramis, siue frondibus arborum lucem introducere. Cato. libr.	17.b
Cotyla poculi genus, quo Diogenes usus ante, quàm uidisset puerum manus in poculum concuasse. Cato. lib. Palladius usus est comula conuersa. y. in u.	20.b
Cantherius castratus equus diffus, quod semine careat. Catone & Varrone auctoribus. item iugi genus cum ueteribus depositis hastilibus adnectuntur singule transuersæ perticæ in imam partem ordinis. auctore Columella libro quarto. est & cantherius mons in sabinis, ut inquit Varro. li. iij.	21.a
Crambe est species brassicæ. Ca. li.	22.b
Colis & eius diminutiuum coliculus est exiguus, ac tener brassicæ uitis et aliorum olerum caulis. Ca. li.	24.a
Carbonis pro usura salis apud Varronem inuenies li. i.	32.a

Cuspidis tubulus finis perforatus. Var. lib. i. 32. a
Carbunculus, terræ species, q̄ satorum radices cōburat. Var. li. i. 33. a
*Centuria est modus ducentorum iugerum olim a centum iugeribus dicta, auctore Varro. lib. primo. sed mox duplicata nomen retinuit. Col. lib. y. ut in dī-
 ctione iugeri.* 37. a
*Cannabis, siue (ut inquit Palla.) Cannabum herba est, de qua torquentur funes
 derivatiuum cannabinus, & cannabaceus. Va. li. i.* 39. a
*Capreolus coliculus intortus in vitibus, ut cincinnus a capiēdo dictus. Va. li.
 ij. est & capreolus bicornis ferramenti genus apud Col. li. xi.* 41. a
Circumcisum uinum iterum expressum dicitur. Var. li. ij. 46. b
Conditio pro conditura apud Var. li. iij. & Col. li. xij. 48. a
*Catulare est ostendere se uelle maritari. auctore Varrone li. ij. i. coitum maris ge-
 sti appetere.* 62. a
Cilicium ex uillis capræ a ciliā, ubi primum inuentum est. Va. li. ij. 64. b
Consultor pro eo qui petit consilium, & qui dat. Var. li. iij. 65. b
Columba a columinibus uillarum dicta est. Var. li. iij. 70. a
Columbi miscelli medij inter maiores & minores. Var. li. iij. 70. a
Curator gallinarius, qui præest pascēdis gallinis. Var. li. iij. 72. a
*Cuniculus tertia leporum species dictus, eo q̄ cuniculos in terra facere soleat
 Varro. lib. iij.* 74. b
Coclea solitanæ ex Aphrica. Var. lib. iij. 75. a
*Cyperum auctore Varrone libro tertio genus est herbae palustris, quæ a Colu-
 cyperus dicitur lib. xij.* 76. b
Cœliacæ apes quæ uentris fluxum patiuntur. Var. li. iij. 77. a
*Cortinale, locus ubi sunt cortinæ, hoc est uasa, quibus sapa decoquitur. Colu-
 libro primo.* 92. b
*Classis, collectio paucorum hominum. Col. libro. primo. classes denum homi-
 num faciundæ in rustico opere, quas antiqui decurias uocabant.* 95. b
Cicera similis piso a qua cicera distat solo colore, ut inquit Palladius. Col. li. i. 101. a
*Colliquiæ, siue colliciæ, siue elices sunt maiores sulci, in quibus si redundat aqua
 excoletur. Col. lib. ij.* 101. a
Catulo facere caniculæ canibus sacrificare. Col. li. ij. 111. a
Casia frutex cubitorum triū suauissimi odoris & uirtutis. Col. li. iij. 117. b
Caput uitis ultimum flagellum. Col. li. iij. 118. b
Creta species terræ, alio nomine argilla dicitur. Col. li. iij. 121. a
*Ciconia mensuræ genus. i. regule machinula ad mensurandam altitudinē, sul-
 ci pascini. Col. li. iij.* 123. a
*Custos, reflex, p̄sidiarius appellatur palmes in trunco uitis in pollicem præcisus.
 Col. lib. iij.* 134. b
*Comphēdere de surculis & plantis Col. dicit quando promissis radicibus iam
 germinant. lib. iij.* 139. a
Calametū cānæ putamina et fragmēta minutiora co. appellare uir li. iij. 138. a

Castaneti dictu est ut cupjsetu, pinetu, cannetu, & unetu. Co. li. iij.	140. b
Caluescere in arboribus defluuiū foliorū pati apud Co. significat. li. iij.	141. b
Clima quoquo uersus pedum est. lx. Columel. libro quinto, ut uidebimus in di ctione iugeri.	142. b
Canteriata uites, quæ pedaminibus adnixa singulis iugis imponuntur.	
Col. lib. quinto.	147. a
Caracata uitis flexa in orbiculos & giros. Co. li. y.	147. a
Candofoccus a gallis dicitur species mergi. Col. li. y.	148. b
Clibanus genus furni minutioris. Col. li. y.	154. b
Cunila bubula herba species quā uulgu cotā uocat. Co. li. yi.	163. b
Coriago morbus quando ita pellis adhæret tergori bouis, ut a costis abduci nō possit. Col. li. yi.	163. b
Clauus genus tuberculi, quod uulgo callus dicitur rotunda specie coloris albi, innascitur plantis, digitisq; pedum maxime. Col. li. yi.	164. a
Cenæ uacca humilis stature lactis abundātes. Col. li. yi.	167. a
Colliriū nō oculorū solū, sed pro oī medicamēto accipit. Col. li. yi.	169. b
Cedria primus sudor qd fluit a canali dum pix fit. Col. li. yi.	170. b
Colostrā uel colostrū spōgiosa lactis densitas, q primū mulgetur, ē et morbi gñs quō lactētes tētātur, si biduo a partu maternū lac gustauerint. Co. li. yi. 175. a	
Cunela uel cunila, quā rustici satireiam appellant, sed cunila a satireia & tim bra distinguitur. Col. lib. yij. & xi.	178. b
Culmus frumentū calamus a radice usq; ad spicam. Co. li. yij.	180. b
Canna de genere est harundo. Col. li. yij.	181. a
Confiligo radix. Col. lib. yij.	182. a
Cellares columbi, q clausi cellis ad foetū nutriuntur. Col. li. yij.	189. b
Colocasiūm, herba q nascitur ad Nilū in Aegypto. Col. li. yij.	194. b
Clathrare clathris aliquid claudere, qd & cancellare dicimus. Co. li. ix. 198. a	
Cherepolus uel cherephilus oleris species, quæ humiliter serpit. Co. li. x. 210. a	
Campe, eruca, uermis genus in pampinis & oleribus. Co. li. x. 213. b	
Cappadocia lactuca, quæ pallido denso & pexo folio uiret. Co. li. xi. 227. b	
Cœpina ubi sunt satæ cœpæ. Col. lib. xi. 230. a	
Crenia tenuia & lenissima ligna, aridaq; uirgulta dicuntur. Co. li. xij. 138. b	
Cacabus haeni genus, in quo pulmentaria coquimus. Col. lib. xij. 247. b	
Cerare ceris oblinire inde caratura. Col. lib. xij. 151. a	
Cyma pro summitate brassicæ. Col. lib. xij. 253. a	
Cantharis siue cantharida uermis uiridis auri colore superlucens, cantharides etiā ficorum uermiculi dicuntur & pyri & pinus. Pal. li. i. 274. b	
Cynus arboris species apud Pal. li. i. 276. a	
Cribello. i. cribro frumenta excutio. Pal. li. i. 277. a	
Cauter uel cauterium ferrum ad urendū. Pal. li. i. 177. b	
Culex herba species apud Pal. lib. iij. 298. b	
Claua longior & crassior talea est. Pal. lib. iij. 300. b	

Citrus apud nos alterius generis q̄ citri atlantica, ac quoniam præciosissima nunc sæ apud Romanos fiebant. Pal. li. iij.	300. b
Carica fici species apud Pal. li. iij.	301. b
Coracinus, piscis species, licet a cornu etiã coracinus ducatur. Pal. li. iij.	302. a
Cephalo, is, palmorum planta. Pa. li. y.	307. a
Crocomaga herbæ species. Pal. li. xi.	
Cerebrofi boues ptumaces ut hoïes a peruerso cerebro, qui toti suo consilio heret & iracundiæ obtemperant, & a nemine persuaderi pñt. Co. li. ij.	
Centones ex pannis uel lanis diuersorum colorum in unum condensatis uel cõ fuitis fiebant. Ca.	car. i. b
Cucullones idem putamus q̄ cucullos. Ca.	car. i. b
Corrudam syluestrem asparagum uocant. Ca.	3. a
Clathri, ligna sunt cauearum, uel quibus aliquid munitur, aut sepitur, inde cla thrata fenestra. Ca.	5. a
Cocula uasa ænea coctionibus apta. Ca.	
Coagmenta pñctiões arctæ & cõpares a cogēdo. i. stringēdo. Ca.	6. a
Culigna uas proprie uinariũ. Ca.	18. a
Capis capidis genus uasis, inde per diminutionē capidula a capiēdo. Ca.	
Coxendicem coxam exponit. Nonius Ca.	24. a
Compluuata uitis dicta a cauis ædium compluuijs. Var.	32. b
Cimerius ubi iungitur pontus meotica paludi. Var.	50. b
Cataclysmus diluuium, inundatio. Var.	65. a
Citrum, lignum præciosissimum, quo lectos prisci exornabant, & neutriũ ge neris. Var.	66. a
Coturnices aues sunt aduenæ terrestres potius q̄ sublimes, has nũc uulgus quale as appellat, quibus ueneni semen graßissimus est cibus, quã ob causam eas dã nauere mensæ, sinulq; propter comitalem morbum. Var.	69. b
Chirõ & Melampus medici præstantes, a quorum nomine herbæ quoq; dictæ sunt centaurea, melampodion. Col.	86. b
Casim. i. uno icu. Col.	137. b
Cancelli, ligna sunt inter se modicis iteruallis in trãuersũ annexa q̄bus scanæ, & tribunalia, atq; fenestra muniabantur. Va.	73. a
Cæcilia, genus serpentis.	165. a
Cimolia Creta ab insula cimolo, qua utuntur fullones in uestibus abluēdis hãc nunc uulgus terram saponariam uocat. Co.	165. a
Crepido prærupti saxi margo, & extremitas uiarum uel ripa paulo eminen tiores crepidines dicuntur. Col.	197. a
Chalcis, piscis est de genere romborum. Col.	197. a
Charchari, elachatæ, camarus, gobio pisces sunt.	197. a
Corcyrũ antrũ in Sicilia, unde primum delatũ est crocum.	199. b
Chalbanum succus est ferulæ siria, & graci χάλβαρον dicunt per ch, nostri uero in g ch conuertunt. Col.	204. b

- Chelas cancri brachia, quæ facere videntur libræ sidus. Co. 209.b
- Crotum, uenatorem fuisse dicunt, precibusq; musarum in astra relatum, et pro sagittario ponitur. Col. 209.b
- Caurus uentus, qui & corus dicitur. Col.
- Cloaca uero, per quam sordes publicæ eluuntur. 210.a
- Cumæ urbs campaniæ, uñ cumana brassica sessilis folio & capite patula. 210.b
- Corambla herba est, quæ oculos retundit & hebetes facit, ideoq; dicta corābla. nā uox α pupillā significat. α μ β uero retusum & hebes. Co. 211.a
- Cylindrus, lapis teres, quo terra densatur & æquatur. 213.a
- Caput nudum cute. i. caluariam asini. nam asinæ caluaria in hortis ponebatur, ut sua præsentia, quæ spectabat fecundaret. 213.b
- Canis erigones, idest canicula sydus. 214.a
- Congilis rapi genus. Col. 214.a
- Cassiope astrum, in quod relata fuit Cassiope mater Andromedæ. Co. 221.b
- Coracinum piscē nigrum. Col. 302.a
- Crocodilus lacerta ē nili, imēs aq; magnitudinis quā debellauit chneumon.
- Crocomaga herba est.
- Chærus genus uasis.
- D**iuaricare usurpat. M. Cato pro rarefacere ac diuidere, et in diuersas partes porrigere. 8.a
- Deplere pro euacuare, ac superna laticis exhaurire. Ca. de re ru. 12.b
- Depso est subigendo manibus molle et tenerum reddere. quod uerbum a græco fit. Ca. de re. ru. 13.b
- Dispepsia difficilis & ægra coctio δ ἐπὶ τῷ δυσὶν difficile τὸ ἐσθῆν concoquo. Cato. libro de reruisti. 17.b
- Dij consentes, qui multorum consensu dij habiti sunt. unde cōsentia sacra ex multorum consensu statuta. Var. lib. i. 27.a
- Dossuarij aselli, qui uecturæ operam præbent. Var. li. iij. 59.b
- Dentes columellares dicuntur in equis qui incipiunt nasci iam illis agentibus quintū annum. Var. lib. iij. 59.b
- Dentes brochi eminentes dentes. Var. li. iij. 59.b.
- Deliboe est corticem arboribus adimere. Col. li. ij. 98.b
- Dolabra etiam apud Col. marram significat. li. ij. 99.a
- Dupondium, mensura duorum pedum apud Col. li. iij. 124.a
- Decussare est in decusses formare, atq; diuidere, & per integram longitudinem disseccando trahere. decussis enim dicitur a decem assibus. Columella libro tertio. 123.a
- Decacumino est cacumina, idest cimata herbarum, fruticum, arborum decerpere. Columella li. quarto. 130.a
- Delachrimare uites dicuntur quando primo uere guttas demittunt. Colu mel. libro. 130.b
- Dolabella diminutiuum a dolabra. i. marra. Col. libro. quarto. 135.b

Dapsilis prouentus fecundus. Co. li. iij. 138. b
 Disfraro est dinaricare qđ opus rustici castrationem uocant. Col. li. iij. 141. b
 Despondere animū est suae spontis, finem statuere, & q. ex desperatione mori de
 cernere. apud Co. uero pro eodē intellectu despondere sine aīo leges li. iij. 191. a
 Dolare non solum est ascia uel dolabra cedere, sed apud Col. lib. xi. in rectum
 dinem dirigere. 218. a
 Diffundo pro promo & haurio usurpat. Col. li. xij. 242. a
 Decemodia & trimodia uasa sunt rustica, quibus rustici inferēdo frumento dñ
 ferunt utitur, nec non pollinctor in frumento per molas frangendo trimodia,
 utitur Col. lib. xij. 238. a
 Defrutum a deferuendo uinum decoctum usq; ad mediā partē. Pa. li. xi. 213. b
 Delphica laurus, qđ uictores Delphis ea coronarentur, et est uiridior laurus, Cy
 pria uero folio breui, nigro p. margines imbricato crispa. Ca. 3. b
 Delitantes tegulae a delitia tigno dictae has alij colliciares uocant. Ca. 5. a
 Ductarius funis, qui per orbiculos trochleae traicitur. Ca. 18. b
 Desultor, unde & desultorij equi, & desultores qui olim in cursum agebant sin
 gulos equos, ut nunc faciunt qui eos ad braniū ut currant, alunt. Var. 60. b
 διφθέρα diphthera uestis pastorica ex pellibus ouin, aut caprar. Va. 64. b
 Dactylides a digitali gracilitate dictae. Col. 112. b.
 Depangere plantare, inde depactus. Co. 124. b
 Ductim cum mora. Co. 137. a
 Draco appellatur palmes emeritus, pluribusq; induratus annis. 212. b
 Dioneis floribus idest Veneris. 212. b
 Dardaniae artes, Phrygij faciebāt mulierem mēstruatam nusq; cinctam, solutis
 capillis, nudis pedibus contra erucas & cetera, hortū circuire. Co. 213. b
 Decoxit domino debitam pecuniam cum non esset soluendo abstulit. Co. 217. a
 Dolus mendesius scriptor aegyptius fuit. 229. b
 Defrutaria uasa ad defrutum idonea. 238. b
 Digitelli diminutiuum a digito, & uidetur esse genus herbae. 234. b
Erum pabuli, seu leguminis genus dictum ab eruendo, qđ manu carpā
 tur. Cato de agricultura. 7. b
 Euanno est uanno, hoc est cribro frumenta purgare. Var. li. ij. 46. a
 Exaltare in altum effodere, hoc est in profunditatem. usus est Col. li. iij. 122. b
 Exactor operis, is est qui operis rationem exigit. Col. li. iij. 123. a
 Emacitas, emendi auuiditas. Col. lib. iij. 128. b
 Emaciare macrum facere apud Col. lib. iij. significat. 129. b
 Exherbare herbas euellere. Col. li. iij. 141. a
 Epiphora, oculorum morbus, quem uulgo lachrymam uocant cum descēsus hu
 moris oculos angit. Col. li. yi. 165. b
 Erecti pisces sunt in lōgitudinem dorso erecto, ut differant ab his, qui dicuntur
 cubantes & prostrati, quales sunt, rombi, soleae, passerres. 196. b
 Equinoctium uernum circa. iij. Kal. aprilis in octaua parte arietis sic autum

naie in octaua parte librae. Co. lib. ix.	205. a
Examinare examina apum eiicere. Col. li. ix.	205. b
Emuscare muscum adimere. Co. li. xi.	196. b
Aestatis initium. yij. idus maias. Col. li. xi.	220. b
Eruca a grecis κέρως uermis genus, qui olerum folia rodit praesertim brassicae. Col. lib. xi.	230. b
Epitirum a confracta oliua, quae graco dicitur pitiris conditura est oliuae, & e genus edulij, seu casei ficuli, sit. n. ab epi & tiros caseus. Co. lib. xij.	248. b
Exaniari sudando exiccari. Col. lib. xij.	249. a
Exanio. i. sanie eiicere. Col. lib. xij.	252. b
Embamma tis significat immersionem quoniam intingimus, uel panem, uel obsonium in uasculis repletis re liquida. Col. li. xij.	253. b
Aequilibrium ponderis aequamentum. Col. lib. ulti.	256. b
Aestina summa pars uitium a rusticis dicitur auctore Co. li. ulti.	256. b
Ethesia uenti statim per singulos annos.	221. b
Euandus infructuosus dicitur. Co. lib. ultimo	
Epistates praceptor siue perfectus rei facienda. Ca.	11. b
Etymon recta interpretatio. Var.	45. a
Ephippium stragulum quo equus infertur.	60. b
Emblema ex origine dictionis, quae graeca est significat tessellulas, quibus instrata pauimenta uariantur & uersicoloria fiunt.	66. a
Epistomion dicitur foramen, per quod aqua effluit.	70. a
Ex grumantes de mensura & recta uia excedentes uel grumos eruentes.	75. a
Equienti mulae equum appetenti ut credimus.	172. b
Eximij proprie sunt porci, qui de grege excepti ad sacrificandum liberius pasuntur. Col.	180. b
Ebulus herba est facies bacas in similitudinem sambuci. Col.	209. a
Elices dicuntur reuolutiones. Col.	221. b
Enante genus uitis. ix. lib. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.	313. b
F estucare est festucis & paleis et amurca aream aut solare obducere. Cato de re rustica.	260. b
Fiscella non solum uas uimineum, aut ex iuncis quo lac colatur, sed et apud Ca. ex uiminibus & funiculis quod bonum ora, faucesque iumentorum capistratur.	11. b
Fracidus a frango, siue fraceo iam putrescens, unde fraces apud Catonem feces latius significant.	12. b.
Factus siue factum dicebant, quod uno tempore conficerent, quem alij centum quadraginta modiorum, alij centum uiginti. Ca. de reru. & Va. lib. i.	12. b
Ferum genus libi a fero dictum, quod saepe ad sacra ferebatur, uel quod pluribus uarijsque rebus factum esset. Cato de re rusti.	18. b
Fossa incilis ad ducendam aquam apta, dicitur etiam incile. Cato de re ru.	22. a
Fœmiciu fœni sectura & messem significat. Var. lib. i.	36. b
Flagellu uirga siue caput minoris samentis ubi nascitur uua. Va. li. ii.	41. a

<i>Frit in summa spica minusq; granū ē uruncum in infima .Va. li. ii.</i>	45.b.
<i>Forda bos dicitur, q̄ pręgnans est prisci hordā dicebāt, unde & sacra fordica/</i>	
<i>lia qbus pręgnantes boues immolabant. Var. li. iii. & Co. li. yi.</i>	57.b
<i>Felis animal domesticum ad murū uenatum uulgo catus dicitur. q. cantus, ac/</i>	
<i>cipitur et pro fouino. Va. li. iij. & Co. li. yij.</i>	64.a
<i>Fucus a Varrone lib. iij. appellatur & fur.</i>	77.a
<i>Filiētū ut cannetū cupissetū ubi sūt multę filices, canna cupssi. Va. li. iii.</i>	97.a
<i>Farris genera quatuor clusinnū candidum, uenniculum rutilum, et candidum</i>	
<i>halicastrum, & trimestre. Co. li. ij.</i>	100.b
<i>Fœnū gręcū qđ siliquā uocat rustici. Co. li. ij.</i>	104.b
<i>Falces uericulata nostrates uel denticulata a ueru. Co. lib. ij.</i>	110.b
<i>Feria demicales cum familia purgabatur mortui hoīs cā. i. dies qbus i funere ali/</i>	
<i>cuius uacaret tota familia usq; ad exactū funus. Co. li. ii.</i>	111.b
<i>Fecinea uua, q̄ plusq; cetera fecis afferunt. Co. li. iij.</i>	113.a
<i>Fluxura pro uino usurpatur a Co. li. iij.</i>	114.b
<i>Furñculus est unius aut alterius folij pāpinus e duro prorūpēs. Co. li. iij.</i>	134.b
<i>Focaneus palmes q̄ solet in bifurco medius prorepere q̄ inter duo brachia qua se</i>	
<i>diuidit uis enatus uelut fauces obsidet. Co. li. iij.</i>	136.a
<i>Falcis uimitoria figura, capulo ps proxima culter, q̄ flectitur sinns, q̄ a flexu pro</i>	
<i>currit scalprū, q̄ deinde adūca est rostrū appellatur, cui supposita semiformis lu</i>	
<i>na species securis dicitur, eiusq; uelut apex pronus imminens micro uocatur.</i>	
<i>Collu. lib. quarto.</i>	137.b
<i>Fossura pro fossione, uel pro tpe fodiendi usurpatur a Co. li. iij.</i>	139.a
<i>Forma uas in quo formatur caseus. Col. li. yij.</i>	180.a
<i>Fistulosus caseus spongiosus dicitur. Co. li. yij.</i>	180.b
<i>Fastus numero plurali pro fastis. Col. lib. ix.</i>	206.a
<i>Forum uinariū apud Var. canalem significare uidetur, unde Co. li. xi. forum</i>	
<i>& torculare in uindemia emundatur.</i>	222.b
<i>Farraginariū a farragine locus ubi seruatur farrago. Co. li. xi.</i>	223.a
<i>Falcula a falce diminutiū parua falx. Co. lib. xij.</i>	238.a
<i>Fiscus pro sacculo apud col. li. x.</i>	249.a
<i>Fiber animal in ponto quod periculo urgente testiculos sibi amputat medici ca/</i>	
<i>stora uocant. Col. lib. ultimo.</i>	259.b
<i>Ficaria ficorum locus. Pal. lib. iij.</i>	301.b
<i>Falces scirpiculas a scirpādo. i. ligando. nā his utuntur i uinea ligāda.</i>	4.b
<i>Foriculis diminutiū uidetur a foris. Va.</i>	47.b
<i>Floci particula lanę diuisa a uelleribus Va.</i>	64.a
<i>Flores feces sunt uini.</i>	163.b
<i>Fabis habilis herbas significat, quibus faba condiri solebāt, sunt enim faba fa/</i>	
<i>brorum conuiuia.</i>	210.a
<i>Ferali mense lupus. i. februnarius mensis in quo sacra feralia mortuis fiebāt &</i>	
<i>Iudi lupercales. Col.</i>	211.b

Flameola rubea, nam flammum rubeum est. Co.	213. a
Fortis fortunæ dies appellatus a Servio Tullo rege q̄ is sanum fortis fortunæ secū dum tiberim extra urbem dicavit.	213. a
Frugē salis mica salis.	213. b
Flaccidi a flaccis quorū aures pendulæ & nō arrectæ sunt.	179. a
C Lubo aut corticem aut pellem detraho. Ca. de re rustica et dicitur etiā am absolute.	5. b
Gurgulio uermis in horreis tritici & leguminum quorundam maxi ma pestis. Ca. de rerusti.	15. a
Grossi & grossulificus nōdū maturescētes. Ca. de reru.	15. a
Galbulus cupressi pila. Var. lib. ij.	43. a
Gluma est grami triticeī folliculus a glubēdo dicta. Var. lib. ij.	45. a
Granum a gerendo, id enim scribitur uti spica gerat frumentum, non ut glumam aut aristam gerat. Var. li. ij.	45. a
Gallinæ aphricanæ quas græci meleagridas uocant. Va. li. iij.	72. b
Glisco pro eo qd̄ est pinguesco & cresco. Co. li. ij. & lib. yij.	100. a
Glabreta aræ glabræ. i. q̄ herbis fruticibusq; nudæ sint i fūdo sato. co. li. ij.	101. b
Glumus terræ collectæ uerruca minor tumulo. Co. li. ij.	109. b
Garum apud Co. liquamen est ex pisce factum lib. yi.	162. b
Geliadium ipsum gelu & glacies. Col. lib. yij.	179. a
Gallinaria in mari ligustico insula. Co. li. yij.	185. a
Glocio is ē gallinæ uocis cū ouis incubituræ sūt. Dī ēt glocido. col. li. yij.	187. b
Gallina pumilis parua, nana. Col. lib. yij.	185. b
Guttur Co. li. yij. Gallinarum dixit abi receptaculum.	188. b
Gleconites conditura uini ex pluribus rebus. Co. li. xij.	243. a
Gemellar uasis genus. col. lib. xij.	250. b
Gummitio litura ex gummi. col. lib. xij.	251. b
Gleucinū oleū græce mustū hoc ē exp̄ssum aq̄ oliuæ p̄matur. col. li. xij.	252. a
Gumminare gummi obduci. Pal. lib. i.	282. a
Glycyrriza dulcis radix. Pa. lib. xi.	326. a
γίγαρτα uia excrementa. Pal. li. xij.	334. a
Gurgulio pars Gutturis p̄ quā pulmo attrahit & reddit spiritus.	54. b
Gemellæ uites ab uuis semp̄ geminij nomē habuerunt. Co.	113. a
Galactopota lac potantes. Co.	173. a
Grauedo grauior pituita et crassior inde grauedinosi. Co.	176. a
Glaucium herbæ genus syluestris & erraticæ niagram uocatur. alij paralio di cunt, nascitur. n. in afflatu maris, aut nitroso loco inde nomē sumpsit. nā glau cus ceruleum significat, qui color est maris. Col.	210. a
Genera caulium ex his locis complura fiebant. nam pompeianum procerius caule ab radice tenui intra folia crassescit. Gilbus color est.	304. a
H Emina mēsuræ genus sextarij dimidiū. Ca. de reru. et co. li. ulti.	11. b
Halex pisciū iestina et gñs piscis q̄ sola, aq̄ nutritur. Ca. de reru. 12. a	

<i>Hæredium</i> , duo iugera. Var. lib. primo.	45.4
<i>Heliotropium</i> herba solaris. Var. li. ij.	
<i>Hinnus</i> ab <i>hinniti</i> equorum mulus ex equo et asina, mulus vero ex equa & asino. Var. lib. ij. & Co. li. yi.	60.4
<i>Horreum</i> quo confertur omne rusticū instrumentū. Col. li. i.	92.4
<i>Halicastrum</i> in dictione farris.	102.4
<i>Hiena</i> agreste animal. Col. lib. ij.	102.4
<i>Hordeum</i> exasticum a sex ordinibus, idest cantherinum.	102.6
<i>Hordeum</i> disticum galaticum ponderis & candoris eximij.	119.4
<i>Humeri</i> , loci in media uite. Col. lib. iij.	
<i>Harundo</i> crassior canna gracilior apud Col. lib. iij. scribentem ut canna simili	141.6
lis harundo prodeat.	163.6
Herba sanguinalis, quam greci <i>το λυ γονον</i> uocant. Col. li. yi.	174.4
<i>Heritreus</i> color rufus. Col. li. yij.	219.4
<i>Hyemare</i> tempestate agitari significat apud Col. li. xi.	224.4
<i>Hyemis</i> initium. y. idus nouembris. Col. li. xi.	314.4
<i>Halica</i> farina hordeacea apud Pal. lib. yij.	335.6
<i>Hypomelides</i> poma sunt sorbo similia. Pal. li. xij.	210.4
<i>Hyacinthus</i> iris uel gladiolus dicitur similitudine foliorum. Pa. lib. i.	51.4
<i>Hypenemium</i> a uento natum uel factum. Var.	73.4
<i>Hara</i> stabulum dicitur tam de porcis q̄ de anibus. Var.	172.6
<i>Hyoscyamos</i> herba est.	
<i>Hypparchus</i> , <i>Eudoxus</i> , et <i>Meton</i> philosophi qui de sideribus & temporibus anni scripserunt.	206.4
<i>Haron</i> in Egipto uocant bulborum genus scyllæ proximū amplitudine. Co.	212.6
<i>Halesus</i> fluminis & mons non longe ab æthna. Co.	214.4
<i>Hyperionis</i> . i. solis. nam sol ab Hiperione progenitus fuit. Co.	219.4
<i>Halcyonij</i> ab halcyonibus anibus nomen traxere, quæ fœturæ añ brumam septem diebus, & totidem post mare sternitur. Col.	7.4
<i>Heluolū</i> color iter rufū et albū, uñ heluolæ uuae et heluolū uinū. Co.	3.6. & 4.4
I N fundibulū quo ī uasa liquores infunduntur. Ca. de re rust. 4.6.	
In cerniculum setaceū cribrum quo farina decutitur. Ca. de re rust. 4.6.	114.4
Infriare terendo inspergere. Ca. de re rust.	
<i>Iris</i> herba ē suauissimi odoris radicē habet raphano similē, quæ sternutamenta mouet, uulgo lilium cœruleum. Ca. de re rusti.	16.4
<i>Ischia</i> qui coxendice laborant. Ca. de re rusti.	17.6
Infer pro infra utitur. Ca. de re rustica.	21.4
In cerno farinam cribro decutio. Ca. de re rusti.	21.6
Intertrigo suffricationē significat. apud Ca. de re rusti.	24.4
Inharūdulatio ratio colligandi aliqd̄ harūdinibus. Var. li. i.	32.6
<i>Iugum</i> apud Var. lib. i. uocatur quod iuncti boves uno die exarare possunt, & apud Pal. lib. iij. in uinea iugum dicitur cum duabus aut pluribus perticis fixis alie	

fixis alia supra eas alligantur, in quibus uites coninnuntur. 28.b
 Iuger quod quadratos duos actus habeat, quod ita Var. diuidit li. i. actus continet. cxx.
 pedes in longitudinem, et totidem in latitudinem, scrupulus continet quoquo uersus pe-
 des. x. uersus pedes centum, haredium duo iugera, centuria centum iugera, saluus pstat
 ex quatuor centurijs, iuger. apud co. uero distinctius pes digitor. xxi. passus pe-
 dum. y. actus minimus latitudinis pedum quatuor longitudinis. cxx. clima quos
 quo uersus pedum e. lx. actus quadratus undique finitur pedibus. cxx. duo actus
 iuger efficiunt, et ab eo quod erat iunctum nomen iugeri usurpauit, actum provinciae
 beticae rustici agna uocant, idem. xxx. pedum latitudinem, et. clxxx. longitudinem por-
 ca dicunt. at galli cadetum appellant. aratores uero uocant candetum, in areis urba-
 nis spatium centum pedum. in agrestibus uero pedum. cl. semiuuger quoque arepene uo-
 cant. iuger est longitudo pedum. cxl. latitudo pedum. cxx. stadium habet passus. cxxv.
 centuria est modus ductorum iuger olim a centum iugeribus dicta. sed mos duplicata
 nomen retinuit scrupulum iuger centum pedum, quod efficiuntur ex. x. pedibus in quadrato, sex-
 tula iugeri continet quatuor scrupula. Sicilius sex scrupula, semuncia. xij. uncia
 xxij. sextas. xlij. quadras. lxxij. triens. xcy. quincunx. cxx semis. cxliij. septunx.
 clxyij. bes. cxcij. dodras. ccxyi. destans. ccxl. denx. cclxij. as. cclxxxij. iuge-
 rum. pedes. xxvij. millia. et. dccc. hoc est as in quo sunt scrupula. cclxxxvij. 28.b
 Italia a bubus, quod graeci tauros italus dixerunt, uel ab italo tauro profecto ab
 Hercule. Var. li. iij. 50.b
 Initia sacra Cereri. Var. li. iij. 65.a
 Illicium pro incitamento. apud Var. li. iij. 70.b
 Insula gallinaria in mari tusco secundum Italiam contra montes ligusticos. Va. li. iij. 72.b
 Iugarius, qui iugum imponit. Co. li. i. 91.b
 Importare porcas est inducere in agro, nam porcam elatam terram inter duos sul-
 cos a porrigendo dictam uocant. Co. li. ij. 103.a
 Inerticula uua quod iners habetur in tentandis nervis. Co. li. iij. 114.a
 Interordinium, spatium inter ordines, ut intercolumnium. Co. li. iij. 122.a
 Insolare est sole immittere, unde insolatur humus. Co. li. iij. 133.b
 Iumeta, quod nostrum labore uel onera subuectado uel arado iumet. Co. li. yi. 158.a
 Iaculus pro laqueo, ut iaculi quibus copulatur iumentum a iaciendo. Co. li. yi. 159.a
 Inuincare est, ad uncam reddere. Col. lib. yij. 174.b
 Ξουιτροφια piscina uel uinari ubi pisces nutriuntur. Co. li. xyij. 184.b
 Iteratio secunda pressura, tertiatio tertia. Co. li. xij. 205.a. 224.b
 Ιωωσείλιον nonnulli σμύγνιον appellant atrium olus. Ca. li. xi. 228.a
 Indigetur impersonaliter dictum a Pal. li. yij. 315.a
 Interuenium, spatium inter uenas. Pal. li. ix. 317.b
 Inuestis, puer imberbis. Pal. li. yij. 286.a
 Ιωωιον αργος quod et achaicum dicebatur Peloponnesi urbs, et uidetur ab
 egs dictum Var. 50.b
 In speciem litterae graecae. i. delta, uel laudae. 123.a
 Ingata uitis a ingo, quod ad similitudinem militaris ingi fiebat, nam duabus desis
 Col. Repertorium BB

- xīs* hastis tertia superligabatur. 127.b
- ἰχθυοτροφία* ictiotrophea, loca in quibus aluntur pisces. Co. 184.b
- Inversa meta similis hoc ē turbinicā hñs figurā, cuius una ps angusta ē, superior uero lata ē, meta inferiorē ptē latā hēt. supne uero tēdit in acutū. Co.
- Ithipballus proprie mēbrū uirile erectū dī. dñr & ithiphalli curatores bacchi, q̄i orchestra saltabāt, hoc noīe dictus ē priapus εὐρύαλλος gr̄ce. co. 209.a
- Iubar lumen est, & pro aurora ponitur. Co. 212.b
- Iolchos Thessaliae ciuitas. Co. 213.b
- Inficorū genere sunt calcidicae, chia, purpureae, chelidoniae, mariscæ, calistrutiae linia, libissæ, flanae, & reliqua. 214.a
- L** Abrū uinariū uas in qđ de leue defluit uinū. Ca. de re ru. 3.b
- Lora, siue lorea potōnis genus, quā gr̄ci deuteriā appellant. q̄ secūda riā dicta a lotis acinis, fitq; ex maceratis aq̄ uinaceis post mustū acinis expressum, & est oparioꝝ uinū. Ca. de re ru. & Var. li. ij. 7.b
- Lutare, luto obducere. apud Ca. de re rust. significat. 15.a
- Longurius peritica longior, & est id ligni quo in p̄sepe equi discernuntur. Var. li. i. & ij. 35.a
- Legarium legumen uoce gallicana dictum legumen a legendo q̄ uellatur & non subsecetur. Var. lib. ij. 41.b
- Leporariū nō tm̄ pro leporē septo. sed pro quocunq; loco ubi inclusa animalia pascuntur. Var. li. ij. 67.a
- Laticum est locus orbiculans in balneo in se recuruus, in quo elicitur sudor sicco calore dictū, q̄ eo lacones peculiariter uterentur. Co. li. i. 85.a
- Lirā eadē rustici uocāt porcā, cū sic aratū ē, ut inter duos latius distantes sulcos medius cumulus sicca sedē frumētis p̄beat, inde liratum. Co. li. ij. 99.b
- Latitia loci pro ubertate. Co. li. iij. 134.a
- Limes decumanus in senitiis et limitatione agroꝝ is uocatur q̄ agrū ab exitu eq̄ noctiali ad occasum eq̄ noctiale secat. Co. li. ij. 126.a
- Liniamētū filū q̄ ex lino uoluendo trahitur et ps ex p̄ano lineo. co. li. yi. 164.b
- Lacinia sunt i uestim̄to ptes extremae, et casurae p̄culati p̄cise decoris, cā. co. uero li. 8. iubet pecus a grotū distribui i lacinias. i. in particulas separari, ut facilius conualescant. 177.a
- Loculamenta loca distincta, uel capsulae in peristerio ubi columbi, siue aliae aues nidificare solent. Co. lib. yij. 190.a
- Lutescere, luto inquinari. Co. lib. yij. 196.b
- Lapsana holus syluestre triū folioꝝ accipit pro syluestri brassica. co. li. xi. 199.b
- Lapathos siue lapathiū herba ē a nostris mercurialis dicitur. Co. li. x. 213.b
- Lepidiū multū gingiō appellant, herba est omnibus nota, uulgus gicherium appellat. Co. li. xi. 226.b
- Libera dea uini apud Co. li. xij. 238.a
- Latere pro stercore apud Pal. li. i. unde latamen. 267.b
- Lupus ferrula nianubriata. Pa. li. i. 277.b

Lomentum panis ex faba. Pal. li. xi.	326. a
Larix arbor incendia non recipit. Pal. li. xij.	333. a
Lernei cancri. i. qui ex lerna palude exiit dum Hercules pedem momordit pur- gnantis, & in sydnus relatus est. Co.	213. a
Lubrica lapathos, quā ὤδ' ἰσολάτ' αὐθ' οὖν uocant. Co.	213. b
Ligula genus mensuræ. Co.	240. a
Ligusticum herba est in liguria montibus nascens. Co.	254. a
Laserpicia tñ a laserpicio, ē at laserpiciū silphiū, asam nūc uocat. Ca.	17. a
Lusitania pars est ulterioris Hispaniæ, quam nunc Portu galliā appellant dictā dicunt a lusu bacchi.	51. b
Lithostratus locus ē lapidibus stratus. si uerbū græcū proprie itēptari uolumus uer lithostrata ex puulis crustis ptabat, qb' solū pauimētū icrustabat. ua. 65. a	
Lentiscus arbor est, ex qua colligitur mastix, & est trisera.	
Lac cyrenaicum silphium est.	
Lageos herba leporaria.	
Lanata uua a lanugine, quæ eas uestit.	114. 4
Lentore tenacitatem & uiscositatē ex humore procedentem. nam lentus tenacē & uiscosum significat, unde & lentescō uerbum.	165. a
Lotos item arbor est peculiaris Aphricæ, cuius bacis uescuntur hoies. Co.	181. a
λαγοςτοφεία leporaria. Co.	184. b
Leucoia alba uiola.	199. b
Lyra, signum celeste.	210. a
Latrina est locus priuatarum sordium.	210. a
Lactucula quīs descēdat a lactuca, tñ alia ē herba lac hñs. Co.	210. a
Lactis gustus, q̄ p̄diat herba, de lepidio uidet̄ itelligere. cuius usus nō ē sine lacte. emūdat. n. cutē in facie, et lepras tollit, et cicatricum uulnera & nomen tra- hit a græco.	210. a
Lactucarū quoq; plura sunt genera, hoc est Cæcilia, Cappadoces, Tartesiaca, Paphia, siue Cypria, est etiam sessilis lactuca.	211. a
Lonus arbor ē dicata matri deū, ē et herba i phrigia laudatissima. Co.	212. a
M olile magnū haenū q̄ capiat culeos triginta. Ca. de re. ru.	4. a
Meta palearum uel fœni congeries est. siue strues in acutū tendēs. Ca to de re rusti.	11. b
Mitulus, genus piscis. Ca. de re rusti.	24. a
Miscipula, machina ad capiēdos mures. Va. li. i.	32. b
Modicū mēsurā. ccxl. iuger, & modica cēturia. cc. iuger.	37. a
Misella uua nigra apud Var. lib. ij.	46. b
Mulietus pecudū frans. Va. li. iij. greges ouīū cū aestiuatū abigūtur ductores ad publicanum profitentur, nesi inscriptum pecus pauperent lege censoria com- mittant mulietos.	51. b
Mina ouis. i. uentre glabro. Var. lib. iij.	53. a
Maiales porci ubi desinunt esse uerres. Va. li. iij.	57. a

Murena fluta sole torrefacta, q̄ fleſti nō poſſit. Var. li. iij. 59. a
Mellū dicitur cingulū circa collū ex corio firmo cū clauulis capitatis, q̄ itra ca-
pita inſuitur pellis mollis, ne noceat collo duriā ferri dictum, q̄ ex pellibus
melis fieret. Var. li. iij. 62. b
Mulctus & mulctura pro eodē. Var. li. iij. 63. a
Maſonomum genus lancis. Var. li. iij. 68. a
Meles taxus accipit̄ pro eo aīali, q̄ uulguſ appellat marturellū. Va. li. iij. 73. b
Meliturguſ, qui operatur circa mel. Var. li. iij. 76. a
Melittō, uel melitrophio, uel mellariū locus ubi ſunt aluearia. Va. li. iij. 76. a
Mediaſtinuſ, miniſter in ruſtico ope, q̄ ad reliquoꝝ mācipioꝝ nutum uiliſſima
quaq; officia exequatur. Co. li. i. 95. b
Mergæ ſurculæ, q̄bus acervi frugū ſiūt dictæ a mergis uolucris, ſunt et ſalces
Col. libro. ij. 110. b
Maleolus nouellus palmeſ inatus prioris aīni ſtagello a ſimilitudine rei q̄ i ea pte
q̄ deciditur ex uetere ſarmento prominēs utriq; malleoli ſpēm p̄bet. Co. li. 3. 116. b
Mergus ē propaginis curuatura, ubi ſupra terrā iuxta ſuū admiculū uitiſ curua-
tur, atq; ex alto ſcrobe ſubmerſe pducit̄ ad uacatē palū. Co. li. 4. pa. li. 12. 132. a
Materia palmeſ, q̄ de nouello naſci et i tenero alligatus depēdet. Co. li. 7. 132. b
Mus araneuſ græci οκυτόλαν ut alij dñt mi galē magnitudie muris, muſſelia
ſpecie, ore oblōgo, cauda gracili, uerſu dēñ quadruplici, abūdat in inſula bri-
tannia. Col. li. yi. 165. a
Malagma emplaſtrum ſignificat. Co. li. yi. 165. a
Mutulus ſine cornibus. Co. li. yij. 174. a
Mēngo morbuſ quā paſtores oſtiginē uocāt mortifera latētibz. Co. li. 8. 178. b
Matrices quæ pariunt & foetus generant. Col. li. yij. 181. b
Melantiū græce nigrum papauer ſic dictū latine git dicitur alio nomine mela-
ſpermon. i. nigrum ſemen, alij nigellam. Co. li. x. 212. a
Molochē agriā ibiſcū appellāt, q̄dā alij dñt malachiū. i. maluā. Co. li. x. 212. a
Mellatio uindemia mellis. Co. li. xi. 221. a
Mundus muliebris ornatus græce coſmoſ. Co. li. xi. 233. a
Maſſicā cœpā, ruſtica unionē uocāt. Co. li. xij. 235. b
Mella, mellis reſiduum. Co. lib. xij. 236. a
Muſtum lixiuum anteq̄ prælo p̄ſſum ſit, q̄ in lacū muſti fluxerit, uel q̄ de lacu
fluit anteq̄ nimium calcetur uia. Co. li. xij. 241. b
Muſtū tortiū, qd̄ poſt primā preſſuram exprimitur. Co. li. xij. 243. a
Melimeli liquor ex cōditura mellis & mali cidonei. Co. li. xij. 247. a
Meliſphillū herbæ genus quidā apiāſtrū dicūt. Pal. li. i. 275. b
Mureuſ coloris ſpecies. Pal. li. iij. 304. b
Miliariū uas altū & anguſtū. Pa. li. i. 307. b
Morticine, oues quæ morbo pereunt. Va. li. iij. 62. a
Mutica ſpica, quæ non habet ariſtam. Va. li. iij. 45. b
Miſcelli in diſtione colūbi. Var. li. iij. 60. b

Medipontus instrumentum funarium. Ca.	4. b
Myrtum coniugulum. i. coniugalem a coniugijs.	3. b
Matellione a matella derivari sentimus, & est aquarii uas. Ca.	3. b
Medica herba est, q̄ & melica, q̄ semel sata decē annis durat. Va.	39. a
Melimela per simplex l'utrobq; sunt poma mustea a μέλι idest mel & μήλον malum, q̄ mellis saporem habeat.	47. b
Melanthius apud Homerum in odyssea seruus Vlyssis, quē hērus fēda mor- te reuersus domum affecit. Var.	54. b
Matrices dicuntur, q̄ ad progenerādū aptæ sunt, & plerūq; ī gallinis. Va.	58. a
Menalippa, mulier q̄ cū Booto filio ad metapōtum delata fuit ubi sacram adē habuit. Varro.	57. b
Mulsum, uinum cum melle mistum. Va.	75. b
Mecessa pro mihi quæ cessit, & secundum priscos locutus est, qui tibe, & sibe, et me pro tibi, sibi, et mihi dicebant. Va.	75. b
μέλι τρώας melitonas apiaria ubi apes nutriuntur. Co.	76. a
Murgentinam, alij pompeanam uocant. Co.	114. a
Magdews laserpicij genus est, alij dicunt caulē laserpicij eē. Co.	165. a
Munerarij dicebantur, qui munera. i. ludos populo dabant. Co.	173. b
Mendesius possessiuum a ciuitate Aegyptij.	178. a
Muria sal cū aqua medicatū & induratū, de qua plura. Co.	182. a
Meleagrides, & numidicæ, et guttæ, aues sunt q̄ et Afræ dicuntur. Co.	185. a
Melicæ gallinæ. q̄ in media id genus auin corpore amplissimo fiat. l. litera pro d. substituta, Media regio orientis, ex qua Medi q̄ & psæ dñr. Co.	185. a
Melanuriū piscis a nigra cauda nomen trahens. Co.	195. b
Murena tartesia a Tarteso oppido Hispaniæ sito quondam inter betis ostia, quo nomine etiam fluius ipse appellabatur.	196. b
Mustela, piscis in lacu brigantino thetiæ generatus. Co.	196. b
Mandragoræ duo sunt genera, candidus qui & mas, & niger qui fœmina exi- stimatur, ferunt mala auellandarum nucum magnitudine. Co.	209. a
Marræ bidentes & sarcula rustica sunt instrumenta. Co.	210. a
Mauricini populi prope marfos. Co.	210. b
Mater aricia porri, ex Aricia porrum erat capitatum, & genus caulium, non excelsius filio numerosius quoq; atq; tenuius. Co.	210. b
Mea quā generat Tartesi litore gades tartesiā lactucā suā dicit, qm̄ Columella rū familia ex municipio gaditano pro genita erat.	211. a
Miris siue smiriſa, uel ut alij mira herba est simillima cicutæ caule, folijsq; & flore minor. Col.	
Mucrone graphio, quo in pugillaribus careis scribimus. Co.	212. a
N Vbilarin locus ad aream quo propter nubes conferuntur frumenta se- mitrita. Var. li. i.	29. b
Nonalis ubi satū fuit añq̄ secūda aratiōe renouetur. Va. li. ij.	40. b
Nesfrendes porci dicuntur amisso nomine lactantis ab eo q̄ non fabā frendere	

possint. i. frangere. Var. li. iij.	16. b
Numella genus uinculi lignei ad discutiendos noxios paratum quo collum, et pedes immittuntur. Var. li. iij.	62. b
Natrix genus natantis serpentis. Col. li. i.	91. a
Nexus obligatio qdā, q̄ p̄as & librā fiebat. Co. li. i.	89. b
Nux græca in dictione amigdala. Co. lib. y.	155. a
νεοστροφειον ubi nutriuntur anates. Co. li. yij.	195. a
Napina & rapina pro semete napo & rapo.	223. a
Nux tarentina teneri corticis. Pa. li. ij.	282. a
Nasiterna uas aquale est.	4. a
Noxis p̄stari. i. pro dāno satisfacere, & emptorē indēnē facere. Var.	58. a
Nasturciū herba dicta, q̄ nasum torquere faciat. Var.	73. b
Χηνοβοσκιον locus ad alendas aues. Va.	73. a
Nomades pastores dicuntur, quorū uita omnis in pascendis gregibus habetur a græco νέμω idest pasco.	173. b
Nepita herba est, quæ græce καλαμιθι.	178. b
Naxius ardor Bachi corōæ sydus significat. nā (ut ferūt poeta) in insula Dia, q̄ postea naxos dicta fuit, relicta Ariadne a Theseo nuptias cū bacho fecit, donataq; corona inter sydera relata fuit. Co.	209. b
Nepa scorpini significat, alij dicūt cancrum.	209. b
Nocturnas uolucres noctuam, bubonē, ululā, uespertilionē, solebāt. n. p̄isci ad hortos tuendos noctuā penmis patentibus figere. Co.	213. b
Nomophylaces dicuntur le gum custodes & seruatores νεφύλου hoc ē a lege & τοῦ φύλακος quod est custos.	233. b
O Letas, oleitas, oliutas olei, mellatio mellis, messis frugum, uindemia uini est. Ca. de re rust.	12. b
Occo ab occidendo, occare ē glebas cōminuere. Va. li. ij.	40. b
Ocinū q̄ cito ueniat. i. pabuli segete uiride sectū aq̄ gerat siliq̄s. Var. li. ij.	41. a
Oporoteca fructuum repositorium. Va. li. iij.	47. b
Opimi bones altilis. i. ad publica sacrificia saginati. Va. li. iij.	52. a
Ornithon uolucrū oīum generis uinariū. Var. li. ij.	67. a
Ornithoboscion, ubi pascuntur gallinæ. Va. li. iij.	61. b
Ortus aquilæ septimo idus decembris. Co. li. ij.	104. a
Ortus arcturi circa. 6. & 5. Kal. martias. Co. li. ij.	104. b
Oculus articulus & gēma, idem Col. li. iij.	125. b
Ouiaricum pecus de oue dictum. Co. li. yij.	179. a
Orix origis fera ē, q̄ p̄nno pilo, hoc ē ad caput uerso uestitur, oriētēq; caniculā p̄metur & adorat, nasciturq; p̄cipue in gentulia. Co. li. ix.	197. b
Orthocissos recta hædera, & rigēs, q̄ sola sine adminiculo stat. co. li. xi.	219. b
Olus attriplicis græci νεοφαις. Col. li. xi.	228. b
Oxigala condimenti genus. Co. li. xij.	235. a
Olea calabrica, quā qdā olea stellū uocāt diminutiū ab oleastro. co. li. xij.	249. b

Oleum lixinii. quod ante pressurā fuit. Co. li. xij.	250. b
Oximelli mixtura ex aceto & melle. Col. li. xij.	253. b
Oxigarum acetum garo mixtū. Co. li. xij.	253. b
Opon ārenaycū succus sylphij. Pa. li. iij.	
Oenantes flos uini. Pa. li. yij.	313. b
Onychina pruna, q̄ colorē hñt onycos. i. unguis. Co. li. xij.	235. b
Oscylla, tubercula illa in frumento et in legumminibus ex quibus produciuntur ger men. Colu. lib. ij.	86. b
Ostū, qđ ex uno factō olei reficiatur. Var.	39. b
Oletum, confitus olea locus. Co.	car. i. b
Obstrigilandi cā detrahēdi, mordendi, repugnandi.	30. a
Olyssippo Lusitaniae urbs, q̄ nostris tpibus Vlisbona dicitur. Var.	51. b
Ogyges conditor & rex Thebarum, sub quo diluvium factum est.	65. a
Oleagina ad similitudinem oliuae.	114. a
ὄϊστος oestrū asilū latini uocāt, siue tabanū, nōnunq̄ furorē significat. †	205. b
Ora leonis, herbā significat leoninam in montibus nascentem, cuius flores cum emittuntur similes sunt ori leonino aperto.	210. a
Oscitat leo, aperitur leonis flos.	212. a
Oximum herba est, quam basilicon alij appellant, mendose, quidam ocimum pronunciant a uerbo graeco ὄξω.	213. a
Ornithia ab auibus tractum nomē, appellātq; tps, qđ est septuagesimo die post brumam ab aduentu auium, tunc. n. adueniunt hirundines ciconiae coturni ces, & reliquae aues aduenae.	219. a
Omphacomelli immaturo melli. Co.	318. b
Olea conditanea, quae condiri potest apte.	39. b
P Assus tenditur in quinq; pedes in dictione iugeri. Ca. de re. ru.	
Porrina, ut rapina, & napina pro loco ubi est porrorum semenis. Cato de re rustica.	10. b
Pullus & pecudum, uolucrum, arborum est. Ca. de re rusti.	11. a
Pollin, excrementum inter fursurem & farinam. Ca. de re. rust.	14. b
Polenta genus liquidioris placeta. Ca. de re rust.	36. a
Polucere, reddere, uerbum, sacrificare est libamenta de is. Cato de re rustica.	18. a
Pollinctor, curator pistrini, qui pollinario cribro pollinem excutit. Cato de re rustica.	19. a
Partiarius is est, qui fundo quem colit partem dimidiam frugum aufert. Cato de re rustica.	19. a
Pocillum a poculo diminutiuum. Ca. de re ru.	22. a
Primatus, primus locus. Var. li. i.	32. a
Pedamentum & iugum pro palo. apud Var. li. i.	32. b
Porca dicitur, quae est inter duos sulcos elata terra, q̄ ea seges frumentum porri git. Var. li. ij.	40. b

Pampinare est pampinos decerpere. Var. li. ij.	41. a
Poma q̄ indigeant potu. Var. li. ij.	41. a
Porculatio. porcorū nutritus, porculator porcorū nutritor. Va. li. ij.	56. b
Porci delici a māma primū depulsi, neq̄ iā lactātes, q̄ a partu decimo die puri ab eo appellantur, ab antiquis sacres. q̄ tum ad sacrificia idonei primum dis- cuntur. Var. lib. iij.	56. b
Porcus nom̄ gr̄cū antiquū, sed obscuratū, qđ nūc uocāt chirō. Var. li. iij.	56. b
Peroriga appellatur q̄sq̄ equū admittit. Var. li. iij.	60. b
Palea pro pelle dependēte ex aīaliū gutture. Var. li. iij.	71. b
Phalarides, aues aquaticæ. Var. lib. iij.	64. a
Propolis. q. suburbanum. i. q̄ apes ante introitus foramen construunt, ac om- nes frigoris & caloris iniurias propulsant. Va. li. iij.	77. a
Proscindere terram cū primum aratur, cum iterum effringere dicunt, cū itera- tur offringere uocant, tertio cū arāt iāto semine boues lirare dicuntur nō nil- li postea persatores occare solent. Var. li. iij.	40. b
Pūsana decorticatū hordeū, uel hordei succus, siue aqua. Co. li. ij.	100. b
Pāpinariū sarmētū, qđ legitur ex uite ferāli i duro trūco natū. Co. li. iij.	119. a
Pastinatio ē fossio agri ad putādas uites. Co. li. iij.	122. a
Pastinū ferramētū bifurcū plātādis malleolis aptū, uñ repastinare uineæ uete- res dictæ, quæ refodiebātur hæc propria appellatio restibilis uineti, sed nūc q̄ quid' emoti soli uineis p̄paratur, repastinatū uocāt. Co. li. iij.	125. a
Progemmare uites dñr qñ oculos promittūt. Col. li. iij.	130. b
Pedare est uiuibus pedamēta affigere, inde pedatio, & pedamina materia pe- dandi uiuibus apta. Col. li. iij.	131. a
Pes in dictione ingeri. Co. li. y.	142. b
Passus in dictione ingeri. Col. li. y.	123. b
Palmes pampinariū infructuosus, qui ex duro prouenit. Co. li. y.	151. b
Palmes fructuarius, qui ex anniculi palmite procreatur. Co. li. y.	151. b
Præcipites palmites, q̄ de annotinis uirgis enati i duro alligātur. co. li. y.	152. a
Pilea est columna stans. Co. li. y.	153. b
Pituita est catarrus, sed in gallinis, quæ alba pellicula extremam linguam ue- stit. Co. li. yi. & ultimo.	162. b
Papula, tubercula illa dicūtur. quæ in scabiæ tument, quibus cutis exasperatur leniterq; roditur. Co. li. yi.	170. a
Pecus arquatum cui uirent oculi, quem morbum auriginem, alij regium appel- lant. Co. lib. yij.	178. b
Paliurus herba ē spinosa et aspera ab alijs, acus palaris ab alijs acer domesticū uocat. itē arbor ē aphricæ suauē fructū faciēs, q̄ uina cōmēdātur. co. li. 7. 181. a	181. a
Pulicosa canis, pulicibus onusta. Co. li. yij.	162. b
Pyctes, pugillator. Co. li. yij.	185. a
Pullicies. & pullatio pro ipsa pullorum prole et foetura. Co. li. yij.	191. a
Pisces cubātes, siue prostrati sunt, quales rōbi, soleæ, passerres. Col. li. yij.	196. b

Φαγέδαινα	morbus ulcerosus usq; ad ossa celeriter carnē depascēs cum adu- sione, emititq; fœtēntem saniem, et puto hoc in loco esse malum, quod in in- mentis uermen appellant. Co. li. ix.	205.
Pelamides	a luto nomen traxerunt, quæ primū cordilæ, mox cum annū excessse re, tūm uocantur. Co. li. iij.	197. a
Panace	centaurea dicitur. Col. lib. x.	210. a
Palata uinea	a palando, uñ palo as uerbū. Col. li. xi.	218. a
Prodromi	uñ aqlones pcedētes. iij. diebus caniculā pcursores. co. li. xi.	221. a
Pulueratio	a rusticis occasio cū omnis gleba in uineis effringitur & resoluitur in puluerē, inde puluero as. Co. li. xi.	222. a
Palmare	materias. i. palmites, q de nouello nascuntur alligare. Co. li. xi.	225. a
Puluinus	lyræ edita terra. Co. li. xi.	227. a
Pix brutia	secundus est liquor crassior defluens a ligno igni circundato, q rursus in cortinas aneas pfecta spissatur & coagulatur. Co. li. xij.	240. b
Penicillum	diminutiuum a peniculo, peniculū uero a pene. i. cauda derivatur Co. lib. xij.	238. b
Pix corticata	apud allobroges, nemeturica uero i liguria pfiatur. co. li. xij.	240. b
Pelliculare	alligatis pelliculis obturare. Co. li. xij.	144. b
Pausia	genus oliuæ. Co. li. xij.	248. a
Planca	tabula plana ex robore facta. Pal. li. i.	271. a
Πόρος οκορίσσαι	animalia, quæ nocent hortis. Pa. li. i.	275. a
Porrus	masculini generis in plurali porrorū. Pal. li. iij.	291. a
Propomata	olei genus. Pal. li. iij.	295. b
Pusca	uinum in torculari aquatum, quod apud alios lora dicitur, alias genus potionis ex aqua & aceto. Pal. lib. iij.	301. a
Pergula	in uineis topiarium opus significat. Pal. li. xij.	329. a
Posterare	pro differre usurpat. Pa. li. xij.	320. a
Passum	genus liquoris, qd ex uua passa cogitur. Pa. li. xi.	327. a
Palma bigemmis	gemmarum duarum. Co. li. y.	
Pedicinus	idem, quod pes dicitur & petiolus.	
Polubrum	uas aquatile. Ca.	5. b
Patibulum	fera est lignea. Ca.	13. a
Piso & piso	in eodē sensu est in pila tundere, uel molis frangere. Ca.	
Præcidanea	a pcedēdo quēadmodū succidanea a succidēdo, & erat hostia pro frugibus. Ca.	18. b
Πολύτρονον	multi frumenti. Var.	28. b
Pinacotheca	ubi tabulæ reponuntur. Va.	28. b
Paeminosa	mali odoris a pedore dicta.	
Peristylus	locus columnis clausus. Va.	
Φυτῶν	historias. plantatum historias. Sic φυτικῶν αἰτιῶν. i. causarū natu- raliū. sic. n Theophrastus libros scripsit. Va.	31. a
Πολυάγνος	polyarnas multorum agnorum. Var.	

πολυβούτας	polybutas multorum bouum. Var.	
πολυμήλας	Polymelas multarum ouium. Var.	294
Parilia festa	Palis pastore deæ, ubi notādū q̄ i hac dictione mutatur. l. i. r. 50. b	
Palmulæ cariotæ	ἐκ τοῦ κεφαλῆς, i. a capite, sūt. n. palmulæ iniq̄ capiū. 52. b	
Petafo est coxa	cum crure porcino salita. Var.	56. b
Post principia,	locus in castris a principibus militibus dictus.	68. a
Palmaria insula	in mari tyrrheno.	69. b
περί πτερας ματα	sūt uela, q̄ extendūtur ad occludēdū et ornādū locū. 70. a	
Precia.	quæ cito maturescit, quasi præcoqua. Co.	113. b
Psitia etiam uites	sunt. Co.	114. a
Provincia dicebatur	extra italiā, et iō legimus uineas provinciales et italicas. 123. b	
Pandatharia insula	in putzolano sinu. Var.	
περί εἰσορροφίου	colūbarium. Var.	32. a
Polentia, urbs iuxta	alpes diuidentes Italiam a Gallia. Co.	173. b
Porrūm tarentinum,	alio nomine sectium dicitur. Co.	192. b
Pectunculus.	piscis per diminutionem a pectine. Co.	195. b
Polycrates, Phragmon,	et Ageladas statuarij fuere generosi.	209. a
Pestum, oppidum	in campania rosis generosum.	209. a
Pectita picipiū	uidetur noue dcm a pecto, alij legunt percita. Co.	210. a
Pelusiaci. i. ægyptij,	χίθι potus, quæ ex fruge excogitauit, Ægyptus ab alijs cer	
uesia dicitur. Co.		210. b
Pompeij & herculanum	oppida campaniæ. Col.	210. b
Porator helles,	aries qui in cælum deputatus est.	211. a
Pegasidum musarum,	a pegaso equo.	212. a
Pyrois, gemma	a colore igneo dicta.	212. b
Pulex uermiculus	herbis infestus, & p̄cipue brassicis. Co.	213. a
Protocomos primū	comātes, alij prototomos legūt. i. priæ sectiois. Co.	213. b
Pix naricia	ab insula maris ionij dicta.	214. a
Persica pegrina	fuerunt, ut pote q̄ ab Persia ad nostrāsierint. Co.	214. a
Procyon stella,	q̄ añ canis dicitur latine.	221. b

Qualus genus uasis uimineus, per quod uinum guttatim defluit cum calcatur uua a colando. Ca. de re ru.

Quadratal, uasis genus pedem quadratum habens, & p̄tinet. xlyij. sextarios. Ca. de re ru. 12. a

Quatuor tēporū anni principia dies primus ueris ē i aq̄rio, æstatis i tauro. autūnū in leone, hyemis in scorpiōe, adeo ut dies. xxij. aquarij sit ueris initiū, sic reliquorū signorū quatuor añi t̄pūm scdm̄ alios, qđ magis probatur primi dies uerni t̄pis extāt ad. 7. id. fe. æstiuū ad. 7. id. maij. autūnalis ad. 3. id. sextilis. hiberni ad. 3. id. nouēbris. Ver dies habet. 91. Aestas dies habet. 94. Autumnus 92. Hyems. 88. & de ijs latius apud Var. li. ij. 40. a

Querquedula & phalerides aquatice aues. 74. a

- R** Vtrum, quo quid ruitur, inde rutabulum instrumentum, quorum
ficiuntur in prouedo igne panis coquedi gratia. ca. de reru. 4. a
- Runcare mâibus herbas noxias frugibus extirpare. ca. de reru. 8. a
- Ricinus, genus uermis canes acius atq; boues infestâs. ca. de reru. 15. a
- Ridica. robustû pedamētû. i. palus crassior scissus. Va. li. i. 32. b
- Rûpi traduces arbores, in quas uites ex arboribus traducuntur. Va. li. i. 32. b
- Resibilis terra q̄ quot annis obfita sit. Var. li. ij. 44. b
- Rota syluestris capra. Var. li. iij. 50. a
- Rumis, siue ruma māmā, unde dicuntur agni lactentes subrumi, Rumia p̄tere a
dea in rumis sacello pastores sacrificabant lacte pro uino. Va. li. iij. 55. a
- Reditus uel redditus, prouectus prouēns, idē Col. li. ij. 97. a
- Robus genus tritici. Co. li. ij. 84. a
- Recrasinare & posterare pro protrahere leges, apud Co. lib. ij. 110. b
- Refex, malleolus qui ad solem refecatur. Co. li. iij. 119. b
- Racemarij surculi sunt, aut steriles, aut minus feraces. Co. li. iij. 125. a
- Rûpotinû, genus arbusi gallici, inde rûpotinetû locus. Co. li. y. 152. a
- Rana morbus bouillæ linguæ. Co. li. yi. 162. b
- Ruscû uirgultû uel rubus, q̄ lōgiore flagello extēditur in lōgû uñ uites ligātur,
qdā accipiunt pro frutice, ex q̄ nūc scopæ fiūt, q̄ folia hēt myrto similia, sed ac
tiora accipitur et pro folliculo pēdētē i tyrsō, i q̄ claudatur semē. co. li. yij. 182. b
- Remittere librû, corticem reijcere. Co. li. xi. 220. a
- Radix syriaca ignota hac tēpestate, aut eadē ē radix barbarica. co. li. xi. 226. b
- Rasis genus crudæ picis. Co. li. xij. 239. b
- Radula aradendo ostimentum. Co. li. xij. 138. a
- Regulæ uas i Trapeto uñ oleû, aut uinum stringēdo defluit. co. li. xij. 152. a
- Rûco, rusticû istrû arûcâdo. i. stirpâdo, uulgo ita appellatur. pa. li. i. 277. a
- Rododaphnes, rosa laurina, quā nereû uocant. Pa. li. i. 275. a
- Rudis et rudicula aliqñ pōitur pro rutabulo. siue ipolita uirga. Pa. li. yi. 309. a
- Reijcula, oues quæ etate uel morbo graues reijciuntur. Ca. 1. b
- Rufimaceria & pompeij sunt oppida campaniæ. Ca. 7. a
- Rudetum, terra, q̄ prius rudis fuerat & inculta, tñ aut arata. Ca. 86. a
- Recipere est excipere ad usum suum & reseruare, inde recipitur domino. i. refer
uatur domino. Ca. 21. a
- Robigo, deus quē putabāt robiginē auertere, ē at rubigo morb⁹ segetû. ua. 27. a
- Rustica uinalia quartodecimo Kalen. septembris celebrabant, quo die primum
uinum in urbem deferebant. Var. 27. a
- Rosea cāpus appellat i agro reatino q̄ i eo arua rore hñida sp̄serātur. Va. 32. a
- Repasinari ager is dicitur, cuius natura fodiendo mutatur de origine & signis
ficato eiusdem plura. Columella. Var. 42. b.
- Retrimentû a reterēdo deduci uidetur. Plinius recremētû dicit. 48. a
- Rani coloris appellantur, qui sunt inter flauos & casios. 53. a

Rhynton, tarēānus nugator uilissimus i agēdis pāpua fabulis, ad quē alludū
 tā Varro q̄ Colu. apud quos mō legitur Mython, mō Rhynton. 67.a
 Rhetica, a rhetis populis alpinum. 114.a
 Rubellæ nomētanae dñr a rubente materia. 114.b
 Retorridū dicitur, quod intēpestiue amissis uiribus a sole torretur. 121.a
 Rustica gallinae sunt agrestes rostro lōgiore, q̄ p̄ diminutionem rusticulae quoq;
 appellantur. Col. 184.b
 Ripheimontes septentrionales. 210.a
 Resoluit nexus. i. peperit & enixa est. Co. 210.b
 Robigo deo ut auerteret rubiginē catulo ab uberibus tracto faciebāt. Col. 213.b
 Cannū crudū & imotū solū agricolae appellitant. Co. li. ij. 82.b
Simulus aquarius pro situla hoc ē uasē ad hauriēdā aquā accommodo. ca.
 de rerusti. 3.b
 Scabillū a scanno diminutū pro sella. Ca. de re ru. 4.a
 Scutiscū uasis gñs, et uī ex figura græca deriuari a scutra. Ca. de re ru. 3.b. 4.a
 Scarifico significat paululū corticē incidere. Ca. de re ru. 11.a
 Sculponea calcei genus ex lana confectum. Ca. de re ru. 12.a
 Schenus arbor lentisci. Ca. de re ru. 16.a
 Strāguria difficultas urinæ. Ca. de re ru. qñ guttatim mittuntur. 17.b
 Solitaurilia, tauri, arietis, uerris imolationē significat. Ca. de re ru. 19.b
 Sustillum, morbus guttatim mingentis. Ca. de re rust. 22.b
 Suppurare, hoc est subter pus contrahere, inde purulētū. Ca. de re ru. 22.b
 Stolones, pullinā in arborē radicibus. Var. li. i. 28.b
 Scripulus in dictione iugeri. Var. li. i. 28.b
 Saltus in dictione iugeri. Var. li. i. 29.a
 Stilobata, columnæ aquam fundentes. Var. li. i. 34.b
 Seges quod aratum satum est. Var. li. ij. 40.a
 Sulcus uocatur, qua aratrū uomere lacunā stirā fecit. Va. li. ij. 40.b
 Sicilire pratū est falcibus p̄sectari a sectione. Var. li. ij. 45.b
 Stramētū a stādo, ut stramē, siue a stratu q̄ substernat pecori nō edatur. 45.b
 Spicilegiū, spicarū collectio. Var. li. ij. 46.b
 Scapus id ē q̄ semina q̄rūdā herbarū depēdēt, et qd̄ adēptis uuarū granis relinq̄
 Va. li. ij. et robur siue stipēs fruticibus, & hys herbis q̄ per hyemem non demo
 riuntur. Co. lib. ix. 46.b
 Sirus, spelūca subterranea granaria. Var. lib. iij. 47.a
 Subrumi, q̄ alterius q̄ mīis māmā sugūt q̄ oli māmā rumis dicere. u. l. 3. 52.a
 Sacres porci dicuntur, q̄ puri ad sacrificiū. i. primum a lacte depulsi imolātur
 supra in dictione porci. Var. li. iij. 52.a
 Scrophæ cognominis origo. Var. lib. iij. 55.b
 Sus a græca uoce. dicitur. n. a græcis uis, a ueteribus uero dicebatur θυσις a θυο
 q̄ significat sacrifico, ab suillo. n. pecoris genere imolādo initium primū sum
 ptū uidetur. Var. lib. iij. 56.a

Succida lana, recens tonsa a sudore dicta. Var. li. iij.	64. a
Secluforiū auariū ubi aues ab auario secluduntur. Var. li. iij.	65. b
Saxatiles columbi, agrestes, q̄ in turribus nidificant. Va. li. iij.	70. a
Signinū opus fractis testis addita calce p̄ficiēbatur. Co. li. i.	92. a
Siccaneum pro sicco. Co. li. ij.	97. a
Subsulcus, sulcus sine ullo intervallo. Co. li. ij.	100. a
Sedum uel tabuli sessum herba est, q̄ in tectis nascitur, mod. rni semper uiuū ap- pellant, alio nomine anagorum. Co. li. ij.	102. a
Septimontialis ultima satio fabae a sacrificijs. Co. li. ij.	103. b
Stria a stringendo fasceolus, uel strige ordines rex inter se continuata collocata rum, q̄ una sint constricta. Co. li. ij.	110. a
Siphones, fistulae omnes dicuntur. Co. li. iij.	118. b
Spadones surculi, qui nihil attulerint. Co. li. iij.	119. b
Sagitta supior p̄s malleoli hāc rustici uocāt nouissimā p̄tē surculi, siue q̄ longius recessit a matre, & q̄ emicuit, atq̄ prosiluit, seu quia cacumine attenuata p̄- dicti teli speciem gerit. Co. li. iij.	120. b
Stammē dī id, q̄ fulcīt uitis, ut pali et pedamēta, et q̄cqd pro monumēto accedit, et statumia a statu arborū dñr, p̄ut crescēdo statū accipiūt rami. Co. li. 4. 128. a	128. a
Suffrago soboles innata ad ima crura uitiū. Col. lib. iij.	135. b
Itē suffragines nodi sub crura, q̄bus pedis uersura p̄stat. Co. li. yi.	138. a
Stella, coniunctio capium uitis. Co. li. iij.	138. a
Silet uinea, herbae, arbores, q̄ nōdū germināt, et silet luna quae nondum lucet. Col. lib. iij.	138. a
Scobes, scobs, & scobis pro sectura tabularū. Co. li. iij.	140. a
Salix triplex, graeca, gallica, sabina, quā amerinam uocant graeca flauī coloris, et obsoletū, purpurei, & tenuissimi uiminis, amerina salix gracilem uirgam et rutilam gerit. Co. li. iij.	140. b
Salix pericalis, quae peracis, hoc est pedamentis apta sit, uiminalis uero, q̄ uin- ciendis uitis, & alijs rebus nascitur. Co. li. iij.	141. a
Siliq̄ graeca graece ceration dicit̄ gñs arboris et pomi p̄dulcis. Co. li. y.	155. a
Scilla & squilla cepis genus syluestris. Co. li. yi.	161. a
Simonianū trifoliū, graeci asphaltiō uocāt, a nobis acutū trifoliū. Co. li. yi.	165. a
Saluio idē uidetur eē qd saluio. i. sanū facio. Co. li. yi.	167. a
Sātonica herba gñs absynthij amarissimi a santōib⁹ galliae pplis. Co. li. yi.	167. a
Strigosū cuius corpus fame, aut aliqua uitij cā astringitur. Co. li. yi.	171. b
Subrumo pro lacto, usurpatur a Col. lib. yij.	176. b
Scabrics pro scabie. Co. lib. yij.	177. b
Sacer ignis, quā pusulā uocant pastores, inde ouis pusulosa. Col. li. yij.	178. a
Scdā, folliculi sunt p̄nētes foetū i matris utero cū mēstruis. Co. lib. yij.	180. a
Scandula parua tabella, hoc est in paruas laminas scissae e ligno, quibus tecta tegiuntur. Co. lib. yij.	186. b
Sardinia piscis genus, qd uulgus sardellā uocat. Co. li. yij.	197. a

Sarrana uiole pupurea, unde sarrana purpura. Col. li. ix.	199. b
Solstitiū æstiuū circa octauā partem cancri. Co. li. ix.	205. b
Sylua barbarica. i. p̄semie a recte glātib⁹, et ceteris semib⁹ p̄ferit. co. li. xi. 224. a	
Solstitiū brūale, ut placet hipparco. xxi. kal. Ianna. ut caldeis. ix. co. li. ii. 224. b	
Sentis canis κην ὀσβατον. Co. li. xi.	225. b
Sphōgias agricolæ uocant corrudæ radículas inter se iplicatas. co. lib. xi. 228. b	
Scorpiones asparagi spinæ. Co. lib. xi.	229. a
Sedentaria opera, quæ ab artificibus sedendo fiunt. Co. li. xi.	233. b
Sampsæ, os oliuæ. Co. li. xij.	248. a
Summittere finire coalescere. Co. li. ultimo.	257. a
Statumino, statuminibus firmo, & supra impono, atq; intego. Pa. li. i.	268. b
Scutulæ scutis itertextæ, qđ opus a gallis ē institutū p̄. Pal. li. i.	268. b
Staphisagria pastinaca agrestis. Pal. li. i.	271. b
Sepum, siue sebū, siue seuum. tribus. n. modis dicitur pinguedo, ex qua fiunt cā delæ. Pal. lib. i. inde sebo uerbū. Co. li. ij.	274. a
Serratura locus serra apertus. Pa. li. iij.	288. a
Sales pro condimento in plurali usurpat. Pal. li. yi.	310. a
Sisamū milio simile seritur septēbri mēse usq; ad idus octobris. Pa. li. xi.	320. a
Sexenniū ut decēniū usurpat. Pal. li. xij.	332. b
Suniculus genus uasi. Pa. li. xij.	334. a
Singultiēs gallina, quæ singulum pullos illestat, est. n. singulus ipsa illestantis gallinæ cloacatio. Co. li. yij.	170. b
Sextarius mensuræ genus.	10. b
Sublinat. i. pinuat. Ca.	5. a
Spira dicitur basis columna unius tori, & genus operis pistorij, & funis nauis cus in orbem conuolutus. Ca.	13. b
Serta campanica herba est, quam mellilotum dicimus. Ca.	16. a
Strues dicebantur extructiones rerum, & proprie in sacrificijs. Ca.	18. b
Subscudes appellantur tabellæ, quibus tabulæ inter se p̄figuntur, qđ quo inmitun tur succiditur Pacuius. nec ulla subscus cohibet compagē. Ca.	6. a
Seffarius porcus, qui gregē præcedens ducit. Ca.	21. b
Semēniæ feriæ, a semente, quod sationis cā susceptæ.	28. a
Sybaris ciuitas Calabria.	32. a
Sacer mōs ē ut opinamur sacrū p̄mōtoriū, qđ nūc appellāt caput. S. Vicētiij. ua.	
Succida a suis edēdis dicta, succidiū expomit Nonius pro larido.	55. b
Salire proprie dñr aīalia rōne carētia qñ sceminā mares iēnt ab eo fit salior, iūn lata salitur onis et salax saleis nomē hoc ē in coitu fortis & creber. Va.	53. b
Salaria uia dicta, qm̄ ex illa sal in sabinos portari p̄sueuerat. Var.	65. a
Sine afflatu. i. sine nota aspirationis.	65. a
Sectores dicti sunt, qui specie lucris sui secuti bona condemnatoꝝ auktionabantur proq; his pecunias pensitabant singulis, sectio uero ipsa actio. Var.	
Scarus piscis est, qui solus pisciū dicitur ruminare, herbisq; uesci.	67. a

Suggestus uel suggestū, ut hic a suggero fit, & est locus editior.	70.a
Subscribere fauere proprie i cāis agēdis, uñ et subscriptores fautores. Co.	88.a
Streptus, quod cum sole circumagatur. Co.	112.b
Stephanitis a coronario natura luxu foliis acinos intercurrentibus.	112.b
Suffraginosa nula, cuius suffragines morbo uitiatae sunt. Co.	172.b
Scirpus iuncus est. Co.	
Stellio genus est stellati lacerti. Co.	201.a
Salgama appellabantur a priscis quaecunq; conditanea ad uictum nostrum in uasis seruabantur. Co.	210.b
Signia urbs campaniae. Co.	210.b
Stabia, uetus campaniae oppidum. Co.	210.b
Sebetide nymphea, sebetos fons est Neapoli, cuius aqua uicatim decurrens omnes fere usus Neapolitanis praestat.	210.b
Siler fluminis iuxta praedicta oppida. Co.	210.b
Sabelli populi a sabinis orti, q̄ icolūt mōtes, q̄ sūt iter sabinos et marsos. Co.	210.b
Sabellico usq; in admiratiōem crispa sunt folia. Co.	
Sāpſucus herba, quā nūc appellāt maior anā, alioq; noīe amaracus dī.	211.a
Sabaeum arabicū, nā i arabia felici odoramēta p̄iosa nascuntur, ut balsamus. casia, thus.	212.a
Scirpiculū canistrum ex scirpis p̄fectum. Co.	213.a
Sectio sectino.	213.b
Sacris tardipedi. i. i. uulcanalibus.	214.b
Sesquiculleare uas quod continet cullen & dimidiū alterius.	238.b
Subfriare a sub & frio fit, hoc est paululum conterere.	243.b
Sestiana mala a Sestio nomen acceperunt. Col.	247.a
T Estoriū incrustatio calce uel gypso parietū. Ca. de re ru.	4.a
Torcularium, cella olearia. Ca. de re ru.	5.b
Trapetū instrumentum & mola qua oleum perstringitur sic dictum a uertendo, siue a stringendo. Ca. de re ru.	5.b
Tracta, tabula qua panis, uel aliud fictile formatur. Ca. de re rust.	13.b
Turunda, pastillus, quo uolucres saginantur, & liniamentum & tenta quo ulcera curantur. Ca. de re ru.	14.b
Tertiariū & quartariū, tertia & quarta pars. Ca. de re ru.	15.a
Tormina, intestinorum dolores. Ca. de re ru.	17.b
Tubuli fistulae sunt maiores fictiles. Va. li. i.	32.b
Talea frustum ligni praecisum ex utraq; parte, ut in terra inferatur, quam alij sclauolam uocant. Var. li. i.	10.b.43.a
Taura appellatur, quae sterilis est uacca. Var. li. ij.	57.b
Tertiare tertiō arare. Co. li. ij.	99.b
Trimestre triticum, quod legitur intra tres menses. Co. li. ij.	100.b
Terra furcularis ubi surgunt plurimi furculi. Co. li. iij.	121.a
Taleola diminutivum a talea. Co. li. iij.	124.b
Trigēmis malleolus, qui exceptis oculis, quibus est frequens in ipso capite tres	

deinceps articulos. totidē q; gēmas habet. Col. li. iij.	125. b
Torus in trunco vitis, ut in corpore nostro pars eminētiōr. Co. li. y. 132. a. 151. a	19. a
Et chordula apud Ca.	164. a
Titimallū lactuca marina, vulgo turtumaglio. Co. li. yi.	213. b
Termes ramus de arbore reāsus. Co. li. yij.	225. a
Tannū herba est minutis folijs, Et aculeata. Co. li. x.	227. a
Tuberes pegrinæ arbores ex Aphrica ī Italiā allatæ. Co. li. xi.	242. b
Teniola exiguū filum. Co. li. xi.	246. b
Tomix resta leniter trita ex cānabi imposito Et sparto, ex q; funes fiūt, puluilli quoq; quos in collo hñt aīalia ne recte lādātur tornices uocātur. co. li. xij. 242. b	64. b
Turiones sūt teneritates sumitatū arborū uel arborū. Co. li. xij.	4. b
Tonfores romam e sicilia uenerunt anno quadringentesimo quinquasimo quarto ab urbe condita duce Pu. Ticinio Mena.	3. b
Trusatiles molæ, alio nomine manniaræ, q; manibus trūdātur.	4. b
Trulleum uas quo manus perluuntur. trulla tñ Et trua uas quo e culina in la- trinam aquam fundant.	3. b
Trocheæ, siue trochalia ista cū orbiculis ad subleuāda et depriūda onera. 4. b	50. b
Thracius a thracia ostiū pōti, p qd in propōnda influit pōtus. Va.	56. a
Tomacina, q; apud alios tomacula et tanacæ edulia ex carne porcina. Va.	70. a
Turduli populi sūt Hispaniæ. Va.	70. b
Tholus lignū cui iheret tectū tēpli, græci qdā exponūt domū eē rotūdā.	70. b
Θεατρὸν diminutiū forma græca a theatro.	76. b
Tibi trado respicit ad morē currētū cū facibus in festo cæreris, quorū primus cū ad locū statutū uenisset facē sequenti dabat.	74. b
Θηριοτόπος locus ubi feræ aluntur. Var.	112. b
Trepidaneæ a mēsurā dicuntur, aliq; legunt crepidaneas a crepida.	136. a
Teredo uermis est lignū terens, atq; exedens.	137. b
Tectū pecus dī ad dīriam colonici appellatū tectū, q; opimēis tegetur.	187. a
Tēporius aduerbiū deductū a tempore aduerbio, q; significat opportune et tempestiue. Col.	196. b
Turdus, merula, uarij. piscium nomina. Co.	209. a
Taxus arbor ē. ex q; fabricātur arcus, toxica quoq; inde sudare dñr.	210. b
Turni lacus, locus ex cōualle aricina, ubi quondam fuit lacus Turni, inde subie- runt lacutres caules. Co.	213. b
Tages is fuit, qui primus Hetruscis Aruspicij disciplinam tradidit. Col.	213. b
Tarcon Hetruuriæ dux Et aruspex.	213. b
Tyrso tartesiacos. i. lactuca, tartesia, Paphios, Cypriæ	268. b
Tesseræ appellat lapilloꝝ frusta quadrata.	3. b
V Rpex rusticū instrumētū ad agrū aratū coequādū. Ca. de reru.	7. a
Vinū pliganeū siue plo exp̄ssum siue a plegēdo dictū. Ca. de reru.	19. b
Vidueritas calamitas. Ca. de reru. q; nos uiduet.	21. a
Vinis in ablatiūo plurali apud Ca de reru.	

Villa à uehendo. q. uehilla q̄ in eā fructus uehebant ex agris, rustici uia uehā appellant propter uecturas & uellā nōnullā. Va. li. i.	29. a
Vellaturā facere pro uecturā facere. Va. li. i.	25. a
Versus in dictione ingeri. Va. li. i.	28. b
Vicia à uinciendo pp capreolos leguminis genus. Var. li. ij.	41. a
Veterina animalia quæ uehunt, quorū medici ueterinarij appellantur quos uulgo gus merefalcos dicit. Va. lib. ij.	42. b
Veruactum terra quæ alternis annis requieuit. q. uere actum, et est qñ uere pri mum agri proscinduntur ad differentiā restibilis dictū. Va. li. ij.	44. b
Ventilabrū pala qua triticū uentilatur. Va. lib. ij.	46. a
Vellus uel uelumium est Lana ex una oue detōsa, & conglobata a uellendo. Var. lib. iij.	64. b
Vocifico apñ est proprie cū fucos susurro insequuntur. Va. li. iij.	76. a
Viatores q̄ a uilla in senatum proceres arcessebant. Co. li. i.	85. b
Vestiarium pro ipsa ueste. Co. lib. i.	95. a
Versus pro uersura. Co. lib. ij.	98. b
Varia & cariōsa terra cum post longas siccitates leuīs pluuia superiorem partē glebarum madefecit. Co. li. ij.	99. b
Vehæ genus plaustrī a uehendo. Co. li. ij.	100. a
Valuula pro siliqua. Co. li. ij.	106. b
Vua apianæ q̄ apibus prædā afferant. Co. lib. iij.	113. b
Viniradix surculus cum radicibus. Co. li. iij.	110. b
Vitiarium locus unde uites trāsferuntur. Co. lib. iij.	116. a
Vinea restibilis q̄ seritur ubi fuerit. Co. lib. iij.	121. a
Vnguis incisio in speciē unguis. Co. lib. iij.	136. a
Vitis capitata & brachiata quæ scinditur in diuersa capita, & in diuersa bra chia. Colu. lib. y.	129. a
Vara siue uaria instrumentū genus. Co. li. y.	153. a
Vbero pro exubero uerbum simplex. Co. lib. y.	154. a
Vacerra genus clatrōrū ex stipibus confectum. Co. li. ix.	197. b
Vergiliarium ortus circa. y. idus Maias. Co. lib. ix.	205. a
Vindemiator à græcis τρυγητής. Co. lib. xi.	219. a
Vlpicū à qbusdā punicū allium ἀφροσκόπος ov a græcis longe maioris incre mentū q̄ allium. Co. li. xi.	227. a
Valitudinariū, locus in quo agros manēt ut inuētur. Co. li. xi.	233. b
Vapidum uinū qd̄ iā exhauritasseria in fundo remansit. Co. li. xi.	234. a
Vrna quatuor & xx. sextarios cōtinet. Co. li. xij.	239. b
Vinum myrtæ myrto medicatum. Co. li. xij.	243. b
Volucra genus aialis, qd̄ pampinos & uuas prærodit. Co. li. ult.	259. b
Vncia, digitū & triētem significat apud Pal. li. i.	268. a
Vanga pro bipalio usurpat. Pa.	277. b
Vitex salicis genus, ex quo uasa uiminea fiunt. Pa. lib. ix.	317. b

<i>Vinum diureticum durabile. f. Pal. li. xi.</i>	325. b
<i>Vinum prafaminum ad sacrificia electum.</i>	19. b
<i>Viere est uincire, uel inflectere.</i>	
<i>Vari dicuntur obtortis cruribus introrsum, ut putamus, nam in exteriorem partem obtorta crura habentes uacciae dicuntur.</i>	61. b
<i>Ve grandes male grandes, paruae, & minutae. Var.</i>	53. b
<i>Veternum morbus ex nimio ocio. Co.</i>	136. a
<i>Vrinare est mergi, inde urinatores, qui sub aqua natant. Co.</i>	193. b
<i>Vergiliae stellae sunt, quae pleiades alio nomine dicuntur. Co.</i>	206. a
<i>Vesuium, siue uesbius mons ardens in eadem campania.</i>	210. b
<i>Viabius albis, uite bionia, quae dicitur.</i>	213. b
<i>Patremfa. uendacem non emacem esse oportere. Cato.</i>	car. 1. b
<i>Cogitato si nihil fiat, nihilominus sumptum futurum. Ca.</i>	car. 9. b
<i>Romanus sedendo uincit uetus prouerbiu. Var. li. i.</i>	28. a
<i>Portam itineri dici longissimam. Var. li. i.</i>	28. a
<i>Qui arat fructum rogat, qui stercoret exorat, qui cedit cogit. Co. li. y.</i>	154. a
<i>Facetissimum Philippi dictum peream nisi piscem putari. Co. libro. yij. 195. & Var. libro tertio.</i>	67. b
<i>Nihil agendo homines male agere discunt. Catonis oraculum. Co. li. xi.</i>	217. a
<i>M. Varronis uilla in casinate. Var. li. iij.</i>	60. a
<i>Malum consilium consultori pessimum. Var. li. iij.</i>	65. b
<i>Q. hortensius primus omnium coena ad iudiciali paucem apposuit. Varro libro tertio.</i>	70. a
<i>Infra mensuram palmi non nascitur curculio. Co. lib. i.</i>	92. b
<i>Latiae musae Accium & Virgilium non solos ad ius suis recepere. Columella libro primo.</i>	86. b
<i>Summum ius summam crucem dixerunt ueteres. Co. li. i.</i>	77. b
<i>Vel optima nomina non appellando fieri mala scenerator Alphius dixit. Co. libro primo.</i>	93. a
<i>Necessitas feriis caret. Pal. li. i.</i>	266. a
<i>Praesentia domini prouectus est agri. Pal. li. i.</i>	266. a
<i>Vrinae asini porcino admixta stercore mali, punici uermibus obuiabit. Palladi. libro quarto.</i>	299. b
<i>Castitatem oliuae praesulem crediderunt antiqui. Pal. li. i.</i>	267. a
<i>Qui agrum colit grauem tributis creditorem patitur. Pal. li. i.</i>	266. b
<i>Maturam sationem saepe decipere solere, seram nunquam, quin mala sit prouerbiu a ueteribus usurpatum uatur. Col. li. x.</i>	221. b
<i>Paupertatem certissimam esse cum alicuius indigeas uti eo non posse, quia ignoretur ubi proiectum iaceat, quod desideratur, uetus prouerbiu, uatur. Co. li. xi.</i>	232. b
<i>In re familiari laboriosior est negligentia quam diligentia. Co. li. xi.</i>	232. b
Z <i>Xiphus genus arboris, quam nostrates Xibebos uocant Xiphu eius fructus. Pal. li. i. & li. yi.</i>	199. b

I AM pridem decreui, quacunq; in re possum, prodesse studiosis. Quam ob rem perquam uile uisum est futurum, si hic de diebus, et qui in uiginti quatuor partes, & qui in duodecim diuiduntur, tum de horis, quæ sunt apud Palladiū. non nihil dicamus. Atq; eò magis, quod à perq; paucis ætatis nostræ hominibus intelligantur. Dierum duo sunt genera. alij naturales, alij ciuiles. Naturales, quibus nunc passim utimur, constant quatuor & uiginti partibus æqualibus ab occasu solis ad alterum occasum, quæ horæ appellantur, & græce ὀρθήματα, latine æquinoctiales dicuntur. Ciuiles autem, ab ortu solis ad occasum constant duodecim partibus inæqualibus, quæ græce ὀρθήματα, latine temporales, seu, quod idem est, uulgares nominantur. Atq; hæ duodecim partes hybernæ solstitijs breuissimæ sunt, & tertia parte minores, quàm æquinoctiales, æstiuæ autem longissimæ, eademq; tertia maiores quàm illæ, & quod sequens est, uincunt hybernas duabus quartis, siue, quod idem est, dimidio. id quod significare uoluit Virgilius eo uersu, An' ne nouum tardis sydus te mensibus addas, idest Iunio, & Iulio, quibus horæ longissimæ sunt. At uere, sole Arietem, Autumno Libram ingrediente, pares sunt æquinoctialibus, eademq; ab hyberno Solstitio ad æstiuum, cum die crescente crescunt, ab æstiuo autem ad hybernum, cum eodem decrecente decrescunt. Et quoniam singuli dies ciuiles, ac noctes totius anni, horis duodecim continentur, Sexta diei hora semper est Meridies. & prima incipit oriente sole, Duodecima eodem occidente finitur. Verbi gratia, mense Martio cum hæ ipsæ horæ temporales fere pares sunt æquinoctialibus, Prima hora diei ciuilis est eadem cum tertiadecima diei naturalis. Secunda, eadem cum quarta decima. Tertia, cum quinta decima. Quarta, cum sexta decima. Quinta, cum decima septima. Sexta, cum decima octaua. Septima cum decima nona. Octaua cum uigesima. Nona cum uigesima prima. Decima, cum uigesima secunda. Undecima cum uigesima tertia. Duodecima, cum uigesima quarta. Illud igitur in sacris literis, A sexta autem hora usq; ad Nonam, tenebræ factæ sunt super uniuersam terram, intelligendū est à Decima octaua hora, usq; ad uigesimam primam diei naturalis, ut nunc horæ aguntur. Nam apud ueteres, Solaria in horas tam noctis, quàm diei temporales non æquinoctiales diuidebantur. Mense autem Iunio, cum horæ quam longissimæ sunt, prima hora temporalis, est eadem, quæ nona cum tertia parte decimæ æquinoctialis. Secunda, quod reliquum decimæ cum duabus tertijs undecimæ. Tertia, quæ duodecima cum tertia parte undecimæ. Atq; ita singulæ tres horæ temporales continent quatuor æquinoctiales. Pari modo, quarta est eadem, quæ tertiadecima cum tertia parte quartæ decimæ. Quinta, quod reliquum quartæ decimæ cum duabus tertijs quintæ decimæ. Sexta, quod reliquum quintæ decimæ cum integra sextadecima. & est Meridies. Item tres temporales Septima, Octaua, Nona, sunt eadem, q̄ quatuor, æquinoctiales, uidelicet, decima septima, decima octaua, decima nona, uigesima. Itē decima, undecima, duodecima, eadem q̄ uigesima prima, uigesima secunda, uigesima tertia, uigesima quarta. Non ab re hic

uisum est subiungere epigramma Martialis ad Euphemum structorem Domi-
tiani, ubi harum horarum temporalium meminit, est autem hoc.

Prima salutes, atq; altera detinet hora.

Exercet raucos tertia caufidicos.

In quintam uarios exercet Roma labores,

Sexta quies lassis, septima finis erit.

Sufficit in nonam nitidis octaua Palastris.

Imperat extructos frangere nona toros.

Hora libellorum decima est Eupheme meorum,

Temperat ambrosias cum tua cura dapes.

Et bonus atherio laxatur neffare Caesar,

Ingentiq; tenet pocula parca manu.

Tunc admittite locos. gressu timet ire licenti

Ad matutinum nostra Thalia Iouem.

Horæ aut, de quibus agit Palladius, sunt quæ diem ab ortu solis ad occasum diui-
dunt, in partes. xij. q. umbris sicprehenduntur. Fiat Planicies quadrata ad
regulā, & libellā in loco aperto, qui toto die illustretur à sole, spectetq; uno late-
re septentrionē alio Meridiē, solem alio orientē, occidentē alio. Deinde in me-
dio quadrati collocetur indagator umbræ, q. græce γνῶμων, seu σκιαθῆρας di-
citur, obserueturq; prima dies cuiusuis mēsis, Verbi gratia Ianuarij, idq; cælo ser-
reno. tūc tacto gnomone à solis radijs, umbra gnomonis prima hora diei erit lō-
ga pedes 29. Secūda 19. Tertia 15. Quarta 12. Quinta 10. Sexta 9. atq; hac ho-
ra, semp (ut dixi) est Meridies, tūc. n. sol altissimus facit umbras breuissimas. De-
inde incipit declinare, & descendere ad occasum, atq; umbra eadē, qua decre-
uerant, mēsurā, augētur. quo fit, ut. yij. hora, q. est prima post meridiē, umbra
gnomonis sit lōga pedes 10. et rñdeat qntæ antemeridianæ (nā horæ ante sextā
meridianæ, post sextam pomeridianæ appellantur) octaua sit longa pedes 12.
& respondeat quartæ. Nona, 15. quanta fuerat tertia. Decima, 19. quot pedum
erat secūda. Vndecima, 29, quot prima. Et qm̄ in horarū spatio Ianuarius cum
Decēbri mēse puenit, eadē erunt umbræ singulis horis hoc mēse, q. & Ianua-
rio. Idem quoq; faciendum est in cæteris mēsibus, ut bini. s. computentur, & Fe-
bruarius in horarum mēsurā cū Nouēbri mēse cōcordet. Martius cum Octo-
bri. Aprilis cum Septēbri. Maius cum Augusto. Iunius cū Iulio, quemadmo-
dum in fine cuiusq; mēsis apud Palladium licet uidere. Illud apud eundem
in fine postremi mēsis his uerbis. Decembrem Ianuario in horis causa dispar
adiunxit, cum linea simili ille augeatur, hic decreseat, intelligendum est & de
umbris, quod tam ante meridiem, q. post, pares, atq; eadem in singulis binis
mēsibus sint, idq; dispari cā, & de diebus, quos cōstat sex mēsibus augeri, et
sex decrescere. Nā et si eadē qntate sunt horæ mēse Ianuario, qua et Decēbri,
eadēq; mēse Februario, qua & Nouēbri, & sic in reliqs paribus quēadmodū
Author ostendit, tñ ex singulis paribus quantū augetur alter, tñ alter diminui

tur. Ascendete enim Sole à Capricorno ad Cancrum (ut supra diximus) dies
semper augentur. Decrescunt contra descendente illo à Cancro ad Capricornū.
Notandum præterea, crescentibus diebus, decrescere semper umbras gnomonis,
contra, decrescentibus illis, has semper augescere. Et hinc est, quod mense Ia-
nuario cum dies breuissimi sunt, & augentur, prima hora diei umbra gnom-
onis est longa pedes. XXIX. Februario, quæ est longissima. XXVII. Martio. XXV.
Aprili. XXI. Maio. XXIII. Iunio. XXII. Mense autem Iulio, cum dies longissi-
mi sunt, & decrescunt, prima hora diei umbra gnomonis est longa pedes. XXII.
quæ est breuissima. Augusto, XXIII. Septembri, XXIII. Octobri, XXV. Novem-
bri, XXVII. Decembri, XXIX. Id quod ut melius cognoscatur, subiunximus
& eos menses, quibus dies augentur, umbris decrescentibus, et eos, quibus dies
decrescunt, umbris crescentibus. Incepimus autem ab Ianuario, & Iulio, quo-
rum altero dies sunt breuissimi, & semper augentur usque ad solstitium æstiuum,
& umbra longissima, sed decrescunt, quandiu dies augentur. Altero dies sunt
longissimi, & semper decrescunt usque ad solstitium hybernū, & umbra bre-
uissima, sed augentur, quandiu dies decrescunt. Et licet à solstitijs incipiendum
fuisset, quæ Decembri, & Iunio sunt, tuncque dies uel augeri, uel decrescere inci-
piunt, tamen incrementa, uel diminutiones dierum cum diminutionibus, incre-
mentisque umbrarum sic facilius dignoscuntur. qua quidem re cognita, et dispar
illa causa cognoscetur, qua in horarum spatio Ianuarius Decembri, Februarius
Novembri, Martius Octobri, Aprilis Septembri, Maius Augusto, Iunius Iulio
adiuncti, linea simili, ut ait Palladius, augentur uel decrescunt.

Ianuarius augentur dies, & umbra
decrescunt.

hora	1	ped.	29
hora	2	ped.	19
hora	3	ped.	15
hora	4	ped.	12
hora	5	ped.	10
Chora	6	ped.	9
hora	7	ped.	10
hora	8	ped.	12
hora	9	ped.	15
hora	10	ped.	19
hora	11	ped.	29

Iulio decrescunt dies, & umbra au-
gentur.

hora	1	ped.	22
hora	2	ped.	12
hora	3	ped.	8
hora	4	ped.	5
hora	5	ped.	3
Chora	6	ped.	2
hora	7	ped.	3
hora	8	ped.	5
hora	9	ped.	8
hora	10	ped.	12
hora	11	ped.	22

Februario augentur dies, & umbra
decreſcunt.

hora	1	ped.	27
hora	2	ped.	17
hora	3	ped.	13
hora	4	ped.	10
hora	5	ped.	8
Chora	6	ped.	7
hora	7	ped.	8
hora	8	ped.	10
hora	9	ped.	13
hora	10	ped.	17
hora	11	ped.	27

Martio augentur dies, & umbra de
creſcunt.

hora	1	ped.	25
hora	2	ped.	15
hora	3	ped.	11
hora	4	ped.	8
hora	5	ped.	6
Chora	6	ped.	5
hora	7	ped.	6
hora	8	ped.	8
hora	9	ped.	11
hora	10	ped.	15
hora	11	ped.	25

Aprili dies augentur, & umbra de
creſcunt.

hora	1	ped.	24
hora	2	ped.	14
hora	3	ped.	10
hora	4	ped.	7
hora	5	ped.	5
Chora	6	ped.	4
hora	7	ped.	5
hora	8	ped.	7
hora	9	ped.	10
hora	10	ped.	14
hora	11	ped.	24

Auguſto, decreſcunt dies, & umbra
augentur.

hora	1	ped.	23
hora	2	ped.	13
hora	3	ped.	9
hora	4	ped.	6
hora	5	ped.	4
Chora	6	ped.	3
hora	7	ped.	4
hora	8	ped.	6
hora	9	ped.	9
hora	10	ped.	13
hora	11	ped.	23

Septembri decreſcunt dies, et umbra
augentur.

hora	1	ped.	24
hora	2	ped.	14
hora	3	ped.	10
hora	4	ped.	7
hora	5	ped.	5
Chora	6	ped.	4
hora	7	ped.	5
hora	8	ped.	7
hora	9	ped.	10
hora	10	ped.	14
hora	11	ped.	24

Octobri dies decreſcunt, & umbra
augentur.

hora	1	ped.	25
hora	2	ped.	15
hora	3	ped.	11
hora	4	ped.	8
hora	5	ped.	6
Chora	6	ped.	5
hora	7	ped.	6
hora	8	ped.	8
hora	9	ped.	11
hora	10	ped.	15
hora	11	ped.	25

Maio augentur dies, & umbrae decrescunt.

hora	1	ped.
hora	2	ped.
hora	3	ped.
hora	4	ped.
hora	5	ped.
Chora	6	ped.
hora	7	ped.
hora	8	ped.
hora	9	ped.
hora	10	ped.
hora	11	ped.

Novembri, dies decrescunt, & umbrae augentur.

hora	1	ped.	27
hora	2	ped.	17
hora	3	ped.	13
hora	4	ped.	10
hora	5	ped.	8
Chora	6	ped.	7
hora	7	ped.	8
hora	8	ped.	10
hora	9	ped.	13
hora	10	ped.	17
hora	11	ped.	27

Iunio dies augentur, & umbrae decrescunt.

hora	1	ped.
hora	2	ped.
hora	3	ped.
hora	4	ped.
hora	5	ped.
Chora	6	ped.
hora	7	ped.
hora	8	ped.
hora	9	ped.
hora	10	ped.
hora	11	ped.

Decembri dies decrescunt, & umbrae augentur.

hora	1	ped.	29
hora	2	ped.	19
hora	3	ped.	15
hora	4	ped.	12
hora	5	ped.	10
Chora	6	ped.	9
hora	7	ped.	10
hora	8	ped.	12
hora	9	ped.	15
hora	10	ped.	19
hora	11	ped.	29

SED Sciendum, primos quosque dies mensis descriptos tantum à Palladio, nec tantas fore umbras cæteris diebus cuiusque mensis, quantæ fuere primis, si quis eas describeret, sed semper, uel minores, cum dies crescunt, uel maiores illis decrescentibus. quæ si describerentur omnes, magnum efficerent uolumen. esset præterea opus multis annis, si id fieret in Europa. nam cum oporteat singulos quosque dies totius anni ab ortu solis ad occasum tunc esse serenos, nec id contingat unquam in Europa, obseruandi forent dies sereni multorum annorum, donec omnes describerentur. Quod quia laboriosum est, & longi tædij plenum, nec Palladius fecit, nec alius quisque, nec forte erit unquam qui faciat. Sed de his hæc satis. tu uero Lector carissime uale, & me ama.

AMBROSIUS NICANDER TOLE
tanus in correctoris laudem.

Arva, pecus, fundum, uites, armenta, bouile
 Salgama, mella, oleum, rura beata, nemus
 Scripsimus ornato quondam sermone, sed heu nos
 Tempus edax lateros, morte sequente, dedit
 Quattuor at pariter uita redeunte uenimus
 Autores, maior uis noua membra fouet
 Ille animas iterum nostras renouauit ab orco,
 Qui uitia, & maculas, depulit atq; suum.
 Diuinos igitur sumat corrector honores
 Mortua qui ingenio uiuere & arte facit.

τέλος.

M. CATO DE RE RVSTICA.

EST INTERDVM præstare, mercaturis rem quærere, ni tam periculosum fiet, & item fœnerari, si tam honestum fiet. Maiores enim nostri sic habuere, & ita in legibus posuere, furem dupli condemnari, fœneratorem quadrupli. Quanto peiorem ciuem existimarint fœneratorem, q̃ furem, hinc licet existimari. Et uirū bonum cum laudabant, ita laudabāt. Bonū agricolā, bonumq; colonū. Amplissime laudari existimabatur, qui ita laudabatur. Mercatorē autem strenuum, studiosumq; rei quærendæ existimo, uerum (ut supradixi) periculosum, & calamitosum. At ex agricolis & uiri fortissimi, & milites strenuissimi gignuntur, maximeq; pius questus, stabilissimū que consequitur, minimeq; inuidiosus. Minimeq; male cogitantes sunt, q̃ in eo studio occupati sunt. Nunc (ut ad rem redeam) quod promisi institutum primum hoc erit.

I. PRÆDIVM cū cōparare cogitabis, sic in aīo habeto, uti ne cupide emas, nēne op̃a tua parcas uisere, et ne satis habeas semel circūire. Quoties ibis, toties magis placebit, quod bonū erit. Vici quo pacto niteāt, id animū aduertito. In bona regiōe benenitere oportebit, & uti eo cū introeas, circūspicias. uti inde exiri possit, uti bonum cælum habeat, ne calamitosum fiet. solo bono sua uirtute ualeat. Si poteris sub radice montis fiet, in meridiem spectet, loco salubri, operariorum copia fiet, bonumq; ibiq; aquarium, et oppidum ualidū prop̃ fiet, aut mare, aut amnis, quā naues ambulant, aut uia bona, celebrisq;. Siet autem & in ijs agris, qui nō sepe dominos mutant, qui in his agris prædia uendiderint, quos pigeat uendidisse, uti bene edificatum fiet. Caueto alienam disciplinam temere contemnas. De domo bono colono, bonoq; edificatore melius emetur. Ad uillam cum uenies. uideto, uasa, torcula, et dolia multa ne fiēt. ubi nō erūt, scito pro ratione fructuum esse. Instrumenti magni ne fiet, bono loco fiet. Videto quamminimi instrumenti, sumptuosus ager ne fiet. Scito idem agrum quod hominem, quamuis questuosus fiet, si sumptuosus erit, relinqui non multum. Prædium quod primum fiet, si me rogabis, sic dicam. De omnibus agris, optimoq;

Collu.

4

loco si emeris iugera agri centum, uinea est prima si uino multo fiet. Secundo loco hortus irriguus, tertio salictum, quarto oleum, quinto pratum, sexto campus frumentarius, septimo sylua caedua, octauo arbustum, nono glandaria Sylua. II.

P A T E R familias ubi ad uillā uenit, ubi larem familiare salutaui, fundum eodem die, si potest, circumeat, si nō eodē die, at postridie, ubi cognouit quomodo fundus cultus fiet, operaq; quae facta, infectaq; siēt, postridie eius diei uillicum uocet roget, quid operis fiet factum, satisne tempori opera sient cōfecta, quae durare possint, quid restet, aut quae reliqua sient conficienda, et quid factum uini, frumenti, aliarumq; rerum omniū. Vbi ea cognouit, rationem inire oportet operarium dierum. Si ei opus nō apparet, dicat uillicus sedulo se fecisse, seruos non ualuisse, tempestates malas fuisse, seruos aufugisse, opus publicum esse. Vbi eas, aliasq; causas multas dixerit, ad rōnē operū, opariūq; uillicū reuoca. Cū tēpestates, pluuiaeue fuerint, uideto quot dies, quae ue opa p imbrē fieri potuerint, dolia lauare, picari, uillā purgari, frumētū trāsferri, stercus foras efferri, sterquiliniū fieri, semē purgari, funes ueteres sarari, nouosq; fieri, centones cuculionesue familiā oportuisse sibi sarare. Per serias uero potuisse fossas ueteres tergeri, uia publicā muniri, nepres recidi, hortū fodiri, pratū purgari, uirgas uinari, spinas uincari, cremariq; ex piscina immunditias efferri, munditias fieri, seruis excocta cibaria non tāta dari, q̄ta cum sine tempestate operātur in aruis. Vbi haec cognita aequo animo sient, quēne reliqua opera sient, curare uti perficiantur. Rationes putare argentariam, et frumētariam familiā, pabulinē causa. Quae paranda sient parare. Rationē itē uinariam, oleariamq; quid uenierit, quid exactum fiet, quid reliquum fiet, quidq; fiet, quod ueneat, quae satis accipiunda sient, satis accipiātur. Reliqua quae sient, ut compareant. Siqua desint in animum, uti comparentur quae supersint, uti ueneant. quae opus sient locato, locentur quae deinde opera fieri uelit, et quae locari uelit uti imperet, et ea scripta relinquat. Pecus consyderet, auctiōnē uti faciat. Vēdat oleum, si pretium habeat, uinum frumentumq; quod supersit. Vendat boves uetulos, armenta reijcula, oues reijculas, lanam, pelles, plostrum uetus, ferramenta uetera, seruum senem, seruum morbosum, et siquid aliud supersit, uendat. Patrem familias uendacem, non emacem esse oportet. III.

PRIMA adolescentia patremfamilie agrum statim conferere
studere, edificare diu cogitare oportet, cōserere cogitare nō oportet, sed facere *ubi et* as accessit ad ānos triginta sex, tum edificare oportet, si *agrum* *consistum* agrum *ubi et* situm hēas. Tū ita edifices, ne uilla fundū
qrat, nēne fundus uillā. Patrēfamilie uillā rusticam bñ edifica
tā habere expedit, et cellam oleariam, uinariamq; instructā, et
dolia multa, uti lubeat caritatem expectare, et id rei et uirtuti,
et glorie erit. Torcularia bona habere oportet, ut opus bene ef
fici possit. Olea ubi lecta fiet, oleum fiat continuo, ne corrumpatur.
Cogitato quot annis tempestates magnas uenire, et oleam
deicere solere. Si cito sustuleris, et uasa parata erunt, damni ni
hil erit ex tempestate, et oleum uiridius, et melius fiet. Si in
terra, uel tabulato olea nimium diu erit, putrescet, oleū foetidū
fiet, et quauis olea oleum uiridius, uel bonum fieri potest, si tem
pori facies. In ingera oleti cetum uiginti, uasa bina esse oportet.
Si oletum bonum, beneq; frequens, cultumq; erit, trapetos bonos
priuos impares esse oportet, ut si orbes contriti fiēt, commutare
possis, funes loreos, priuos, uectes senos, fibulas duodenas, medi
pontos priuos loreos, trochleas græcicas binas, quæ funibus
sparteis ducantur. Orbiculis superioribus octonis, inferioribus se
nis citius duces. Si rotas uoles facere, tardius ducentur, sed mi
nore labore.

IIII.
BVBILIA bona, beneq; edificata, boas præsepes faliscas ha
beant clatratas. Clatros inter se oportet pede distare. Si ita feceris,
pabulum boues non eiciant. Villam suburbanam pro copia
edificato in bono prædio. Si bene edificaueris, beneq; posueris
eam, ruri si recte habitaueris, libentius, et sæpius uenies, fundus
melior erit, minusq; peccabitur, fructi plus capies. Frons occipitio
prior est. Vicinis bonus esto. Familiam ne sineris peccare.
Si te libenter uicinitas uidebit, facilius tua uendes, operas facili
us locabis, operarios facilius conduces. Si edificabis, operis, in
mentis, materia inuabunt. Siquid (bona salute) usu uenerit, be
nigne defendent.

V.
HAECERUNT uillia officia. Disciplina bona utatur.
Feria seruentur. Alieno manum abstineat. Sua seruet diligen
ter. Litibus familia supersedeat. Siquis quid deliquerit, pro no
xa bono modo uindictet. Familie male ne sit, ne algeat, ne esu
niet, opere bene exerceat, sic facilius malo, et alieno prohibe
a ij

bit. Villicus si nolet male facere, non faciet. Si passus erit, dominus impune ne sinat esse. Pro beneficio gratiam referat, ut alijs recte facere libeat. Villicus ne sit ambulator, sobrius fiet semper. Ad coenam nequod eat. Familiam exerceat, ut si deret, quae dominus imperauerit fiant. Ne plus censeat sapere se, quam dominum. Amicos domini eos habeat sibi amicos. Cui iussus fiet, auscultet. Rem diuinam nisi compitalibus in compito, aut in foco ne faciat. Iniussu domini credat nemini. Quod dominus crediderit, exigat. Satui semen, abaria, far, vinum, oleum mutuum dederit nemini. Duas, aut tres familias habeat, unde utenda roget, & quibus det, preterea nemini. Rationem cum domino crebro putet. Operarium, mercenarium, pollintorem diutius eundem ne habeat die. Nequid emisse uelit insciente domino, neu quid dominum celauisse uelit. Parasitum nequem habeat. Augurem, aruspicem, ariolum, chaldaeum ne quem consuluisse uelit. Segetem ne defrudet, nam id infelix est. Opus rusticum omne curet uti sciat facere, & id faciat saepe, dum ne lassus fiat. Si fecerit, scabit in mente familiae quid fiet, & illi animo equiore facient. Si hoc faciet, minus libebit ambulare, & ualebit rectius, & dormibit libentius. Primus cubitu surgat, postremus cubitum eat. prius uillam uideat clausa uti fiet, & uti suo quisq; loco cubet, & uti iumenta pabulum habeant. Boes maxima diligentia curatos habeto. Bubulis obsequitor statim, quo libentius boes curent. Aratra, uomeresq; facto, uti bonos habeas. Terram curiosam caueto ne ares, neue plostrum, neue pecus in eam impellas. Si ita non caueris, quo impuleris, triennio fructum amittes. Pecori, & bubus diligenter substernatur, ungulae curentur. Scabiam pecori, & iumentis caueto, id ex fame, & si impluit fieri solet. Opera omnia mature conficias face. Nam res rustica sic est, si unam rem sero feceris, omnia opera sero facies. Stramenta si deerunt frondem iligneam legito, eam substernito ouibus, bubusq;. Sterquilinium magnum stude ut habeas. Stercus sedulo conserua cum exportaueris spargito, & comminuito. Per autumnum euebito. Circum oleas autumnitate ablaqueato, & stercore addito, confoueto, frondem populneam, ulmeam, querneamq; cedito, per tempus eam condito non per aridam pabulum ouibus. Item foenum cordum, sicilimenta de prato demitto, eaq; arida condito. Post imbrem autumnu rapinam pabulum,

lupinumq; serito.

AGRVM Quibus locis conseras, sic observari oportet. Vbi ager crassus, ~~et~~ lectus est sine arboribus, eum agrum frumentarium esse oportet. Idem ager si nebulosus est, rapa, raphanos, milium, panicum id maxime seri oportet, in agro crasso, et calido oleam condiam, radium maiorem salentinam, orchitem poseam, fergianam, colminianam albicerem, quam earum in his locis optimam dicent esse, eam maxime serito. Hoc genus oleæ in uigintiquinq; aut triginta pedes conserito. Ager oleto conserundo, qui in uentum fauonium spectabit, et soli ostentus erit, alius bonus nullus erit. Qui ager frigidior, et macrior erit, ibi oleam licinianam seri oportet. Sin in loco crasso, aut calido seueris, hostus nequam erit, et serundo arbor peribit, et muscus ruber molestus erit. Circum coronas, et circum uias ulmos serito, et partim populos, uti frondem ouibus, et bubus habeas, et materia, siqua opus sit parata erit. Siubi in his locis ripæ, aut locus humectus erit, ibi cacumina populorum serito, et arundinetum. Id hoc modo serito, bipalio uortito, ibi oculos arundinis pedes ternos alium ab alio serito. Ibiq; corudam serito, unde asparagi fiant. Nam conuenit arundinetum cum coruda, eo quia foditur, et incenditur, et umbram per tempus habet. Salicem grecam circum arundinetum serito, uti fiet, qui uineam alliges. Vineam quo in agro conseri oportet, sic observato. Qui uino locus optimus dicetur esse, et ostentus soli, ibi amineum minusculum, et geminum eugeneum, et helueolum minusculum conserito. Qui locus crassus erit, aut nebulosior, ibi amineum maius, aut murgentinum, aut apicium lucanum serito. Ceteræ uites, misellæ maxime in quenuis agrum conueniunt.

VII.

FVNDVM suburbanum arbutum maxime conuenit habere uti ligna, et uirgæ salicti uenire possint, et domino fiat, qui utatur. In eodem fundo suum quodq; fructi genus conseri oportet, arbutoque uitem copulari. Amineum minusculum, et maiusculum, et apicium. Hæc in ollis, ollæ in uinacis conduntur. eadē in sapa, et musto recte conduntur, quas suspendas duracinas, amineas maiores, et scantianas, opportunissimas esse, hæc et ad fabrum ferrarium, pro passis recte seruantur. Poma mala struthæa, cotonea, scātiana, quiriniana, itē alia cōditina mala mustea, et punica, eo lotium suillum, aut stercus, ad radicem eorum

a iij

M. C A T O.

addere oportet, uti stabilia mala fiant. Pira uolema, aniciana, et sementina. Hæc conditina in sapa bona erunt, tarētina, mustea, et cucurbitina. Item alia genera quæ plurima serito, aut inserto, oleas orchites, posias, et optimæ conduntur, uel uirides in muria, uel in lentisco confusæ. Orchites ubi nigrae erunt, et sicca, sale confricato dies ducos, postea salem excutito in solemposito biduū, uel sine sale in defrutum condito. Sorba in sapa cum uis cōdire, uel siccare, uiridia facias. itē pyra eodē mō facias. VIII. F I C O S Mariscas in loco cretoso, et aprico serito, africanas, et herculanas, sagūtinās, hybernas, telanas, atras pediculo lōgo, eas in loco crasso, aut stercorato serito. Pratum si irriguum habebis, fœnum non deficiet. si non, et erit siccū, summittito. Sub urbe hortum omne genus, coronamēta omne genus, bulbos megaricos, myrtum coniugulum, et album, et nigrum, laurum delphicam, et cypricam, et syluaticā, nuces caluas, auellanas, prænestinas, et græcas, hæc facito uti serantur. IX.

F V N D V M Suburbanū, et qui eum fundum solum habebit, ita paret, itaq; conserat, uti quam fertilissimum habeat. Salicta locis Aquosis, uietis, umbrosis, propterq; amnes ibi seri oportet. Et id uideto, uti aut domui opus fient, aut ut uenire possint. Prata irrigua, si aquam habebis, id potissimum facito, si aquā non habebis, sic ut habeas quamplurimum facito. Hoc modo pradium quoduis expedit facere. X.

O L I V E T V M Agri ducentorum quadraginta iugerum habere oportet uillicum, uillicam, operarios quinque, bubulcos tres, subulcum unum, asinarium unum, opiliōem unum. Summa hominum XIII. boues ternos, asinos instratos clitellarios, qui sterces uectent, tres, asinum unum ad oues cētum, uasa olearia instructa iuga quinque, abenum unum, quod capiat quadrantalia triginta, operculum abeni unum, uncas ferreos tres, urceos aquarios tres, infundibula duo, abenum aliud, quod capiat quadrantalia decem. abeni operculum, urceos tres, labellum poluolum, amphoras olearias duas, urnā quinquagenariam unam, trullas tres, situlū aquarium unum, peluim unam, matellionē, trullum scutiscum unum, matellam, nasiternam unam, cādela brum unū, sextarium unum, plostra maiora tria, aratra cum uomeribus sex, iuga cum loris ornata tria, ornamenta bubus sex, urpicē unū, crates stercorarias quatuor, sarpeas stercorarias tres

seminas tres, instrata asinis tria, ferramenta, furcas ferreas octo, sarcula octo, palas quatuor, rutra quinq; rastro quadridētes duos, falces scenarias tres, stramentarias sex, arborarias quinq; securēs tres, cuneos tres, fistulam farrariam unam, forcipes duas, rutabulum unum, foculos duos, dolia olearia decem, labra totidem, dolia quis vinaceos cōdat decem. amurcaria decem, uinaria decem. frumentaria viginti, labrum lupinarium unum, series sex, labrum uinaticum unum, solium unum, labra aquaria quinq; opercula dolys, et series prina plura, molas asinarias unas, et trusatiles unas, hispaniēses unas, mollilia tria, abacum unum, orbes aeneos duos, mensas duas, scamna magna tria, scamnum in cubiculo unum, scabillia tria, sellas quatuor, solia duo, lectum in cubiculo unum, lectos loris subtentos quatuor, et lectos communes tres, pilam ligneam unam, fullonicam unam, tedam iogalem unam, pilas duas, pilum fabarium unum, farrearium unum, seminarium unum, qui nucleos seernat, modium unum, semodium unum, culatras octo, istragula octo, pulvinos sexdecim, operimenta decem, mappas tres, centones pueris sex.

XI.

VINEA M. Centenum iugerum habere oportet villicum villicam, operarios decem. bubulum unum. asinarium unum. subulum unum. Summa hominum. XV. boues duos. et asinos plostrarios duos. asinum molarium unum. uasa torcularia, instructa tria. dolia cum operculis, ubi uindemiæ esse possint, culeorum octingentorum. dolia item, ubi vinaceos cōdat viginti, frumentaria viginti. opcula doliorum, et tectoria prina. urnas sparteas sex. amphoras sparteas quatuor. infundibula duo. cola uitilia tria. cola, quis florem demant, tria. urceos mustarios decem. plostra duo. aratra duo. iuga plostraria duo. iugum asinarium unum. mollile unum, abenum, quod capiat culeos triginta. operculum abeni unum, uncōs ferreos tres. abenum aliud, quod capiat culeos decem, et operculum, urceos aquarios duos. amphorā, nasternam unam. peluim unam. matellionem unum. trullum unum. situlum aquarium unum. trullum scutiscum unum. candelabrum unum. matellam, lectos quatuor. scamnum unum, mensas duas. abacum unum. scabillia quatuor, arcam uestiariam unam. armarium promptuariū unum. scamna longa sex. rotam aquariam unam. modium preferratum unum. semodium unum. solium unum. labrum uinariū unum. labrum lupinariū unum. series decem.

iiiij

ornamēta bubus, et asinis instrata tria. semuncias tres. sportas
fecarias tres. molas asinarias tres. trusatiles unas. ferramenta, fal
ces vineaticas sex, sarpiculas quinque, falces syluaticas quinque, ar
borarias tres, rusticarias decem, secures quinque, et cuneos quatu
or, uomeres ferreos decem, palas sex, rutra quatuor, rastros qua
dridentes sex, crates stercorarias quatuor, sarpeam stercorariam
unam, forāpes duas, foculos duos, rutabulum, corbūlas ameri
nas, viginti, quala sataria. VII. alueos quadraginta palas li
gneas quadraginta, lintres duos, culatras quatuor, instragula
quatuor, puluinos sex, operimenta sex, mappas tres, centones
pueris sex.

XII.

IN TORCVLARIVM hæc opus sunt, uasis qui
nis, præla temperata quinque, supernacanea tria, fuculas quinque,
supernacaneam unam, fines loreos quinque, subductarios quinque,
medipōtos quinque, trocleas quinque, capistra quinque, assercula qu
que, ubi præla sita sient quinque, serias tres, fibulas quadraginta,
uectes quadraginta, consibulas ligneas, quis arbores comprimat,
si dehiscant, et cuneos sex, trapetos quinque, cippas minuscultas
decem, alueos decem, palas ligneas decem, rutra ferrea quinque. XIII.

IN TORCVLARIVM vsui quod opus fiet. Urceum unum æne
um, quod capiat quadrantalia quinque, uncōs ferreos tres, orbem
æneum unum, molas unas, cribrum unum, incerniculum unum,
securim unam, scamnum unum, seriam uinariam unam, clauē
torculario unam, lectum stratum, ubi duo custodes liberi cubent,
et tertius seruus una cum factoribus uti cubet, fisciā nouas, ue
tus epidromum, puluinum, corium unum, lucernas craticulas
duas, carnarium unum, scalas unas. In cellam oleariam hæc
opus sunt. Dolia olearia, et opercula, et labra olearia. XIII. con
chas maiores duas, et minores duas, trullas æneas tres, am
phoras olearias duas, urceum aquarium unum, urnam quinquagenariam unam,
sextarium olearium unum, labellum unum, infundibula duo, spōgias duas,
urceos fictiles duos, urnales duos, trul
las ligneas duas, clauēs cum clostris III. cellas duas, trutinam
unam, centum pondiū incertum unum, et pondera certa. XIII. VILLAM
Aedificandam si locabis nouā ab solo, faber hæc
faciat oportet. Parietes omnes (uti iussit) calce, et cements, pi
las ex lapide angulari, tigna omnia, quæ opus sunt, limina, po
stes, iugumenta, asseres, fulamenta, præsepes bubus hybernas, et

æstinas faliscas, equile, cellas familiæ, carnaria tria. orbem, abel
na duo, haras decem, focum, ianuâ maximam, & alteram, quâ
uolet dominus, fenestras, clatros in fenestras maiores, & minor
res bipedales decem. lumina sex. scamna tria, sellas quinq; tedas
iogales duas, luminaria sex, paululum latam pilam, ubi triticū
pinsant, unam, fullonicam unam, ante pagmenta, uasa torcula
duo. Herus materiem, & quæ opus sunt domui, præstabit, &
ad opus dabit, succidet, dolabit, lineabit, secabitq; materiam so
lam duntaxat. Conductor uero lapidem, calcem, arenâ, aquâ,
paleasq; parabit, & terram, unde lutum fiat. Si de cœlo uilla ta
cta fiet, de ea re uerba diuina uti fiant, procuret. Huic operi pre
tium ab domino bono, qui bene præbeat, quæ opus sunt, & nu
mos fide bona soluat. In tegulas singulas. N. duo. In tectum sic
numerabitur tegula, integra quæ erit, quæ nō erit, unde quarta
pars aberit duæ pro una. Deliciares quæ erunt, pro binis inte
gris putabuntur, in alijs quot erunt in singulas quaternæ nume
rabuntur. Villa fundamenta ex cementsis, & calce supra terram
pede, ceteros parietes ex latere, ingumenta, & antepagmenta,
quæ opus erunt, ex lapide indito. Cetera lex uti uilla ex calce, et
cementsis si fiat, in tegulas singulas. N. 115. in loco salubri bono
domino. Hæc pretia, quæ supra posita sunt ex signo inani p̄titiū
erit, loco pestilenti, ubi æstate fieri non potest, bono domino pars
quarta pretij accedat.

XV.

M A C E R I A Si ex calce, & cementsis, uel silice ædificetur,
uti dominus omnia ad opus præbeat, altā pedes quinq; facto, et
culmen pedem unum crassam, pedem, & semissem, lōgam pe
des quindecim, & uti sublinat locari oportet. Parietes uillæ
si locet in pedes centum, idest pedes denos quoquo uersum habe
at libellum in pedes quinos, & perticam unam, ped. iiii. cūx. Si
sesquipedalem parietē dominus uoluerit, fundamēta faciat, &
ad opus præbeat, ei lōgitudini, & latitudini i pedes singulos al
titudinis opus est calis modiu unū, arenæ modios duos.

XVI.

C A L C E M Partiario coquendam qui dant, ita dant. Calca
rius perfiat, & coquit, & ex fornace calcem eximit, et ligna cō
fiat ad fornacem. Dominus lapidem, ligna ad fornacem, quod
opus fiet, præbet.

XVII.

R O B V R, Et materies item pro ridica, ubi solstitium fuerit
ad brumam semper tempestina est. Quæ materies semen habet,

cum maturum semen habet, tum tempestina est. Quæ materies semen non habet, cum glubet, tum tempestina est. Ea quæ semen uiride, & maturum habet, uti est semen de cupresso, & de pino, quisvis anni temporibus legere possis. itē quisvis anni temporibus matura est, & tempestina, ibi dum sunt nuces bimæ, inde semen excidet, & annicula. ubi primum incipiunt hiascere, tum legi oportet, tum primum per semen incipiunt maturæ esse. Postea usque adeo sunt plus menses octo. Hornotina nuces uirides sunt. Ulmus, cum folia cadunt, tum utraq; tempestina est. XVIII. TORCVLARIVM si edificare uoles, quadrarijs uasis uti contractiora fient. ad hunc modum uasa composito, arbores crassas pedes duos, altas pedes nouem cum cardinibus, foramina longa pedes tres semis, & exalpta digitos sex. Ab solo forame primum, pede uno semis. inter arbores ped. ii. inter arbores, & parietes ped. ii. arbores ad stipitem primum directos ped. sex decem, stipites crassi ped. ii. alti cum cardinibus ped. decem, suctula præter cardines ped. nouem, prælū longum ped. uigintiquinque, inibi lingulam ped. 115. pauimentum binis uasis cum canalibus duobus ped. trigintaquatuor, trapetibus locum dextra, & sinistra, pauimentum ped. uiginti, inter binos stipites uetibus locum pedes uigintiduo. Alteris uasis ex aduersum ab stipite extremo ad parietem, quipponē arbores est, pedes uiginti. Summa torculario, & uasis quadrarijs, latitudo pedum sexaginta sex, longitudo pedum quinquaginta duorum fiet. Inter parietes arbores ubi statues, fundamēta bona facito, alta pedibus quinque, inibi lapides silices in totum forum statuito longum ped. quinque, latum ped. 115. Ibi foramen pedicinis duobus facito. ibiq; arbores pedicino in lapide statuito. Inter duas arbores, quod loci supererit, robore expleto, eo plumbum fundito superiorem partem arborum digitos sex altam facito fiet. Eo capitulum robustū indito, uti fiet stipites ubi stent. Fundamenta pedibus quinque facito. Ibi silicem longum ped. CXV. latum ped. CXV. Crassum. ped. XV. planum statuito, ibi stipites statuito. Item alterum stipitem statuito, insuper arbores, stipitesq; trabem planam imponito, latam ped. duos, crassam pedem unum, longā ped. triginta septē. Has duplices indito, si solidas non habebis. Sub eas trabes inter canales, et parietes extremos, ubi trapeti stent, trabeculam pedū uigintitrium & semis imponito sesqui pedalem, aut binas p sin

gulis desuper ponito. In his trabeculis trabes, quæ insuper arbores stipites stant, collocato. In his tignis parietes extruito, iungitoq; materiæ, uti oneris satis habeat. Aream ubi facies, ped. quinq; fundamenta alta facito, lata ped. sex, aream & canalem rotundam facito latam ped. quatuor S. Ceterum pavimento toto fundamenta pedum duorum facito. Fundamenta, primum fistucato, postea cementis minutis, & calæ arenato semipedem unumquodq; corium struito. Pavimenta ad hunc modum facito. Vbi libraueris, de glarea, & calæ arenato primum corium facito, id pilis subigito, inde alterum corium facito. Eo calcem cribro succretam indito alte digitos duos. Ibi de testa arida pavementum struito. Vbi structum est, pavito, fricatoq; oleo perungito, uti pavementum bonum fiet. Arbores, stipitesq; robustas facito, aut pineas. Si trabes minores facere uoles canales extra columnam exponito, si ita feceris, trabes pedum uigintiduorum longæ opus erunt. Orbem olearium latum pedibus quatuor, puni carnis coagmentis facito crassum digitis sex, subscaudes iligneas adindito. Eas ubi confixeris, clavis corneis occludito. In eum orbem tres cathenas indito. Eas cathenas cum orbibus clavis ferreis corrigito. Orbem ex ulmo, aut ex corylo facito. Si utrūque habebis, alternas indito.

XIX.

IN VASA uinaria stipites, arboresq; binis pedibus altiores facito, supra foramina arborum pedem quæq; uti absient, unæ fibule locum facito. semipedem quoquoersum, in fuculam sena foramina indito. Foramen, quod primum facies, semipedem ab cardine facito, cetera diuidito quam rectissimi me porculum in media fucula facito. Inter arbores medium quod. erit, id ad mediā collibrato ubi porculum figere oportebit. uti in medio prælum recte situm fiet. Lingulam cum facies, de medio prælo collibrato, ut inter arbores bene conueniat, digitum pollicem laxamenti facito. Vectes longissimos pedum decem, & octo, secundos pedum sexdecim, tertios pedum quindecim, remissarios pedum duodecim, alteros pedum decem, tertios pedum octo.

XX.

TRAPETI Columnellam, ferream, quæ in miliario stat, eam rectam stare oportet in medio ad perpendicularum, cuneis salignis circumfigi oportet bene. eo plumbum effundere caueto, nō labet columnella. Si autem mouebitur, eximito, & denuo eodem modo facito, donec non se moueat, si se mouerit, eo plumbi funi

M. CATO.

dito. Modiolos in orbes, oleaginos ex orchite olea facito, et eos circumplumbato, caueto, ne laxi fient. Si autem labent, in cuppam eos indito tunicas solidas, & latas digitum pollicem facito, labeam bifariam faciat, & habeat quas figat clauis duplicibus, ne cadant.

XXI.

C V P P A M trapeti facito pedes decem tam crassam, quam modioli postulabunt, mediam aliam inter orbes, quæ cōueniat, tam crassam, quam columnella ferrea erit. Eam mediam pertundito, uti in columnella indere possis. Eo fistulā ferream indito, quæ in columnellam conueniat, & in cuppam. Inter cuppam dextra, sinistraq; pertundito late digitos primores. IIII. alte digitos primores tres, sub cuppa tabulam ferream lata cuppa media erit, pertusam figito, quæ in columnellam cōueniat dextra, sinistraq; foramina ubi feceris, laminis circumplectito replicato in inferiorem partem cuppæ omnis quatuor laminas dextra, sinistraq; foramina utrinq; secus laminas. Sublaminas polulas minutas supponito, easq; inter sese configito, ne foramina maiora fiant, quo cuppæ minuscule indentur. Cuppam, qua fini in modiolos erit, utrinque secus imbriabus ferreis quatuor desues, ibiq; utrinq; secus facito, qui figas. Imbrices medias clauulis figito. Supra imbrices extrinsecus cuppam pertundito, qua clauus eat, qui orbem claudat. Insuper foramen librarium ferreum digitos sex latum indito, pertusum utrinq; secus, qua clauus eat. Hæc omnia eius rei causa fiunt, uti ne cuppa in lapidem conteratur.

Armillas quatuor facito, quas circum orbem indas, ne cuppa, & clauus conterantur. Intrinsecus cuppam materia ulmea, aut faginea facito. Ferrum factum, quod opus erit, uti idem faber figat. LX. operæ opus sunt, cum plumbū in cuppā emittis. IIII. cuppam qui conannat, & modiolos qui indat, & plumbet operas fabri duntaxat octo. Idem trapetum oportet accommodet. Sumpti summa. N. LXXII. præter adiutores.

XXII.

T R A P E T V M hoc modo accommodare oportet, librator uti statuatur pariter, ab labris digitum minimū orbē abesse oportet. ab solo mortarij orbes cauere oportet, ne qd mortariū terāt. Inter orbem, et miliariū unum, digitum interesse oportet, si plus intererit, atq; orbes nimium aberunt, funi circūligato miliariū arte crebro uti expleas quod nimium interest. Si orbes altiores erunt, atq; nimium mortarium deorsum teret orbiculos ligneos

pertusos in miliarium, in columnellam supponito, eo altitudinē
 temperato. Eodem modo latitudinē orbiculis ligneis, aut armil-
 lis ferreis temperato, usq; dum recte temperabitur. Trapetus em-
 ptus est in Sueffano numis quadringētis, & olei. p. l. compostu-
 ra numis sexaginta, uectura boum, & operas sex cum bubulis
 numis septuaginta duobus. cuppam ornata, numis septuagin-
 ta duobus. pro oleo. N. XXV. Summa sumpti. N. DCXXIX.
 ceterus ornatus domi. Pōpeys emptus ē trapetus numis tricētis
 octogintaquatuor, uectura ducētis octoginta numis emptā est.
 Domi melius conannatur, & accommodatur. Eo sumpti opus
 est. N. LXV. Summa. N. DCCXXIX. Si orbes ueteres trapeto
 parabis medios crassos pede uno, digitis tribus. altos pede uno,
 foramen semipede quoquo uorsum, Eos cū aduexeris, ex trapeto
 temperato. Vēdūtur ad rufri macerias numis centum octoginta.
 tēperantur numis triginta, tantidē Pōpeys emūtur. XXIII.
FACE Ad uindemiam, quæ opus sunt, uti antea parētur, ua-
 sa lauentur, corbulæ sarciantur, picētur dolia, & alia, quæ opus
 sunt, picentur. & cum pluet, aqua imbuantur Quala parētur,
 & sarciantur. far molatur. bennæ emantur. oleæ caducæ saliātur.
 Vuas misellas ad uinū preliganeum, quod operarij bibant, ubi
 tempus erit, legito succum puriter omnium dierum pariter in do-
 lia diuidito. Si opus erit, defrutum indito in mustum, de musto
 lixiuo coctum, partem quadragesimā addito defruti, uel salis ses-
 quilibrā in culeum indito. Marmor si indes in culeum, librā
 indito in urnam, & misceto cum musto. Si in dolium resinan-
 indes, in culeum musti. p. iii. bene comminuato, inde in fiscellam
 indito, & facito uti in dolio musti pēdeat. eam crebro quassato,
 uti resina deliquescat. Si indideris defrutum, aut marmor, aut
 resinam, dies uiginti permisceto crebro, tribulatoq; quotidie.
 Tortiuum mustum circuncidaneum suo cuiq; dolio diuidito, ad-
 ditoq; pariter. XXIIII.
VINVM græcum hoc modo fieri oportet. Vuas Apicias per-
 coctas bene legito. ubi delegeris, in eius musti culeum aquæ ma-
 rinæ ueteris quadrantalia bina, uel salis puri modium. Hunc in
 fiscellam suspendito, finitoq; cum musto distabescat. Si helueolū
 uinum facere uoles, dimidiū helueoli, dimidiū apicij indito,
 defrutiq; ueteris partem trigessimā addito. Quicquid uini de-
 frudabis, partem trigessimā defruti addito. XXV.

C V M Vinum coctum erit, & cum legetur facito uti seruetur familie primum. Sicq; facito, studeas bene percoctum, sicumq; legere, ne vinum nomen perdat. Vinaceos quotidie recentes succernito, Lectos exiccato restibus subtentis, cribro illi rei parato, siccos conculcato in dolia picata, uel in lacum uinarium picatū. id bene operito, iubetoq; oblini uti habeas, quod des bubus per hyemem. Indidem, si uoles, lanito paululum, & lorea erit familie, quod bibat.

XXVI.

V I N D E M I A Facta uasa, torcula, corbulae, fisanas, funes, patibula, fibulas iubeto suo quicque loco condi. Dolia cum uino bis in die face extergeantur. Priuasq; scopulas in dolia facito habeas illi rei, quis labra doliorum circumfrices. Vbi erit lectum post dies triginta, si bene deacinata erunt dolia, oblinito. Si uoles de fece demere uinū, tum erit ei rei optimū tēpus.

XXVII.

S E M E N T I M Facito ita, ocynum, uiciam, scœnum græcum, fabam, eruum, pabulum bubus serito. Alteram, & tertiā pabuli sationem facito. Deinde alias fruges serito, Scrobes inuertito oleis, ulmis, uitibus, ficiis, simul cum semine. Si erit locus siccus, tum oleas per sementim serito, & quæ ante satæ erunt, teneras tum supputato, & arbores ablaqueato.

XXVIII.

O L E A S, Ulmos, ficos, poma, uites, pinos, cupressos cum seres, bene cum radicibus eximito cum terra sua quamplurima, circumligatoq; uti ferre possis, in alueo, aut in corbula ferri iubeto. Caueo autē, ne cum uentus fiet, aut imber, effodias, aut seras. nā id maxime cauendum est. In scrobe cum pones summam terrā subdito. postea opito terra radicibus fini, deinde calcato pedibus bene, deinde fistucis, uestibusq; calcato, quamoptime poteris. Id erit ei rei primum. Post hæc arbores crassiores digitis quinque quæ erunt, eas præcisas serito, oblinitoq; fimo summas, & folijs alligato.

XXIX.

S T E R C V S diuidito sic. Partem dimidiam in segetem, ubi pabulum seras, inuehito. etsi ibi olea erit, simul ablaqueato, stercoq; addito. Postea pabulū serito, partem quartā circum oleas ablaqatas, qua maxime opus erit addito, terraq; sterco opito. Alteram quartam partē in pratum reseruato, idq; tum maxime opus erit, ubi fauonius flabit. Euehito luna silenti.

XXX.

B V B V S Frondem populneam, ulmeam, querneam, ficulneamq; usquedum habebis, dato. Onibus frondem uiridem: usque

dum habebis, præbeto. Vbi sementim facturus eris, ibi oues delegato, et frōdem usq; ad pabula matura dato. Pabulum aridū quod condideris in hyeme, q̄maxime conseruato, cogitatoq; hyemis q̄longa fiet.

XXXI.

AD Oleam cogendam quæ opus erunt, parentur. Vimina matura, salices per tempus legantur, uti fiet unde corbulæ fiant, et ueteres sarciantur. Fibulæ unde fiant aridæ iligneæ, ulmeæ, nucæ, ficulneæ face uti in sterco, aut in aquam coniiciantur. inde ubi opus erit, fibulas facito. uetres iligneos, aqui folios, laureos, ulmeos facito, uti fient parati. Prælum de sappino atra potissimum facito. At ulmeam, pineam, nucæam, hanc, atq; aliā materiem omnem cum effodies, luna decrescente eximito post meridiem sine uento austro. Tum erit tempestiua, cum semen suū maturum erit. Cauetoq; ne per rorem trahas, aut doles. Quæ materies semen nō habebit, cū glubet, tempestiua erit. Vento austro caueto, neq; materiē, nēne uinū tractes, nisi necessario. XXXII.

VINEAS, Arboresq; mature face incipias putare. Vites propages in sulcos, sursum uorsum, quod eius facere poteris facito uti ducas. Arbores hoc mō putentur, rami diu aricentur, quos relinques, & uti recte cadantur, & ne nimium crebri relinquatur. uites bene nodentur per omnes ramos, diligenterq; caueto, ne uitem præcipites, & ne nimium perstringas. Arbores facito uti bene maritæ sint, uitesq; uti satis multæ asserantur, & sicubi opus erit, de arbore deiciantur, et in terram deprimantur, & biennio post prædito ueteres.

XXXIII.

VINEAM sic facito, uti curetur. Vitem bene enodatam deligato recte, flexuosa uti ne fiet, sursum uorsum semper adducito quod eius poteris, uinarios, custodesq; relinquito. Quam altissimam uineam facito, alligatoq; recte, dum ne nimium constringas, hoc modo eam curato. Capita uitium per sementim ablaqueato. Vineam putatā circūfodito. arare incipito, ultro atroq; sulcos perpetuos ducito. Vites teneras quam primum propagato, ueteres q̄minimum castrato, potius, si opus erit, deiciato, biennioq; post prædito. Vitem nouellam rescari tum erit tempus, ubi ualebit. Si uinea à uite caluata erit, sulcos iterponito, ibiq; uiniradicem serito. umbram ab sulcis remoueto, crebroq; fodito. In uinea uetere serito ocymum. Si macra erit, quod granū capi at ne serito, et arcū capita addito sterco, paleas, uinaceas, aut

M. CATO.

aliquid horum, quo rectius ualeat. Vbi uinea frondere cœperit, pampinato. Vineas nouellas alligato crebro, ne caules perfringantur. Et quæ iam in perticam ibit, eius pampinos tene ros alligato leuiter, corrigitoq; uti recte spectent. Vbi uua uaria fieri cœperit, uites subligato, pampinatoq; et uuas expellito circum capita sarrito. Salictum suo tempore cedito, glubito, ardeq; alligato. Librũ conseruato, et cũ opus erit i uinea ex eo in aq; coniũcto. Vimina unde corbula fiãt, cõseruato. XXXIIII.

REDEO ad semetum. ubi quisq; locus frigidissimus, aquosissimusq; erit, ibi primum serito. In calidissimis locis sementim postremum fieri oportet. terram caue cariosam tractes ager rubricosus, et terra pulla atterina rudeta, et arenosa. Item quæ aquosa non erit, ibi lupinum bonum fiet. In creta, et uligine, et rubrica, et agro, qui aquosus erit, semen adorem potissimum serito, quæ loca sicca, et nõ herbosa erunt, aperta ab umbra, ibi triticum serito. XXXV.

FABAM in locis ualidis non calamitosis serito. Viciam, et fœnum græcum q̃minime herbosis locis serito. Siliginem, triticum in loco aperto, et ælso, ubi sol q̃diutissime fiet, seri oportet. Lentum in rudeto, et rubrico loco, qui herbosus nõ fiet, serito. Hordeum qui locus nouus erit, aut qui restibilis fieri poterit, serito. trimestrem quo in loco sementin maturam facere non poteris, et qui locus restibilis crassitudine fieri poterit, seri oportet. Rapinã et coles rapicij unde fiant, et raphanum in loco stercorato bene aut in loco crasso serito. XXXVI.

QUAE segetem stercorant. Stercus columbinũ spargere oportet in pratum, uel in hortum, uel in segetem. Caprinum, ouillũ, bubulum, item cæterum stercus omne sedulo conseruato. Amurcam spargas, uel irriges ad arbores, circum capita maiora amphoras, ad minora urnas cum aquæ dimidio addito, prius ablaqueato non alte. XXXVII.

CARIOSAM terram faciet, si iacies acer, et quia uellitur. et quod salsum est, eo malum est. Hordeum, fœnum græcum, erium, hæc omnia segetem exugunt, et omnia, quæ uelluntur ex eis, mala sunt. Nucleos in segetem ne indideris, qui suffocant fruges. Lupinum, faba, uicia, stercus unde faciãs, habent. Stramenta, paleæ, fabalia, et cætera itidem. Aeris frondem, iligneam, querneam ex segeti uellito. Stipulas, ebulum, et acutam et circum sata

omni sata herbarum altam succide, & eam substernito omnibus, but-
busq;. Frondem putridam & putrem partem de nucleis succer-
nito, et in lacum conijcto, eo aquam addito, permiscetoq; rutro
bene. Inde lutum circum oleas ablaqueatis addito, & nucleos
item combustos addito. Vineam si macra erit, sarmenta sua con-
cidito minute, & ibidem inarato, aut infodito. Per hyemem lu-
cubratione hac facito. Ridicas, & palos, quos pridie in tecto po-
sueras, siccos dolato, faculas facito. Stercus egerito, nisi in trime-
stri, lunaq; dimidiata materiam ne tãgas. Materiam quam effo-
dies, aut pãdes, ab terra diebus septẽ, p̃ximis qbus luna plena
fuerit, optime exime. Omnino caueto, ne quam materiã doles,
neu cãdas, neu tãgas, si potes nisi siccã, neu gelidam, neu roru-
lentã. Frumenta bis face sarrias, runcesq;, auenãq; destringas.
De vinea, et arboribus putatis sarmenta deterge, sisinam face,
& vites, & ligna in caminum congere, siculna, & codiallos
domino in acerium componito.

XXXVIII.

FORNACEM Calcariam pedes latam decem facito, altã
pedes viginti, usque ad pedes tres summam latam redigito. Si
uno p̃æfurnio coques, lacunam intus magnam facito, uti satis
fiet, ubi cinerem concipiat, ne foras sit educendus. Fornacem be-
ne struito, faritoq; foras, ut totam fornacem infimam complecta-
tur. Si duobus p̃æfurniis coques, lacuna nihil opus erit. Cũ a-
nere eruto opus erit, altero p̃æfurnio eruito, i altero ignis erit.
Ignem caueto ne intermittas, quin semper fiet, neue noctu, ne-
ue ullo tpe intermittatur caueto. Lapidem bonum, q̃durissimũ,
q̃candidissimũ, q̃minime uarium in fornacem indito. Cum for-
nacem facies, fauces p̃æcípites deorsum facito. Vbi satis foderis,
tum fornaci locum facito, ut quamaltissima, & quamminime uẽ-
tosa fiet. Si parum altam fornacem habebis, ubi facies, lateribus
summam struito, aut cementis. Summam cum luto extrinsecus
oblinito. Cum ignem subdideris, siqua flamma exhibit, nisi per
orbem summum. Luto oblinito, Ventus ad p̃æfurnium caue-
to ne accedat. Inibi austrum caueto maxime. Hoc signi erit,
ubi calx cocta erit, summos lapides coctos esse oportebit. Item
infimi lapides cocti cadent, & flamma minus fumosa exhibit.
Itaq; si ligna, et uirgas nō poteris uendere, neq; lapidem habe-
bis, unde calcem coquas, de lignis carbonem coquito, uirgas, &
sarmẽta, quæ tibi uestioni supererunt, in segetem comburito. Vbi

Collu.

b

cas combusseris, ibi papauer serito.

XXXIX.

V B I Tempestates male erunt, cum opus fieri non poterit, ster-
cus in sterquilinum egerito. Bubile, ouile, cortem, uillam be-
ne purgato, Dolia plumbo uinato, uel materie quernæ, & uiti
sicca alligato. Si bene sarseris, aut bene alligaueris, & in rimas
medicamentum indideris, beneq; picaueris quoduis dolium ui-
narium facere poteris. Medicamentum in dolium hoc modo fa-
cito. Cere partem. I. resinæ partem. I. & sulfuris partem. IS.

Hæc omnia in calicem nouum indito, eo addito gypsum contri-
tum, uti crassitudo fiat quasi emplastrum, eo dolia sarato. Vbi
Sarseris, qui colorem eundem facias, cretæ crudæ partes duas
calis tertiam commisceto, inde laterculos facito, coquito in for-
nacem, conterito, idq; induito. Per imbrem in uillam querito,
quid fieri possit. Ne cessetur munditias facito. Cogitato, si nihil
fiet, nihilominus sumptum futurum.

XL.

P E R Ver hæc fieri oportet. Sulcos, et scrobes fieri seminarijs.
Vitarijs locum uerti. uites propagari. In locis crassis, & hume-
ctis ulmos, ficos, poma, oleas seri oportet. Ficos, oleas, mala, py-
ra, uites inferi oportet luna silenti post meridiem, sine uento au-
stro. Oleas, ficos, pyra, mala, hoc modo inferito. Quem ramum
insiturus eris, præcido, inclinato aliquantulum, ut aqua deflu-
at. Cum præcides, caueto, ne librum conuellas. Sumito tibi sur-
culum durum, eum peracuito, salicem græcam discindito, argil-
lam, uel cretam coaddito, arenæ paululum, & finium bubulū.
Hæc unà bene condensato, quammaxime uti lutum fiat, dein ca-
pito tibi sissam salicem, eaq; stirpem præcisam circunligato, ne li-
ber frangatur. ubi id feceris, surculum aridum præacutum inter
librum, & stirpem arato primores digitos duos, postea capito ti-
bi surculum, quod genus inferere uoles, eum primorem proacui-
to obliquum primores digitos duos, surculum aridum, quem ar-
cueras, eximito, eoq; arato surculum, quem inferere uoles. librū
ad librum uorsum facito, arato usque adeo quo præacueris. Idē
alterum surculum tertium, quartum facito. Quot genera uoles,
tot indito, salicem græcam amplius circunligato, luto densato,
stirpē oblinito, digitos crassum tres. Insuper lingua bubula ob-
tegito, si pluat, ne aqua in librum permeet, eam linguā insuper
librum alligato, ne cadat. Postea stramentis circundato, alliga-
toq; neu gelu noceat.

XLI.

VITIS Insitio una est per uer, altera est cum uua floret, ea optima est. Pyrorum, & malorum insitio per uer, & per solstitium dies quinquaginta, & per uindemiam. Oleæ, & ficorum insitio est per uer. Vitem sic inserito, prædido quā inferes, eāq; mediam diffindito per medullam, eo surculos præacutos arato.

Quos inferes medullam cum medulla composito. Altera insitio est. Si uitis uitem contingat, uitis utriusq; latus alterum præradito oblique, & inter sese medullam cum medulla libro colligato. Tertia insitio est. Terebra uitem quam inferes, pertundito. eo duos surculos uitigineos, quod genus esse uoles, insertos obliquos arato ad medullam, facitoq; ut medullæ medullam coniungas, aratoq; ea, qua terebraueris, alterum ex altera parte. Eos surculos facito sint longi pedes binos, eos in terram demittito, replicatoq; ad uitis caput, utiq; uinclis alligato, medios in terrā defigito, terraq; operito. Hæc omnia luto prædicto oblinito, alligatoq; integitoq; ad eundem modum, tanquam oleas. XLII.

FICOS, & oleas alitero modo inserito, quod genus aut ficum, aut oleam esse uoles, inde librum scalpro eximito, alterum librum cum gēma de eo fico, quod genus esse uoles, eximito, apponito in eum locum, unde exicaueris in alterum genus, facitoq; uti conueniat. Librum longum facito digitos tres semis, latū digitos tres, ad eundē modū oblinito, integito, uti cætera. XLIII.

S VLCOS, si locus aquosus erit, alueatos esse oportet latos summos pedes tres, altos pedes quatuor, infimum latum pedem unum, & palmum. eos lapide consternito. si lapis non erit, pericis saligneis uiridibus quoquoersus collatis consternito. si perica non erit, sarmentis colligatis itidem facito. Postea scrobes facito altos pedes tres semis, latos pedes quatuor, & facito, uti de scrobe aqua i sulcos defluat, et ita oleas inserito. Vitibus sulcos, & propagationes, ne minus pedibus. II. S. quoquoersus facito. Si uoles uinea cito crescat, & olea, quam seueris, semel in mense sarrito, & circum capita oleagina quot mensibus usq; donec trimæ erunt, fodere oportet. Eodem modo cæteras arbores procurato.

XLIIII.

OLIVETVM diebus quindecim ante æquinoctium uernum incipito putare. Ex eo die dies quadraginta quinque recte putabis. Id hoc modo putato, qui locus recte ferax erit, quæ arida erunt, & siquid uentus interfregerit, ea omnia eximito, qui lo-

b ij

cus ferax non erit, eo plus concidito, aratoq; bene, enodato, stir/
pesq; leues facito. XLV.

T A L E A S Oleaginas, quas in scrobe saturus eris, tripeda
neas decidito, diligenterq; tractato, ne liber laboret, cum dola
bis, aut secabis, quas in seminario saturus eris, pedales facito,
easq; sic inserito. Locus bipalio subactus fiet, beneq; glutus fiet.
Cum taleam demittes, pede tantum opprimito, si parum descē
dit, malleolo, aut mateola adigito, cauetoq; ne librum sandas,
cum adiges. Palo prius locum si feceris, quo taleā demittas, et
si ita seueris, utilis fiet talea, meliusq; uiuet. Talea ubi trimae
sunt, tum deniq; tibi curae sint, ubi liber sese uertet. Si in scrobi
bus, aut in sulcis seres, ternas taleas ponito, easq; diuaticato, su
pra terram, ne plus quatuor digitis transuersis emineant, gem
ma, uel oculo seruato. XLVI.

S E M I N A R I V M ad hunc modum facito. Locum quā
optimum, & apertissimum, & stercoratissimū poteris, & quā
simillimum terrae, ubi semina positurus eris, & uti ne nimis lō
ge semina ex seminario ferantur, eum locum bipalio uortito, de
lapidatoq; & circūsepito bene, & in ordine serito, in sesquipe
dem quoquo uorsum taleam demittito, opprimitoq; pede, & si
parum deprimere poteris, malleo, aut mateola adigito, digitum
supra terram facito semina emineant, fimoq; bubulo summā
taleam oblinito, signumq; apud taleam apponito, crebrōque
farrito. Si uoles cito semina crescant, ad eundem modum alia se
mina serito. XLVII.

A R V N D I N E M sic serito. In ternos pedes arundinum
oculos disponito, uitiarium eodem modo facito, seritoq; , ubi ui
tis bima erit, resecatō, ubi trima erit, eximito, si pecus pasceat, ubi
uitem serere uoles, ter prius resecatō, q̄ ad arborē ponas, ubi quā
q; nodos ueteres habebit, tum ad arborē ponito, quotannis por
rinam ibi serito, quotannis habebis quid eximas. XLVIII.

P O M A R I V M seminarium ad eundem modum, atque
oleagineum facito, suum quodq; genus talearum serito. Semen
cupressi ubi seres bipalio uortito, uere primo serito, porcas pedes
quinos latas facito, eo stercus minutum addito, & confarrito,
glebasq; comminuito. Porcam planam facito, paululum concu
uam. Tum semen serito, cribro tanquam linum, & eo terram
cribro incernito altam digitum transuersum, eam terram tabu

bula, aut pedibus complanato, furcas circum offigito, eo ptiat intendito, eo sarmenta, aut crates ficarias imponito, quæ frigus arceant, & solem, uti subtus homo ambulare possit, facto, crebro runcato, simulac herbæ inceperint nasci, eximito. Nam si herbæ duram uelles, cupressos simul euelles. Ad eundem modum semen pyrorum, malorum serito, tegitoq;. Noces pineas ad eundem modum, tanquam allium serito.

XLIX.

VINEAM ueterem si in alium locum transferre uoles, dum taxat brachium crassam licebit. Primum deputato, binas gemmas, nec amplius relinquito, ex radicibus bene effodito, usq; radices persequitor, & caueo, ne radices faucies. Ita uti fuerit, ponito in scrobe, aut in sulco, operitoq;, & bene occulcato. Eodemq; modo uineam statuito, alligato, flexatoq; uti fuerat, crebroq; fodito.

L.

PRATA primo uere stercorato luna silenti, quæ irrigua nō erunt. Vbi fauonius flare cœperit, tum prata defendes, depurgato, herbasq; malas omnes radicibus effodito. Vbi uineam deputaueris, aceruum lignorum, uirgarumq; facto. Ficos interpretato, & in uinea ficos succidito alte, ne eas uites scindant. Seminaria facto, & uetera resarato. Hæc facto ante quàm uineam fodere incipias. Vbi daps profanata, comestaq;, erit uerno arare incipito, & loca primum arato, quæ siccissima erunt, & quæ crassissima, & aquosissima erunt, ea postremum arato, dum ne prius obdurescant.

LI.

PROPAGATIO pomorum, aliarumq; arborum. Ab arbore abs terra pulli, qui nascentur, eos in terram deprimito, extollitoq; primorem partem, uti radicem capiat, inde biennio post effodito, seritoq;. Ficum, oleã. malum, punicum, cotoneum, aliaque mala omnia, laurum, myrtum, noces prænestinas, platanumq;. Hæc omnia à capite propagari, eximiq;, seri;q; eodẽ modo oporet.

LII.

QVAE diligentius propagari uoles, in aullas, aut in qualos, pertusos propagari oportet, et cū his in scrobem deferri oportet. In arboribus, ubi radices capiant, calicem, aut qualum pertundito, per fundum ramū, quem radicem capere uoles, scarificato, trauctoq;. Eū qualū, aut calicem terra impleto, calcatoq; bene, in arborem relinquito. Vbi ita fuerit, & radices egerit, ramum sub qualo prædito. Qualum incidito ex una parte perpetuum.

b iij

M. C A T O.

Si uero calix erit conquassato, cū eo qualo, aut calicē in scrobem ponito. Eodē modo uitē facto, eam āno post recidito, seritoq; eū qualo. Hoc modo quodq; genus uolueris propagabis. **LIII.**

F O E N V M, ubi tēpus erit, secato, canetoq; ne serō seces. Prius quā semen maturum fiet, secato, & quod optimum fœnum erit, seorsum condito. **LIIII.**

P E R uer cum arabitur ante quā ocymum nascatur, dies qđ edant bubus pabulum. Id hoc modo parari, dariq; oportet. Vbi sementim patraueris, glandē parari, legiq; conuenit, et in aquā conijci. Inde semodios, singulis bubus in dies dari oportet, aut modium uinaciorū, quos in dolium condideris. At si non laborabunt, pascantur, satius erit. Interdiu pasito, noctu fœni pondo. **XXV.** uni boui dato. Si fœnum non erit, frondem iligneam, & ederaceam dato. Paleas triticæas, & ordeaceas, uiciam acus fabaginum, uel de lupino, item de cæteris fragibus omnia condito. Cum stramenta condes, quæ herbosissima erunt, in tecto cōdito, & sale superspargito. Deinde ea pro fœno dato. Vbi uerno dare cœperis, modium glandis, aut uinaciorum dato, aut modium lupini macerati, & fœni pondo. **XV.** Vbi ocymum tempestiuum erit, dato primum. Manibus carpito, id renascetur, qđ falcula secueris, non renascetur. Vsq; ocymum dato, donec arescat, ita temperato, post uiciam dato, postea panicū dato, secūdū panicum frondem ulmeam dato. Si populneam habueris, admisce to, ut ulmea satis fiet. Vbi ulmeam non habebis, querneam, & si culneam dato. Nihil est, quod magis expediat, q̄ boues bene curare. Boues nisi per hyemem, cum nō arabunt, pasā nō oportet. Nam uiride cū edunt, semper id expectant, & fisciellas hñe oportet, ne herbam sectentur, cum arabunt. **LV.**

L I G N A domino in tabulato condito, codiaillosq; oleagineos, radices in acervo sub dio metas facto. **LVI.**

F A M I L I A E cibaria ubi opus facient per hyemem, tritici modios. **IIII.** per æstatē modios. **IIII.** semis uillico, uillicæ epistatæ, opilioni modios. **III.** Compeditis per hyemē panis pōdo. **IIII.** Vbi uineam fodere cœperint, panis. **p. V.** usque adeo dum ficus esse cœperint, deinde ad panes. **IIII.**redito. **LVII.**

V I N V M familiæ, ubi uindemia facta erit, loram bibant mēs tres. Mense quarto heminam in dies. **I.** in mense congios tres. Mense quinto, sexto, septimo, & octauo. in dies sextarium. **I.** in

menſe congios quinque, nono, decimo, undecimo, & duodecimo in dies heminas ternas, ideſt amphoram in menſe. Hoc amplius ſaturnalibus, & compitalibus in ſingulos hoīes congios. Summa uini ī homines ſingulos intra annum quadrantalīa. VIII. compeditis autem ut quicquid operis facient pro portione addito. Eos non eſt nimium in annos ſingulos uini quadrantalīa. X. ebibere.

LVIII.

PVLMENTARIVM familie, oleæ caducæ quamplurimum condito. Poſtea oleas tempeſtinas, unde minimum olei fieri poterit, eas condito, & partito, uti q̄diutiffime durēt. ubi oleæ comeſe erūt, halecem, & acetū dato. Oleū in mēſes dato unicuiq; ſextarium. I. Salis unicuiq; in anno modium ſatis eſt. LIX. **VESTIMENTA** familie tunicam. p. III. S. ſaga alternis annis. Quoties cuique tunicam, aut ſagam dabis, prius ueterem accipito, unde centones fiant. Sculponeas bonas alternis annis dare oportet.

LX.

BVBVS cibaria ānua in iuga ſingula lupini modios. CXX. ac glandis modios. CCXL. fœni pondo. LXXI. ocymi tantundem, ſabæ modios. XX. uiciæ modios. XXX. Præterea uideto, uti ſatis uiciæ ſeras. Pabulū cum ſeres, multas ſatiōes facito. LXI. **QVID** eſt agrum bene colere? Primum bene arare. Quid ſecundum? Arare. Quid tertium. Stercorare. Qui oletum ſepiffime, & altiffime miſcebit, is tenuiffimas radices exarabit, ſi male arabit, radices ſurſum abibunt, craſſiores fient, & in radices uires oleæ abibunt. Agrum frumentarium cū aras, bene, & tēpeſtine ares, ſulco uario ne ares. Cætera cultura eſt multum ſerere, & diligenter eximere ſemina, & per tempus radices quamplurimas cum terra ſerre. ubi radices bene operueris, calcato bene, ne aqua noceat. Siquis quærat, quod tempus oleæ ſerēdæ fiet, agro ſicco per ſementim, agro leto per uer.

LXII.

QVOT iuga boium, mulorum, aſinorum habebis, totidē ploſtra eſſe oportet.

LXIII.

FNEM torculum eſſe oportet extentum. p. LV. Funem loreum in ploſtrum. p. LX. lorea retinacula longa. p. XXVI. ſubiugia in ploſtrum. p. XIX. funiculum. p. XV. in aratrum ſubiugia lorum. p. XVI. funiculum. p. VIII.

LXIII.

OLEA ubi matura erit, q̄primum cogi oportet, quāminimū. in terra, & in tabulato eſſe oportet. In terra, & in tabulato pu

b iiij

M. C A T O.

trescit. Leguli uolunt, uti olea caduca quāplurima sit, quo plus legatur. Factores, ut in tabulato diu sit, ut fraida sit, quo facilius oleū efficiant. Nolito credere oleū in tabulato crescere posse. Quamātissime conficies, tam maxime expediet, & totidem modis collectæ plus olei efficient, & melius. Olea, quæ diu fuerit in terra, aut in tabulato, inde minus fiet olei, & deterius. Oleū, si poteris, bis in die depleto. Nam oleū quādiutissime in amurca, & in fraibus fuerit tam deterrimum erit. LXV.

OLEVM uiride sic facto, oleam quamprimum ex terra tollito. Si inquinata erit, lauito, à folijs, & stercore purgato. Postridie, aut post diem tertium, quæ lecta erit, facto. Oleā, ubi nigra erit, stringito. Quā acerbissima olea oleum facies, tam oleum optimum erit. Domino de matura olea oleū fieri maxime expediet. Si geliadia erunt, cum oleam coges, triduum, aut quatrimum post oleum facto. Eam oleam, si uoles, sale inspergito. Quā utilidissimum torcularium, & cellam, habeto. LXVI.

CVSTODIS, & capulatoris officia. Seruet diligenter cellam, & torcularium. Caneat quāminimum in torcularium, & in cellam introeatur. Quāmundissimo, purissimoq; fiat uase abeneo, neq; nucleis ad oleum ne utatur, nam si utetur, oleū male sapiet. Cortinam plumbeam in lacum ponito, quod oleū fluat. Vbi factores uestibus premerint, continuo capulator concha oleum quāmdiligentissime poterit, tollat, nec cesset. Amurcam caueat ne tollat. Oleum in labrū primum indito. Inde in alterū doliū indito. De us labris fraces, amurcamq; semper subtrahito. Cum oleū sustuleris de cortina amurcā dehorito. LXVII.

ITEM custodis officia, quæ in torculario erunt uasa, pura habeat, curetq; uti olea bene perficiatur, beneq; siccetur. Ligna in torculario ne cedat. Oleum frequenter capulet. Factoribus det in singulos factus, olei sextarios, & in lucernam quod opus fiet. Fraces quotidie euacuat, amurcam cōmutet usque adeo, donec in lacum, qui in cella est, postremum peruenerit, si sinas spongia effingat. Quotidie lacum oleo cōmutet, donec in dolium peruenerit. In torculario, & in cella caneat diligenter, neqd olei furripiatur. LXVIII.

VBI uindemia, & oleitas facta erit, præla extollito, funes torculos, medipontos, subductarios aut in carnario, aut in prælo suspendito, orbes, fibulas, uestes, scutulas, si sinas, corbular, quala,

scalas, patibula oīa, q̄s usus erit, ī suo qd̄q; loco repōito. **LXIX.**

DOLIA olearia noua sic inibuito. Amurca īpleto dies **VII.**

Facito, ut amurcā quotidie suppleas. Postea amurcā eximito, et arefacito. Vbi arebit, cuminum pridie in aquā infundito. Eā postridie diluito. Postea dolium calfacito. Minus, q̄ si picare uelis, tepeat, satis est, Lenibus lignis facito caleseat. Vbi temperate tepabit, tum cuminum indito, postea linito. Si recte lineris, indolium quinquagenarium cumini. p. **IIII.** satis erit. **LXX.**

BVBVS si morbu metues, sanis dato salis micas. **III.** laurea folia. **III.** porri fibras. **III.** ulpii spicas. **III.** alij spicas. **III.** thuris grana. **III.** herbae sabinæ plantas. **III.** rutæ folia. **III.** uitis albæ caules. **III.** fabulos albos. **III.** carbones uiuos. **III.** uini. **S. III.** Hæc oīa sublimiter legi, teri, dariq; oportet. Ieiunus fiet, q̄ dabit. Ter tridui de ea potiōe unicuiq; bōi dato. Ita diuidito, cū ter unicuiq; dederis, oēm absumas. Bosq; ipsus, et q̄ dabit, facito ut uterq; sublimiter stent, nase ligneo dato. **LXXI.** **BOS** si ægrotare cœperit, dato continuo ei ouum unum gallinaceum crudum, integrum deuoret. Postridie caput ulpii conterito, & id nase ligneo terito, & cum hemina uini facito bibat sublimiter. Bosq; ipsus, & qui dabit, sublimiter stet. Ieiunus, ieiuno boni dato. **LXXII.**

BOVES ne pedes subterant priusquam in uiam quoquam agas, picæ liquida cornua infima unguito. **LXXIII.**

VBI uæ uariæ cœperint fieri, bubus medicamentū dato quottannis, uti ualeant. Pellem anguinam ubi uideris, tollito, et cōdito, ne queras, cum opus fiet. Eam pellem, & far, & salem, & serpyllum, hæc omnia unā conterito, cum uino dato bubus omnibus ut bibant, per æstatem boues aquam bonā, & liquidā bibant, semper curato, ut ualeant, refert. **LXXIIII.**

PANEM depiticum sic facito. Manus, mortariumq; bene lauato. Farinā in mortariū idito, aq̄ paulatim addito, subigitoq; pulchre, ubi bene subegeris, defingito, coqtoq; sub testā. **LXXV.**

LIBM hoc modo facito. Casei pondo. **II.** in mortario bene disterat. Vbi bene distriuerit, farine siliginis librā, aut si uoles tenerius esse, selibram siliginis solum eodem indito, permiscetoque cum caseo bene, ouum. **I.** addito, & unā bene permisceto. Inde panem facito. Folia subdito, in foco calido sub testu, coquito leniter. **LXXVI.**

M. CATO.

PLACENTAM sic facito. Farinae filigineae lib. II. unde solum facias in tracta, farinae lib. IIII. & alicae primae. lib. II. alicam in aquam infundito. ubi bene mollis erit, in mortarium purum indito, siccatoq; bene. Deinde manibus depsito. ubi bene subactum erit, farinae lib. IIII. paulatim addito, id utrunque tracta facito. In qualo, ubi arescant. composito. ubi arebunt, composito puriter, tum facies in singula tracta. Vbi depsueris, panis no oleo uncto tangito, & circumtergito, ungitoq; ubi tracta erunt focum, ubi coquas, calfacito bene, & testum. Postea farinae li. II. conspergito, condepsitoq;. Inde facito solum tenue casei ouilis. p. XIII. ne acidum fiet, & bene recens in aquam ter indito, ibi macerato, aquam ter mutato. Inde eximito, siccatoq; bene paulatim manibus, siccum bene in mortarium imponito. Vbi omnem caseum bene siccaueris, in mortarium purum manibus condepsito, communitoq; quam maxime. Deinde cribrum farinarium purum sumito, caseumq; per cribrum facito transeat in mortarium. Postea indito mellis boni. p. IIII. S. id una bene commisceto cum caseo. Postea in tabula pura, quae pateat pedem. I. ibi balteum ponito, foliaq; laurea uncta supponito, placentam fingito. Tracta singula in totum solum primum ponito, deinde de mortario tracta linito, tracta addito singulatim, item linito usque adeo, donec omnem caseum cum melle abusus eris. In sinum tracta singula indito, postea solum contrahito, ornatoq; focum. de iunipero, temperatoq;. Tunc placentam imponito, testo caldo operito, pruna insuper, & circum operito. Videto ut bene, & otiose procoquas, apito, dum inspicias bis, aut ter. ubi cocta erit, eximito, & melle ungito, haec erit placenta semodialis. LXXVII.

SPIRAM sic facito. quantum uoles pro ratione, ita uti placenta fit, eadem omnia facito, nisi alio modo fingito in solo tracta, cum melle oblinito bene. Inde tanquam restim facito, ita imponito in solo, dein plicis completo bene arte. Cetera omnia quasi placentam facias, facito, coquitoq;. LXXVIII.

SCRIBLITAM sic facito. In baltheo tracta ex caseo, ad eundem modum facito, uti placentam sine melle, coquitoq;. LXXIX.

GLOBULOS sic facito. Caseum cum alica ad eundem modum misceto, inde quantos uoles facere facito, in ahenum caldum unguen indito. Singulos, aut binos coqto, uersatoq; crebro duabus rudibus, coctos eximito. Eos melle ungito, papauere in

friato, ita ponito.

LXXX.

ENCHYTVM sic ad eundem modum facito, uti globulos, nisi calicem pertusum cauum habeat, ita in unguen caldum indito, hoc in restim quasi spiram facito, idq; duabus rudibus versato perfrigitoq;. Item ungit, coloratoq;, caldum ne nimium id cum melle, aut cum mulso apponito.

LXXXI.

ERNEVM TANQVAM placentam facito, eadem omnia indito, quæ in placentam, & permisceto in alueo. Indito in hirneam fictilem, eam demittito in aullam æneam aquæ calidæ plenam. Ita coquito ad ignem. ubi coctum erit, hirneam cōfringito, ita ponito.

LXXXII.

SPHAERICAM sic facito, ita uti spiram, nisi sic effingito, detractis caseo, melle, sphaeras pugnum altas facito. Eas in solo composito, densas eodem modo composito, atque spirā, itēq; coquito.

LXXXIII.

VOTVM pro bubus, ut ualeant, sic facito. Marti Sylvano, in sylua interdus in capita singula boū uotū facito, farris adorei libras tres, & lardi pondo. IIII. pulpæ pondo. IIII. S. uini sextarios tres. S. Id in urnas liceto cōijcere, & uinum idem in unum uas liceto cōijcere. Eam rē diuinam uel seruus, uel liber licebit faciat. Vbi res diuina facta erit, statim ibidem consumito. Mulier ad eam rem diuinā ne adsit, ne ue uideat quō fiat. Hoc uotum in annos singulos, si uoles, licebit uouere.

LXXXIIII.

SAVILLVM hoc modo facito. Farinæ selibrā, casei. p. II. S. unā commisceto quasi libum, mellis pondo, & ouum. Catinū fictile oleo ungit. Vbi bene omnia commiscueris, in catinū indito. Catinum testō operito, uideto ut bene percoquas medium, ubi altissimum est, ubi coctum erit, catinum eximito, melle ungit, papauere ifriato, sub testum subde paulisper, postea eximito, ita pone cum catino, & lingulis.

LXXXV.

PVLTEM punicam sic coquito. Libram alicæ in aquam indito, facito ut bene madeat. Id insundito in alueum purum, eo casei recentis. p. III. mellis. pondo. S. ouum unum, omnia unā bene permisceto. Ita insipito in aullam nouam.

LXXXVI.

GRANEAM triticeam sic facito. Selibrā tritiā puri in mortarium purum indat, lauetq; bene, corticemq; deterat bene, eluatq;. Postea in aullam indat, & aquam puram, coquatq;. Vbi coctū erit, lacte addat, paulatim usque adeo, donec cremor crassus

sus factus erit.

LXXXVII.

A M Y L V M sic facito. Siliginem purgato bene, postea in alveum indat, eo aquam addat bis in die. Die decimo aquam exiccato, exurgeto bene, in alveo puro misce to bene, facito tanquam fex fiat. Id in linteam novum indito, exprimito cremorē in patinam novam, aut in mortarium, id omne ita facito, & refricato denuo. Eam patinam in sole ponito, ut areseat, ubi arebit, in ollam novā indito, inde facito cum lacte coquat. LXXXVIII.

S A L E M Candidum sic facito. Amphoram defricato, colluitoq; puram impleto aqua pura, in sole ponito, ibi fiscellam cum sale populari suspendito, & quassato, suppletoq; identidem. Id aliquoties in die facito usque adeo, donec sal desinerit tabescere biduum. Id signi erit, menam aridā, uel ovum demittito, si natabit, ea muries erit, qua uel carnem, uel caseos, uel salsamētā cōdias. Eam muriā in labella, uel in patina in sole ponito. Usque adeo in sole habeto, donec concreuerit. Inde flos salis fiet. Vbi nubilabitur, noctu sub tecto ponito. Quotidie, cum sol erit, in sole ponito. LXXXIX.

G A L L I N A S, & anseres sic facito. Gallinas teneras, quæ primum parierint, concludat, polline, uel farina ordeacea conspersa turundas faciat, eas in aquam intinguat, & in os indat, paulatim quotidie addat, & ex gula consideret, quod satis fiet. Bis in die faciat, & meridie bibere dato, nec plus aquam ante finat, q̄ horam. I. Eodem modo anserem alito, nisi prius dato bibere bis in die, & bis escam. XC.

P A L V M B V M recentem sic facito. Vti prehensus erit, ei fabam coctam tostam primum dato, ex ore in eius os inflato item aquam. Hoc dies. VII. facito. Postea fabam fresam purā, & far purum facito, & fabæ tertia pars ut inferuescat, cum feruere incipiet, puriter facito, & coquito bene, id ubi excoxeris, deponito, bene oleo manum ungito, depositoq; primum pusillū, postea magis dep̄ses, oleo tangito, depositoq; dum poteris facere turundas, ex aqua dato, escam temperato. XCI.

A R E A M sic facito. Locum ubi facias cōfodito, postea amurcā conspergito bene, finitoq; combibat. Postea comminuito bene glebas. Deinde coequato, et pauculis uerberato. Postea denuo amurcā conspergito, finitoq; areseat. Si ita feceris, neq; formicæ nocebunt, neq; herbæ nascentur. XCII.

FRUMENTO ne gurgulio noceat, neu mures tangant, lutum de amurca facito, palarum parum addito, finito marcescant bene, & subigito, eo granarium totum oblinito crasso luto, postea cōspergito, amurca bene oē, quod lutaueris. Vbi aruerit, eo frumentū refrigeratum cōdito, gurgulio nō nocebit. XCIII.

OLEA si fructum non fert, ablaqueato. Postea stramenta circūponito. Postea amurcam cum aqua commisceto equas ptes. Deinde ad oleam circūfundito, ad arborem maximam amphorā unam commisti satis est. Ad minores arbores pro ratione indito. Et idē hoc si facies ad arbores feraces. hæ quoq; meliores fiēt. Ad eas stramenta ne addideris. XCIII.

FICI uti grossos teneant, facito omnia, quæ mō oleæ, & hoc amplius, cum uer appetet, terram adaggerato bene. Si ita feceris, & grossi non cadent, & si scabræ non fient, & multo feraciores erunt. XCV.

CONVOLVULUS in uinea ne fiat, amurcā condito, puram bene facito, in uas æneū indito congios duos, postea igni leui coqto, rudicula agitato crebro usque adeo, dū fiat tā crassa, q̄ mcl. Postea sumito bituminis tertiariū, et sulfuris quartariū. Conterito ī mortario seorsum utrūq; Postea infriato q̄ minutissime ī amurcam caldā, & simul rudicula misceto, & denuo coqto sub dio. Nā si in tecto coquas, cū bitumē, & sulfur additū est, exardescet. Vbi erit tā crassa, q̄ uiscum, finito frigescat. Hac uitē circūcaput, & sub brachia ungitō, cōvoluulus nō nascetur. XCVI.

OVES ne scabræ fiant, amurcam puram, & aquam ubi lupinus deferbuerit, & facem de uino bono inter se pariter omnia sumito, & bene commisceto. Postea cum detunderis, ungitō totas, finito biduum, aut triduum confudent. Deinde in mari lauito, si aquam marinam non habebis, facito aquam salsam, ea lauito. Si hæc sic feceris, neq; scabræ fient, & lanæ plus, & meliorem habebunt, & ricini non erunt molesti. Eodem modo in oēs quadrupedes utito, si scabræ erunt. XCVII.

AMVRCA decocta axem ungitō, & lora, & calciamenta, & coria omnia, & meliora facies. XCVIII.

VESTIMENTA ne tineæ tangant, amurcam decoquitō ad dimidium, & ea ungitō fundum arcæ, & extrinsecus pedes, & angulos. Vbi ea adaruerit, uestimenta condito. Si ita feceris, tineæ non nocebunt. Et item ligneam suppellectilem

omnem si ungues, non putrescet, & cum ea terferis, splendidior fiet. Item omnia aenea unguito, sed prius extergito bene. Postea cum unxeris, & ea uti uoles, iterum extergito, splendidior erit, & ærugo non erit molesta. XCXI.

FICI Aridæ si uoles ut integræ sint, in uas fictile condito, id amurcæ decocta unguito. C.

OLEVM si in metretam nouam inditurus eris, amurcæ ita uti est cruda prius colluito, agitatoq; diu, ut bene combibat. Id si feceris, metreta oleum non bibet, & oleum melius fiet, & metreta ipsa firmitior erit. CI.

VIRGAS myrteas si uoles cum bacis seruare, & item aliud genus quod uis, & si ramulos ficulneos uoles cum folijs inter se alligato, fasciculos facto, eos in amurcam demittito, superset amurcæ facto. Sed ea, quæ demissurus eris, sumito paulo acerbiora. Vas, quo condideris, oblinito planè. CII.

SI BOVEM, aut aliam quæ quadrupedem serpens mordet Melanthij acetabulum, & quod medici uocant smyrneum, conterito in uini ueteris hemina. Id per nares indito, & ad ipsum morsum, sterco suillum apponito. Et idem hoc (si usus euenerit) homini facito. CIII.

BOVES uti ualeant, & curati bene fient, & qui fastidient cibum, uti magis cupide appetant, pabulum, quod dabis, amurcæ spargito, primo paululum, dum consuescant, postea magis, & dato rarenter bibere, commistum cum aqua æquabiliter quarto, quintoq; die, hoc si feceris, ita boues & corpore, curatiores erunt, & morbus aberit. CIIII.

VINVM familiæ, per hyemem qui utatur. Musti quadrantalialia. X. in dolium indito, aceti acris quadrantalia. II. Eodē infundito saporis quadrantalia duo, aquæ dulcis quadrantalia. L. Hæ crude misceto ter in die, dies. V. continuos. Eo addito aquæ marinæ ueteris sextarios. LXIIII. & operculum in dolium imposito, & oblinito dies. X. Hoc uinum durabit tibi usque ad solstitium. Siquid superfuerit post solstitium, acetum acerrimum, et pulcherrimum erit. CV.

QUI AGER à mari longe aberit, ibi uinum græcum sic facito. Musti quadrantalia uiginti in abenum, aut plumbeum infundito, ignem subdito. Vbi bullabit uinum, ignem subduito. Vbi id uinum refrixerit, in dolium quadragenarium infundito,

seorsum in uas aquae dulcis quadrantal. I. infundito, salis mod. I. finito muriam fieri. Vbi muria facta erit, eodem in dolium infundito. Schoenū, & calamū in pila contundito, qđ fiet sextarium unum, eodem in dolium confundito, ut odoratum fiet. Post dies. XXX. dolium oblinito. Ad uer in amphoras diffundito. Biennium in sole finito positum esse. Deinde i testum conferto. Hoc uinum non erit deterius, qđ cum.

CVI.

AQVAE marinae conannatio. Quadrantal. I. ex alto sumito, quo aqua dulcis non accedat, sesquilibram salis frigito, eodem indito, & rude misceto usq; adeo, donec ouum gallinaceum coctum nabit, desinito miscere. Eodem uini ueteris, uel amunū, uel musellialbi congios duos infundito, misceto probe. Postea in uas picatū confundito, & oblinito. Siquidē plus uoles aquae marinae conannare, pro portione, ea omnia facito.

CVII.

HOC modo labra doliorum circunlinas, ut odorata fient, & nequid uitij ī uinum accedat, sapa congios. VI. quamoptime infundito in abenum, aut in plumbeum, & iris aridae contusae herminam, & sertam campanicam. p. V. bene odoratam unā cum iri contundas, quamminutissime per cribrum cernas, & unā cū sapa coquas sarmentis, & leui flamma commoueto. Videto, ne aduras, usq; coquito, dum dimidium excoquas. Vbi refrixerit, confundito in uas picatum bene odoratum, & oblinito, & utitor in labra doliorum.

CVIII.

VINVM Si uoles experiri duraturum sit, nec ne, polentam grandem dimidium acetabuli in caliculum nouum indito et uini sextarium de eo uino, quod uoles experiri, eodem infundito, et imposito ī carbones, facito bis, aut ter inferueat. Tum id percolato, polentam aduato. Vinum ponito sub dio. Postridie mane gustato. Si id uinum sapiet, quod in dolio est, scito duraturū. Si subacidum erit, non durabit.

CIX.

VINVM asperum quoderit leue, & suauē si uoles facere, sic facito. De eruo farinam facito lib. II. & uini cyathos. III. conspergito sapa. Postea facito laterculos. Sinito combibant noctem, & diem. Postea commisceto cum eo uino in dolio, & oblinito dies. LX. id uinum erit lene, & suauē, & bono colore, & bene odoratum.

CX.

ODOREM deteriozem uino demere si uoles, testam de regula crassam puram calfacito in igni bene. Vbi calebit, eam picato,

resticula alligato, testam demittito in dolium infimum leniter, finito biduo oblitum dolium, si demptus erit odor deterior, id optime, si non, sæpius facito, usque dum odorem malum dempseris.

CXI.

SI VOLES scire in vinum aqua addita sit, nec ne, vasculum facito de materia ederacea. Vinum id, quod putabis aquam habere, eodem mittito. Si habebit aquam, vinum effluet, aqua manebit. Nam non continet vinum vas ederaceum.

CXII.

VINVM cum si facere uoles, aquam ex alto marinam sumito, mari tranquillo, cum uentus non erit, die septuagesima ante uindemiam, quo aqua dulcis non perueniat. Vbi hauseris de mari, in culeare dolium fundito, nolito implere, quadratilibus quinque minus sit, quam plenum, operculum imposito, relinquito, quod interspiret. Vbi dies. XXX. præterierint, transfundito in alterum dolium puriter, et leniter relinquito in imo, quod defecerit, post dies viginti in alterum item dolium transfundito, ita relinquito usque in uindemiam. Vnde vinum cum facere uoles, uas relinquito in uinea, finito, ut bene coquantur, et ubi pluerit, et siccauerit, tunc deligito, et ponito in sole biduum, aut triduum sub dio, si pluuie non erunt, si pluuia erit, in tecto in cratibus componito, et si qua acina corrupta erunt, depurgato. Tum sumito aque marine suprascripte quadrantalia. X. in dolium quinquagenarium infundito. Tum acina de uuis misellis decerpito, descopio, et in idem dolium usque dum impleueris, manu comprimito, ut combibant aquam marinam, ubi compleueris dolium, operculo operito, relinquito, quod interspiret. Vbi triduum præterierit, eximito de dolio, et in torculario calcato, et id uini condito in dolia lauta, et pura, et sicca.

CXIII.

VT VINVM bene odoratum fiet, sumito testam picatam.

Eo prunam lenem indito, suffito, ferta, et schæno, et palma, quam habent unguentarii, ponito in dolio, et operito, ne odor exeat, ante quam vinum indas. Hoc facito pridie quam vinum infundere uoles, de lacu vinum quam primum in dolium indito, finito dies. XV. opertum ante, quam oblinas, et relinquito quod interspiret vinum. Postea oblinito. Post dies. XL. diffundito in amphoras, et addito in singulas amphoras sapa sextarium unum. Amphoras nolito implere nimium ansarum infimarum fini. Amphoras in sole ponito, ubi herba non fiet, amphoras operito, ne aqua accedat, et ne

dat, & ne plus quatrídium in sole siueris. Post quatrídium in
culeum componito, & instipato.

CXIII.

V I N V M Si uoles conánnare, ut aluum bonam faciat, secun-
dum uindemiam, ubi uites ablaqueantur, quantum putabis ei
rei satis esse uini, tot uites ablaqueato, & signato, earum radices cir-
cū sarrito, & purgato. Veratri radices in pila cōtundito, eas ra-
dices ponito circum uitem, & his sterus uetus, & ueterē cinerē,
& duas partes terrae circumaddito. Radiabus uitis terram insu-
per inijato. Hoc uinum seorsum legito. Si uoles seruare in uetu-
statem, ad aluum mouendam seruato, nec cōmisceas cum cetero
uino. De eo uino cyathum sumito, & misce to aqua, & bibito
ante cōnam. Sine periculo aluum mouebit.

CXV.

V I N V M ad aluum mouendam, in uinum mustum ueratri
atri manipulum conijcito in amphoram, ubi satis efferbuerit, de
uino manipulum eycito. Id uinū seruato ad aluum mouendam.
Aliter si uoles uinum ad aluum mouendā conánnare. Vites cū
ablaqueabuntur, signato rubrica, ne admisceas cum cetero ui-
no. Tres fasciculos ueratri circūponito circum radices, & terram
insuper inijato. Per uindemiam de his uitibus quod delegeris,
seorsum seruato, cyathum in ceteram potionem indito, aluum
mouebit, & postridie perpurgabit sine periculo.

CXVI.

LENTIM Q V O modo seruari oporteat. La serpitiū ac-
eto diluito, permisce to lentim aceto la serpitiato, & in sole poni-
to. Postea lentim oleo perfricato, finito arescat, ita integra serua-
bitur recte.

CXVII.

O L E A E albæ quemadmodū condiantur, ante quā nigræ
fiant contendantur, & in aqua deiiciantur, crebro aquā mitet.
Deinde, ubi satis macerate erunt, exprimat, & i acetū conijciat.
& oleū addat, & salis sēlibram, in modū olearū fœniculum, et
lētiscū seorsum cōdat i acetū. Si unā admiscere uoles, cito utitor,
in orculā calcato manibus sicis, cū uti uoles, sumito.

CXVIII.

O L E A M albam qua uti secundum uindemiam uoles, sic cō-
dito. Musti tantundem addito, quantum aceti. Cetera item con-
dito ita, uti supra scriptum est.

CXIX.

E P I T Y R V M Album, nigrum, uariumq; sic facito. Ex ole-
is albis, nigris, uarijsq; nucleos eycito. Sic condito. Conadito ip-
sas, addito oleum, acetum, coriandrum, cyminiū, fœniculum, ru-
tam, mentā, in orculā condito, oleū supra fiet, ita utitor.

CXX.

Collu.

c

M V S T V M Si uoles totum annum habere, in amphorā mustum indito, & corticem oppicato, demittito in piscinā, post trigesimum diem eximito, totum annum mustum erit. CXXI.

M V S T A æos sic facito farine siligineæ modium unum musto conspergito. Anisum, cuminum, adipis. p. II. casei libram, et de uirga lauri deradito, eodem addito. Et ubi definxeris, lauri folia subtus addito, dum concoques. CXXII.

V I N V M conannare, si lotium difficiliter transibit. Capreidam, uel iuniperum contundito in pila, libram indito in duobus congijs uini ueteris, in uase æneo, uel plumbeo deferuefacito. ubi refrixerit, in lagenam indito, mane ieiunus sumito cyathū, proderit. CXXIII.

V I N V M ad ischiacos sic facito. De iunipero materiam semipedem crassam concidito minutim. Eam inferuefacito cum congijs uini ueteris. Vbi refrixerit, in lagenam cōfundito, & postea id utitor uini cyathum mane ieiunis proderit. CXXIII.

C A N E S interdum clausos esse oportet, ut noctu uigilatiores, & acriores sint. CXXV.

V I N V M myrteum sic facito, Myrtum nigrā arefacito in umbra. Vbi iam erit passa, seruato ad uindemiam in urnam musti contundito myrtæ semodum, id oblinito. Vbi defuerit feruere mustum, myrtum eximito. Id est ad aluum crudum, & ad lateris dolorem, & ad celiacum, & si alius nō consistet. CXXVI.

A D T O R mina, & si teniæ, & lumbrici molesti erūt, triginta mala punica acerbissima sumito, contundito, indito in urceum, & uini nigri austeri congijs tres supponito, uas oblinito, post. XXX dies aperito, & utitor, ieiunus heminam bibito. CXXVII.

A D D I spepsiam, & stranguriam malum punicum ubi florebit, colligito. Tres heminas in amphoram infundito, uini ueteris quadrant al addito, & fœniculi radicem puram contusam heminam unam. Oblinito amphoram, et post dies. XXX. aperito, & utitor. Vbi uoles abum concoquere, & lotiū facere, hinc bibito quantum uoles sine periculo. Idem uinum tenias perpurgat, & lumbricos, si sic concinnes. Incœnatum iube esse, postridie thuris drachmam conterito. & mellis cocti drachmam unam, & uini prædicti sextarium, & origanum, dato ieiuno, & puero pro ætate triobolum, & uini heminam. Supra pilam inscendat, & saliat decies, & deambulet. CXXVIII.

HABITATIONEM delutare cum uoles, terram, quā maxime cretosam, uel rubricosam sumito, eo amurcam infundito paleas indito. Sinito quatrimum fracescat. Vbi bene fracterit, rutro concidito. Vbi consideris, delutato. Ita neque aspergo nocēbit, neque mures caua facient, neq; herba nascetur, neq; lumenta scindēt se.

CXXIX.

AREAM ubi frumentum teratur, sic facies. Confodiatur minute terra, & amurca bene conspergatur, ut combibat quam plurimum. ubi bene cōminuta terra fuerit, & amurcā cōbiberit, cylindro, aut panicula coequato. Vbi coequata erit, neque formice molestæ erunt, & cum pluet lutum non erit.

CXXX.

CODICILLOS, oleaginos, et cætera ligna amurca cruda perspergito, & in sole ponito, perbibant bene. Ita neq; fumo sa erunt, & bene ardebunt.

CXXXI.

DAPEM pro bubus pyro florente facito. Postea uerno arare inapito. Ea loca primum arato, quæ rudeta, arenosaq; erunt. Postea uti quæq; grauissima, atque aquosissima erunt, ita postremo arato.

CXXXII.

DAPEM hoc modo fieri oportet. Ioui dapali culignam uini quantum uis polueto. Eo die feriæ bubus, & bubulis, & qd apem facient. Cum poluere oportebit, sic facies. Iupiter dapalis, quod tibi fieri oportet, in domo, familiaq; mea culignam uini dapi eius rei ergo. Maeste uino inferiori esto. Maeste hac illac dapē poluenda esto. Manus interluito. Postea uinum sumito. Iupiter dapalis, maeste istac dape poluenda esto. Maeste uino inferiori esto. Vestæ si uoles dato, daps Ioui assaria pecuina urna uini Ioui caste. Profanato sine contagione. Postea dapefacta, serito milium, panicum, lentim, allium.

CXXXIII.

PROPAGATIO pomorum, cæterarumq; arborum. Arboribus ab terra pulli, qui nati erunt, eos in terram deprimito, excolitoq; uti radicem capere possint. Inde, ubi tempus erit, effodito, seritoq; recte. Ficū, oleam, malū punicum, mala struthea, cotonea, aliaq; mala oīa laurum cypriā, delphicam, prunū, myrtum coniugulū, & myrtum albū, & nigrum, nuces auellanas, prænestinas, platanum, hæc oīa genera a capitibus propagari, & eximi ad hunc modum oportebit. Quæ diligētius feri uoles, in calicihus feri oportet. In arboribus radices uti capiant, calicē pertusum sumito tibi, aut quassilum, p eū ramulum transferito,

c ij

M. C A T O.

eum quassilum terra impleto, calcatoq; in arborem relinquito. Vbi bimum erit, ramum tenerum infra prædito, cum quassilo serito. Eo modo quod uis genus arboræ facere poteris, uti radices bene habeant. Item uitem in quassilum propagato, terraq; bene operito, anno post prædito, cū qualo serito. CXXXIIII.

P R I V S quam messem facias, porcam prædaneam hoc modo fieri oportet. Cereri porca prædanea, porcam fœminam, prius quam hæc fruges condantur far, triticum, ordeum, fabam, semen rapium, thure, uino, Iano, Ioui, Iunoni præfato. Prius quam porcam fœminam immolabis, Iano struem commoueto sic, Iane pater te hac strue commouenda bonas preces te precor uti sis uolēs propitijs mihi, liberisq; meis, domo, familieq; meæ mactus hoc ferto. Fertum Ioui moueto, & mactato sic. Iupiter te hoc ferto obmouendo bonas preces precor uti sis uolens propitijs mihi, liberisq; meis, domo, familieq; meæ mactus hoc ferto. Postea Iano uinum dato sic. Iane pater, uti te strue commouenda bonas preces bene precatus sum, eiusdem rei ergo mactæ uino inferiori esto. Postea Ioui sic. Iupiter mactæ ferto esto, mactæ uino inferiori esto. Postea porcam prædaneam immolato. Vbi exta proiecta erunt, ita Iano struem commoueto, mactatoq; item, uti prius obmoueras. Ioui item fertum obmoueto, mactatoq; uti prius feceras. Item Iano uinum dato, & Ioui uinum dato, ita uti prius datum fuit ob struem obmouendam, & fertum libandum, postea Cereri exta, & uinum dato. CXXXV.

R O M A E tunicas, togas, saga, cætiones, sculponeas, Calibus, & miuturnis, cuculliones, ferramenta, falces, palas, ligones, secures, ornamenta, murices, clitellas, Venafro, palas Sueffæ, & in Lucanis plostra, treblæ albæ, Romæ dolia, labra, tegulæ ex Venafro. Aratra in terram ualidam romanica bona erunt, in terram pullam campanica, iuga romanica optima erunt. Vomus indutilis optimus erit. Trapeti Pompeijs. Nolæ ad rufimaceriam clauēs. Clostra Romæ, ac hamæ. Vrnæ cleariæ, urcei aquarij, urnæ uinariæ, & alia uasa ænea Capuæ. Nolæ fisanæ campanicæ. Hæ hamæ utiles sunt. Funis subductarius, spartū omne Capuæ, Fisanas romanicas Sueffæ, cassino. Eæ optimæ erunt romæ. Funem torculum si quis faciet cassini. L. numis, Venafri miuturnis. CL. eo indere oportet coria bona. VIII. nostratia recenti aqua depsta sient, quam minimum salis habeāt, ea depfere, & ungere

unguine prius oportet, tum siccare. Funem exordiri oportet lon-
 gum pedes. LX XII. toros. III. habeat loris in toros singulos.
 IX. latis digitos duos. Cum tortus fuerit, longus erit pe. XLIX.
 In commissura abibunt pedes. III. reliquum erit ped. XLVI.
 Vbi extentus erit accedent pedes. V. longus erit pedes. LI. Funē
 torculum extentum longum esse oportet pedes. LV. maximis uas-
 sis, minoribus pedes. LI. Funem loreum in plostrum iustum pe.
 LX. semifunium pedes. XLV. lora retinacula in plostrum ped.
 XXXVI. ad aratrum pedes. XXVI. Lora præductoria pedes
 XXVII. S. subiugia in lustrum lora ped. XIX. funiculum ped.
 IIX. in aratrum subiugia in lustrum lora pedes. XIX. funicu-
 lum pedes. XV. Trapetos latos maximos pedes. IIII. S. orbes al-
 tos ped. III. S. orbes medios ex lapidianis cum eximet crassos pe-
 dem, & palmum inter miliarium, & labrum ped. II. digitos.
 II. Labra crassa digitum. Secundarium trapetum latum pedes
 IIII. & palmum, inter miliarium, & labrum ped. I. digit. I.
 labra crassa digitos. II. orbes altos pedes III. et digitos. V. cras-
 sos ped. I. et digitos. III. Foramē in orbes semipedem quoquo-
 uersum facito. Tertium trapetum latum ped. IIII. inter milia-
 rium, & labrum pedē. I. digitos. V. orbis altus ped. III. digitos
 III. crassos pe. I. digitos. II. Trapetum ubi aduectum erit, ubi
 statues, ibi & commodato, conannatoq;. CXXXVI.
POLLINTIONEM in agro Cassinate, et Venafri sic da-
 re oportet. In loco bono parte octaua corbis diuidat, satis bona
 septima, tertio loco sexta, si granum modio diuidet quanta in Ve-
 nafro ager optimus. IX. parte corbis diuidat. Si cōmuniter pin-
 sunt, quæ ex pte pollintori pars est, eā partē in pistrinū pollintor
 ordeū V. modio fabā quinta modio diuidat. CXXXVII.
VINEAM curandam partiario, bene curet fundū, arbustū,
 agrum frumentariū. Partiario scenum, & pabulū, quod bubus
 satis fiet, q illic fient. Cætera omnia pro indiuiso. CXXXVIII.
BOVES feriis coniungere licet. Hoc licet facere, aruehant li-
 gna, fabalia, frumentum quod non daturus eris. Mulis, equis,
 asinis feriæ nullæ, nisi si in familia sunt. CXXXIX.
LVCVM collucare Romano more sic oportet. Porco piaculo
 facito. Sic uerba concipito. Si deus, si dea, cuius illud sacrum est,
 uti tibi ius fiet porco piaculo facere, illiuscæ sacri coercendi ergo.
 Harumq; rerum ergo siue ego, siue quis in ssu meo fecerit, uti id

recte factum fiet. Eius rei ergo te hoc porco piaculo immolando bonas preces precor, uti sis uolens propitius mihi, domo, familiarēq; meae, liberisq; meis. Harumce rerum ergo macste hoc porco piaculo immolando esto. CXL.

S I F O D E R E uelis altero piaculo eodem modo facto, hoc amplius dicto, operis faciendi causa, cum opus quotidie per partes facies, si intermiseris, aut serie publicae, aut familiares intercesserint, altero piaculo facto. CXLI.

A G R V M lustrare sic oportet imperans solitaurilia circūagi cum diuis uolētibus, quodq; bene eueniat mando tibi Mani, uti illa solitaurilia, fundum, agrum, terramq; meam quota ex parte siue circūagi, siue circūferenda censeas, uti cures lustrare. Ianum, Iouemq; uino praefamino, sic dicto. Mars pater te precor, quaeq; uti sis uolens propitius mihi, domo, familiarēq; nostrae, quouis rei ergo agrum, terram, fundumq; meum solitaurilia circūagi iussi, uti i morbos uisos, inuisosq; uiduertatē, uastitudinēq; calamitates, intēperiasq; prohibeas, defendas, auerrūasq; uineta tu fruges, frumenta, utiq; uirgultaq; grādire, beneq; euenire sinas, pastores, pecuaq; salua seruassis, diuisq; bonā salutē, ualitudinemq; mihi, domui, familiarēq; nostrae. Harumce rerū ergo fundi, terrae, agriq; mei lustrandi, lustriq; faciendi ergo, sicuti dixi macste hisce solitaurilibus laetentibus immolandis esto. Mars pater eiusdem rei ergo, macste hisce solitaurilibus laetentibus esto. Item cultro facto struem, et fertum uti adsiet. Inde obmoueto. Vbi porcum immolabis, agnū, uitulūq; sic oportet. Eiusq; rei ergo macste hisce solitaurilibus immolandis esto nominare uetat Martem, neq; agnum, uitulūq;. Si minus in omnes litabis, sic uerba concipito. Mars pater, siquid tibi in illisce solitaurilibus laetentibus, neq; satisfactum est, his solitaurilibus piaculo. Si uno, duobus uē dubitaueris, sic uerba cōcipito. Mars pater, quod tibi illuc porco, neq; satisfactū est, te hoc porco piaculo. CXLII.

V I L L I C I officia quae sunt, quae dominus praecipit, ea oīa, quae in fundo fieri oportet, quaeq; emi, parariq; oportet, quomodo quaeque cibaria, et quae uestimenta dari familiae oportet, eadem uti cures, faciatq; moneo, dominoq; dicto audiens sit. Hoc amplius, quomodo uillicum uti oportet, et quomodo imperari oportet, uti in aduentu domini, quae opus sunt, parentur, curenturq; diligenter. CXLIII.

VILLICAE quæ sunt officia, curato faciat. Si eam tibi dederit dominus in uxorem, ea esto contentus. Ea te metuat. Facito, ne nimium luxuriosa fiet. Vicinis, alijsq; mulieribus quamminimum utatur. Ne ue ad eas domum eat, ne ue ad sese recipiat. Ad cœnam nequod eat, ne ue ambulatrix fiet, rem diuinam ne faciat, ne ue mædet qui pro ea faciat iniussu domini, aut domine. Sato dominum pro tota familia rem diuinam facere. Munda sit. Villam conuersam, mundamq; habeat. Focum purum circũuersum quotidie, prius quam cubitum eat, habeat. Calendis, Idibus, nonis festus dies cum erit, coronam in focum indat. Per eosdemq; dies Lari familiari pro copia supplicet. Cibum sibi, & familiæ curet, uti coctum habeat. Gallinas multas, et oua uti habeat. Pyra arida, sorba, ficos, uuas passas, sorba in sapa, et pyra, & uuas in dolijs, & mala struthæa. Vuas in urcæis, & in uinaæis, uel in terra obrutas. Et nuces prænestinas recentes in urcæo in terra obrutas habeat. Mala scantiana in dolijs, & alia, quæ condi solent, & syluatica. Hæc omnia quotannis diligenter uti condita habeat. Farinam bonam, & subtile far satiat facere.

CXLIIII.

OLEAM legendam hoc modo locare oportet. Oleam cogito recte omnem arbitrati domini, aut quem custodē fecerit, aut cui olea uenierit. Oleam ne stringito, ne ue uerberato iniussu domini, aut custodis. Si aduersus ea q̄s fecerit, quod ipse eo die delegerit, pro eo nemo soluet, neq; debetur. Oleam qui legerint, omnes iuranto ad dominum, aut ad custodem sese oleam nō surripuisse, neque quenq; suo dolo malo ea oleitate ex fundo. L. Manly. Qui eorum ita non iurauerint, quod is legerit, pro eo nemo argentū dabit, neq; debetur. Oleā cogi recte, satisdato arbitrati L. Manly. Scalæ ita uti datæ erunt, ita reddito, nisi q̄ uetustate fractæ crūt. Si nō erunt, reddet æquas, aut arbitrati deducet. Siqd redēptoris opera dño damni datum erit, resolutio. Id boni uiri arbitrati deducetur. Legulos quot opus erunt, præbeto, & factores. Si non præbuerit, quanti conductū erit, aut locatū erit, deducetur, & tātō minus debetur. De fundo ligna, & oleā ne deportato. Qui oleā legerit, qui deportauerit, in singulas deportationes HS. N. II. deducuntur, neque id debetur. Omnem oleam puram metietur. Modio oleario assiduos homines quinquaginta præbeto, duas partes strictorū præbeto. Nequis concedat, quo

M. C A T O.

olea legunda, & faciunda carius locetur. Extra quam si quem so-
cium impresentiarum dixerit, si quis aduersum ea fecerit, si dñs,
aut custos uolent, iurent omnes socij. Si non ita iurauerint, pro
ea olea legunda, & faciunda nemo dabit, neq; debebitur ei, qui
non ita iurauerit. Accessiones in modios. CC. oleæ accedent sa-
lis modij. V. olei puri pōdo. IX. in tota oleitate HS. V. acetī qua-
drātalia. II. quo oleæ sale m non acceperint, dum oleam legent
in modios singulos HS. dabuntur. CXLV.

O L E A M faciundam hac lege oportet locare. Facito recte ar-
bitratu domini, aut custodis. Qui id negotij curabit, si ex uirge
is uasis opus erit, facito. Homines eos dato, qui placebunt aut cu-
stodi, aut ei, qui eam oleam emerit. Trapeti facito. Si operarij cō-
ducti erunt, aut faciunda locata erit, pro eo resolutio, aut dedu-
cetur. Oleum ne tangito utendi causa, neque furandi causa, nisi
quod custos dederit, aut dominus. Si sumpserit, in singulas sum-
ptiones. HS. N. XL. deducuntur, neque debebitur. Factores, qui
oleum fecerint, omnes iuranto aut ad dominum, aut ad custo-
dem, sese de fundo L. Manlij, neque alium quenquam suo dolo
malo oleum, neque oleam surripuisse. Qui eorum non ita iura-
uerit, quæ eius pars erit, deducetur, neque debebitur. Socium ne-
quem habeto, nisi quem dominus iusserit, aut custos. Siquid re-
demptoris opera domino damni datum erit, uiri boni arbitratu
deducetur. Si uiride oleum fiet, facito accedat oleum, & sal suæ
uisioni, quod satis fiet, & uasa uiminea. CXLVI.

O L E A M pendente hac lege uenire oportet. Olea pendens
in fundo Venafro uenibit. Qui oleam emerit, amplius q̄ quan-
ti emerit, omnis pecuniæ centesima accedet. Preconium præsens.
HS. L. & oleum romanici pondo. MD. uiridis pondo. CC. oleæ
caducæ modij L. strictinæ modij. X. Modio oleario mensum da-
to, unguinis pondo. X. ponderibus, modysq; domini datoris pri-
mæ cotylas duas. Dies argento ex Cal. mensum. X. oleæ legendæ
faciundæ quæq; locata est, & si emptor locarit Idibus soluto.
Recte hæc dari, fieriq; satisq; dari domino, aut cui iusserit, pro-
mittito, satisq; dato arbitratu domini. Domino cum solutum
erit, aut ita satisdatum erit, quæ in fundo illata erunt, pignerī
sunto. Nequid eorum de fundo deportato. Siquid deportauerit,
domini esto. Vasa, torcula, fines, scalas, trapetos, & siquid aliud
datum erit, salua recte reddito, nisi quæ uetustate fracta erunt.

Si non reddet, equum soluito. Si emptor legulis, & factoribus, qui illic opus fecerint, nō soluerit, cui dari oportebit, si dominus uolet, soluat. Emptor domino debeto, & id satisdato, proq; ea re ita, uti superscriptum est, item pigneri sunt. CXLVII.

LEGE Hac uinum pendens uenire oportet. Vinaceos illutos, & fecem relinquito. Locus uinis ad Calendas Octobris primas dabitur, si non ante ea exportaueris, dominus uino, qd uolet, faciet. Cetera lex quæ oleæ pendenti. CXLVIII.

VINVM in dolijs hoc modo uenire oportet. Vini in culleos singulos quadragenæ, & singulæ urnæ dabuntur, quod neq; accat, neq; muceat. Id dabitur in triduo proximo, boni uiri arbitratu degustato. Si non ita fecerit, uinum pro degustato erit. Quot dies per dominum mora fuerit, quo minus uinum degustet, totidem dies emptori procedent. Vinum accipito ante Calen. Ianu. primas. Si non ante acceperit, dominus uinū admetietur. Quod admensum erit, pro eo dominus resoluito. Si emptor postulauerit domino insiurandum, dabit uerum fuisse. Locus uinis ad Calen. Octobris primas dabitur. Si ante nō deportauerit, dominus uino quod uolet faciet. Cetera lex, quæ oleæ pendenti. CXLIX.

QVA LEGE pabulum hybernium uenire oporteat. Qua uendas finis dicito. Pabulum fini accipito. Ex Calendis Septembribus prato sicco decedat. Vbi pyrus florere cœperit, prato irriquo. ubi super, inferq; uicinus permittet, tum decedito, uel diem certam utriq; facito. Cetero pabulo Calend. Martijs ædito. Buius domitis binis canterio uni, cum emptor pascat, domino pascere recipitur. Oleris, asparagis, lignis, aqua itinere, actū domini usioni recipitur. Siquid emptor, aut pastores, aut pecus emptoris domino damni dederit, boni uiri arbitratu resoluat. Siquid dominus, aut familia, aut pecus emptori damni dederit, uiri boni arbitratu resoluetur, donecum pecuniam satisfecerit, aut delegarit, pecus, & familia, quæ illic erit, pigneri sunt. Siquid de his rebus controuersia erit, Romæ iudicium fiat. CL.

FRVCTVM OVIVM hac lege uenire oportet. In singulas casei pondo. XV. dimidium aridum, lacte ferijs quod mulserit dimidium, & præterea lactis urnam unam. Hisce legibus agnus diem, & noctem qui uixerit, in fructum, & Calend. Ianu. nys emptor fructu decedat. Si intercalatum erit Calend. Maijs agnos. XXX. ne amplius promittat. Oues, quæ non pepererint

binæ pro singulis in fructu cedent. Die lanam, & agnos uēdat. Menses. X. ab coactore releget porcos sectarios. In oues denas singulos pascat. Cōductor. II. menses pastorem præbeat, donec domino satisfecerit, aut soluerit, pigneri esto.

CLI.

QVO PACTO cupresseta feri oporteat Memius Perœninus, Nolanus ad hunc modum monstrauit. Semen cupressi tarentinæ peruer legi oportet, maturum est, ubi ordeum flavescat, semē ubi legeris, in sole ponito, id purgato, id aridum condito, uti aridum expositum fiet, per uer serito in loco, ubi terra tenerrima erit quam pullam uocant, ubi aqua propter fiet, eum locum stercorato primum bene stercore caprino, aut ouillo, tum uortito bipalio, & terram cum stercore bene commisceto, depurgato ab herbis, graminibusq;. Bene terram comminuato, areas facito pedes latas quaternos subcanas facito, uti canæ aquam continere possint, inter eas sulcos facito, qua herbas de areis purgare possis.

Vbi areæ factæ erunt, semen serito crebrum, ita ut linum feri solet, eo cribro terram incernito, dinudiatum digitum terram altam succernito, id bene tabula, aut manibus, aut pedibus complanato. Siquando non pluet, uti terra sitiāt, aquam irrigato leuiter in areas. Si non habebis, unde irriges, gerito, inditoq; leuiter. Quotiescūq; opus erit, facito, uti aquam addas. Si herbe natæ erunt, facito, uti ab herbis purges quamtenerrimis, et quoties opus erit per æstatem, ita, uti dictum est, fieri oportet, et ubi semen satum fiet, stramentis operiri oportet, ubi germen nasci cœperit, tum stramenta demi.

CLII.

DE SCOPIS uirgeis, quæ M. Memius, & M. Manlius monstrauerunt, in diebus. XXX. quibus uinum legeris, aliquoties facito scopas uirgeas ulmeas aridas, leas ī asserculo alligato, eas latera dolijs intrinsecus usque bene perfricato, ne fex in lateribus adhærescat.

CLIII.

VINVM fecatum sic facito. Fisānas olearias campanicas duas ille rei habeto, eas fecis impleto, sub preluūq; subdito, exprimētoq;.

CLIIII.

VINVM EMPTO ribus sine molestia hoc modo admetiri debet. Labrum culeare illæ rei facito, id habeat ad summum ansas. II. uti transferri possit. Ad imū pūdito. Ea fistulā subdito uti obthurarier recte possit, & ad summū, qua fini culeū capiet, p̄signato, id in doliū paulatim demittito, uti in eo de fistu

la uinū salire possit, id impleto usquedū signum tangat, postea obthurato. Id in suggestu inter dolia positum seruato. CLV. PER HYEMEM aquam de agro depelli oportet. In mōte fossas inales plures habere oportet. Prima autumnitate cū puluis est, tum maxime ab aqua periculum est. Cum pluere incipiet, familiam cum ferreis sarculis exire oportet, & in alia aperire, aquam diducere in uias, & segetem curare oportet, uti fluat. In uilla cum pluet, circuire oportet, sicubi perpluat, & ubi pluerit, tegulā signare carbone cū desierit pluere, uti tegula mutetur. Per segetem in frumentis, aut in segete, aut in fossis sicubi aqua cōsistat, aut aliquid aquæ obstat, id emittere, patefieri, remoueriq; oportet. CLVI.

DE BRASSICA quod concoquit. Brassica est, quæ omnibus oleribus antistat, eam esto uel coctam, uel crudam, crudā si edas, in acetum intingito, mirificæ concoquit, aluum bonam facit, lotiumq; ad omnes res salubre est. Si uoles in conuiuio multū bibere, cœnareq; libenter, ante cœnam esto crudam quantum uoles ex aceto. Et item, ubi cœnaueris, comesto alia quinque folia, reddent te quasi nihil ederis, biberisq; bibesq; quantum uoles. Aluum si uoles deicere, superiorem, sumito cymā brassicæ, quæ leuissima erit pe. II. Inde facito manipulos equales tres, colligatoq;. Postea ollam statuito cū aqua. ubi occipiet feruere, paulisper dimittito unum manipulum, feruere desistet. Postea ubi iterum occipiet feruere, paulisper dimittito usq; admodum dum quinquiesq; numeres. Tum eximito, & ita facito alterum manipulum, & item tertium, postea eximito, & contundito, & per linteū exugeto succum, quasi heminam, in pocillum fictile. Eo indito salis micam quasi eruum, & cymini triti q̄tum oleat. Postea ponito pocillum in sereno noctu. Qui poturus erit, lauet calida, bibat aquam mulsam, cubet in cœnatis. Postea mane bibat succū, deābuletq; horas. III. et agat, negotij si qd habet. Vbi libido ueniet nausæ, eumq; apphendet, decūbat, purgetq; sese. Tantū bilis, pituitæq; eiciet, uti ipse miretur, unde tñ fiet. Postea ubi deorsum uersus ibit, heminam aut paulo plus bibat. Si amplius ibit, sumito farinæ minutæ conchas duas, infriet in aquā, paulū bibat, cōsistet. Vex quibus tormina molesta erūt, brassicā in aquā macerare oportet. ubi macerata erit, conijcto in aquā macerare oportet. ubi macerata erit, conijcto in aquā cali-

dam, coquito usquedum ea commadebit bene, aquam defundito. Postea salem, & cimini paululum, & pollinem polentæ, & oleum eodem addito, deinde iterum feruefacito. Infundito in catinum, uti frigescat, eo cuminum interito, quod uolet tibi postea edat, sed si poterit solam brassicam esse, edat. Et si sine febre erit, dato uini atri duri. A quæ tum bibat quamminimum. Si febris erit, aquam bibat. Id facito continuo quotidie mane. Nolito multum dare, ne pertædescat, uti possit porro libenter esse. Ad eundem modum uiro, & mulieri, & puero dato. Nunc de iis, quibus egre lotium it, quibusque substillum est. Sumito brassicam, conuato in aquam feruentem, coquito paulisper, uti subcruda fiet, postea aquam defundito non omnem, eò addito oleum & salem, & cimini paululum, inferuefacito paulisper, postea inde in sculum frigidum sorbere, & ipsam brassicam esse oportet, utiquamprimum excoquat, quotidie id facito. CLVII.

DE BRASSICA pythagorea quid in ea boni sit, salubritatisque principium te cognoscere oportet, quot genera brassicæ sint, & cuiusmodi naturam habeant. Ad salutem temperat comesta sese semper cum calore, & rigore, arido, simul & humido, & dulci, & amaro, & acri. Sed quæ uocatur σελινόειδος, hæc septem habet bona in comestura. Nunc uti cognoscas genera earum, prima est leuis, quæ nominatur λεῖα, grandibus, & latis folijs, caule magno, ualidam hæc habet naturam, & uim magnam habet. Altera est crispa, quæ à similitudine apij, σελινόειδος uocatur. Hæc est & aspectu, & natura bona ad curationem, ualidiorque est, quam quæ superscripta est. Item est tertia, quæ κρόμβη uocatur, minutis caulibus, tenuioribus folijs, & acerrima, omnium est istarum, tenui succo uehementissima. Et primum scito, de omnibus brassicis nulla est illiusmodi medicamentosior. Ad omnes tumores, ad omnia uulnera eam contritam imponito. Hæc omnia ulcera purgabit, sanamque faciet sine dolore. Eadem tumida concoquit, eadem erumpit, eadem uulnera putrida, canculosque purgabit, sanosque faciet, quod medicamentum aliud facere non potest. Verum prius quam id imponas, aqua calida multa lauato. Postea bis in die contritam iponito. Ea omnem putorem adimet. Si cancer ater est, is olet, et sanie spurcam mittit. Si albus purulentus est. Sed si fistulosus, subtus suppurat sub carne. In ea uulnera huiusmodi tere brassicam, sanam faciet, nam optima est ad

huiusmodi uulnera. Et luxatum si quod est, bis die calida foueto, brassicam tritam apponito, cito sanum faciet. Si bis die apponitur, dolores auferet, et si quid contusum est, erumpet, si brassicam tritam apposueris, & sanum faciet, & si quid in mammis ulceris natum, & carcinoma, brassicam tritā apponito, sanum faciet. Et si ulcus acrimoniam eius ferre non poterit, farinam hordeaceam misceito, ita apponito. Huiusmodi ulcera omnia hæc sana faciet quod aliud medicamentū facere non potest, nec purgare. Et puero, & puellæ si ulcus erit huiuscemodi, farinam hordeaceā addito. Et si uoles eā esse, confectam, lautam, siccam, sale, aceto sparsam esto, salubrius nihil erit. Quo libentius edas, aceto, mulso spargito, mentam siccam, & rutam, coriandrū sectam, sale sparsam paulo libentius edes. Id bene faciet, & mali nihil finet in corpore cōsistere, & aliū bonā faciet. Siquid antea mali intus erit, oīa sana faciet. De capite, & de oculis oīa deducet, & sanū faciet. Hanc mane esse oportet ieiunū. Et si bilis atra est, & si lienes turgent, & si cor dolet, & si iecur, aut pulmones, aut præcordia. uno uerbo oīa sana faciet, quæ intro dolitabunt, eodē silphiū inradito, bonū est. Cum uenæ oēs, ubi sufflatæ sunt ex cibo, nō pnt perspirare in toto corpore, idē aliqui morbi nascunt, ubi ex multo cibo aliuis non it, pro portione brassica si uteris (uti te moneo) nihil istorū usu ueniet ex morbis. Verum morbum articulārē nulla res tantum purgat, q̄tum brassica cruda, si eam edes cū ruta, & coriandro concisam. Sic & laserpitium in rasum cum brassica ex aceto oxymelli, et sale sparsa. Hac si uteris, oēs articulares morbos poteris expellere. Nullus sumptus est, & si sumptus esset, tñ ualeitudinis cā experirer, eam mane oportet ieiunū esse. Omnis qui insomniosus est hac eadem curatione sanū facies. Vex assam brassicam, & unctam caldam salis paululum dato homini ieiuno. Quamplurimam ederit, tā citissime sanus fiet ex eo morbo. Tormina quibus molesta erunt, sic facito. Brassicā macerato bene, postea in aullam cōiūcto, deferuefacito bene, ubi cocta erit bene, aquam defundito. Eo addito oleum bene, & salis paulū, & cuminum, & pollinem polentæ. Postea bene feruefacito, ubi ferbuerit, in catinum indito. Dato edat, si poterit, sine pane, si nō, panis parū ibidem ma defaciat, et si febrim non habebit, dato ut uinum atrum bibat, cito sanus fiet. Et hoc si quando usu uenerit, ut quis debilis fiet hæc res sanum facere potest, si brassicam edet.

ita, uti suprascriptum est, et hoc amplius, lotiū conseruato eius, qui brassicam esitauerit, id calfacito, eo hominem demittito, cito sanum facies hac cura, expertum hoc est. Item pueros pusillos, si laues eo lotio, nunquam debiles fient, & quibus oculi parū sunt clari, eo lotio inunguito, plus uidebunt. Si caput, aut ceruices dolent, eo lotio caldo lauato, desinent dolere. Et si mulier eo lotio locos fouebit, nunquam ū uirosi fient. Et fouere sic oportet. ubi in schuttra feruefeceris id lotium, sub sellam supponito pertusam eo mulier assidat. Circum uestimenta eam dato. Brassica erraticam maximam uim habet, eam arefacere, conterereq; oportet bene minutim, si quem uoles purgare, pridie ne coenēt, & mane ieiuno dato brassicæ, tritæ, decoctæq; aquæ cyathos quatuor, nulla res tam bene purgabit, neque elleborum, neq; scamoneū, & sine periculo, & scito salubrem esse corpori. Quos diffidas sanos facere, facies. Qui hac purgatione purgandus erit, sic eū curato. Sorbitiōe liquida hoc per dies. VII. dato. ubi eē uolet, carnem assam dato. Si esse non uolet, dato brassicam coctam, & panem, & bibat uinum lene dilutum, lauet raro, utatur unctiōe, qui sic purgatus erit, diutina ualeitudine utetur, neq; ullus ueniet morbus nisi sua culpa. Et si quis ulcus tetrum, uel recens habebit, hanc brassicam erraticam aqua inspergito, apponito, sanum facies. Et si fistula erit, turunda intro trudit, si turundam non recipiet, diluito succum exprimito, eum in uesicam indito, uesicæ calanum alligato, & ita premito, ut in fistulam succus introeat. Ea res sanum faciet cito. Et ad omnia uetera ulcera, et noua contritam cum melle apponito sanum faciet, & si polypus in naso introierit, brassicam erraticam aridam tritam in malum coniungito, & ad nasum admoeto. Ita subducito susum animam quam plurimum poteris, in triduo polypus excidet, & ubi exciderit, tum aliquot dies idem facito, ut radices polypi persanas facias. Auribus si parum audies, terito cum uino brassicam, succum exprimito, in aurem intro tepidum instillato, cito itelliges te plus audire. Deinde impetigini paræ brassicam apponito, sanam faciet, & ulcus non faciet.

CLVIII.

ALVVM Deijcere hoc modo oportet, si uis bene deijcere, sume tibi ollam, addito eo aquæ sestarios. VI. & eo addito ungulam de perna. Si ungulam non habebis, pone de perna frustum p. S. quamminime pingue, ubi iam incipit coctū esse, eo addito

brassica coliculos. II. beta coliculos. II. cum radice sua, felicula paulum, herba mercurialis non multum, mytilorum. L. II. pisces capitonem, & scorpionem. I. cochleas. VI. & lentis pugillum. Hæc omnia decoquito usq; ad sestarios tres iuris, oleum ne addideris, indidem sume tibi sestarium unum tepidum. adde vini coi cyathum unum, bibe, interquiesce, deinde iterum eodem modo, deinde tertium. Purgabit te bene. Et si uoles insuper uinum cum misti bibere, licebit bibas, Ex his tot rebus, quot scriptum est, unum, quod eorum uis, alium deicere potest. Verum ea re tot res sunt, ut bene deicias, & suaue est.

CLIX.

INTER trigini remedium, cum in uia ibis, absynthij pontici a firculum sub annulo habeto.

CLX.

L V X V M siquod est, ut exantes, hac cantione sanum fiet, arundinem prende tibi uiridem pedes. IIII. aut. V. longam. Mediam diffinde, & duo hoies teneant ad coxendices. Incipe cantare in alio. S. f. motas danata daries dardaries astararies, dic una pariter usq; dum coeat. Ferro insuper iactato, ubi coierint, & alteram altera tetigerit, id manu prende dextra, sinistra præide. Ad luxum, aut fracturam alliga, & sanum fiet, & tñ quotidie cantato i alio. S. f. uel luxato. Vel hoc mō, haut haut haut ista pista sista, damiabo, damaustra, & luxato. Vel hoc modo, Haut haut haut ista gis tursis ardannabon damaustra. CLXI.

LOCVM, VBI asparagum seras, bene subigere oportet, qui habeat humorem, aut loco crasso, ubi erit subactus, areas facito, ut possis dextra, sinistraq; sarrire, seu runcare, ne calcetur.

Cum deformabis areas, interuallum facito inter eas semperdem latum in omnes partes. Deinde serito. Ad lineam grana bina, aut terna palo demittito. Eodem palo cauum terra operito. Deinde supra areas stercus spargito, bene serito. Secundum æquinoctium uernū, ubi natum erit, herbas crebro purgato, cauetoq; ne asparagus una cum herba uellatur. Quo anno seueris sub stramentis per hyemem operito, ne rigore puratur. Deinde primo uere aperito, sarritoq; runcatoq;. Post annum tertium, q̄ seueris, incendito uere primo. Deinde ne ante sarrieris, q̄ asparagus natus erit, ne in sarriendo radices ledas. Tertio, aut quarto anno asparagum uellito ab radice. Nam si defringes, stirpes fi ent, & intermorientur, usq; licebit uellas, donicum in semen uideris ire. Semen maturum fit ad autumnum. Ita cum sumpseris

M. CATO.

semen incendito, & cum coeperit asparagus nasci, sarrito, et ster-
corato. Post annos VIII. aut. IX. cum iam uetus est, digerito, et
in quo loco positurus eris, terram bene subigito, & stercoreato. De-
inde fossulas facito, quā radices asparagi demittas. Intervallum
sit ne minus pedes singulos inter radices asparagi euellito, & sic
circumfodito, ut facile euellere possis. Caueto ne frangatur. Ster-
cus ouillum quamplurimum fac ingeras, id est optimum ad eā
rem. Aliud sterqus herbas creat.

CLXII.

PERNAS sic salire oportet, in dolio, aut in seria. Cum pnas
emeris, ungulas earum praecidito. Salis romaniensis moliti in sin-
gulas semodius. In fundo doli, aut serie salem sternito. Deinde
pernam ponito. Cutis deorsum spectet. Sale obruito totam. Dein
de alteram insuper ponito. Eodem modo obruito. Caueto, ne ca-
ro carnem tangat. Ita omnes obruito, ubi iam omnes composue-
ris, sale insuper obrue, ne caro appareat, aequalem facito. Vbi
iam dies. V. in sale fuerint, eximito omnes cum suo sale. Quae tū
summæ fuerint, imas facito. Eodemq; modo obruito, & componi-
to. Post diem omnino duodecimū pernas eximito, & salem oēm
detergeto, & suspendito in uento biduum. Die tertio extergeto
spongia bene, perungito oleo. Suspendito in fumo biduum. Ter-
tio die demittito. Perungito oleo & aceto commisto, & suspen-
dito in carnario, nec tineae, nec uermes tangent.

FINIS.

23

M. T. VARRONIS REI RVSTICAE
CAPITA LIBRI PRIMI.

- Qui de agricultura græce et poenice & latine scripserūt. Ca. I.
 Quæ disiungenda sint ab agricultura. Cap. II.
 Qd aliud sit agricultura et aliud pastio, sed tñ affines. C. III.
 De disiungenda pastione ab agricultura. Ca. IIII.
 Quod agricultura sit ars & necessaria & magna. Cap. V.
 Quot partes habeat agriculturæ disciplina. Cap. VI.
 De solo fundi quæ sint uidenda. Cap. VII.
 Quis sit ager optimus & quis ab eo proximus & quis dein/
 æps. Ca. VIII.
 Qualem terram habeat soñl fundi perspicendum. Cap. IX.
 Quod uitium species plurimæ sint. Cap. X.
 Quod tribus modis terra dicitur bona, aut non bona, aut com/
 munis. Cap. XI.
 De modorum uarietate, qbus metiuntur rura. Cap. XII.
 De errore multorū in statuenda uilla. Cap. XIII.
 De aqua uillæ. Ca. XIIIII.
 Quo sit loco potissimum uilla statuenda. Cap. XV.
 Quæ in uilla faciunda sint membra. Cap. XVI.
 De septorum uarietate quæ tutandi fundi causa fieri debe/
 ant. Cap. XVII.
 De finibus prediorum sine septis. Ca. XVIII.
 De commodis aut incommodis uicinarum regionum seu proxi/
 morum locorum. Cap. XIX.
 Quibus rebus agri coluntur. Cap. XX.
 De numero familiæ rusticalis, et quot operis quisq; ager coli pos/
 sit, & de modo cuiusq;. Cap. XXI.
 Quot iugis bouum qsq; agri modus coli possit. Cap. XXII.
 De eligendis bubus, & modo probandi, & edomandi nouellos
 iuuenços. Ca. XXIII.
 De canibus sine qbus utiq; uilla parū tuta sit. C. XXIIII.
 De apparatu instrumentorum, quæ in fundo uillæ opus
 sunt. Cap. XXV.
 Quæ & quo quidq; loco maxime expediat serere. Cap. XXVI.
 Olea in quo agro serēda sit, qua pte, quo ordine. Ca. XXVII.
 Vinea in quo agro serenda sit. C. XXVIII.

Varro .

d

Qua celi parte ridica in uinea figi debeant. Cap. XXIX.
In quot mensibus & temporibus diuidatur annus, & in qbus
 qd feri oporteat, ac de agro seminata colligi. Cap. XXX.
Quot dies hēat q̄libet ps āni et ī qbus signis celi intrēt. C. xxxi.
Quid iter fauoniū & æquinoctiū uernū fieri oporteat. XXXII.
Quæ inter æquinoctium uernum & uergiliarum exortum fieri
 debeant. C. XXXIII.
Quæ inter uergiliarū exortū et solstitiū fieri oporteat. C. xxxiiii.
Quid inter solstitiū & caniculā faciundum sit. Cap. XXXV.
Quid iter caniculā et æquinoctiū autūni fieri oporteat. C. xxxvi.
Quæ inter æquinoctium autumnale, & uergiliarum occasum
 fieri debeant. C. XXXVII.
Quid iter uergiliarū occasū et brumā fieri oporteat. C. xxxviii.
Quæ inter brumā & fauoniū fieri oporteat. Ca. XXXIX.
De lunaribus diebus. Cap. XL.
De altera temporum diuisione coniuncta cum sole & luna, &
 habente sex partes, seu gradus. Cap. XLI.
De præparando agro gradus primus. Cap. XLII.
De stercore & sterquilinio. Ca. XLIII.
De ferendo agro gradus secundus, & quatuor sunt genera semi-
 num, & quæ quo tempore & loco debeāt feri. Ca. XLIII.
De temporibus transferendorum sirculorū, & quæ sint post sa-
 tionem obseruanda. Cap. XLV.
De medica. Cap. XLVI.
De cytiso. Ca. XLVII.
Quot modi seruntur fabæ, tritiā, hordei, farris. C. XLVIII.
De nutritionibus gradus tertius, & quæ sata quoto quoq; die
 prodeant de terra. Cap. XLIX.
Ex quibus folijs cognosci pōt solstitiū æstiuū cōfectū eē. Cap. L.
Quemadmodum sata sint tuenda. Cap. LI.
Quæ in spica sunt uocabula, & causæ eorū. Cap. LII.
De legēdis fructibus gradus quartus, & fœni sicio, & sialiaione
 pratorum. Cap. LIII.
De messe, & quare messis sit appellata, & alijs nonnullis uoca-
 bulis. Cap. LIIII.
Aream qualem esse oporteat. Cap. LV.
In semen quemadmodum spicas secerni oporteat, & de tritura,
 & stipula. Cap. LVI.

De uindemia facienda.	Cap. LVII.
De olea legenda.	Cap. LVIII.
De condendis fructibus gradus quintus, & primum de fœno condendo.	Cap. LIX.
De tritico condendo.	Cap. LX.
De faba & leguminibus & uuis condendis.	Cap. LXI.
De pomis condendis.	Cap. LXII.
De olea condenda.	Ca. LXIII.
De amurca condenda.	Ca. LXIII.
De promēdis fructibus gradus sextus.	Cap. LXV.
De promendo frumento tuendi causa.	Cap. LXVI.
De amurca tuenda & promenda.	Ca. LXVII.
De uino promendo.	C. LXVIII.
De olea promenda.	Cap. LXIX.
De nuce & palmula et fici sabina promendis.	Cap. LXX.
De uuis et malis et sorbis pēsilibus promendis.	Cap. LXXI.
De farre promendo.	Ca. LXXII.

CAPITA LIBRI SECYNDI.

De origine rei pecuariæ.	Cap. I.
De dignitate rei pecuariæ.	Cap. II.
De scientia pastoralis in genere.	Cap. III.
De pastione.	Cap. IIII.
De fœtura, & primum de admissione.	Cap. V.
De nutritu.	Cap. VI.
De sanitate.	Cap. VII.
An nouenæ ptes exeāt extra pecoris mioris ac maioris nomē. c. 8	
De pecudibus arietibus et agnis quorum item pastio fœtura, nu tritus & sanitas considerata sunt.	Cap. IX.
De capris hircis & hœdis.	Cap. X.
De suillo pecore.	Cap. XI.
De bubus & uaccis.	Cap. XII.
De asinis.	Cap. XIII.
De equis & equabus.	Cap. XIII.
De mulis & hinnis.	Cap. XV.
De canibus.	Cap. XVI.
De pastoribus.	Cap. XVII.
De lacte, caseo, & lana.	Ca. XVIII.

CAPITA LIBRI TERTII.

De uillis & earum uaria specie.	Cap. I.
Que in uilla circūne eam ali uel pasā possint.	Cap. II.
De anibus in genere.	Cap. III.
De turdis.	Ca. IIII.
De pauonibus.	Cap. V.
De columbis.	Cap. VI.
De turturibus.	Cap. VII.
De gallinis.	Ca. VIII.
De anseribus.	Cap. IX.
De anatibus.	Cap. X.
De leporibus.	Cap. XI.
De apris.	Cap. XII.
De cochleis.	Ca. XIII.
De gliribus.	C. XIII.
De apibus.	Cap. XV.
De apium fructu.	Cap. XVI.
De pisanis.	Ca. XVII.

F I N I S.

I. Cap.
II. Cap.
III. Cap.
IIII. Cap.
V. Cap.
VI. Cap.
VII. Cap.
IX. Cap.
X. Cap.
XI. Cap.
XII. Cap.
XIII. Cap.
XIV. Cap.
XV. Cap.
XVI. Cap.
XVII. Cap.
XVIII. Ca.

27

M. T E R E N T I I V A R R O N I S
D E R E R V S T I C A A D
F V N D A N I A M V X O
R E M L I B. I.

OTIVS essem consecutus Fundania et cō
 modius, si tibi hæc scriberem, quæ nunc, ut po
 tero, exponam, cogitans esse properandum,
 quod (ut dicitur) si est homo bulla, eo magis
 senex. Annus enim octogessimus admōet me.
 ut sarcinas colligā ante, q̄ proficiscar è vita.
 Quare, quoniam emisisti fundum, quem bene
 colēdo fructuosum cū facere uelis, meq; ut id mihi habeam cura
 reroges, experiar, & non solum, ut ipse quo ad uinā, quid fieri
 oporteat, ut te moneam, sed et post mortem. Neq; patiar Sibyllā
 non solum cecinisse, quæ, dum uiueret, prodesse hominibus, sed
 etiam quæ cum perisset ipsa, & id etiā ignotissimis quoq; homi
 nibus, ad cuius libros tot annis post publice solemus redire, cū de
 sideramus quid faciendum sit nobis ex aliquo portento, me, nedū
 uino quidem, necessarijs meis quod prosit facere. Quo circa scri
 bam tibi tres libros indices, ad quos reuertare, si qua in re quæres
 quemadmodum quidq; te in colendo oporteat facere. Et quoniā
 (ut aiunt) dei facientes adiuvant, prius invocabo eos, nec ut Ho
 merus, et Ennius, musas, sed duodecim deos consentis, neq; tamē
 eos urbanos, quorū imagines ad forum auratæ stant, sex mares,
 & fœminæ totidem, sed illos duodecim deos, qui maxime agrico
 larum duces sunt. Primum, qui oēs fructus agriculturæ cœlo, &
 terra continent, Iouem, & Tellurem. Itaq; duo hi parentes ma
 gni dicuntur. Iuppiter pater, Tellus uero mater. Secundo Solē,
 & Lunam, quorū tempora obseruantur, cum quedam seruntur,
 & conduntur in tpe. Tertio Cererem, & Liberum, quod horum
 fructus maxime necessarij ad uictū sint. Ab his enim cibus, & po
 tio uenit è fundo. Quarto Robigum, & Floram, quibus propi
 tijs, neq; rubigo frumenta, atq; arbores corrumpit, neq; non tem
 pestiue florent. Itaq; publicæ Robigo feriæ, robigalia, Floræ, lu
 di floralia instituti. Item adueneror Minervā, & Venerē, quær
 unius procuratio oleti, alterius hortorū, quo nomine rustici uina
 lia instituta. Nec nō etiam precor Lympham, ac bonū euētum,
 d iij

quoniam sine aqua omnis arida, ac misera agricultura sine successu, ac bono euentu, frustratio est non cultura. His igitur deis ad uenerationē uocatis, ego referā sermones eos, quos de agricultura habuimus nuper, ex quibus quid te facere oporteat animaduertere poteris, in quibus quæ non inerunt & quæres, indicabo, à quibus scriptoribus reperiās, & græcis, & nostris.

Qui de agricultura græcæ & poenice & latine scripserunt.

Cap. I.

QVI græcæ scripserunt dispersim alius de alia re, sunt plus quā quaginta. Hi sunt, quos tu habere in consilio poteris, cum qd cōsulere uoles, Hieron siculus, & Attalus philometor, de philosophis, Democritus physicus, Xenophon socraticus, Aristoteles, & Theophrastus peripateticus, Architas pythagoreus, item Amphilocho atheniēsis, Anaxipolis thasius, Apollonius pgameneus, Apollodorus lemnus, Aristophanes maleotes, Antigonus cymeus, Agatocles chiensis, Aristandrus atheniēsis, Bacchius milesius, Bion soleus, Chæreus, & Chæreas atheniensis, Diodorus priennis, Dion colophonius, Diophanes nicēsis, Epigenes rhodiensis, Euagon thasius, Euphranij duo, unus atheniensis, alter amphipolites, Aegestas maronites, Menandri duo, unus priēnensis, alter heracleotes, Nicēsius maronites, Pythion rhodius. De reliquis, quorū quæ fuerit patria nō accepi, sunt Androcion. Aeschariō, Aristomenes, Athenagoras, Crates, Oades, Dionysius πρὸς φυτῶν, Euphorion, Eubolus, Lysimachus, Mnaseas, Menestratius, Plenthiphanes, Persis, Theophilus, Ii, quos dixi, oēs soluta oratione scripserunt easdē res, & quidā et uersibus, ut Hesiodus ascreus, et Menecrates ephesus. Hos nobilitate Mago Carthaginensis pteryt poenica lingua, quod res dispersas comprehendit libris duodeciginta, quos Cassius Dionysius uticensis uertit libris uiginti græca lingua, et Sextilio ptori misit, in quæ uolumina de græcis libris eorū quos dixi, adiecit nō pauca, & de Magonis dempsit instar librorū octo. Hosce ipsos utiliter ad sex libros redegit Diophanes in Bithynia, & misit Deiotaro regi. Quo breuius de ea re conor tribus libris exponere, uno de agricultura, altero de re pecuaria, tertio de uillatis passionibus. Hoc libro circūcis rebus, q̄ nō arbitror pertinere ad agriculturam. Itaq; prius ostendā, q̄ secerni oporteat ab ea. Tum de his rebus dicā sequens

naturales diuisiones. Ea erūt ex radicibus trinis, & q̄ ipse in meis fundis colendo aīaduerti, et quæ legi, et quæ à peritis audiri.

Quæ disiungenda sint ab agricultura. Cap. II.

SEMENTINIS ferijs in ædem Telluris ueneram rogatus, ab æditimo, ut dicere didicimus à p̄ribus nostris, ut corrigimur à recentibus urbanis ab ædituo. Offendi ibi. C. Fundanium socerum meum, & C. Agrium equitem Romanum socraticum, & P. Agrasium publicanum spectātes in pariete pictam Italiam. Quid uos inquam hic, num feriæ sementinæ otiosos huc adduxere, ut patres, s̄t auos solebant nostros? Nos uero (inquit Agrius, ut arbitror) eadem causa, quæ te, rogatio Aeditimi. Itaq; si ita ē, ut annuis, morare, oportet, nobiscum, dū ille reuertatur. Nā accersitus ab ædile, cuius procuratio huius templi est, non dum rediit, & nos, ut expectaremus se, reliquit, qui rogaret. Vultis igitur interea uetus prouerbiū, quod est, Romanus sedēdo uināt, usurpemus, dum ille uenit? Sanē inquit Agrius, & simul cogitans, portam itineri diā longissimam esse, ad subsellia sequentibus nobis præcedit. Cum consedissemus, Agrasius, uos qui multas perambulastis terras, ecquam cultiorem Italia uidistis inquit? Ego uero inquit Agrius, nullam arbitror esse, quæ tam tota sit culta. Primū cum orbis terræ diuisus sit in duas partes ab Eratosthene, maxime secundum naturam ad meridiem uersus, et ad septentrionem. Et sine dubio, qm̄ salubrior pars septentrionalis est, q̄ meridiana. Et quæ salubriora, illa fructuosiora, dicendum, magis Europam fuisse opportunam ad colēdum, q̄ Asiam, ibiq; Italiam. primum quod est in Europa, secundo, quod hæc temperatior pars, q̄ interior, nam intus penē sempiternæ hyemes. Nec mirum, quod sunt regiones inter circulum septentrionalem, & inter cardinem cœli, ubi sol etiam sex mensibus continuus non uidetur. Itaq; in oceano in ea parte ne nauigari qdē posse dicunt. p̄pter mare congelatum. Fundanius, en ibi tu quicq; nasci putas posse, aut coli natum? Verum. n. ē illud Pacui, Sol si perpetuo sit, aut nox, flāmeo uapore, aut frigore, terræ fructus oēs iterire. Ego hic, ubi nox, & dies modicæ redit, & abit, tñ æstiuo die, si nō defenderē me in æstuosum meridiē, uiuere nō possem, illic in semestri die, aut nocte quemadmodū quicq; feri, aut alescere, aut meti possit? Cōtra quid in Italia utensile non modo nō nascitur,

d iij

sed est non egregium sit? quod far conferam campano? quod tritici cum appulo? quod uinum falerno? quod oleum uenafro? Non arboribus consita Italia, ut tota pomarium uideatur? An Phrygia magis uitibus cooperta, quam Homerus appellat ἀμπελόεσσα, quae haec? aut Argos, quam idem poeta πολύτιμον, in qua terra iugerum unum denos, et quinos culleos fert uini, quot quaedam in Italia regiones. An non. M. Cato scribit in libro originum sic? Ager Gallicus Romanus uocatur, qui uirum cesennatibus datus est ultra agrum picenum. In eo agro aliquot fariam in singula iugera denarii cullei uini sunt. Non ne item in agro fauentino, a quo ibi tricenariae appellantur uites, quae iugerum tricenas amphoras reddat? Simul aspiciat me, certe inquit. L. Martius praefectus fabrum tuus in fundo suo fauentiae hanc multitudinem suas dicebat reddere uites. Duo in primis spectasse uidentur Italici homines, colendo possent ne fructus per impensa, ac labore reddere, et utrum saluber locus esset, an non, quorum si alterutrum decollat, et nihilo minus quis uult colere, mente est captus, atque ad agnatos, et gentiles est deducendus. Nemo. n. sanus mente debet uelle impensam, ac sumptum facere in culturam, si uidet non posse resciri. Nec si poterit rescire fructus, si uidet eos fore, ut pestilentia dispereant. Sed opinor qui haec commodius ostendere possint, adsunt. Nam C. Lianium Stolonem, et Cn. Tremelium Scrofam uideo uenire, unum cuius maiores de modo agri legem tulerunt. Nam Stolonis illa lex, quae uetat plus quingenta iugera habere ciuem Romanum, et quae propter diligentiam culturae Stolonum confirmavit cognomen, quod nullus in eius fundo repiri poterat stolo quod effodiebat arcum arbores, et radiabatur, quod nasceretur ex solo, quos stolones appellabant, eiusdem gentis. C. Licinius trib. pl. cum esset post reges exactos annis trecentis sexaginta annis, primus populum ad leges accipiendas in septem iugera forensia ex comitiis eduxit. Alter collegam tuum uigintiuium qui fuit, ad agros diuidendos capanos, uideo huc uenire Cn. Tremelium Scrofam, uirum omnibus uirtutibus politum, qui de agricultura Romanus peritissimus existimatur. An non iure inquam? Fundi. n. eius propter culturam incandiores spectaculo sunt multis, quam regie polita aedificia aliorum, cum huius spectatum ueniant uillas, non ut apud Lucillum, ut uideant pinacothecas, sed oporothecas. Huiusce inquam pomaria summa sacra uia, ubi poma ueneunt, contra auream imaginem. Ille interea ad nos, cum Stolone coena comesa-

inquit uenimus. At non C. uidemus Fundanium, qui nos aduo-
cauit. Bono animo este inqt Agrius. Nam non modo non dum
illud sublatū est, quod ludis arcensibus nouissimi curriculi finem
facit quadrigis, sed ne illud qdem ouum uidimus, quod in cerea-
li pompa solet esse primum. Itaq; dum hic nobiscum unā sedetis
aduenietq; editimus, docete nos agriculturam, quam summam
habeat, utilitatem ne, an uoluptatem, an utrunq;. Ad te enim
rudes agriculturæ nunc, olim ad Stolonem iuisse dicunt.

Qd aliud sit agricultura & aliud pastio sed tñ affines. C. III.

SCR OFA, Prius inquit discernendum, utrum quæ serant
in agro ea sola sint in cultura, an et q̄ inducant in rura, ut oues,
& armenta. Video. n. qui de agricultura scripserunt, & pœni-
cæ, & græcæ, & latine, latius uagatos, q̄ oportuerit. Ego uero in-
quit Stolo, eos non in omni re imitandos arbitror, & eo melius
fecisse quosdam, q̄ minore pomerio finierunt, exclusis partibus,
quæ non pertinent ad hanc rem. Quare tota pastio, quæ coniu-
gitur à plerisq; cum agricultura, magis ad pastorem, q̄ ad agri-
colam pertinere uidetur. Quo circa principes, qui utriq; rei præ-
ponuntur, uocabulis quoq; sunt diuersi, quod unus uocatur Vil-
licus, alter magister pecoris. Villicus agri colendi causa constitu-
tus, atq; appellatus à uilla. Villa, quod ab eo in eam conuehun-
tur fructus, & euehuntur, cū ueneūt. A quo rustici et nūc quoq;
uiam ueham appellant, propter uecturas, & uellam non uillā,
quod uehunt, & unde uehunt. Item dicuntur, qui uecturis uiuūt,
uellaturam facere. Certe inquit Fundanius aliud pastio, et ali-
ud agricultura, sed affinis. Et ut dextra tibia alia q̄ sinistra, ita
ut tamen sit quodammodo cōiuncta, quod est altera eiusdē car-
minis modorū incentiua, altera succentiua. Et quidem licet adij-
cias inquam, pastorū uitam esse incentiuam, agricolarū succen-
tiuā authore doctissimo homine Dicearcho, q̄ Græciæ uita qua-
lis fuerit, ab initio nobis ita ostendit, ut superioribus tēporibus fuis-
se doceat, cū homines pastoriciā uitam agerent, neq; scirent et
arare terram, aut serere arbores, aut putare, ab his inferiore gra-
du etatis susceptam agriculturam. Quo circa et succinit pastora-
li, quod est inferior, ut tibia sinistra à dextræ foraminibus. Agri-
us Tu inquit tibicen non solum adimis domino pecus, sed etiā ser-
uis peculium, quibus domini dant, ut pascant, atq; etiam leges

colonicas tollis, in quibus scribimus, Colonus in agro firculario ne capras compascat, quas etiā astrologia in cœlum recepit non longe ab Tauro. Cui Fundanius, uide inquit, ne Agri istuc sit ab hoc, cum in legibus etiam scribatur, pecus quoddā. Quēdā enim pecudes culturae sunt inimicæ, ac ueneno, ut istæ, quas dixisti, capræ. Hæ enim omnia nouella sata carpendo corrumpunt, nō minimum uites, atq; oleas. Itaq; propterea institutum diuersa de cā, ut ex caprino genere ad aliū dei aram hostia adducere/ tur, ad aliū nō sacrificaretur, cum ab eodem odio alter uidere nollet, alter ēt uidere percuntem uellet. Sicq; factum, ut Libero patri repertori uitis hirci immolarentur, proinde ut capite darent pœnas. Contra, ut Minervæ caprini generis nihil immolarent, propter oleam, quod eā, quam laeserit, fieri dicunt sterilē, eius. n. saluam esse fructus uenenū. Licius, Hoc nomine ēt Athenis in arcem nō iungi, præterquam semel ad necessarium sacrificiū, ne arbor olea, quæ primum dicitur ibi nata, à capra tāgi possit. Nec ulla inquit pecudes agriculturae sunt propriæ, nisi quæ agrū operæ, quo cultior sit, adiunare, ut eæ, quæ iunctæ arare possint. Agrasius si istuc ita est inq; quomodo pecus remoueri potest ab agro, cum stercus, quod plurimum prodest, greges pecorum minustrent? Sic inquit Agrius, uenaliū greges agriculturam dicemus esse, si propter istam rem habēdum statuerimus. Sed hinc error, quod pecus in agro esse potest, & fructus non in eo agro ferre, quod non sequendum. Nam sic etiam res aliæ diuersæ ab agro erunt assumendæ, ut si habeas plures in fundo textores, atque institutos histonas, sic & alios artifices.

De disiungenda pastione ab agricultura.

Cap. IIII.

SCROFA, Disiungamus igitur inquit, pastionem à cultura, & si quis qd uult aliud. An ne ego inquam sequar Saseruū patris, & filij libros? ac magis putem pertinere figlinas quem admodum exerceri oporteat, q̄ argēti fodinas, aut alia metalla, q̄ sine dubio in aliquo agro sunt. Sed neq; lapidicinæ, neq; arenariæ ad agriculturam pertinent, sic figlinæ, neq; ideo nō in quo agro idoneæ possint esse, non exercendæ, atque ex eis capiūdi fructus, ut etiam si ager secūdum uiam, & opportunus uiatoribus locus, ædificandæ tabernæ diuersoriæ, quæ tamen quāuis sint fructuosæ, nihilo magis sunt agriculturæ partes. Non enim si quis

propter agrum, aut etiam in agro profectus domino, agriculturae acceptum referre debet, sed id modo, quod nec satione terra sit natum, ad fruendum suscipit. Stolo, Tu inquit inuides tanto scriptori, & obstrigilandi causa figlinas reprehendis, cum praeclara quaedam, ne laudes, praetermittas, quae ad agriculturam uehementer pertineant. Cū subrisisset Scrofa, quod non ignorabat libros, & despiciebat, & Agrasius se scire modo putaret, ac Stolonem rogasset, ut diceret, coepit, Scribit cimices quemadmodum inter fia oporteat his uerbis. Cucumerem anguinum condito in aquam eamq; insundito quod uoles, nulli accedent, uel fel bubulum cum aceto mistum, unguito lectum. Fundanius aspiciat ad Scrofam, & tamē uerum dicit, inquit, hic, ut hoc scripserit in agricultura? Ille, Tam hercle, q̄ hoc, siquē glabrum facere uelis, quod iubet, ranam luridam conijcere in aquam, usquequo ad tertiam partē decoxeris, eaq; ungere corpus. Ego quod magis inquam ptineat ad Fundanij ualitudinem, & in eo libro est, satius dicam, nā et huiusce pedes solent dolere, in fronte cōtrahere rugas. Dic Sodes inquit Fundanius, nā malo de meis pedibus audire, q̄ quemadmodum pedes betaceos feri oporteat. Stolo subridens dicam, inquit eisdem, quibus ille uerbis scripsit, ualent quae iā audiui. Cum homini pedes dolere coepissent, qui tui meminisset, ei mederi posse. Ego tui memini, medere meis pedibus. Terra pestē teneto. Salus hic maneto in meis pedibus. Hoc ter nouies cantare iubet, terrā tangere, despuere, ieiunū cantare. Multa inquā item alia miracula apud Safernas inuenies, quae oīa sunt diuersa ab agricultura, & iō repudianda, quasi uero inquā, nō apud ceteros quoq; scriptores talia repiantur. An non in magni illius Catonis libro, q̄ de agricultura est editus, scripta sunt p̄ multa similia ut haec? Quemadmodū placētā facere oporteat, quo pacto libū, quārōne pernas salire. Illud non dicis inquit Agrasius, quod scribit, si uelis in conuiuio multum bibere, coenareq; libenter, ante eē oportet brassicam crudam ex aceto, & post, alia folia quinq;.

Quod agricultura sit ars & necessaria & magna. Cap. V.

IGITUR inquit Agrasius, quae disiungenda essent à cultura cuiusmodi sint, quoniam discretum, de ijs rebus dicendū, quae scientia sit, & quid in colendo nos docet, ars an sit, an qd aliud, & à quibus carceribus decurrat ad metas. Stolo cum aspexisset

M. VARRONIS.

Scrofam, Tu inquit, & ætate, & honore, & scientia quod præstas, dicere debes. Ille non grauatus, Primum inquit, non modo est ars, sed etiam necessaria, ac magna, eaq; est scientia, quæ docet, quæ sint in quoquo agro ferunda, & faciunda, quæq; terra maximos perpetuo reddat fructus. Eius principia sunt eadem, quæ mundi esse Ennius scribit, aqua, terra, anima, & sol. Hæc enim cognoscenda prius, quam iacuas semina, quod initium fructuum oritur. Hinc profecti agricolæ ad duas metas dirigere debent, ad utilitatem, & uoluptatem. Utilitas querit fructum, uoluptas delectationem. Priores partes agit, quod utile est, quæ quod delectat, nec non ea, quæ faciunt cultura honestiorem agrum, pleraq; non solum fructuosiore eundem faciunt, ut cum in ordinem sunt composita arbuta, atq; oliueta, sed etiam uendibiliorem, ut quæ adiciant ad fundi pretium, nemo enim eadem utilitate non formosius quod est, emere mauult pluris, quæ si est fructuosius turpe. Utilissimus autem is ager, qui salubrior est, quæ alij, quod ibi fructus certus, contraq; in pestilenti, calamitas, quamuis in feraci agro colonum ad fructus peruenire non patitur. Etenim ubi ratio cum orco habetur, ibi non modo fructus est incertus, sed etiam colentium uita. Quare, si salubritas non est, cultura non aliud est, quæ alea domini uitæ, ac rei familiaris. Hoc uero diminuitur scientia, ita enim salubritas, quæ duarum est cælo, ac terra, non est in nostra potestate, sed in naturæ, ut tamen multum sit in nobis, quod grauiora quæ sunt, ea, diligentia, leuiora facere possumus, etenim si propter terram, aut aquam odoremue, quem aliquo loco eructat, pestilentior est fundus, aut propter cæli regionem ager calidior sit, aut uentus non bonus flet. Hæc uitia emendari solent domini scientia, ac sumptu, quod permagni interest, ubi sint posite uillæ, quantæ sint, quod spectent, portiabus, ostijs, ac fenestris. An non ille Hippocrates medicus in magna pestilentia, non unum agrum, sed multa oppida, scientia seruauit? Sed quid ego illum uoco ad testimonium? Non hic Varro noster, cum Corcyræ esset exercitus, ac classis, & omnes domus repletæ essent ægrotis, ac funeribus immisso fenestris nouis aquilone, & obstructis pestilentibus, ianuaq; permutata, ceteraq; eius generis, diligentia, suos comites, ac familiam, incolumnes reduxit?

Quot partes habeat agriculturæ disciplina. Cap. VI.

SED Quoniam agriculturæ, quod esset initium, & finis dixi, relinquitur quot partes ea disciplina habeat, ut sit uidendum. Equidem innumerabiles mihi uidentur inquit Agrinus, cum lego libros Theophrasti complures, qui inscribuntur *πρόξιπυτων ἰσορίαι*, & *πρόξιπυτων αἰτιῶν*. Stolo isti inquit libri non tam idonei us, qui agrum colere uolunt, q̄ qui scholas philosophorū, neq; eo dico, quod non habeant & utilia, et cōmunia quedam, quapropter tu potius agriculturæ partes nobis expone. Scrofa agriculturæ inquit, quatuor sunt partes summæ, è quis prima cōgnitio fundi solum et partes eius quales sint. Secunda, quæ in eo eo fundo opus sunt, ac debeant esse culturæ causa. Tertia quæ in prædio colendi causa sint faciunda. Quarta, quo quæq; tempore in eo fundo fieri conueniant. De his quatuor generibus singulæ minimum in binas diuiduntur species, quod habet prima ea, quæ ad solum pertinent terræ, & quæ ad uillas, & stabula. Secunda pars, quæ mouentur, atq; in fundo debeant esse culturæ causa, est item bipartita, de hominibus, per quos colendum, & de reliquo instrumēto. Tertia pars, quæ de rebus, diuiditur, quæ ad quanq; rem sint preparandæ, & ubi quæq; faciunda. Quarta pars de temporibus, quæ ad solis circuitum annuū sint referēda, et q̄ ad Lunæ mēstruū cursum. De primis quatuor partibus prius dicam, deinde subtilius de octo secundis.

De solo fundi quæ sint uidenda.

Cap. VII.

IGITUR primum de solo fundi uidendum. Hæc quatuor. Quæ sit forma, quo in genere terræ, quātus, quamq; per se tutus. Formæ cum duo genera sint, una quam natura dat. altera, quæ sationes imponunt, prior, quod alius ager bene natus, alius male, posterior, quod alius fundus bene confitus est, alius male, dicā prius de naturali. Igitur cum tria genera sint à specie simplicia agrorum, campestre, collinum, montanum, est ex his tribus quartum, ut in eo fundo, hæc duo, uel tria sint, ut multis locis licet uideri. E quibus tribus fastigijs simplicibus, sine dubio infimis alia cultura aptior, q̄ summis, quod hæc calidiora, q̄ summa, sic collinis, quod ea tepidiora, q̄ infima, aut summa. Hæc apparent magis ita esse in latioribus regionibus, simplicia cum sunt. Itaque ubi lati campi, ibi magis æstus. Et eo in Apulia loca calidiora, & grauiora. Et ubi montana, ut in Vespurio, quod leniora, &

ideo salubriora. Qui colunt deorsum magis estate laborant, qui
 sursum, magis hyeme, uerno tempore in campestribus maturius ea-
 dem illa feruntur, quam in superioribus et celerius hic, quam illic cogun-
 tur. Necnon sursum, quam deorsum tardius feruntur, ac metuntur.
 Quaedam in montanis prolixiora nascuntur, ac firmiora, pro-
 pter frigus, ut abietes, ac sappini. Hic quod tepidiora populi, ac
 salices, sursum fertiliora, ut arbutus, ac quercus, deorsum, ut nu-
 ces graeca, ac mariscæ fia. In collibus humilibus societas maior cum
 campestri fructu, quam cum montano, in altis contra. Propter hæc tria fa-
 stigia formæ, discrimina quaedam sunt sationum, quod segetes me-
 liores existimantur esse campestres, uinæ collinæ, syluæ montanæ,
 plerumque hyberna us esse meliora, qui colunt campestria, quod tunc
 prata ibi herbose, putatio arborum tolerabilior. Contra aestina
 montanis locis comodiora, quod ibi tum et pabulum multum,
 quod in campis aret, et cultura arborum aptior, quod tum illic fri-
 gidior aer. Campester locus is melior, quam totus æquabiliter in unam
 partem uergit, quam is, qui est ad libellam æquus, quod is, cum aqua non
 habent delapsus, fieri solet uliginosus, eo magis si quis est inæquabi-
 lis eo deterior, quod sit propter lacunas aquosus. Hæc, atque huiusmodi
 tria fastigia agri ad colendum dispariliter habent momentum.

Quis sit ager optimus et quis ab eo proximus et quis
 deinceps. Cap. VIII.

STOLO, Quod ad hanc formam naturalem pertinet, de eo
 non incommode Cato uidetur dicere, cum scribit optimum agrum
 esse, qui sub radice montis situs sit, et spectet ad meridianam cæ-
 li partem. Subiicit Scrofa. De formæ cultura hoc dico, quæ spe-
 cie fiant uenustiora, sequi, ut maiore quoque fructu sint, ut qui ha-
 bent arbuta, si sata sunt in quincuntem propter ordines, atque in-
 terualla modica. Itaque maiores nostri ex aruo æque magno, male
 confito, et minus multum, et minus bonum faciebant uinum, quod
 quæ suo quicque loco sunt posita ea minus loci occupant, et minus
 offit aliud aliud ab sole, ac luna, et uento. Hoc licet coniectura
 uidere ex aliquot rebus, ut nuces integras, quas uno modio com-
 prehendere possis, quod putamina suo loco quæque habet natura
 composita, cum easdem si frigeris uix sexquimodio concipere possis.
 Præterea quæ arbores in ordine sate sunt, eas æquabiliter ex omnibus
 partibus sol, ac luna coquunt, quo fit, ut uinæ, et oleæ plures na-

scantur, ut celerius coquantur, quas res duas sequuntur altera illa duo, ut plus reddant musti, & olei, & pretij pluris.

Qualem terrā habeat solum fundi perspicendum. Cap. IX.

SEQVITVR secundum illud, quali terra solum sit fundi, & à qua parte uel maxime bonus, aut nō bonus appelletur. Refert. n. quæ res in eo feri, nasciq; & cuiusmodi possint. Non. n. eadem omnia in eadem agro recte possunt. Nam ut alius est ad uitem appositus, alius ad frumētum, sic de cæteris alius ad aliam rem. Itaq; Cretæ ad cortyniam dicitur platanus esse, quæ folia hyeme non amittat. Itemq; in Cypro, ut Theophrastus ait una. Item Sybari, qui nunc Thurij dicuntur, quercus simili esse natura, quæ est in oppidi conspectu. Item contra atq; apud nos fieri ad elephātinem, ut neq; ficus, neq; uites amittant folia. Propter eandem causam multa sunt bifera, ut uites apud mare Smyrnæ, malus bifera, ut in agro consentino. Idem ostēdit, quod in locis feris plura ferunt, in ijs quæ sunt culta, meliora. Eadem de causa sunt, quæ nō possunt uiuere nisi in loco aquoso, aut et i aqua, et id discriminatim, ut alia in lacubus, ut arundines in Aretino, alia in fluminibus, ut in epiro arbores alni, alia in mari, ut scribit Theophrastus, palmas, & squillas. In Gallia transalpina intus ad Rhenū, cum exercitum ducerem, aliquot regiōes accessi, ubi nec uitis, nec olea, nec poma nascerentur, ubi agros stercorarent candida fossicia creta. Vbi salem nec fossicium, nec maritimū haberent, sed ex quibusdam lignis cōbustis, carbonibus salsis pro eo uterentur. Stolo, Cato quidem inquit, gradatim præponēs, alium alio, agrum meliorem dicit esse in nouem discriminibus, quod sit primus, ubi uineæ possunt esse bono uino, & multo. Secundus, ubi hortus irriguus. Tertius, ubi salicta. Quartus, ubi oliueta. Quintus, ubi pratū. Sextus, ubi cāpus frumētarius. Septimus, ubi cædua sylua. Octauus, ubi arbustū. Nonus, ubi glādarīa sylua. Scrofa, Scio inquit scribere illū, sed de hoc non consentiunt oēs, qđ alij dant primatū bonis pratis, ut ego quoq; à quo antiqui prata parata appellarūt. Cæsar Vopiscus edilitius, cām cum ageret apud Censores, campos Rosiæ Italiæ dixit cēsumē, in quo relicta pertica postridie nō appareret propter herbam.

Quod uitium species plurimæ sint.

Cap. X.

CONTRA uineam sunt, qui putent sumptu fructus deuora-
 re. Refert inquam, quod genus uineæ sit, quod sunt multa speciei-
 es eius, aliæ enim humiles, ac sine ridiis, ut in Hispania, aliæ
 sublimes, ut quæ appellantur ingatæ, ut pleræq; in Italia, quare
 nomina duo, pedamenta, & iuga, quibus stat recta uinea dicitur
 tur pedamenta, quæ transversa iunguntur iuga, ab eo quoq; ui-
 neæ ingatæ. Ingorum genera ferè quatuor, pertica, arundo, res-
 tes, & uites. Pertica, ut in Falerno, Arundo, ut in Arpino, Re-
 stes, ut in Brundisino. Vites, ut in Mediolanensi agro. Ingatio-
 nis species duæ, una directæ, ut in agro canusino, altera complu-
 uiata in longitudinem, & latitudinem ingata, ut in Italia ple-
 ræq;. Hæc ubi domo nascuntur, uineæ non metuant sumptū, ubi
 multa ex propinqua uilla, non ualde. Primum genus, quod di-
 xi, maxime querit salicta. Secundum, arundinetæ. Tertium iun-
 ceta, aut eius generis rem aliquam. Quartum arbuta, ubi tra-
 duces possint fieri uitium, ut mediolanenses faciunt in arboribus,
 quas opulos uocant, canusini in barundulatione in ficis. Pedamē-
 tum item ferè quatuor generum. Vnum robustum, quod optimū
 solet afferri in uineam è quercu, ac iunipero, & uocatur ridica.
 Alterum palus è pertica, melior è dura, quod diuturnior, quæ cū
 in finem terra uoluit, puter eueritur, & fit solum summū. Ter-
 tium, quod horum inopiæ subsidio misit arūdinetū. Inde enim
 aliquot colligatas libris demittunt in tubulos fictiles cum fundo
 pertuso, quos cuspides appellant, quæ humor aduenticius transi-
 re possit. Quartum pedamentum est natiuū eius generis, ubi ex
 arboribus in arbores traductis uitibus uinea sit, quos traduces, q-
 dam rumpos appellant. Vineæ altitudinis modus, longitudo ho-
 minis. Intervalla pedamentorū, quæ boues iuncti arare possint.
 Ea minus sumptuosa uinea, quæ sine iugo ministrat acratopho-
 ron uinum. Huius genera duo, unū, in quo terra cubilia præbet
 uuis, ut in Asia multis locis, quæ sepe uulpibus, et hominibus sit
 cōmunis, necnon, si parit humus mures, huius minor sit uindē-
 mia, nisi totas uineas oppleueris muscipulis, quod in insula Pā-
 datharia faciunt. Alterum genus uineti, ubi ea modo remouet
 à terra uitis, quæ ostenderit se affere uuam. Sub eam, ubi nascit
 uua subiunguntur citræ bipedales è furculis furcillæ, ne uindēmia
 pereat, & uindēmia facta deniq; discat pendere in palmam, aut
 funiculo, aut uinctu, quod antiqui uocabāt æstum, ibi dominus
 simulac

simulac vidit occipitum vindemiatoris, furcillas reducit hybernatum in tecta, ut sine sumptu earum opera altero anno uti possit. Hac consuetudine in Italia utuntur Reatini. Hæc ideo varietas maxime, quod terra cuiusmodi sit, refert. ubi enim natura humida, ibi altius vitis tollenda, quod in partu, & alimonio vinum non ut in calice querit aquam, sed solem, itaq; ideo (ut arbitror) primum è vinea in arbores ascendit vitis.

Quod tribus modis terra dicitur bona, aut non bona, aut communis.

Cap. XI.

TERRA inquam, cuiusmodi sit refert, & ad quam rem bona, aut non bona sit. Ea tribus modis dicitur, cōmuni, proprio, & misto. Cōmuni, ut cum dicimus orbem terræ, & terram Italianam, aut quā aliam, in ea enim & lapis, & arena, & cetera eius generis sunt in nominando cōprehensa. Altero modo dicitur terra proprio noīe, q̄ nullo alio vocabulo, neq; cognomine adiecto appellatur. Tertio modo dicitur terra, quæ est mista in qua ferri qd potest, & nasci, ut argillosa, aut lapidosa, sic & aliæ, cum in hac species nō minus sint multæ, q̄ in illa cōi ppter admistiones, in illa. n. cum sit dissimili vi, ac potestate, partes permultæ, inquis, lapis, marmor, rudus, arena, sabulo, argilla, rubrica, pulvis, creta, glarea, carbunculus, idest, quæ sole perferuet ita, ut radices factorum comburat. Ab ijs, quæ proprio nomine dicitur terra, cum est admista ex his generibus aliqua re, tum dicitur aut cretosa, aut glarea, & sic ab alijs generū discriminibus mista, & uti horū varietates, ita genera hæc, ut p̄terea subtiliora sint alia, nam ad minimum in singula facies terna, quod alia terra est ualde lapidosa, alia mediocriter, alia propè pura. Sic de alijs generibus reliquis, admistæ terræ tres gradus ascendūt eosdem. Præterea hæ ipse ternæ species ternas in se habent alias, qd ptim sunt humidiores, partim aridiores, partim mediocres, neq; non hæc discrimina ptinent ad fructus uehementer, itaq; periti in loco humidioris far adorem potius serunt, q̄ triticū. Cōtra in aridioris ordeū potius, q̄ far, in mediocri utrūq;. Præterea ē discriminina oīum horum generū subtiliora alia, ut in sabulosa terra, q̄ ibi refert, sabulo albus sit, an rubicūdus, quod sabulo albus ad ferendos alienus, contra rubicūdior appositus. Sic magna tria discrimina terræ, quod refert utrum sit macra, an pinguis, an me-

Varro.

e

M. VARRONIS.

diocris, quod ad culturam pinguis fecundior ad multa, macra contra. Itaq; in Veijs, ut in Pupinia, neq; arbores prolixas, neq; uites feraces, neq; stramenta uidere crassa poteris, neq; ficum mariscam, & arbores plerasq; ac prata retorrida, & muscosa. Contra in agro pingui, ut in Hetruria, licet uidere fructuosas segetes, ac restibiles, & arbores prolixas, et omnia sine musco. In mediocri aut terra, ut in Tyburti, q; propius accedit, ut non sit macra, q; ut sit ieiuna, eo ad oēs res comodior, q; si inclinauerit ad illud, quod deterius. Stolo, Non male inquit, quæ sit idonea terra ad colendū, an non, Diophanes bithynius scribit signa sumi posse aut ex ipsa, aut ex iis, quæ nascunt ex ea, ex ipsa, si sit terra alba, si nigra, si leuis, quæ cū fodiatur, facile frietur, naturaq; nō sit cineritia, ne ue uehementer densa. Ex his autem, quæ enata sunt, fera, si sunt prolixa, atq; ea, quæ ex his nasci debent, earum rerum feracia. Sed quod sequitur tertium illud de modis dicæ.

De modorū uarietate, quibus metiuntur rura. Cap. XII.

I L L E Modos, quibus metirentur rura, alius alios constituit. Nam in Hispania ulteriore metiuntur iugis, in campania uersibus, apud nos in agro Romano, ac latino iugeris. Iugum uocāt quod iūcti boves uno die exarare possint, uersum dicunt centum pedes quoquo uersum quadratū. Iugerū, quod quadratos duos actus habeat. Actus quadratus, qui & latus est pedes centum uiginti, & longus totidem, Is modius, ac mina latine appellatur. Iugeri pars minima dicitur scrupulum, idest decem pedes in longitudine, et latitudine quadratum. Ab hoc principio mensores nonnunquam dicunt in subcisiuum esse unciam agri, aut sextantem, aut quid aliud, cum ad iugerum puenerunt, id habet scrupula ducenta octoginta octo. Quantū attinet ad antiquos nros, ante bellum punicum pendebant bina iugera, quod à Romulo primum diuisa dicebantur uiritim, quæ quod heredem sequerentur, heredium appellarunt. Hæc postea à centum centuria, quæ duplicata est quadrata in omnes quatuor partes, ut habeat latera longa II. CCCC. pedes. Hæ porro quatuor centuriæ cōiunctæ, ut sint in utranque partem binæ, appellantur in agris diuisis uiritim publicæ saltus.

De errore multorum in statuenda uilla. Cap. XIII.

IN MODO fundi non animaduerso lapsi sunt multi, quod alij uillam minus magnā fecerunt, q̄ modus postulauit, alij maiorem, cum utrūque sit contra rem familiarem, ac fructū, maior .n. tecta & edificamus pluris, & tuemur sumptu maiore, mīnora cum sunt, q̄ postulat fundus, fructus solent disperire. Lici-
nius. Dubiū .n. nō est, quin cella uinaria maior sit faciūda in eo agro, ubi uineta sunt ampliora, ut horrea, si frum̄tarius ager ē.

De aqua uillae.

Cap. XIII.

IN VILLA edificanda hoc potissimum, ut intra septa uil-
la habeat aquam, si non, q̄ proxime. Primum, quae ibi sit nata,
secundum, quae influat perennis. Si omnino aqua non est uina,
cisternae faciūda sub tectis, et lacus sub dio, ex altero loco ut ho-
mines, ex altero ut pecus uti possit.

Quo sit loco potissimum uilla statuenda.

Cap. XV.

DANDVM operā, ut potissimū sub radiabus montis sylue-
stris uillā ponas, ubi pastiones sint laxae, ita ut cōtra uentos, qui
saluberrimi in agro flabūt posita sit. Ad exortus æquoc̄tiales ap-
tissima, quod æstate habeat umbrā, hyeme solē. Sin cogare secun-
dum flumen edificare, curandū ne aduersum eurū ponas, hyeme
 .n. fiet uehementer frigida, & æstate nō salubris. Aduertendum
 ēt si qua erūt loca palustria, & propter easdem cās, & quod are-
scunt, & quod in ijs crescunt aīalia quaedam minuta, quae non
possunt oculi cōsequi, & per aera intus in corpus per os, ac nares
perueniunt, atq; efficiūt diffīciles morbos. Eūdanius, Quid po-
tero inq̄t facere, si istiusmodi mihi fundus hereditate c̄buerit,
quo minus pestilētia nocēat? Istuc uel ego possum r̄ndere inquit
Agius. Vendas quot assibus possis, aut si nequeas, relinquo. At
Scrofa uitandū inquit, ne in eas partes spectet uilla, ex quibus
uētus grauior afflare soleat, ne ue in conualli caua, & ut potius
in sublimi loco edifices, q̄ quod p̄flatur, si quod est, quod aduersa-
riū inferatur, facilius discutit̄. Præterea, qđ ab sole toto die illu-
stratur, salubrior est, quod & bestiolae siquae propē nascunt̄, et in-
ferunt̄, aut efflant̄, aut aritudine cito pereunt. Nimbi repētini,
& fluij, ac torrentes piculosi illis, qui in humilibus, ac cauis lo-
cis aedificia habent, & repētinae p̄donū manus, quod impronisos
facilius opprimere possunt. Ab hoc utroq; superiora loca tutiora.

c ij

IN VILLA faciunda sunt stabula, ita ut bubilia sint, ubi hyeme possint esse caldiora. Fructus ut est uinum, & oleum loco plano in cellis, ita ut uasa uinaria, et olearia potius sint in locis aridis, quàm humidis, fructus, ut est faba, lentes, ordeum, & far, & fœnum in tabulatis. Familia ubi uersetur providendum, si fessio opere, uel frigore, aut calore, ubi commodissime possint sese quieti recipere. Villiæ proxime ianuam cellam esse oportet, eumque scire, qui introeat, aut exeat noctu, quidue ferat, presertim si hostiarius est nemo. In primis culina uidenda, ut sit admota, quod ibi hyeme antelucanis temporibus aliquot res conficiuntur, cibis paratur, & capitur. Faciundum etiam plaustris, ac cetero instrumento omni, quibus celum pluuium inimicum, in chorte ut satis magna sint tecta, hæc enim si intra clausum in cōsepto, & sub dio, firem modo non metuant, sed aduersus tempestatem nocentem non resistunt. Chortes in fundo magno duæ aptiores. Una, ut interius cōpluium, habeat lacum, ubi aqua saliat, qui intra stilobatas cū uenit, sit semipiscina. Boves enim ex aruo æstate reducti hic bibunt, hic perfunduntur, nec minus è pabulo cum redierunt, anseres, sues porci. In chorte exteriori lacum esse oportet, ubi maceretur lupinum, item alia, quæ demissa in aquam ad usum aptiora fiant. Chors exterior crebro operta stramentis, ac paleis, obculcata pedibus pecudum, sit ministra fundo, ex ea quod euehatur. Secundum uillam duo habere oportet sterquilinia, aut unum bifariam diuisum, alteram enim in partem ferri oportet è uilla nouum finium, ex altera ueterem tolli in agrum, quod enim inferitur recens, minus bonum, id cum flacuit, melius, nec non sterquilinum melius illud, cuius latera, & summum uirgis, & fronde uindicatur ab sole. Non enim succum, quem querit terra, solem ante exugere oportet. Itaque periti (qui possunt) ut eò aqua influat, eo nomine faciunt. Sic enim maxime retinetur succus in eo. Quidam & sellas familiaricas ponunt, Aedificium facere oportet, sub quod tectum totam fundi subijcere possis messem, quod uocant quidam nubilarium. Id secundum aream faciundum, ubi triturus sis frumentum, magnitudine pro modo fundi ex una parte apertum, & id ab area, quo & in trituram prouere facile possis, & si nubilare cœperit, inde ut rursus celeriter recipere. Fenestras

habere oportet ex ea parte, unde commodissime perflari possit. Fundanius, Fructuosior inquit est certe fundus propter ædificia si potius ad antiquorū diligentiam, q̄ ad horum luxuriā dirigas ædificationem. Illi. n. faciebant ad fructuum rōnem, hi faciūt ad libidines indomitas. Itaq; illorū uillæ rusticæ erant maioris, q̄ urbanæ, quæ nunc sunt pleræq;. Cōtra, illic laudabatur uilla, si habebat culinam rusticam bonam, præsepas laxas, cellam uinari- am, & oleariam ad modū agri aptam, & pavimento proclini in lacum, in quo, si contigerit, defluens uinum exapiatur, ne perreat, quod sepe, ubi conditū nouū uinum, orca ut in Hispania feruore musti rupta, nec nō & dolia, ut in Italia. Item cætera, ut essent in uilla huiuscemodi, quæ cultura quæreret, p̄uidebāt. Nunc cōtra uillam suburbanam q̄ maximam, ac politissimā habeant, dant operam, ac cum Metelli, & Luculli uillis pessimo publico ædificatis certant, quo elaborant, ut spectent sua æstina triclinaria ad frigus orientis, hyberna ad solem occidentē potius, q̄ ut antiqui in quam partem cella uinaria, aut olearia fenestras h̄ret, cum fructus in ea uinarius quærat, ut dolia aera frigidiorem, item ut olearia caldiorem habeat. Item uidere oportet, si est collis (nisi quid impedit) ubi potissimum ponatur uilla.

De septorum uarietate quæ tutandi fundi causa fieri debeant.

Cap. XVII.

N V N C de septis, quæ tutandi fundi cā, aut partis fiant, dicā. Earum tutelarum genera quatuor. Vnum naturale, alterū agreste, tertium militare, quartum fabrilē. Horum unūquodq; species habet plures. Primum naturale sepimentum, quod obseri solet uirgultis, aut spinis, quod habet radices uinæ sepi, ac uiatoris prætereuntis lasciui non metuit faciem ardentem. Secunda sepes est ex agresti ligno, sed nō uiuit. Fit aut palis statutis crebris, ac uirgultis implicatis, aut latis perforatis, & per ea foramina traiectis longurijs ferē binis, aut ternis, aut ex arboribus truncis demissis in terram deinceps constitutis. Tertium militare sepimentum est fossa, & terreus agger, sed fossa ita idonea fiat, ut omnē aquā, quæ de cælo uenit, recipere possit, aut fastigiū habeat, ut exeat è fundo. Agger is, q̄ intrinsecus sit iunctus fossæ, ita arduus sit, ut eū transcendere nō sit facile. Hoc genus sepi fieri secundū uias publicas solet, & secundū amnes. Ad uiam salariam, & in

M. VARRONIS.

agro crustuminio uidere licet locis aliquot coniunctos aggeres cum fossis, ne flumen agris noceat. Aggeres qui faciunt sine fossa, eos quidam uocant muros, ut in agro reatino. Quartum fabrile sepimentum est notissimum, maceria. Huius species ferè quatuor, quod sit è lapide, ut in agro Thusculano, quod è lateribus coctilibus, ut in agro Gallico. quod è lateribus crudis, ut in agro sabino, quod ex terra, & lapillis compositis in formis, ut in Hispania, & agro tarentino,

De finibus prediorum sine septis. Cap. XVIII.

PRAETEREA sine septis fines prædij, sationis, notis arborum tutiores sunt, ne familiae rixentur cum uicinis, ac limites ex litibus iudicem querant. Serunt alij circum pinos, ut habet uxor in Sabinis. Alij cypressos, ut ego habeo in Vesuuiio. Alij ulmos, ut multi habent in Crustuminio, quod ibi pullulat maxime. Et ubi est campus nulla potior arbor seritur, quàm maxime fructuosa, quod & sustineat sepem, ac colit aliquot corbularum unarum, et frondem incundissimam ministrat ouibus, ac bubus, ac uirgas præbet sepibus, & foco, ac furno. Scrofa. Igitur primum hæc, quæ dixi, quatuor uidenda agricolæ, de fundi forma, terræ natura, de modo agri, de finibus tuendis.

De commodis aut incommodis uicinarum regionum seu proximorum locorum. Cap. XIX.

RELINQVITVR altera pars, quæ extra fundum est. Cuius appendices uehementer pertinent ad culturam propter affinitatem. Eius species totidem. Si uicina regio est infesta. Siquid neque fructus nostros exportare expediat, neque inde quæ opus sunt, apportare. Tertium, si uie, aut fluij qua portetur, aut non sunt, aut idonei non sunt. Quartum, siquid ita est in confinibus fundi, ut nostris agris profit, aut noceat, è quis quatuor, quod è primum, refert infesta regio sit, nec ne. Multos. n. agros egregios colere non expedit, propter latrocinia uicinarum, ut in Sardinia quosdam propè Celiem, & in Hispania propè Lusitaniã. Secundum, quæ uicinitatis inuectos habent idoneos, ut quæ ibi nascunt, ibi uedant, & illinc inuectos opportunos ad ea, quæ in fundo opus sunt, quod propterea sunt fructuosa. Multi enim habent prædia, quibus frumentum, aut uinum, aliud ue quid desit importandum.

Contra, nō pauci, quibus aliquid sit exportandum. Itaq; sub urbe colere hortos late expedit, sicut uiolaria, ac rosaria. Item alia multa, quæ urbs recipit, cū eadem in longinquo prædio, ubi nō sit quō deferri possit uenale, nō expedit colere. item, si ea oppida aut uiciu, aut et diuitum copiosi agri, ac uillæ, unde non caremere possis, quæ opus sunt in fundum, quibus quæ supersunt uenire possint. ut quibusdam pedamenta, aut perticæ, aut arūdo, fructuosior sit fundus, q̄ si longe sint inportanda, nonnunq̄ etiā, q̄ si colendo in tuo ea parare possis. Itaq; in hoc genus coloni potius annuensarios habent uicinos, q̄bus imperent medicos, fullores, fabros, q̄ in uilla suos habeant, quod nonnunq̄ unius artificis mors tollit fundi fructū, quam partem latifundi diuites domesticæ copię mādare solēt. Si. n. ab fundo lōgius absint oppida, aut uici, fabros parent, quos habeāt in uilla, sic ceteros necessarios artifices, ne de fundo familia ab ope discedat, ac p̄festis diebus ambulet feriata potius, q̄ opere faciundo agrum fructuosiorem reddat. Itaq; iō Saserne liber præcipit, nequis de fundo exeat præter uillicum, et promū, et unum, quem uillicus legat. Siquis cōtra exierit, ne impune abeat, si abierit, ut in uillicū animaduertatur. Quod potius ita præcipiendum fuit, nequis iniussu uillicū exierit, neq; uillicus iniussu domini lōgius, q̄ ut eodem die redierit, neq; id crebrius, q̄ opus esset fundo. Tertio eundem fundū fructuosiorem faciūt uecturæ, si uia sunt, quā plastra agi facile possint, aut flumina p̄pina, quā nauigari possit, q̄bus utrisq; rebus euehi, atq; inuehi ad multa prædia scimus. Quarto refert et ad fundi fructus, quemadmodum uicinus in confinio constitutum agrū habeat, si. n. ad limitē queretū habet, nō possis recte secundum eam syluā serere oleam. quod usque eo est cōtrariū natura, ut arbores nō solum minus ferant, sed et fugiant, ut introrsum in fundū se reclinent, ut uitis adsita ad olus facere solet, ut quercus, si inglandes magnæ, crebræ, finitimæ, fundi oram faciūt sterile.

Quibus rebus agri coluntur.

Cap. XX.

DE Fundi quatuor partibus, q̄ cum solo hærent, et alteris quatuor, quæ extra fundū sunt, et ad culturā ptinent, dixi. Nūc dicā agri q̄bus rebus colātur, quas res alij diuidūt in duas ptes, in homines, et adminicula hominum, sine quibus rebus colere nō possunt. Alij in tres ptes, scilicet i uocale, et semiuocale, et mutū.

e iij

M. VARRONIS.

Vocale, in quo sunt serui. Seminocale, in quo sunt boues. Mutū, in quo sunt plaustra. Omnes agri coluntur hominibus, seruis, aut liberis, aut utrisq;. Liberis, aut cū ipsi colunt, ut pleriq; pauperuli cum sua progenie, aut mercenarijs, & conductijs liberorū operis, res maiores, ut vindemias, & fœnificia administrant ij, quos oberatos nostri vocitarunt, ut etiam nunc sunt in Asia, atq; in Aegypto, & in Illyrico complures. De quibus uniuersis hoc dico. Grauiora loca utilius esse mercenarijs colere, q̃ seruis, & in salubribus quoq; locis opera rustica maiora, ut sunt in cōdendis fructibus vindemiæ, aut messis. De his cuiusmodi eē oporteat, Cassius scribit hæc. Operarios parandos esse, qui laborē ferre possint, ne minores annorū viginti duorū, & ad agriculturā doctiles. Eam coniecturā fieri posse ex aliarum rerum imperatis, & more incolarum ē nouitijs requisito ad priorem dominum quid facitarent. Manipia esse oportere neq; formidolosa, neq; animosa. Qui præsint esse oportere, qui litteris, aliqua sint humanitate imbuti, frugi, ætate maiore, q̃ operarios, quos dixi. Facilius. n. his, q̃ minoribus natu dicto sunt audientes. Præterea potissimū eos præesse oportet, qui periti sint rerū rusticarum, non solum. n. debere imperare, sed etiam facere, ut facientem imitentur, & ut animaduertant eum cum causa sibi præesse, quod scientia p̃stet, & usu. Neq; illi concedendum, ita imperare, ut uerberibus coerceat potius q̃ uerbis. Et (si modo id efficere possis) neq; eiusdē nationis plures parandos esse, ex eo enim potissimum solere offensiones domesticas fieri. Præfectos alacriores faciundum premijs, dandaq; opera, ut habeant peculium, & coniunctas conseruas, è quibus habeant filios, eo enim fiunt firmiores, ac coniunctiores fundo. Itaq; propter has cognatiōes epiroticæ familiæ sunt illustriores, ac cariiores. Ad iniiciendam uoluptatem his, præfecturæ honore aliquo habendi sunt, & de operarijs, qui præstabunt aliquod, communicandum quoque cum ijs, quæ faciūda sunt opera, quod ita cum sit, minus se putant despicī, atq; aliquo numero haberi à domino. Studiosiores ad opus fieri liberalius tractando, aut ciuarijs, aut uestitu largiore, aut remissione operis, cōcessione ue, ut peculiare aliquid in fundo pascere liceat, aut huiusmodi rerum, alijs, ut quibus qd grauius sit imperatum, aut animaduersum, qui consolando eorum restituat uoluntatem, ac beneuolentiam in dominum.

De numero familiæ rusticalis, et quot operis quisq; ager coli possit, & de modo cuiusq;.

Cap. XXI.

FAMILIAM Cato dirigit ad duas metas, ad certum modum agri, & genus sationis scribens de oliuetis, & uinetis, ut duas formulas, unam, in qua præcipit quomodo oliuetum agri iugerum ducentorū quadraginta instruere oporteat. Dicit enim in eo modo hæc, manāpia tredecim habenda, uillicum, uillicā, operarios quinque, bubulcos tres, asinarium unum, subulcum unū, opilionem unum. Alteram formulam scribit de uinearū ingeribus centum, ut dicat haberi oportere hæc, quindecim manāpia, uillicum, uillicam, operarios decem, bubulcum unum, asinariū unū, subulcum unum. Salserna scribit satis esse ad iugera octo hominem unum ea debere eū fodere diebus quadragintaquinque, tætsi quaternis operis singula iugera possit, sed relinqre se opas tredecim ualetudini, tempestati, inertia, indulgentiæ. Lianius. horū neuter satis dilucide modulos reliquit nobis. Quod Cato si uoluit (ut debuit), ut pro portione ad maiorem fundum, & minorem adderemus, & demeremus. Præterea extra familiā debuit dicere uillicū, & uillicam, neq; n. si minus. CCXL. iugera oliueti colas, non possis minus uno uillico habere, nec si bis tæto ampliore fundū, aut eo plus cola, ideo duo uillia, aut tres habendi fuere. Operarij modo, & bubulā pro portione demendi, uel addendi, ad minores, maiores ue modos fundorū, hi quoq; si similis ager est, sin est ita dissimilis, ut totus arari non possit, ut si sit confragosus, atq; arduus cliuis minus multi opus sunt boues, & bubulā. Inyicio illud, quod modum, neq; unū, neq; modicū ppo sit ducentorū quadraginta iugerum. Modicus. n. centuria, et ea ducentorū iugerum, è qua ni sexta pars sit ea quadraginta, quæ de ducentis quadraginta demitur, nō uideo quemadmodum ex eius præcepto demam sextam partē, & de tredecim manāpijs uililo magis si uillicū, & uillicam remouero, quemadmodū ex undecim item sextā partem demam. Quod aut ait in centum ingeribus uinearū opus esse quindecim manāpia, si quis habebit cēturiā, quæ sit dimidiū uineti, & dimidium oliueti, sequet, ut duos uillicos, & duas uillicas habeat, quod est deridiculum. Quare alia rōne modus manāpioꝝ generatim est animaduertendus, & magis in hoc Salserna probāndus, qui ait singula iugera qua

M. VARRONIS.

ternis operis uno operario ad faciendum satis eē. Sed si hoc in Saferna fundo in Gallia satis fuit, non continuo idem in agro ligustico mōtano. Itaq; de familiæ magnitudine, et reliquo instrumento cōmodissime scies, quantū pares, si tria animaduerteris diligēter. In uianitate p̄dia cuiusmodi sint, et q̄ta, & quot, quæq; hominibus colantur. Et quot additis opis, aut demptis melius, aut deterius habeas. Nobis. n. cultum biuium ad culturam dedit natura experientiā, & imitationem. Antiquissimi agricolæ tentando pleraq; constituerūt, liberi eorū maximam partem imitando. Nos utrunq; facere debemus, & imitari alios, & aliter ut faciamus, experientia tentare quædā sequētes non aleā, sed rōnem aliquam, ut si altius repastinauerimus, aut minus, q̄ alij, quod momentū ea res habeat, ut fecerunt ij, in sarriēdo iterū, et tertio, & q̄ insitiones ficulnas ex uerno tempore in æstiuū contulerunt.

Quot ingis boum quisq; agri modus coli possit. Cap. XXII.

DE RELI qua parte instrumenti, quod semiuocale appellatur, Saferna ad ingera ducenta arui boum inga duo satis eē scribit. Cato in oliuetis, ducentorum quadraginta ingerū boues ternos, ita fit, ut Saferna dicat uerū ad centū ingera, iugum opus est, si Cato ad octogena. Sed ego neutrum horum ad oēm agrū conuenire puto, & utrūq; ad aliquem. Alia enim terra facilior, aut difficilior est alia. Terram durā boues p̄scindere nisi magnis uiribus non possunt, & sepe fracta bura relinquunt uomeres in aruo. Quo sequendum nobis in singulis fundis, dum sumus nouicij, tripliā regula, superioris domini instituto, & uicinorū, & experientia quadam. Quod addit asinos, q̄ stercus uectent, tres, asinum molarium, in uinea ingerum centum, iugum boum, in hoc genere semiuocalium, adiiciendum de pecore, ea sola, q̄ agri colendi causa erunt, ut solent esse pecuaria, pauca habenda, quo facilius mancipia quæ solent se tueri & assidua esse, possint. In eo numero non modo qui prata habent, ut potius oues, q̄ sues habeant, curant, sed etiam qui non solum pratorum causa habent, propter stercus.

De eligendis bubus, & de modo probandi, & edomandi nouelos iuuenços. Cap. XXIII.

IGITUR De omnibus quadrupedibus prima probatio est, qui idonei sint boues, qui arandi cā emuntur, quos rudes, neque minores trimos, neq; maiores quadrimos parandum. Vt uiribus magnis sint, ac pares, ne in opere firmior imbecillioem cōficiat, amplis cornibus, & nigris potius, q̄ aliter, ut sint lata fronte, naribus finis, lato pectore, crassis coxendiabus. Hos ueteranos, ex campestribus locis, non emendū in dura, ac montana, nec non, ita si incidit ut sit uitandū. Nouellos cum quis emerit iuuenos, si eorū colla in furcas destinata incluserit, ac dederit cibū, diebus paucis erunt mansueti, & ad domandum proni. Tum ita subigendum, ut minutatim assuefaciant, & ut tironē cum ueterano adiungant, imitando. n. facilius domantur. Et primum in equo loco, & sine aratro, tum eo leni, & principio per arenam, aut molliorem terram. Quos ad uecturas, item instituendum, ut inania primum ducāt plaustra, & si possis, per uicū, aut oppidum, creber crepitus, ac uarietas rerum, consuetudine celeberrime ad utilitatem adducat. Neq; pertinaciter, quem feceris dextrū in eo manendum. Quod si alternis sit sinister, sit laboranti in alterutra parte reges. Vbi terra leuis, ut in cāpania, ibi non bubus grauius, sed uacis, aut asinis quod arant, eo facilius ad aratrū leue adduci possunt, ad molas, & ad ea, siqua sunt, quæ in fundo conuehuntur. In qua re alij asellis, alij uacis, ac mulis utuntur, exinde ut pabuli facultas est. Nā facilius asellus, q̄ uacca alitur, sed fructuosior hæc, in eo agricolæ hoc spectandū, quo fastigio sit fundus, in cōfragoso. n. ac difficili ualentiora parandum, et potius ea, quæ per se fructum reddere possunt, cum idē operis faciūt.

De canibus sine quibus neq; uilla parū tuta sit. Cap. XXIIII.

CANES potius cum dignitate, & acres paucos habendum, q̄ multos, quos consuefacias potius noctu uigilare, & interdum clausos dormire, cathena uinctos, ut soluti acriores fiant. De indomitis quadrupedibus, & pecore instructo, & canibus hoc faciendum, Si prata sunt in fundo, neq; pecus dominus habet, danda opera, ut pabulo uēdito, alienum pecus in suo fundo pascat, & stabulet.

De apparatu instrumentorum, quæ in fundo uillæ opus sunt.

Cap. XXV.

DE RELIQUO instrumento muto, in quo sunt corbulæ, & dolia, & alia, sic præcipiendum. Quæ nasci in fundo, ac fieri à domesticis poterunt, eorū nequid ematur, ferè sunt, quæ ex uiminibus, et materia rustica fiunt ut corbes, fisciæ, tribula, mallei, & rastelli. Sic quæ sunt de cannabi, lino, iunco, palma, scirpo, ut fines, restes, tegetes. Quæ è fundo sumi non poterunt, ea si emptæ erunt potius ad utilitatem, quàm ob speciem, sumptu fructum non extenuabunt, eo magis, si inde emptæ erunt potissimum, ubi ea & bona, & proxime, & uillissimo emi poterunt. Cuius instrumenti uaria discrimina, ac multitudo, agri magnitudine finit, quod plura opus sunt, si fines distant late. Itaque Stolo inquit, Proposita magnitudine fundi, de eo genere Cato scribit, Oliueti iugera ducenta quadraginta quæ coleret, cum ita oportere, ut faceret uasa olearia instruere, iuga quinque, quæ membratim enumerat, ut ex ære abena, urceos, nasiternam, item alia sic è ligno, & ferro, ut plostra maiora tria, aratra cum uomeribus sex, crates stercorearias quatuor. item alia, sic de ferramentis quæ sint, et quot opus ad multitudinem, ut furcas ferreas octo, et sarcula totidem, dimidio minus palas, item alia. Item alteram formulam instrumenti fundi uinarij fecit, in qua scribit, si sit ager centum iugerum, habere oportere uasa torcularia instructa trina, dolia cum operculis culeorum octingentorum, acinaria uiginti, frumentaria uiginti. Item eiusmodi alia, quam minus multa quidem alij, sed tantum numerum culleorum scripsisse puto, ne cogere quotannis uendere uinum. Vetera enim quam noua, & eadem alio tempore, quam alio pluris. Item sic de ferramentorum uarietate scribit permulta, & genere, & multitudine qua sint, ut falces, palas, rastros. Sic alia, quorum nonnulla genera species habent plures, ut falces, nam dicuntur ab eodem scriptore uineaticæ opus esse sex, scirpiculæ quinque, syluaticæ quinque, arborariæ tres, & rusticariæ decem. Hic hæc. At Scrofa, Instrumentum, & supellectilem rusticam omnem oportet habere scriptam in urbe & rure dominum, uillicum contra ea ruri omnia certo suo quæque loco ad uillam esse posita. Quæ non possunt esse sub clauis, quam maxime facere, ut sint in conspectu, oportet, eo magis ea, quæ in rarioribus sunt usu, ut quibus in uindemia utuntur, ut corbulæ, & sic alia, quæ. n. res quotidie uidentur, minus metuunt furem.

Quæ & quo quodque loco maxime expediat serere. Cap. XXVI.

SVSCIPIT Agrasius. Et quoniam habemus illa duo prima, ex diuisione quadripartita, de fundo, & de instrumēto, quo coli solet, de tertia parte expecto. Scrofa, Quoniam fructum inquit, arbitror esse fundi eum, qui ex eo satus nascitur utilis ad aliquam rem, duo consideranda, quæ, & quo quidq; loco maxime expediat serere, alia enim loca apposita sunt ad fœnum, alia ad frumentum, alia ad vinum, alia ad oleum. Sic ad pabulū quæ pertinent, in quo est ocymum, farrago, uicia, medica, cytisum, lupinum. Neq; in pingui terra omnia feruntur recte, neq; in macra nihil. Rectius enim in tenuiore terra ea, quæ non multo indigēt succo, ut cytisum, & legumina, præter cicer, hoc enim quoq; legumen, ut cætera, quæ uelluntur è terra non subsecantur, quæ qd ita legunt, legumina dicta, in pingui rectius, quæ succi sunt maioris, ut holus, triticum, siligo, linum. Quædam etiam serenda non tam propter præsentem fructum, q̄ in annum prospicientē, quod ibi subiecta, atq; relictā terram faciunt meliorem. Itaq; lupinum, cum nec dum siliculam cepit, & nonnunquam fabalia, si ad siliquas non ita peruenit, ut fabam legere expediat, si ager macrior est, pro stercore in arare solent. Nec minus ea discrimināda in conserūdo, quæ sunt fructuosa propter uoluptatem, ut quæ pomaria, ac floralia appellantur. Item illa, quæ ad hominū uictum, ac sensum, delectationemq; non pertinent, neq; ab agri utilitate sunt disiuncta. Idoneus locus eligendus, ubi facias salictū, & arūdinetum, sic alia, quæ humidum locum quærunt. Cōtra, ubi segetes frumentarias, ibi fabam potissimum seras. Item alia, quæ arida loca sequuntur, sic ut umbrosis locis alta seras, ut corruca, quod ita petit asparagus, aprieis, ut ibi seras uiolā, et hortos facias, quod ea sole nutrantur. Sic alia & alio loco seruāda, ut habeas uimina, unde utendo quid facias, ut sirpeas, uallos, crates. Alio loco ut seras, & colas syluam cæduam, alio ubi aucupare. Sic ubi cānabim, linum, iuncum, spartum, unde nectas bubus paleas, lineas restis, funes, quædam loca eadem, alia ad seruandum idonea. Nam & in recentibus pomarijs desitis seminibus, in ordinemq; arbusculis positis primis annis ante, q̄ radices longius procedere possint, alij conserunt hortos, alij quid aliud. neq; cum conualuerūt arbores, idem faciunt, ne uiolent radices.

Stolo. Quod ad hæc pertinet Cato non male quod scribit de stationibus, ager Crassus, & letus, si sit sine arboribus, eum agrum

M. VARRONIS.

frumentarium fieri oportere, idem ager si nebulosus sit, rapa, raphanum, milium, panicum fert.

Olea in quo agro serenda sit, qua pte, quo ordine. C.XXVII.

IN AGRO Crasso, & calido oleam conditaneam, radium maiorem, salentinam, orchitem, poseā sergianam, colminiā, albicerem, quam earum in his locis optimam dicent esse, eam maxime ferere. Agrū oliueto conferendo, nisi qui in uetum fauonium spectet, & soli ostentus sit, alium bonū nullum esse. Qui ager frigidior, & macrior sit, ibi oleam licinianam feri oportere. Si in loco crasso, aut calido posueris, hostum nequam fieri, & ferendo arborem perire, & muscum rubrū molestum esse. Hostum uocant, quod ex uno facto olei reficiatur. Factū dicunt, quod uno tpe conficiunt, quem alij centum sexaginta aiunt eē modiorū, alij ita minus magnū, ut ad centum viginti descendat, & exinde, ut uasa olearia quot, & quanta habeant, quibus conficiūt illud. Quod Cato ait circum fundū ulmos, & populos, unde frons ouibus, & bubus sit, & materies feri oportere. Sed hoc neq; in omnibus fundis opus est, neq; in quibus est opus, propter frondem maxime, si ne detrimento ponūtur ab septentrionali plaga, qđ nō offiāt soli. Ille adiūt ab eodē scriptore. Si locus humectus sit, ibi cacumina populorū serunda, & arūdinetū, id prius bipalio uerti ibi oculos arundinis pedes ternos aliū ab alio feri, ibi quoq; corrudā, unde asparagi fiant, aptā esse utriq; eandē ferē culturā, salicē grēcā circū arundinetum feri oportere, uti sit, qui uitis alligari possit.

Vinea in quo agro serenda sit.

Cap. XXVIII.

VINEA quo in agro serunda sit, sic obseruādum. Qui locus optimus uino sit, & ostentus soli, aminæum minusculum, & geminum eugeneū, & helueolum minusculum feri oportere. Qui locus crassior sit, aut nebulosus, ibi aminæum maius, aut murgētinum, aut apicium lucanum feri. Ceteras uites, & de his miselas maxime in omne genus agri conuenire.

Qua cœli pte ridicæ in uinea figi debeant.

Cap. XXIX.

IN OMNI uinea diligenter obseruant, ut ridica uitis ad septentrionem uersus tegatur, & si cypressos uinas pro ridicis inferunt, alternos ordines imponunt, neq; eas crescere altius, q̄ ridi-

cas patiuntur, neq; propter eas adserunt uites, quod inter se hæc inimica. Agrius Fundani uereor inqt, ne ante æditimus ueniat huc, q̄ hinc ad quartum actū accedamus, uindemiam .n. expecto. Bono animo es inquit Scrofa, si sinas expediet, ac urnam.

In quot mensibus & temporibus diuidat̄ annus, & in quibus quid feri oporteat, ac de agro seminata colligi. Cap. XXX.

ET QVONIAM tempora duorū generū sunt, unum annale, quod sol circuitu suo finit, alterū menstruum, quod luna circūiens comprehendit, prius dicam de sole. Eius cursus annalis primum ferē circiter ternis mensibus ad fructus est diuisus in quatuor partes totus, & idē subtilius sesquimensibus in octo. In quatuor tpa diuiditur, in uer, & æstatē, & autumnū, & hyemem. Vere stationes quædam sunt. Terrā rudē prosindere oportet, quæ sunt ex ea enata, prius q̄ ex ijs, quid seminis cadat, ut sint extradicata. Et simul canis ab sole percalefactis aptiores fieri ad accipiendum imbrem, & ad opus faciliores, relaxatis, neq; ea minus bis arandū, ter melius. Aestate fieri messes oportere. Autūno sicis tēpestatibus uindemias, ac syluas excoli cōmodissime, tunc uel prædi arbores secundū terrā oportere. Radices aut̄ prioribus imbris ut effodiantur, neqd ex his nasci possit. Hyeme putari arbores dūtaxat his tpiibus cū gelu cortices, ex imbris careant, & glacie.

Quot dies habeat quælibet pars anni, & in quibus signis cœli intrent. Cap. XXXI.

DIES primus ueris est in aquario, æstatis in tauro, autumnū in leone, hyemis in Scorpione. Cum uniuscuiusq; horum quatuor signorum dies tertius & uicesimus, quatuor temporum sit primus, efficitur, ut uer dies habeat nonaginta unū, æstas nonaginta quatuor, autumnus nonaginta duos, hyems octoginta octo.

Quæ redacta ad dies ciuiles nostros, qui nunc sunt primi uerni temporis extant ad septimum Idus Februarij, æstiu extant ad septimū Idus Maij, autūnalis extant ad tertium Idus Sextilis, hyberni extant ad tertium Idus Nouemb. Subtilius descriptis temporibus obseruanda quædā sunt, eaq; in partes octo diuiduntur. Primū ab fauonio ad æquinoctiū uernum dies quadraginta duo, hinc ad uergiliariū exortum dies quadraginta quatuor. Ab hoc ad solstitiū dies quadraginta nouem, idē ad caniculæ signū dies

M. VARRONIS.

uigintinouem. deinde ad æquinoctium autumnale dies sexaginta septem, exinde ad uergiliarum occasum dies triginta duo. Ab hoc ad brumã dies quinquaginta septem, inde ad fauonium dies quadraginta quinque.

Quid inter fauonium & æquinoctium uernum fieri oporteat.

Cap. XXXII.

IN PRIMO interuallo inter fauonium, & æquinoctium uernum hæc fieri oportet. Seminaria omne genus ut seratur, putari in primis, arcu uites ablaqueari, radices, quæ in summa terra sunt, prædi, prata purgari, salicta feri, segetes sarrire. Seges dicitur, quod aratum satum est, aruum, quod aratum, nec satum est. Noualis, ubi satum fuit ante, quæ secunda aratione renouetur. Rursum terram cum primum arant profandere appellant, cum iterum offringere dicunt, quod prima aratione glebæ grandes solent excitari, cum iteratur offringere uocant. Tertio cum arant iacto semine, boues lirare dicuntur, id est cum tabellis additis ad uomerem simul, & satum frumentum opunt in porcis, & sulcant fossas, quod pluuia aqua delabatur, nonnulli postea, quæ segetes non tam latas habent (ut in Apulia) id genus prædij per sarritores occare solent, siquæ in porcis grandiores relictæ sunt glæbæ. Qua aratrum uomere lacinam stiriam fecit, sulcus uocatur. Quod est inter duos sulcos elata terra, dicitur porca, quod ea seges frumentum porrigit. Sic quoque exta deis cum dabant, porrigere dicebant.

Quæ inter æquinoctium uernum & uergiliarum exortum fieri debeant.

Cap. XXXIII.

SECUNDO interuallo inter uernum æquinoctium, et uergiliarum exortum hæc fieri debent. Segetes runcari, herbam ex segetibus expurgari, boues terram profandere, salicem cædi, prata defendi, quæ superiore tempore fieri oportuerit de arboribus, & non sunt absoluta ante, quæ gemmas agant, ac florescere incipiunt, fiant. Quod si quæ folia emittere solent, aut ante frondere, quæ florere inceperint, statim ad serendum idoneæ non sunt. Olea feri, interpretari quoque oportet.

Quæ inter uergiliarum exortum & solstitium fieri oporteat.

Cap. XXXIIII.

TERTIO

TERTIO intervallo inter uergiliarum exortum, & solstitium hæc fieri debent. Vineas nouellas fodere, aut arare, et postea occare id est comminuere, ne sit gleba, quod ita occidunt, occare dicunt. Vites pampinari, sed à sciēte, nam id, quod putare maius, neque in arbusco, sed in uinea fieri. Pampinare est ex sarmento colles, qui nati sunt, de iis, qui plurimum ualent, primum, ac secundum, nonnunquam etiam tertium relinquere, reliquos decerpere, ne relictis colibus sarmentum nequeat ministrare succum. Ideo in uitiario primitus cum exit uitis, tota refecare solet, ut firmiore sarmento è terra exeat, atque in pariendis colibus uires habeat maiores. Euincidum enim sarmentum propter infirmitatem sterile scit, neque ex se potest eicere uitē, quam minorem uocant flagellum, maiorem etiam, unde uuae nascuntur, palmam prior littera una mutata declinata à uenti flatu similiter flabellum ac flagellum, posterior quo ea uitis immittitur ad uuas pariendas dicta primo uidetur à pariēdo parilema ex immutatis litteris ut in multis diu cœpta palma. Ex altera parte caprea dicta, quod parit capreolum. Is est coliculus uiteus intortus, ut cinānus, is enim uites ut teneat, serpit ad locum capiundum, ex quo à capiēdo capreolus dictus. Omne pabulum primum ocymum, farraginem, uiciam nouissime fœnum secari. Ocymum dictum à graeco uerbo ὀκνῶ, quod ualet cito. Similiter quoque ocymū in horto. Hoc amplius dictum ocymum quod citat alium bubus, et id iis datur, ut purgent, id est pabuli segete uiride sectū anteq̃ gerat filiquas. Cōtra, ex segete, ubi sata admista ordeū et uicia, et legumina pabuli causa uiridia, quo far & ferro cesa, farrago dicta, aut quod primum in farracia segete seri cœpta. Eo equi, & iumenta cetera uerno tempore purgantur, ac saginantur. Vicia dicta à uinciēdo, quod item capreolos habet, ut uitis, quibus sursum uorsum serpit, ad scapum lupini, aliū uel calamum ad quē ut hereat, eū solet uincire. Si prata irrigua habebis, simul ac fœnum sustuleris, irrigare. In poma, quae insita erunt, siccitatibus aquam addi quotidie à quo quod indigent potu, poma dicta esse possunt.

Quid inter solstitium & caniculam faciundū sit. Ca. XXXV.

QUARTO intervallo inter solstitium, & caniculam plerique messē faciunt, quod frumentum dicunt quindecim diebus

Varro.

f

M. VARRONIS.

esse in uaginis, quindecim florere, quindecim exarescere, cum sit maturum. Arationes absolueri, quæ eo fructuosiores sunt, quo calidior terra aratur. Cum prosideris, offringi oportet, id est iterare, ut frangantur glebæ. Prima enim aratione grandes glebæ ex terra sinduntur. Serendum uiciam, lentem, acerculam, erui-liam, ceteraq; quæ alij legumina, alij (ut gallicani quidam) legaria appellant, utraq; dicta à legendo, quod ea non secantur, sed uellendo leguntur. Vineas ueteres iterum occare, nouellas è tertio, si sunt etiam tum glebæ.

Quid inter caniculam & æquinoctium autumnii fieri oporteat.

Cap. XXXVI.

QVINTO intervallo inter caniculam, & æquinoctium autumnale oportet stramenta desecari, & acervos construi, aratro offringi, frondem cædi, prata irrigua iterum secari.

Quæ inter æquinoctium autumnale, & uergiliarum occasum fieri debeant.

Cap. XXVII.

SEXTO intervallo ab æquinoctio autumnali incipere scribunt oportere serere, usq; ad diem. XCI. Post brumam, nisi quæ necessaria cæ coegerit, nō serere, qd tñ intersit, ut ante brumam sata, septimo die, quæ à bruma sata. XL. die uix exeant, neq; ante æquinoctiū incipi oportere putant, quod si minus idoneæ tempestates sint cōsecutæ, putrescere semina soleāt. Fabam optime seri in uergiliarum occasu. Vitis aut legere, & uindemiam facere inter æquinoctiū autumnale, & uergiliarum occasum. Dein uites putare incipere, & propagare, et serere poma. Hæc aliquot regionibus, ubi maturius frigora sunt asperiora, melius uerno tempore.

Quid inter uergiliarum occasum & brumam fieri oporteat. C. 38.

SEPTIMO intervallo inter uergiliarum occasum, & brumam, hæc fieri oportere dicunt. Serere lilium, & crocum, quod iam egit radicem. Rosa etiā conaditur radiatus in uirgulas palmares, & obruitur, hæc eadem postea transfertur facta uiuira dix. Violaria in fundo facere non est utile, ideo quod necesse est è terra ad ea obruenda puluinos fieri, quos irrigationes, & pluuie, & tempestates abluunt, & agrum faciunt minorem. Ab fauonio usque ad arcturi exortum recte serpyllum è seminario trāsferri, quod dictum ab eo, quod serpit. Fossas novas fodere, ueter

res tergere, uineas, arbutumq; putare, dum in. XV. diebus ante
& post brumam, ut pleraque ne facias, necnon tum aliquid re-
cte feritur, ut ulmi.

Quæ inter brumam & faonium fieri oporteat. Ca. XXXIX.

OCTAVO intervallo inter brumam, & faonium hæc fie-
ri oportet de segetibus, si qua est aqua, deduci, sin siccitates sunt,
& terra tenebritudinem habet, sarrire, uineas, arbutaq; putare.
Cum in agris opus fieri non potest, quæ sub tecto possunt, tunc cõ-
ficienda antelucano tempore hyberno. Quæ dixi scripta, & pos-
ita habere in uilla oportet, maxime ut uillicus norit.

De lunaribus diebus.

Cap. XL.

DIES LVNARES quoq; obseruandi, qui quodammo-
do bipartiti. Quod à noua Luna crescit ad plenam, & inde rur-
sus ad nouam lunam decrescit, quoad ueniat ad intermestruum,
è quo die dicitur luna eẽ extrema, & prima, à quo Athenis eam
diem appellant ἑνὴν καὶ ὑεῖαν τετρακτέος, quædam facienda
in agris potius crescẽte luna, q̃ senescente, quædam contra, ut
quæ metas frumenta, & cæduam syluam. Ego ista etiam inquit
Agrasius, non solum in ouibus tondẽdis, sed in meo capillo à pa-
tre acceptum seruo, ne decrescẽte luna tondens caluescam. Agri-
us. Quemadmodum inquit luna quadripartita? & quid ea di-
uisio ad agros pollet? Tremellius, Nunquam rure audisti inquit
octauo ianiam lunam & crescentem, & contra senescentem, &
quæ crescente luna fieri oporteat, & tamen quædam melius fie-
ri post octauo ianiam lunam, q̃ ante. Et si quæ senescente luna fie-
ri conueniret melius, quanto si minus haberet ignis id astrum?
Dixi de quadripartita forma culturæ agri.

De altera temporum diuisione coniuncta cum sole & luna, &
habente sex partes, seu gradus. Cap. XLI.

STOLO, Est altera inquit temporum diuisione coniuncta quo-
dammodo cum sole, & luna, quæ in sex partita est, quod omnis
ferè fructus quinto deniq; gradu peruenit ad perfectum, ac uidet
in uilla dolium, ac modium, unde sexto prodit ad usum. Primo
preparandum, secundo ferendum, tertio nutricandum, quarto
legendum, quinto condendum, sexto promendum.

f ii

AT IN preparando, scrobes faciendi, aut repastinandum, aut sulcandum, ut si arbutum, aut pomariū facere uelis. Ad alia arandum, aut fodiendum, ut si segetes instituas. Ad quædam bipalio uertenda terra, plus, aut minus, aliæ enim radices angustius diffunduntur, ut cupressi, aliæ latius, ut platani usque eo (ut Theophrastus scribit) Athenis in Lyceo, cum et nunc platanus nouella eēt, radices triū, et triginta cubitorū egisse. Quædam si bubus, et aratro psideris, et iterandū ante, quā semē iactes. Itē præparatio si qua fit in pratis, id est, ut defendantur à pastione, quā ferē obseruat à pyro florēte, si irrigua sunt, ut tēpestine irrigent.

De stercore et sterquilinio.

Cap. XLIII.

Q V A E Loca in agro stercoreanda uidendum, et qui, et quo potissimum genere facias, nam discrimina eius aliquot. Stercus optimum scribit Cassius esse uolucrum, præter palustriū, ac nautium. De his præstare columbinum, quod sit calidissimum, ac fermentare possit terram. Id ut semen aspergi in agro oportere, non ut de pecore acruatim poni. Ego arbitror præstare ex auariis turdorum, ac merularum, quod non solum ad agrum utile, sed etiam ad cibum, ita bubus, et suibus, ut fiant pingues. Itaque qui auaria conducunt, si caueat dominus, stercus ut in fundo maneat, minoris conducunt, quā uis, quibus id accedit. Cassius secundum Columbinū scribit esse hominis. Tertio caprinum, et ouilium, et asinum. Minime bonum equinum, sed in segetes, in pratena. uel optimum, ut ceterarum ueterinarum, quæ ordeo pastuntur, quod multam facit herbā. Sterquilinium secundū uilam facere oportet, ut quā pauca operis egerat. In eo si in medio robusta aliqua materia sit depacta, negant serpētem nasci.

De serendo agro gradus secundus, et quatuor sunt genera seminum, et quā quo tempore et loco debeant feri. Cap. XLIIII.

SATIONIS autem gradus secundus hanc habet naturā, ad quod tempus cuiusque seminis apta sit ad serendum. Nā refert in agro ad quam partem cæli quisque locus spectet, sic ad quā tempus quæque res facillime crescat. Nonne uidemus alia florere ueruno tempore, alia æstino, neque eadem autumnali, quæ hyberno?

Itaq; alia feruntur, atq; inferuntur, & metuntur ante, aut post
 q̄ alia, ut complura quæ uere melius, q̄ autumno inferuntur. Cir
 citer solstitium inferi fici solet, nec non brumalibus diebus cera
 fus. Quare cum semina ferè sint quatuor generum, quæ transfe
 runtur è terra in terram, per se à natura, alia ex industria, ut fa
 ciunt uiniradices, quæ ex arboribus dempta demittuntur in hu
 mum, quæ inferuntur ex arboribus in arbores. De singulis rebus
 uidendum, quo quæq; tempore, locoq; facias. Primum semen, qd̄
 est principium oriendi, id duplex, unum, quod latet nostrum sen
 sum, alterum quod apertum. Latet, si sunt semina in aere, ut
 ait phisicus Anaxagoras, & si aqua, quæ influit, in agrum in
 ferre solet, ut scribit Theophrastus. Illud, quod apparet ad agri
 colas, id uidendum diligenter, quædam enim ad oriendum sunt
 usque adeo parua, ut sint obscura, ut cupressi, nō enim galbuli,
 qui nascuntur, tanquam pilæ paruæ corticiæ id semen, sed in his
 intus primigenia semina dedit natura. Reliqua inuenit experi
 entia coloni. Num prima, sine colono, prius q̄ sata, nata? Secun
 da, quæ ex his collecta, neq; prius q̄ sata, nata. Prima semina ui
 dere oportet, ne uetustate sint exueta, aut ne sint admista, aut
 ne propter similitudinem sint adulterina. Semen uetus tantum
 ualet in quibusdam rebus, ut naturam commutet, nam ex semi
 ne brassicæ uetere sato nasci aiunt rapa, & contra ex rapoꝝ bras
 sicam. Secunda semina uidere oportet, ne unde tollas, nimium
 cito, aut tarde tollas. Tempus enim idoneum, quod scribit Theo
 phrastus, uere, & autumno, & caniculæ exortu, neq; omnibus lo
 cis, ac generibus idem. In sicco, & macro loco, & argilloso, quo
 minus habet humoris, uernum tempus idoneum, in terra bona,
 ac pingui, autumno, quod uere multus humor, quam sationem
 quidam metiuntur ferè diebus triginta. Tertium genus seminis,
 quod ex arbore per furculos defertur in terram, sic in humum de
 mittitur, ut in quibusdam tamen sit uidendum, ut eo tempore sit
 deplantatum, quo oportet. Id enim fit ante, q̄ gemmare, aut flo
 rere quid incipit, & quæ de arbore transferas, ut ea deplātes po
 tius, quàm defringas, quod plantæ solum stabilius, quo latius, ut
 radices facilius mittat, ea celeriter ante quàm succus exarescat,
 in terram demittunt. Denum in oleagineis seminibus arbores ui
 dendum, ut sit de tenero ramo ex utraq; parte æquabiliter præ
 cisum, quas alij clauolas, alij taleas appellant, ac faciunt cirāter

pedales. Quartū genus seminis, quod transit ex arbore in aliā. Videndum, quā ex arbore in quam transferatur, & quo tpe, & quemadmodum obligetur, nō enim pyrum recipit quercus, neq; enim si malus pyrum. Hæc sequuntur multi, qui aruspices audiunt multum, à quibus proditum in singulis arboribus quot genera insita sint, uno ictu tot fulmina fieri illud, quod fulmen concepit, si in pyrum syluaticam infueris pyrum quamuis bonā, nō fore pyrum tam incundum, q̄ si in eā, quæ syluestris non sit. In quācunq; arborem inferas, si eiusdem generis est dumtaxat, ut sit utraq; malus, ita inferere oportet, referentem ad fructum, meliori genere, ut sit surculus, q̄ est, quo ueniat arbor. Est altera species ex arbore in arborem inferendi nuper animaduersa in arboribus propinquis. Ex arbore enim, à qua quis uult habere surculum, in eam, quā inferere uult, ramulum traducit, & in eius ramo p̄ciso, ac diffisso implicat, tū ramuli locus, qui contingit ex utraq; parte, qua fissuram intrat falce extenuatur, ita ut ex una parte, qua cœlum uisurus est, corticem cum cortice exæquatum habeat. Eius autem ramuli, quem inferet, cacumen ut directum sit ad cœlum, curat. Postero anno cum comprehendit, unde propagatum est, ab altera arbore prædicit.

De temporibus transferendorum surculorum, & quæ sint post factionem obseruanda.
Cap. XLV.

QVO Tempore quæq; transferas, hæc in primis uidenda, qđ quæ prius uerno tempore inferebantur, nunc etiam solstitiali, ut ficus, quod densa materia non est, & ideo sequitur caldorem. A quo fit, ut in locis frigidis ficeta fieri non possint. Aqua recenti insito inimica. Tenellum enim cito facit putre. Itaque quod inserit caniculæ signo, commodissime æstimatur inferi, quæ autem natura minus sunt mollia, uas aliquod supra alligāt, unde stillet lente aqua, ne prius exarescat surculus, q̄ coalescat, cuius surculi corticem integrum seruandum, & eum sic exacuendum, ut non desnudes medullam, ne extrinsecus imbres noceant, aut nimius calor, argilla obliniendum, ac libro obligandum, itaq; uitem triduo ante quā inferāt, desecant, ut qui in ea nimius est humor defluat ante, q̄ inferatur, at in qua inferunt, in ea paulo infra, q̄ insitum est, incidunt, unde humor aduentitius effluere possit, cōtra in fico, & malo punica, & siqua etiā horū natura aridiora,

continuo. In alijs translationibus uidendum, ut quod transfer-
tur, in cacumen habeat gemmam, ut in ficis. De his primis qua-
tuor generibus seminum, quædam quod tardiora, surculis poti-
us utendum, q̄ semine, ut in ficetis faciunt. Fici enim semen natu-
rale intus in ea fico, quam edinius, quæ sunt minuta grana, è q̄-
bus paruis, quod enasi coliculi uix queunt. Omnia enim minu-
ta, & arida, ad crescendum tarda, & quæ laxiora, ea s̄t fœcun-
diora, ut fœmina, q̄ mas, ex proportionem in uirgultis item, itaq̄
ficus, malus punica, & uitis propter fœmineam molliæ ad cre-
scendum prona. Contra palma, & cupressus, & olea in crescendo
tarda, in hoc enim humidiora, q̄ aridiora, quare ex terra potius
in seminarijs surculos de ficeto, q̄ grana de fico expedit obruere,
præter si aliter nequeas, ut si quando quis trans mare semina mit-
tere, aut inde petere uult, tum enim resticulas per ficos, quas edi-
mus, maturas perserunt, & eas cum inaruerint, complicant, ac
quò uolunt mittunt, ubi obrutæ in seminario pariant. Sic gene-
ra ficorum, chia, ac calidice, & Lydiæ, & Africanæ. Item cæte-
ra transmarina in Italiam perlata. Simili de causa oleæ semen
cum sit nucleus, qđ ex eo tardius enascebatur colis, q̄ ex taleis, iō
potius in seminarijs taleas, quas dixi, serimus.

De medica.

Cap. XLVI.

DE MEDICA in primis obserues, ut ne in terram nimium
aridam, aut uariam, sed temperatam semen demittas in ingerū
unum, si est natura temperata terra, scribunt opus esse medicæ
sesquimodium, id seritur ita, ut semen iactatur, quemadmodum
salicet cum pabulum, & frumentum seritur.

De cytiso.

Cap. XLVII.

CYTISVM SERITVR in terra bene subacta tanquā
semen brassicæ, inde differtur, & in sesquipedem ponitur, aut eti-
am de cytiso durior uirgulæ deplantantur, & ita pangitur in
serendo.

Quot modi seruntur fabæ, tritici, hordei, farris. Cap. XLVIII.

SERVNtur fabæ modi quatuor in ingero, tritici. V. orde-
VI. farris. X. Sed nonnullis locis paulo amplius, aut minus, si. n.

f iij

M. VARRONIS.

locus crassus, plus, si macer, minus. quare obseruabis, quantum in ea regione cōsuetudo est ferendi, ut tantum facias, quantum ualeat regio, ac genus terræ, ut ex eodem semine alibi, cum decimo redeat, alibi cum quintodecimo, ut in Hetruria, et locis aliquot in Italia. In Sybaritano dicunt etiam cum centesimo redire solitum, in Syria ad Garada, & in Africa ad byrachium. itē ex medio nasci centum. Illud quoq; multum interest in rudi terra, an in ea seras, q̄ quotānis obsita sit, quæ uocatur restibilis, an in ueruacto, quæ interdum requierit. Cui Agrius. In Olynthia quotannis restibilia esse dicunt, sed ita ut tertio quoq; anno uberiores ferāt fructus. Licius. Agrū alternis ānis relinq̄ oportet, aut paulo leuioribus sationibus ferere. i. quæ minus fugunt terram.

De nutritionibus gradus tertius, & quæ sata quoto quoq; die prodeant de terra.

Cap. XLIX.

DICETVR inquit Agrius de tertio gradu, de nutritionibus, atq; alimonijs eorū. Licius. Quæ nata sunt inquit, in fundo alescunt, adulta concipiunt, prægnātia cum sunt, matura pariunt poma, aut spicam, sic alia simile ei, à quo profectum est, reddunt semen. Itaq; si florem, acerbumue pyrum, aliudue quid decerpseris, in eodem loco, eodem anno, nihil renascitur, quod prægnationis diem idem bis habere non potest, ut enim mulieres habent ad partum dies certos, sic arbores, ac fruges. Primum plerūq; è terra exit ordinem diebus septem, nec multo post triticum. Legumina ferè quatrinduo, aut quinque diebus, præterquam faba, ea enim serius aliquanto prodit seges. Ostendit idem milium, et sesima, & cetera similiter æquis ferè diebus, præterquam siquid regio, aut tempestas uitij attulit, quo minus ita fiat. Quæ in seminario nata, si loca erunt frigidiora, quæ molli natura sunt per brumalia tempora tegere oportet fronde, aut stramentis, si erunt imbres secuti, uidendū necubi aqua consistat, uenenum. n. gelu radiabus tenellis sub terra, & supra, uirgulta, nec eodem tpe æque crescunt, nā radices autumnō, aut hyeme magis sub terra, q̄ supra alescunt, quod tectæ terræ tepore propagantur, supra terram aere frigidiorerungunt, idq; ita esse docent syluestria, ad quæ sator non accessit, nā prius radices, q̄ ijs ex quæ solent nasci, crescunt, neq; radices longius procedunt, nisi quo tpe uenit sol,

his duplex cā, quod & radicū materiam aliam, q̄ aliam lōgius
proyat natura, & quod alia terra, alia facilius viam dat.

Ex qbus folijs cognosci pōt solstitiū æstiuū confectū eē. Cap. L.

PROPTER eiusmodi res admiranda discrimina sunt nat-
uralia, quod ex quibusdam folijs ppter eorum uersuram, quod
sit anni tempus, diā possit, ut olea, & populus alba, et salix. Ho-
rum enim folia, cum conuerterunt se, solstitium dicitur fuisse, nec
minus admirandum, quod sit in floribus, quos uocant heliotro-
pia, ab eo quod solis ortum mane spectant. & eius iter ita sequū-
tur ad occasum, ut ad eum semper spectent.

Quemadmodum sata sint tuenda.

Cap. LI.

IN SEMINARIO quæ surculis confita, & eorū mollio-
ra erūt natura cacumina, ut olea, ac ficus. Ea summa itegēda bi-
nis tabellis dextra, ac sinistra deligatis, herbæq; elidēdæ, et dū te-
neræ sunt uellēdæ, nā aridæ factæ rixantur, ac celerius rūpuntur
q̄ sequuntur. Contra herba in pratis ad spem fœnificiæ nata, nō
modo non euellenda in nutritu, sed et non calcanda. Quin et
pecus à prato ablegandum, & omne iumentū, ac etiā homines,
solum. n. hominis exitium herbæ, & semitæ fundamentum.

Quæ in spica sunt uocabula, & causæ eorum.

Cap. LII.

IN SEGETIBUS autem, frumentū, quo culmus extulit Spi-
cam, ea, quæ mutica nō est, in ordeo, & tritico tria habet cōtinē-
tia. Granum, glumam, aristam, & etiam primitus spica cum ori-
tur uaginam. Granum dictum, quod est intimum solidum. Glu-
ma, qui est folliculus eius. Arista, quæ ut acustenuis longa emi-
net è gluma. Proinde ut granitheca sit gluma, & apex arista.
Arista, & granum omnibus ferè notum, gluma paucis, itaq; id
apud Ennium solum scriptum scio esse in euhemeri libris uersis,
uidetur uocabulum etymon habere à glubendo, quod eo follicu-
lo deglubitur granum. Itaq; eodem uocabulo appellāt fia eius,
quam edimus, folliculum. Arista dicta, quod arescit prima, gra-
num à gerendo, id enim feritur, uti spica gerat frumentum, non
ut glumam, aut aristam gerat, ut uitis feritur, non ut pampinū
ferat, sed uiam. Spica autem, quam rustici, ut acceperunt anti-
quitus, uocant spicam, & à spe uidetur nominata, eam enim

M. VARRONIS.

quod sperant fore serunt. Spica mutica dicitur, quæ nō habet aristam, Aristæ enim quasi cornua sunt spicarum, quæ primitus cū oriuntur, neq; planè apparent, quæ sublatent herba, ea uocatur uagina, ut in qua latet conditus gladius. Illud autē summa in spica iam matura, quod est minus, q̄ granum uocatur frit, quod in infima spica ad culmum stramenti sumum. item minus quàm granum est, appellatur urrunum.

De legēdis fructibus gradus quartus, & fœnificatio, & siliatione pratorum.

Ca. LIII.

VERVM cum de nutritu conticuisset Lianius, nec interrogaretur, credens nihil desiderari, dic inquit Agrius de fructibus maturis capiendis. Et ille. Primum de pratis summissis, cum herba crescere desiit, & aestibus arescit, subsecari falibus debet, & quoad perarescat, furillis uersari, cum paruit, de ea manipulos fieri, ac uehi ad uillam, tum de pratis stipulam rastellis eradi, atque addere fœnificæ cumulum. Quo factō silienda prata, id est falibus confectāda, quæ fœnificæ præterierunt, ac quasi tuberosum reliquerunt campum. A qua sectione arbitror dictū siliare pratum.

De messe & quare messis sit appellata, & alijs nonnullis uocabulis.

Cap. LIIII.

MESSIS proprio nomine dicitur in ijs, quæ metuntur, maxime in frumento, & ab eo esse uocabulo declinata. Frumenti tria genera sunt messionis. unum, ut in Umbria, ubi falce secundum terram succidunt stramentum, & manipulum, ut quæq; subsecuerint, ponunt in terra, ubi multos eos fecerunt, iterum eos percensent, ac de singulis secant inter spicas, & stramentum, spicas coniungunt in corbem, atq; in aream mittunt. Stramenta relinquunt in segete, unde tollātur in aceruum. Altero modo metūt, ut in Piceno, ubi ligneum habent incuruum bacillum, in quo sit extremo ferrula ferrea. Hæc cum comprehendit fascem spicarum defecat, & stramenta stantia in segete relinquit, ut postea subsecantur. Tertio modo metitur, ut sub urbe Roma, & locis plerisq; ut stramentum medium subsecant, quod manu sinistra summum prehendunt, à quo medio messem dictam puto. Infra manū stramentum, quod terræ heret, postea subsecatur. Contra, quod cum

spica stramentum heret, corbibus in areā deferitur, ibi discedit in apto loco palam, à q̄ nominata pōt esse palea. Alij stramentum à stando, ut stramen dictum putant. Alij ab stratu, quod id substernatur pecori. Cum est matura seges, metendum, cum in ea iugerum ferè una opera, propemodum in facili agro satis esse dicitur, ut messas spicas in aream corbibus deferre debeant.

Aream qualem esse oporteat.

Cap. LV.

A R E A M esse oportet in agro, sublimiori loco, quam perflare possit uentus. Hanc esse modicam pro magnitudine segetis, potissimum rotundam, et mediam paulo extumidam (ut si pluerit, non consistat aqua, & quambrenissimo itinere extra aream defluere possit. Omne porro breuissimum in rotundo è medio ad extremam) solida terra pauita, maxime si est argillosa, ne aestu rimosa, in rimis eius grana oblitescant, & recipiant aquam, & ostia aperiant muribus, & formicis. Itaq; amurca perfundere solent, ea enim herbarum est inimica, & formicarum, & talparum uenenum. Quidam aream ut habeant solidam, muniunt lapide, aut etiam faciunt pavementum. Nonnulli etiam tegunt areas, ut in Bagiennis, quod ibi sæpe id temporis anni oriuntur nimbi, ubi ea resecta, & loca calida propè aream faciendum, umbracula, quò succedant homines in aestu tempore meridiano.

In semen quemadmodum spicas secerni oporteat, & de tritura & stipula.

Cap. LVI.

Q V A E Seges grandissima, atq; optima fuerit, seorsum in aream secerni oportet spicas, ut semen optimum habeat. E spicas in aream excuti grana, quod fit apud alios iumentis iunctis, ac tribulo, id fit è tabula lapidibus, aut ferro exasperata, quo imposito auriga, aut pōdere grandi trahitur iumentis iunctis, ut discatiat è spica grana, aut ex assibus dentatis cum orbiculis, quod uocant plostellum pœnicum. In eo quis sedet, ut agitet, quæ trahant iumenta, ut in Hispania citeriore, & alijs locis faciunt. Apud alios exteritur grege iumentorum inactō, & ibi agitato perticis, quod ungulis è spica exterunt grana, his tritis, oportet è terra subiacuari uallis, aut uentilabris, cum uentus spirat lenis, ita fit, ut quod leuissimū est in eo, atq; appellat acus, euannat foras extra aream, ac frumentū, quod est pōderosum, purū ueniat.

M. VARRONIS.

ad corbem messi facta, speciegium uenire oportet, aut domi legere stipulam, aut si sunt spicæ raræ, & operæ raræ, compasci. Summa .n. spectanda, ne in ea re sumptus fructum superet.

De uindemia facienda.

Cap. LVII.

IN VINETIS uua cum erit matura, uindemiam ita fieri oportet, ut uideas à quo genere uuarum, & à quo loco uineti incipias legere, nam & præcox, & misella, quam uocant nigrâ, multo ante coquitur, quo prior legenda, & quæ pars arbusi, ac uineæ magis aprica prius debet descendere de uite. In uindemia diligentius uua non solum legitur ad bibendum, sed eligitur ad edendum. Itaq; lectius deferitur in forum uinariū, unde in dolium inane ueniat, electa in secretam corbulam, unde in ollulas addatur, & in dolia plena uinaceorum contrudatur, alia, quæ in pisanam in Amphoram picatam descendat, alia, quæ in aram, ut in carnarium ascendat. Quæ calcatæ uuæ erunt, earū scopi cum folliculis subiiciendi sub prælum, ut siquid reliqui habeant musti, exprimatur in eundem lacum. Cum desijt sub prælo fluere, quidam circumcidunt extrema, & rursus premunt, & rursus, cum expressum, circumasitum appellant, ac seorsum, quod expressum est, seruant, quod resipit ferrum, expressi acinorum folliculi in dolia coniunguntur, eoq; aqua additur, ea uocatur lora, qd̄ lota acina, ac pro uino operarijs datur hyeme.

De olea legenda.

Cap. LVIII.

DE Oliueto, oleam, quam manu tangere possis è terra, aut scalis, legere oportet potius, q̄ quatere, quod ea, quæ uapulauit, inarescit, nec dat tm̄ olei, quæ manu stricta, melior, ea, quæ digitis nudis laudabilior, q̄ illa, quæ cū digitalibus. Duriciæ .n. eorum nō solum stringit baccam, sed & ramos glubit, ac relinqt ad gelidum reiectos, quæ manu tãgi nō poterunt, ita quati debent, ut arundine potius, q̄ pertica feriantur. Grauior enim plaga, medicum querit. Qui quatiet, ne aduersam cedat, sepe .n. ita percussa olea secū defert de ramulo ptem, quo facto, fructū amittūt posteri anni, ut hæc nō minima cā, quod oliueta dicant̄ alternis ānis nō ferre fructus, aut nō æque magnos. Olea ut uua p idē biuium redit in uillam, alia ad sibiū eligitur, alia ut eliquescat, ac non

solum corpus intus ungar, sed etiam extrinsecus. Itaq; dominū & ad balneas, & ad gymnasium sequitur. Hæc, de qua fit oleum, congeri solet acernatim per dies singulos in tabulata, uti ibi mediocriter fracescat, ac primus quisq; ærneus demittatur per serias, ac uasa olearia ad trapeta, in quæ eam terent molæ olearia è duro, & aspero lapide. Olea lecta si nimium diu fuerit in ærneis calore fracescat, & oleum foetidum fit, itaq; si nequeas mature conficere, in ærneis iactando uentilare oportet. Ex olea fructus duplex. Oleum quod omnibus notum, & amurca, cuius utilitatem, q̄ ignorant pleriq; licet uidere è torculis olearijs fluere in agros, ac non solum denigrare terram, sed multitudine facere sterilem, cum is humor modicus, cū ad multas res, tū ad agriculturam pertineat uehementer, quod circum arborū radices infundi solet, maxime ad oleā, & ubicunq; in agro herba nocet.

De condendis fructibus gradus quintus, & primum de fœno cōdendo. Cap. LIX.

AGRIUS iandudum inquit in uilla sedens expecto cum clauis te Stolo, dum fructus in uillam referas. Ille, n̄ quin adsum, uenio inquit ad limen, fores aperi. primum fœnificiæ conduntur melius sub tecto, q̄ in ærneis, quod ita fit incandius pabulum, ex eo intelligitur, quod pecus utroq; posito libentius est.

De tritico condendo.

Cap. LX.

AT TRITICVM condi oportet in granaria sublimia, quæ perslentur uento ab exortu, ac septētrionum regione, ad quæ nulla aura humida è propinquis locis aspiret, parietes & solum opere tectorio marmorato loricadi, si minus ex argilla misto acere è frumento, & amurca, quod murem, et uermem non patitur esse, et grana facit solidiora, & firmitiora, quidam ipsum triticū conspergunt. cū addant arāter in. M. modiū quadrantal amurcæ. Item alius aliud aspiat, aut aspergit, ut chalcidicam, aut caricam, cretam, aut absynthium, absynthiue decoctum. Item huius generis, alia. Quidam granaria habent sub terris, uti spelūcas, quas uocant syros, ut in Cappadocia, ac Thracia, alij, ut in Hispania citeriore, puteos, ut in agro Carthaginensi, & oscensensi. Horum solum paleis substernūt, & curant, ne humor, aut aer tāgere possit, nisi cum promitur ad usum, quo enim spiritus non

M. VARRONIS.

peruenit, ibi non oritur circulio. Sic conditum triticum ma-
net uel annos quinquaginta, millium uero plus annos centum.
granaria supra terram in agro quidam sublimia faciunt, ut in
Hispania citeriore, & in Apulia, ita ut non solum à lateribus p
fenestras, sed etiam subtus à solo uentus regirare possit.

De faba & leguminibus & uuis condendis.

Cap. LXI.

FABA, & legumina in olearijs uasis oblita cinere per diu in
columnia seruantur. Cato ait, uiam amineam minusculam, &
maiores, & apiciam in ollis commodissime condi, eadem in sa-
pa, & musto recte, quas suspendas opportunissimas eē duracinas,
& amineas, & scantianas.

De pomis condendis.

Cap. LXII.

CONDITIVA mala struthea, cotonea, scātiana, grinia-
na, orbiculata, & quæ antea muste a uocabf, nūc melimela ap-
pellant. Hæc oīa in loco arido, & frigido supra paleas posita ser-
uari recte putāt. Et iō oporothecas q faciunt ad aquilonem, ut fe-
nestras habeāt, atq; ut eæ perslent curant, neq; tñ sine foriculis,
ne cum humorē amiserint, pertinaci uento uietæ fiant. Ideoq; in
ijs, cameras marmurato, & parietes, pauimenta q; laudabiliter
faciunt, quo frigidior locus sit, in quo qdā ē tricliniū sternere so-
lent cœnandi cā. Etenim in, quibus luxuria concesserit, ut in pi-
nacothecæ faciant, quod spectaculum dat ab arte, cur non quod
natura datū utāt in uenustate disposita pomor? p̄sertim, cū id
non sit faciendum, quod qdam fecerunt, ut Romæ coempta po-
ma rus intulerint in oporothecæ instruendā conuiuij cā. In opo-
rothece mala manere putant satis commode, alij in tabulis, ut in
opere marmurato, alij substrata palea, uel ēt floccis. Mala puni-
ca demissis suis furculis in dolio arenæ. Mala cotonea, struthea
in pensilibus iūctis. Cōtra in sapa cōdita manere pyra antiana,
et semētina. Sorba qdā dissecta, et in sole macerata, ut pyra, &
sorba p se ubicūq; sint posita in arido facile durare. Seruare ra-
pa cōsecta in sinape, nuces inglādes in arena, punica mala et in
arena iā decerpta, ac matura, ut dixi, et ēt imatura cū hærent in
sua uirga, si demiseris in ollā sine fundo, eāq; si cōiecēris in terrā,
et obteres arcū ramū, sic ne extrinsecus spiritus afflet, ea non mō
integra eximi, sed ēt maiora, q̄ in arbore unquam pependerit.

OLEAS esui optime condi scribit Cato orchites, & pauseas aridas uel uirides in muria, uel in lentisco contusas. Orchites nisi gras sale si sunt confricatae dies quinque, & tum sale excusso, biduum si in sole posita fuerint, manere idoneas solere, easdem sine sale in defrutum condire.

De amurca condenda.

Cap. LXIII.

RECTE amurcā periti agricolae tam in ollis condunt, quā oleum, aut uinum. Eius cōditio, cū expressa olea, quod statim effluerit de ea, decoquuntur duae partes, ac refrigeratum conditur in uasa. Sunt itē aliae conditiones, ut ea, in qua adiungunt mustum.

De promendis fructibus gradus sextus.

Cap. LXV.

QVOD nemo condit fructus, nisi ut promat, de eo quoque uel sexto gradu animaduertenda pauca. Promūt cōdita aut propterea quod sunt tuenda, aut quod utenda, aut quod uendenda. Ea, quae dissimilia sunt inter se, aliud alio tempore tuendum, et utendū.

De promendo frumento tuendi causa.

Cap. LXVI.

TUENDI causa promendum id frumentum, quod circuliones exesse incipiunt, id enim cum proptū est in sole ponere oportet aquae catinos, quod eō conueniunt, ut ipsi se necent, circuliones. Sub terra quae habent frumentū in ijs, quos uocāt syros, quo cū periculo introitur recenti aptione, ita ut quibusdā sit interclusa aīa, aliquanto post promere, quā aperuerint, oportet. Far, quod in spiciis condideris per messē, & ad usus cibatus expedire uelis, promendum hyeme, ut in pistrino pinsatur, ac torreatur.

De amurca tuenda & promenda.

Cap. LXVII.

AMURCA cum ex olea est expressa, quā est humor aquatilis, ac retrimentum conditū in uas fictile, id quidā sic solent tueri, diebus. XV. ex eo, quod est leuissimum, ac summū depletur, ut traiciant in alia uasa, & hoc ijsdem interuallis duodecies. In sex mēsis proximis id faciunt. Cum id nouissime faciunt potissimum traiciant, cum senesat luna, tunc decoquunt in abenis leui igne duas partes quoad regerunt, tum denique ad usum recte promitur.

QUOD mustum conditur in dolium, ut habeamus uinum, non promendum, dum feruet, neq; etiam cum processit, nisi prius sit uinum factum. Si uetus bibere uelis, quod non fit ante quam accesserit annus, tum, cum fuerit anniculum, promito. Si uero est ex eo genere uuae, quae dum maturescit, coalescat, ante uindemiam consumi, aut uenire oportet. Genera sunt uini, in quo falerna, quae quanto plures annos condita habuerunt, tanto, cum prompta sunt, fructuosiora.

De olea promenda.

Cap. LXIX.

OLEAS albas, quas condideris nouas, sic celeriter pomas, nisi condieris, propter amaritudinem respuit palatum. Item nigras, nisi prius eas sale maceraris, ut libenter in os recipiantur.

De nuce & palmula & fici sabina promendis. Cap. LXX.

NUCEM inglandem, & palmulam, & ficum sabinam quanto citius pomas, iucundiore utare, quod uetustate ficus fit pallidior, palmula cariosior, nux aridior.

De uuis & malis & sorbis pensilibus promendis. Cap. LXXI.

PENSILIA, ut uuae, mala, & sorba, ipsa ostendunt, quando ad usum oporteat promi, quod colore mutato, & contractu acinorum, si non demiseris ad edendum, ad abijciendum descensura se minitantur. Sorbum maturum mite conditum citius promi oportet. Acerbum enim suspensum lentius mitescit. Quod prius domi maturitatem assequi uult, quam nequit in arbore, ut inde promatur ad escam.

De farre promendo.

Cap. LXXII.

MESSVM far promendum hyeme in pistrino ad torredum, quod ad cibarium expeditum esse uelis. Quod ad sationem tum promendum cum se getes maturae sunt ad accipiendum. Item quae pertinent ad sationem suo quoque tempore promenda. Quae uendenda, uidendum, quae quoque tempore oporteat promi. Alia, n. quo manere non possunt, ante quam se commutent, ut celeriter promas, ac uendas, alia quae seruari possunt, ut tum uendas, cum caritas est

ritas est. Sæpe enim diutius seruata non modo usuram adiungit, sed etiam fructum duplicant, si tempore promas. Cum hæc diceret Stolo, uenit libertus æditumi ad nos flens, et rogat, ut ignoscamus, quod sumus retenti, et ut ei in funus postridie prodeamus. Omnes consurgimus, ac simul exclamamus, quid in funus? quod funus? quid est factum? Ille flens narrat, ab nescio quo percussim cultello concidisse, quem qui esset, animaduertere in turba non potuisse, sed tantummodo exaudisse uocem, perperam fecisse. Ipse, cum patronum domum sustulisset, et pueros dimisisset, ut medicum requirerent, ac mature adduceret, quod potius illud administrasset, quam ad nos uenisset, æquum esse sibi ignosci. Nec si eum seruare non potuisset, quoniam non multo post animam efflaret, tamen putare se fecisse recte. Id nos moleste ferentes descendimus de æde, et de casu humano magis querentes, quam admirantes id Romæ factum, discedimus omnes.

M. T E R E N T I I V A R R O N I S
D E R E R V S T I C A A D
N I C R V M T V R A N
N I V M. L I B. I I.

IRI MAGNI NOSTRI MA-
iores non sine causa præponebant rusticos ro-
manos urbanis, ut ruri enim, qui in uilla ui-
uunt ignauiores, quam qui in agro uersantur in
aliquo opere faciundo, sic qui in oppido seder-
ent, quam qui rura colerent, desidiosiores puta-
bant. Itaque ænum ita diuiserunt, ut nonis mo-

do diebus urbanas res usurparent, reliquis. ut rura colerent.
Quod dum seruauerunt institutum, utrumque consecuti sunt, ut et
cultura agros fecundissimos haberent, et ipsi ualitudine firmio-
res essent, ac ne grecorum urbana desiderarent gymnasia, quæ
nunc uix satis singula sunt, nec putant se habere uillam, nisi mul-
tis uocabulis retineant grecis, quin uocent particulatim loca προ-
κοιτωνα, τελαρις αμ, εταροδ' υτ ηγειον, τεγειςυλον οβριθωνα, ποδσε-
ρεωνα ο' τεωροθικην. Igitur quod nunc intra murum ferè patres
familie correpserunt relictis falce, et aratro, et manus mouere
maluerunt in theatro, ac circo, quam in segetibus, ac uinctis fumen-
tum locamus, qui nobis aduehat, qui saturi fiamus, ex Africa,

Varro.

g

M. VARRONIS.

& Sardinia, & nauibus uindemiā condimus ex insula Coa, et Chia. Itaq; in qua terra culturam agri docuerunt pastores progeniem suā, qui condiderunt urbem, ibi contra progenies eorū, propter auaritiam contra leges, ex segetibus fecit prata, ignorātes non idem esse agriculturam, & pastionem, alius. n. opilio, et arator, nec si possit in agro pasci armentarius, non aliud ac bubulus. Armentū. n. id, quod in agro natum non creat, sed tollit dentibus. Contra, bos domitus cā fit, ut cōmodius nascatur frumentum in segete, & pabulum in nouali. Alia inquam ratio, ac scientia coloni, alia pastoris. Coloni, ut ea, quae in agricultura nascant, è terra fructum faciant. Contra, pastoris ut ea, quae nata ex pecore. Quare, qm̄ inter se societas magna, propterea qd̄ pabulū in fundo cōpascere, q̄ uendere plerūq; magis expedit domino fundi, & stercoratio ad fructus terrestres aptissima est, maxime si ad id pecus sit appositū, qui habet p̄diū, habere utrāq; debet disciplinā & agriculturæ, & pecoris pascendi, & et uillatice pastionis, ex ea. n. quoq; fructus tolli possunt non mediocres ex ornithonibus, ac leporarijs, et piscinis. E quis qm̄ de agricultura librū Fundaniæ uxori propter eius fundum feci, tibi Niger Turāni noster, q̄ uehemēter delectaris pecore, propterea quod te empturientē in campos macros ad mercatū adducūt crebro pedes, quo facilius sumptibus multa poscentibus ministres, quod eo facilius faciā, qd̄ et ipse pecuarias habui grādes, in Apulia ouarias, et i Reatino equarias. Qua de re pecuaria breuiter, ac summatim percurrā, ex sermonibus nostris collatis cum ijs, qui pecuarias habuerunt in Epiro magnas, tū cū pyratice bello inter Delum, & Sialiā Græciæ classibus præessem, incipiam hinc.

De origine rei pecuariæ.

Cap. I.

C V M Menates discessisset, Cossinius mihi, ignoscere non dimitemus inquit, ante q̄ tria illa explicaris, quæ cœperas nuper dicere, cum sumus interpellati. Quæ tria inquit Murius? An ea, quæ mihi heri dixisti de pastoria re? Ista inquit ille, quæ cœperat hic differere, quæ esset origo, quæ dignitas, quæ ars, cum Petam. festum uisere uenissemus, ni mediū aduentus nos interrupisset. Ego uero inquam diu dūtaxat, quod est ἵσος ἡ δὲ, de duabus rebus primis, quæ accepi de origine, ac dignitate. De tertia parte, ubi est de arte, Scrofa suscipiet.

ὅς τ' ἐρμου πολλὸν ἀμείνων,

Vt semigræis pastoribus dicam græcæ. Nam is magister est Lualli Hipri generi tui, cuius nobiles pecuariæ in brutijs habentur. Sed hæc à nobis ita accipietis inquit Scrofa, ut nos, qui estis epirotiā *bietate remine reminiscæ. Hæc, quæ scitis, proferatis in mediū. Nemo enim omnia potest scire. Cum accepissem conditionem, ut meæ partes essent primæ, nō quo non ego pecuarias in Italia habeam, sed nō omnes, qui habent aitharā, sunt aitharædi. Igitur inquam & homines, & pecudes cum semper fuisse sit necesse, natura (sive enim aliquod fuit principium generandi animalium, ut putavit Thales Milesius, & Zeno Cytheius, sive contra, principium horum extitit nullum, ut credidit Pythagoras Samius, et Aristoteles Stagiritæ) necesse est humanæ vitæ à summa memoria gradatim descendisse ad hanc ætatē, ut scribit Dicæarchus, & summum gradum fuisse naturalem, cum uiuerent homines ex ijs rebus, quæ inuiolata ultro ferret terra, ex hac uita in secundā descendisse pastoritiā è feris, atq; agrestibus, ut ex arboribus, ac uirgultis decerpendo glandem, arbutum, mora, pomaq; colligerent ad usum, sic ex animalibus, cum propter eandem utilitatem quæ possent syluestria deprehenderent, ac concluderent, & mansuescerent. In quis primū non sine causa putant oues assumptas, & propter utilitatem, et propter placiditatem, maxime. n. hæc natura quietæ, & aptissimæ ad uitam hominum. Ad cibum enim lacte, & caseum adhibitum, ad corpus uestitum, & pelles attulerunt. Tertio deniq; gradu à uita pastorali ad agriculturā descenderunt. In qua ex duobus gradibus superioribus retinuerunt multa, & quō descenderāt, ibi præsserunt longe, dū annus pueniret. Etiā nūc in locis multis genera pecudū ferarū sunt aliquot, ut in Phrygia ex ouibus, ubi greges uidetur complures, ut in Samothracæ caprarum, quas latine rotas appellāt. Sunt etiā in Italia circum Fiscelium, & Tetricam montes multæ. De suis bus nemini ignotum, nisi qui apros non putant sues uocari. Boues perferi et nunc sunt multi in Dardania, & Media, & Thracia. Asini feri in Phrygia, & Lichaonia. Equi feri in Hispaniæ anterioris regionibus aliquot.

De dignitate rei pecuariæ.

Cap. II.

OR I go, quā dixi, et dignitas, quā dicā, de atiqs illustrissimus

g 4

M. VARRONIS.

quisq; pastor erat, ut ostendit græca, & latina lingua, & ueteres poetae, q; alios uocant πολυαρνας, alios πολυμηλους, alios πολυβουτας, q; ipsas pecudes pp caritatē aureas habuisse pelles tradiderunt, ut Argis Atreus, quam sibi Thyesten subduxisse qritur, ut in Colchide Oeta, ad cuius arietis pellem pfecti regio genere dicuntur argonantes, ut in Libya ad hesperidas, unde aurea mala, idest secundum antiquam consuetudinem capras, & oues, quas Hercules ex Africa in Græciam exportauit. Ea enim sua uoce græci appellantur μῆλα. Nec multo secus nostri ab eadem uoce, sed ab alia littera bela uocarunt. Non enim me, sed bee sonare uidentur oues uocem efferentes, à quo post belare dicunt, extrita è littera, ut fit i multis. Quod si apud antiquos nō magnæ dignitatis pecus esset, in cœlo describendo astrologi nō appellassent eorum uocabulis signa, quæ non modo non dubitarunt ponere, sed etiam ab his principibus. XII. signa multi numerant, ut ab ariete, & tauro, cum ea præponerent Apollini, et Herculi, hi. n. dij ea sequuntur, & appellantur Gemini. Nec satis putarunt de XII. signis sextam partem obtinere pecudum nomina, nisi adieissent, ut quartam tenerent, capricornum. Præterea à pecuarijs addiderunt capram, hœdos, canes. An non etiam item in mari, terraq; ab his regionum notæ? à pecore in mari, quod nominauerunt à capris, ægeum pelagus, ad Syriam montem Taurum, in Sabinis Canterium montem. Bosphorum unum Thracium, alterum Cimerium? Nonne in terris multa, ut oppidum in Græcia ἱπποκρήνη. Deniq; Italia à uitulis, ut scribit Piso. Romanorū uero populum à pastoribus esse ortum quis non dicit? quis Faustulum nesat pastorem fuisse nutrium? qui Romulum, et Remū educauit, non ipsos quoq; fuisse pastores obtinebit, quod parilibus potissimum condidere urbem? non idem, quod multa etiā nunc ex uetere instituto bubus, & ouibus dicitur. Et quod æs antiquissimum, quod conflatum pecore, pecore est notatum. Et qd̄ urbs cū condita est, tauro, et uacca, q; essent muri, et portæ definitum. Et qd̄ Po. Ro. cum lustratur, solitaurilibus circumaguntur uerres, aries, taurus. Et quod nomina multa habemus ab utroq; pecore, à maiore, & à minore. A minore, Porcius, Quinius, Capilius, sic à maiore Equitius, Taurius, cognomina adsignificari, quod dicuntur Anni capræ. Statili Tauri, Pomponij, Vituli. Sic à pecudibus alij multi.

RELIQVVM est de scientia pastoralis, de qua est dicendum, quod Scrofa noster, cui hæc ætas defert rerum rusticarum omnium palmam, quo melius potest dici, cum conuertissent in eum ora omnes. Scrofa igitur inquit, est scientia pecoris parandi, ac pascendi, ut fructus qui possunt maximi capiantur ex ea, à quibus ipsa pecunia nominata est, nam omnis pecunie, pecus fundamentum. Ea partes habet novem discretas ternas, ut sit una de minoribus pecudibus. Cuius genera tria, ovis, capra, sus. Altera de maiori pecore, in quo sunt item aliæ tres species natura discretæ, boves, asini, equi. Tertia pars est in pecuaria, quæ non paratur, ut ex ijs capiatur fructus, sed propter eam aut ex ea sint ut muli, canes, pastores. Harum unaquæque in se generales partes habet novenas, quarum in pecore parando necessariæ quatuor, alteræ in pascendo totidem. præterea communis una. Ita fiunt omnes partes minimum octoginta, et una, et quidem necessariæ, nec parvæ. Primum, ut bonum pares pecus, unum scire oportet, quæ ætate quaque pecudem parare, habereque. Itaque in bubulo pecore minoris emitis anniculam et supra decem annorum, quod à bima, aut trima fructum ferre incipit, neque longius post decimum annum procedit. Nam prima ætas omnis pecoris, et extrema, sterilis. Et quatuor altera pars, est cognitio formæ uniuscuiusque pecudis qualis sit. Magni enim interest, cuiusmodi quæque sit ad fructum. Ita potius bovem emunt cornibus nigrantibus, quam albis, capram amplam, quam parvam, sues proceros corpore, capitibus ut sint parvis. Tertia pars est, quo sint seminio querendum. Hoc enim nomine asini arcadia in Græcia nobilitati, in Italia reatini, usque eo ut mea memoria asinus venierit sextertijs millibus LX. et unæ quadrigæ Romæ constiterint quadringentis millibus. Quarta pars est de iure in parando, quemadmodum quaque pecudem emi oporteat civili iure. Quod enim alterius fuit, id ut fiat meum, necesse est aliquid intercedere. Neque in omnibus satis est stipulatio, aut solutio numerorum ad mutationem dominij. In emptione alias stipulandum statim esse valetudinario, alias è sano pecore, alias è neutro.

M. VARRONIS.

ALTERAE partes quatuor sunt, cum iam emeris, obseruanda, de pasciōe, de foetura, de nutritu, de sanitate. Pascendi primus locus qui est, eius ratio triplex. In qua regione quanq; potissimum pascas, & quando. E quis, ut capras in montosis potius locis, & fructibus, q̄ in herbidis campis, equas contra. Neq; eadē loca aestiua, & hyberna idonea omnibus ad pascendum. Itaque greges omnium longe abiguntur ex Apulia in Samnium aestiuatū atq; ad publicanum profitetur, ne, si inscriptum pecus pauperint, lege censoria committant mulietos, & à campestri, etate exiguntur in Gurgures altos montes. Qui potissimum quaeq; pecudum pascatur habenda ratio, nec solum qđ foeno satuta sit equa, aut bos, cū sues hoc uitent, & q̄rant glandem, sed quod ordeum, & faba interdū sit quibusdā obiciendum, & dandum bubus lupinū, & lactarijs medica, et cytisum. Præterea qđ ante admissurā diebus. XXX. arietibus, ac tauris dat plus cibi, ut uires habeant, foeminis bubus demit, qđ mæscētes melius cōripe dicunt.

De foetura, & primum de admissione.

Cap. V.

SECUNDA pars est de foetura. Nūc appello foeturam à cōceptu ad partum, hi enim prægationis primi, & extremi fines. Quare primum uidendum de admissione, quo quaeq; tempore ut ineant facere oporteat. Nam, ut suillo pecori à fauonio ad æq̄ noctiū uernū putant aptū, sic ouili ab arcturi occasu usq; ad æq̄le occasum. Præterea habenda ratio quanto ante q̄ incipiat admissura fieri, mares à foeminis secreta habeant, quod ferè in omnibus binis mensibus ante faciunt & armentarij, & opiliones. Altera pars est in foetura, quæ sint obseruanda, quod alia alio tempore parere solet. Equa enim uentrem fert. XII. menses, uacca decem, ouis, & capra quinq; sus quatuor. In foetura res incredibilis est in Hispania, sed est uera, quod in Lusitania ad oceanum in ea regiōe, ubi est oppidum Olisippo monte Tagro, quædam è ueto certo tempore conapiunt equæ, ut hic galline quoq; solent, quarum oua hippenemia appellant. Sed ex his equis, qui nati pulli non plus triennium uiuunt. Quæ nata sunt matura, & chorda, ut pure, & molliter stent, uidendum, & ne obterantur. Dicuntur agni chordi, q̄ post tps nascuntur, & remanserūt in uoluis intimis, q̄ græci uocāt χορίον, à quo chordi appellati.

De nutritu.

Cap. VI.

TERTIA res est de nutritu qd observari oporteat, in quo quot diebus matris sugant mammam, & id quo tempore, et ubi & si parum habet lactis mater, ut subiiciat sub alterius mammā, qui appellantur subrumi, idest sub mamma, antiquo enim vocabulo mamma rumis, ut opinor. Ferè ad quatuor menses à māmā non disiunguntur agni, hœdi tres, porci duos, è quis, quoniā pueri sunt ad sacrificium, ut immolentur, olim appellati sacres, quos appellat Plautus cum ait. *Quanti sunt porci sacres? sic boues altilis, ad sacrificia publica saginati dicuntur opimi.*

De sanitate.

Cap. VII.

QUARTA pars est de sanitate, res multiplex, ac necessaria qd morbosum pecus, & vitiosum, & qñ non valet, sæpe magna gregem afficit calamitate. Cuius scientiæ genera duo, unum ut in hominem, ad quē adhibendi medici, alterum, quo ipse etiam pastor diligēs mederi possit. Eius partes sunt tres, nā animaduertendum, quæ cuiusq; morbi sint causæ, quæq; signa earū causarū sint, & quæ quenq; morbum ratio curadi sequi debeat. Ferè morborū causæ erunt, quod laborant propter æstus, aut propter frigora, nec non èt propter nimium laborem, aut contra, propter nullam exercitationē, aut si cum exercueris, statim sine intervallo cibum, aut potionem dederis. Signa aut sunt, ut eorū, qui siue ex æstu, siue è labore febrē habent, ad apertum os humido spiritu crebro, & corpore calido. Curatio aut, cū hic est morbus, hæc, psumitur aqua, & pungitur oleo, & uino tepesacto, & itē cibo sustinetur, & inijciatur aliqd, ne frigus cedat, sitienti aqua tepida datur. Si hoc genus rebus non proficit, dimittit sanguis maxime è capite. Item ad alios morbos aliæ causæ, èt alia signa in omni pecore, quæ scripta hñe oportet magistrū pecoris. Relinquit nonū, quod dixi de numero utriusq; partis cōe. Nam & q parat pecus, necesse est constituat numerū. Quot greges, & qto sit pasturus, ne aut saltus desint, aut supersint, & iō fructus dispereant. Præterea scire oportet in grege quot fœminas habeat, q parere possint quot arietes, quot utriusq; gñis soboles, quot reijculæ sint alienæ. In alimonijs si sint plures nati, ut qdā faciunt, sequēdum, ut quosdam subducas, quæ res facere solet, ut reliq melius crescant.

M. VARRONIS.

An nouenae partes exeant extra pecoris minoris ac maioris nomen.

Cap. VIII.

VIDE inquit Atticus, ne te numerus fallat, et ne nouenae istae partes non exeant extra pecoris minoris, ac maioris nomen. Quo pacto enim erunt in mulis, et pastoribus nouenae partes, ubi nec admissura, nec foetura observatur? In canibus enim uideo posse dici. Sed do est in hominibus posse nouenarium retineri numerum, quod in hybernis habent in uillis mulieres, et quidam etiam in aestiuis, et id pertinere putant, quo facilius ad greges pastores retineant, et puerperis familiam faciant maiorem, et rem pecuariam fructuosiores. Si inquam numerus non est admissim, ut non est, cum dicimus mille naues ysse ad Troiam, centumuirale esse iudicium Romae, deme (si uis) duas res de mulis, admissuram, et parturam. Vactius parturam inquit? proinde ut non aliquoties dicatur Romae peperisse mulam. Cui ego ut succinerem subyicio Magonem, et Dionysium scribere mulam, et equam, cum coeperint, duodecimo mense parere. Quare non, si hic in Italia cum peperit mula sit portetum, adsentiri oes terras. Neque enim hirudines, et aconiae, quae in Italia pariunt, in oibus terris pariunt. Non satis palmas, cariotas in Syria parere, inuectas in Italiam non posse? Sed scrofa. Si exigere manus sine mularum admissura, et foetura numerum octoginta et unum, est qui expleas duplicem istam lacunam, quod extraordinariae fructuum species duae accedunt magnae, quarum una est tosura, quod oues, et capras detundet, aut uellunt, altera, quam latius patet, de lacte, et caseo, quam scriptores graeci separatim *τρυγοτομία* appellauerunt ac scripserunt de ea re multa.

De pecudibus arietibus et agnis quorum item pastio foetura, nutritus et sanitas consideranda sunt.

Cap. IX.

SED Quoniam nos nostrum pensum absoluiamus, ac limitata est pecuaria questio, nunc rursus uos reddite nobis o epirotae de una quaque re, ut uideamus, quid pastores a pergamidae in Aledone potis sint. Atticus, qui tunc Titus Pöponius, nunc Quin. Caelius cum noie eodem ego opinor inquit, incipiam primus, quam uos in me uideo coniecas oculos, et dicam primigenia pecuariae. E feris. n. pecudibus primum diis oues comprehensas ab hominibus, ac mansuesactas, has primum oportet bonas emere, quae sita etate, si

neq; uetulae sunt, neq; meræ agnae, quod alteræ iam non dūm, alteræ iā nō possunt dare fructum, sed ea melior ætas quā sequitur spes, q̄ ea, quā mores. De forma, ouem eē oportet corpore amplo, quæ lana multa sit, & molli, uillis altis, & densis toto corpore, maxime arcū cernicem, & collum, uentrem quoq; ut habeat pilosum, itaq; quæ id nō haberent, maiores nri apicæ appellabāt, ac reijciebant, esse oportet cruribus humilibus, caudis obseruare ut sint in Italia prolixis, in Syria breuibus. In primis uidendū, ut boni seminis pecus habeas, id ferè ex duabus rebus potest animaduerti, ex forma, et ex progenie. Ex forma, si arietes sint fronte lana uestiti bene, intortis cornibus pronis ad rostrum, raris oculis, lana opertis, auribus amplis, pectore, & scapulis, et clunibus latis, cauda lata, & lōga, animaduertendū quoq; lingua ne nigra, aut uaria sit, quod ferè qui talē habent, nigros, aut uarios procreāt agnos. Ex progenie aut animaduertitur, si agnos pcreant formosos. In emptionibus iure utimur eo, qđ lex præscripsit, in ea. n. alij plura, alij pauciora exapiunt, qđā. n. pretio factō in singulas oues, ut agni chordi duo pro una oue annumerent, et si cui uetustate dentes absunt, itē binæ pro singulis, ut prodant, de reliquo antiqua ferè formula utuntur, cū emptor dixit, tātī sunt mihi emptæ? & ille rñdet, sunt, & ex promptis numos. Emptor stipulatur prisca formula sic, illasce oues, quæ de re agitur, sanas recte esse, uti pecus ouillū, quod recte sanum est extra luscām, surdū, minā, idest uentre glabro, neq; de pecore morbofo esse, habereq; recte liare, hæc sic recte fieri spondes? nec cū id factum est, tñ grex dominum non mutat, nisi sit æs adnumeratū. Nec non emptor pōt ex empto uenditorē damnare, si non tradat, cum is nō soluerit numos, ut ille emptorem simili iudicio, si non reddidit pretium. De alteris quatuor rebus deinceps dicam, de pastione, foetura, nutritu, sanitate. Primum prouidendū, ut totum annum recte pascatur intus, & foris, stabula idoneo loco ut sint, ne uentosa, q̄ spectent magis ad orientem, q̄ ad meridianum tēpus. ubi stent, solum oportet esse eruderatū, & proclium, ut enerri facile possit, ac fieri purum. Non. n. solum ea uligo lanam corrūpit ouium, sed et ungulas, ac eas scabras fieri cogit. Cūq; aliquot dies ita steterint, subycere oportet uirgulta, & alia, quo mollius requiescant, purioresq; sint libentius. n. ita pascuntur. Faciendū quoq; septa secreta ab alijs, quo enitentes secludere possis, itē quo

M. VARRONIS.

corpore agro, hæc magis ad uillaticos greges animaduertenda. Contra ille in saltibus q̄ pascuntur, & a tectis absunt longe, portant secum crates, aut retia, quibus cohortes in solitudine faciāt, ceteraq; utensilia. Longe. n. & late in diuersis locis pasci solent, ut multa millia absint sæpe hybernæ pastiones ab æstiuis. Ego uero scio inquam, nam mihi greges in Apulia hybernabant, qui in reatinis montibus æstiuabāt. Cum inter hæc bina loca, ut iugum cōtinet sarpiculos, sic colles publice distantes pastiones, eaq; ibi, ubi pascunt in eadem regione, tñ temporibus distinguunt, ut æstate quod tum prima luce exeunt in pastum, propterea qđ tūc herba rosida, meridianæ quæ est aridior, iucunditate præstat. Sole exorto puro propellunt, ut redintegrantes rursus ad pastū alacriores faciant. Cirāter meridianos æstus, dum deseruescunt, sub umbriferas rupes, & arbores patulas subiūcūt, quoad refrigerato aere uestertino, rursus pascant ad solis occasum. Ita pascere periculis oportet, ut auerso sole agat, caput enim ouis molle, maxime est. Ab occasu paruo intervallo interposito ad bibendum appellant, & rursus pascunt quoad contenebrauit, iterum enim tū iucunditas in herba redintegravit. Hæc ab uergiliarum exortu ad æquinoctiū autumnale maxime obseruant. Quibus in locis menses sunt factæ, interest utile duplici de causa, quod & caduca spica saturantur, & obtritris stramentis, & stercoreatione faciunt in annum segetes meliores. Reliquæ pastiones hyberno, ac uerno tempore hoc mutant, quod pruina iā exhalata propellunt in pabulum, & pascūt diem totū, ac meridiano tpe semel agere potum satis habent. Quod ad pastiones attinet, hæc ferè sunt, qđ ad fœturā, quæ dicā. Arietes, quibus sis usus ad fœturā, bimestri tpe ante secernendum, & largius pabulo explendum. Cum redierint ad stabula è pastu, ordeum si est datum, sunt firmiores ad laborem sustinendū. Tempus optimū ad admittendū, ab arcturi occasu ad Aquilæ occasum, qđ quæ postea concipiunt, sunt uegrades, atq; imbecillæ. Ovis prægnās est diebus centum quinquaginta. Itaq; fit partus exitu autūnali, cum aer est modice tēperatus, ac primitus orit herba imbris primoribus euocata. Quādiu admissura sit, eadem aqua uti oportet, quod cōmutatio et lanā facit uariam, et uterum corrumpit. Cum oēs conceperunt, rursus arietes secernēdi. Ita factis pgnātibus, quod sunt molesti obsunt. Neque pati oportet minores q̄ bimas saliri, quod neq; natum ex

his idoneum est, necnon ipsæ sunt et deteriores, & non meliores
 quæ trimæ admiffæ, deterrēt à saliendo si scællis è iūco, alia ne qua
 re, quam alligant ad naturam. Cōmodius seruantur, si secretas
 pascunt. In nutritu cum parere cœperint inijciunt in ea stabu-
 la, quæ habent ad eā rem seclufa. ibiq; nata recentia ad ignē pro-
 pè ponunt, quoad cōaluerint, biduum, aut tridui retinent, dū
 agnoscant matrem agni, et pabulo se saturent. Deinde matres cū
 grege pastum prodeunt, retinent agnos, qui, cum reductæ ad uer-
 sperum, aluntur lacte, & rursus discernuntur, ne noctu à matri-
 bus conculantur. Hoc item faciunt mane ante quæ matres in pabu-
 lum exeant, ut agni saturi fiant lacte. Circa decem dies cū præ-
 terierunt, palos affigunt, & ad eos alligant libro, aut qua alia
 re leni distantes, ne toto die cursantes inter se teneri delibent ali-
 quid membrorum. Si ad matris mammam nō accedit, admonere opor-
 tet, & labra agni ungere butyro, aut adipe suillo, & olfacere la-
 bra lacte. Diebus post paucis obijcere his uiciā mollitam, aut her-
 bā tenerā ante quæ exeant pastū, & cū reuerterūt. Et sic nutritan-
 tur, quoad facti sunt quadrimestres. Interea matres eorū his tēpo-
 ribus nō mulgent quidam, quæ melius, omnino perpetuo, quod et lanæ
 plus ferunt, et agnos plures. Cū depulsi sunt agni à matribus, ad
 bibēda diligentia est, ne desiderio senescant, itaq; deliniendū in
 nutritu pabuli bonitate, & à frigore, & æstu ne quid laborent,
 curandū. Cū obliuione iā lactis nō desiderāt matrē, tum denique
 cōpellendū in gregem ouium. Castrare oportet agnū non minorē
 quinq; mensium, neq; ante quæ calores, aut frigora se exegerint.
 Quos arietes submittere uolūt, potissimum eligunt ex matribus,
 quæ geminos parere solent, pleraq; similiter faciendū in ouibus
 pellitis, quæ propter lanæ bonitatem, ut sunt tarentinæ, & alti-
 nates pellibus integuntur, ne lana inquinet, quo minus uel infi-
 ci recte possit uel lauari, ac parari. Horū præsepia, ac stabula, ut
 sint pura, maiorem adhibeant diligentiam quæ hirtis, itaq; faciunt
 lapide strata, ut urina necubi in stabulo consistat. His quæcunq;
 inuentur, uescuntur, ut folia ficulnea, & palea, & uinacea, fur-
 fures obijciuntur modice, ne parū, aut nimium saturent, utrunq;
 enim ad corpus alendum inimicū, at maxime amicum cythisum
 et medica, nā et pingues faciunt facillime, et gignit lac. De sanitate
 sunt multa, sed ea (ut dixi) in libro scripta magister pecoris hēt,
 et quæ opus ad medendū secū portat. Relingitur de numero, quæ

faciunt alij maiorem, alij minorem. Nulli enim huius moduli naturalis. Illud ferè omnes in Epiro facimus, ne minus habeamus in centenas oves hirtas singulos homines, in pellitas binos.

De capris hircis & hœdis.

Cap. X.

CVI Cossinius. Quoniam satis balasti inquit, ò Faustule noster, accipe à me cum homerico Melanthio chordo de capellis, & quemadmodum breuiter oporteat dicere discæ. Qui caprinū gregem cōstitueret uult, in eligēdo animaduertat oportet. Primum ætatem ut eam paret, quæ iā ferre possit fructum, & de us eā potius. quæ diutius, nouella enim q̄ uetus melior. De forma uidentum, ut sint firmæ, magnæ, corpus lene ut habeāt, pilo crebro, nisi si glabræ sunt. Duo enim genera earum, sub rostra duas ut mamillas pēsiles habeant, quod hæ fecundiores sunt, ubere sint grādiore, ut & lac multū, & pingue habeant pro portione. Hircus molliori pilo, & potissimum albo, ac cœuicæ & collo breue, gurgulione longiore. Melior fit grex, si nō est ex collectis comparatus, sed ex consuetis unā. De seminio dico eadem, quæ Atticus in ouibus, hoc aliter ouium semen tardius esse, quo hæ sint placidiores. Contra caprile mobilius esse, de quarū uelocitate in originū libro Cato scribit hæc, In forati Fiselio capræ feræ sunt, q̄ saluūt è saxo pedes plus sexagenos. Oues enim quas pasimus ortæ sunt ab ouibus feris, sic capræ, quas alimus, à capris feris sunt ortæ, à q̄s propter Italiam Caprasia insula est nominata. De capris qđ meliore semine eæ, quæ bis pariant, ex his potissimum mares solent summitti ad admissuras, quidam etiam dant operam, ut ex insula media capras habeant, q̄ ibi maximi ac pulcherrimi fieri existimātur hœdi. De emptione aliter atq; de ouibus dico, quod capras sanas sanus nemo promittit, nūquā enim sine febris sunt, itaq; stipulātur paucis exceptis uerbis, ac Manilius scriptū reliquit sic. Illas capras hodie recte eē, & bibere posse, habereq; recte licere, hæc spōdes ne? de quibus admirādum illud, quod ē Archelaus scribit, non ut reliqua animalia naribus, sed auribus spiritum ducere solere. Pastores curiosiores aliquot hoc dicunt. De alteris quatuor, qđ ē de pastu hoc dico, stabulat pecus melius ad hybernos exortus si spectat, qđ ē alsiosū. Id ut pleraq; lapide, aut testa substerni oportet, caprile quo minus sit uliginosum, ac lutulētū.

Foris cum est pernoctandum, item in eandem partem cœli, quæ spectent septa oportet substerni uirgultis, ne oblinantur, nec nilto aliter tuendum hoc pecus in pastu, atq; ouillum, quod tamen habet sua propria quædam, quod potius syluestribus saltibus delectantur, q̄ pratis. Studiosè enim de agrestibus frutiabus pascuntur, atq; in locis cultis uirgulta carpunt, itaq; à carpendo capræ nominatæ, ob hoc in lege locatiōis fundi excipi solet, ne colonus capra natum in fundo pascat. Harum enim dentes inimici satiationis, quas etiam astrologi ita receperunt in cœlum, ut extra limbum duodecim signorum excluderint. Sunt duo hædi, & capra non longe à tauro. Quod ad fœturam pertinet, desistente autē no exigunt à grege in campos hircos in caprilia. Item ut in arietibus dictum, quæ concepit post quartum mensem, reddit tempore uerno. In nutritu hædi trimestres cū sint facti, tum submituntur, & in grege inapiunt esse. Quid dicā de earū sanitate, quæ nunquam sunt sanæ, nisi tñ illud unum, quædam scripta habere magistros pecoris, quibus remedijs utatur ad morbos quosdam earum, ac uulneratum corpus, quod usu sæpe uenit his, quod inter se cornibus pugnāt, atq; in spinosis locis pascuntur. Relinquitur de numero, qui in gregibus est minor caprino, q̄ in ouillo, quod capræ lasciuæ, & quæ dispergunt se. Contra oues, quæ se congregant, & condensent in locum unum. Itaq; in agro gallico greges plures potius faciunt, q̄ magnos, quod in magnis cito existunt pestilentie, quæ ad perniciem eos perducunt. Satis magnum gregem putant esse circiter quinquagenas, quibus assentiri putant id, quod usu uenit Gaberio equiti romano. Is enim, cum in suburbano haberet mille iugerum, & à caprario quodam, qui adduxit capellas ad urbem decem sibi in dies singulos denarios singulos, dare audisset, coegit mille caprarum, sperans se capturum de prædio in dies singulos denarium mille. Tātum enim sefellit, ut breui omnes amiserit morbo. Cōtra, in Salentinis & in Casinati ad cætenas pascunt. De maribus, & fœminis idem ferè discrimen, ut alij ad denas capras singulos parent hircos, ut ego, alij etiam ad .XV. ut Menas, nonnulli etiam, ut Murius, ad uiginti.

De suillo pecore.

Cap. XI.

SED Quis è portu post Italico prodit, ac de suillo pecore expedit? tametsi Scrofam potissimū de ea re dicere oportere cognos-

M. VARRONIS.

men eius significat. Cui Tremellius, ignorare igitur inquit uideris, cur appeller Scrofa. itaq; ut etiam hi propter te sciant, cognosce meam gentem suillum cognomen non habere, nec me esse ab auis eius cognominis ortum. Auis meus primum appellatus est Scrofa. qui quaestor cum esset Licinio Nerva praetore in Macedonia provincia relictus, qui praecesset exercitui, dum praetor rediret, hostes arbitrati occasionem se habere uictoriae, impressionem facere coeperunt in castra. Auis, cum hortaretur milites, ut caperent arma, ac exirent contra dixit celeriter se illos (ut Scrofa porcos) diffecturum, idq; fecit, nam eo prius hostes ita fudit, ac fugauit, ut eo Nerva praetor impator sit appellatus, et auis cognomen inuenerit, ut diceretur Scrofa, itaq; pro auis, ac superiores, de Tremellys nemo appellatus Scrofa. Nec minus septimus sum deinceps praetorius in gente nostra. Nec tamen diffugio, quin dicam quae scia de suillo pecore. Agri. n. culturae ab initio sui studiosus, nec de pecore suillo mihi minor cura est, quam uobis magnis pecuariis. Cui. n. ea res non est comis? Quis enim nostrum fundum colit, quin sues habeat, et qui non audierit patres nostros dicere, ignauum, et sumptuosum esse, qui succidiam in carnario suspenderit potius ab Ianuario quam ex domestico fundo? Ergo qui suum gregem uult habere idoneum, eligere oportet primum bona etate, secundo bona forma. Ea est, cum amplitudine membrorum, praeterquam pedibus, et capite, unicoloris potius quam uarij. Cum haec eadem ut habeant uerres uidendum, tum utiq; sint ceruicibus amplis, boni seminis. Sues. n. animaduertuntur a facie, et progenie, et regione coeli. A facie, si formosi sint uerres, et scrofa. A progenie, si multos porcos pariunt. A regione, si potius ex his locis, ubi nascuntur amplij, quam exiles. Parari, et enim solent sic, illasce sues sanas esse, habereq; recte licere, noxysq; praestari, neque de pecore morbofo esse, spondes ne? Quidam adiungunt praefectas esse a febre, et a foria. In pastu locus huic pectori aptus uiliginosus, quod delectatur non solum aqua, sed etiam luto. Itaque ob eam rem aiunt lupos, cum sint nati sues, trahere usque ad aquam, quod dentes feruorem carnis ferre nequeant. Hoc autem pecus alitur maxime glande, deinde faba, et ordo, et cetero frumento. Quares non modo pinguitudinem efficiunt, sed etiam carnis iucundum saporem. Pastum exigunt aestate mane, et ante quam aestus incipiat, subigunt in umbrosus locum, maxime ubi aqua sit. Post meridiem rursus lenito feruore pascunt. Hyberno tempore non prius exigunt

pastum, quàm pruina euannit, ac colliquefacta est glacies. Ad
 fœturam uerres duobus mensibus ante scernendi. Optimum ad
 admissuram tempus à fauonio ad æquinoctium uernū, ita enim
 contingit, ut æstate pariat, quatuor enim menses est prægnaans, et
 tunc parit, cum pabulo abundat terra, neq; minores admittendæ
 quàm anniculæ. Melius uiginti menses expectare, ut bimæ pari-
 ant. Cum cœperint id facere dicuntur usque ad septimum annum
 recte. Admissuras cum faciunt, prodigunt in lutosos limites, ac lu-
 stra, ut uoluentur in luto, quæ est illorum requies, ut lauatio ho-
 mini. Cum omnes conceperunt, rursus segregant uerres. Verres
 octo mensium incipit salire, pmanetq; ut id recte facere possit, usq;
 ad quartum annum, deinde castratur, saginaturq; quoad perue-
 niat ad lanium. Hic enim conaliator suillæ carnis, datur popu-
 lo. Sus græcè dicitur ὕς olim οὕτης ab illo uerbo dictus, quod
 dicitur ὀνήειν, quod est immolare. Ab suillo enim pecoris gene-
 re immolandi initium primum sumptum uidetur, cuius uestigia,
 quod initijs Cereris porci immolantur, & quod initijs pacis fœ-
 dus cum feritur, porcus occiditur, et quod nuptiarum initio anti-
 qui reges, ac sublimes uiri in Hetruria in coniunctione nuptiali
 noua nupta, & nouus maritus primum porcum immolant. Pri-
 scia quoq; latini, etiam græci in italia idem fecitasse uident. Nā
 & nostræ mulieres maxime nutrices naturam qua fœminæ sunt,
 in uirginibus appellant porcam, & græci χοῖρον significan-
 tes esse dignum insigni nuptiarum, suillum pecus donatū ab na-
 tura dicunt ad epulandum, itaque us animam datam pro sale,
 qui seruaret carnem. E quis succidias galli optimas & maximas
 facere consueuerunt. Optimarum signum, quod etiam nūc quot
 annis è Gallia apportantur Romam perne tomacina, & tania-
 cæ, & petasiones. De magnitudine gallicarum succidiarum Ca-
 to scribit his uerbis. In italia in scrobes terna, atq; quaterna mi-
 lia aulia succidia. Vere sus usque adeo pinguitudine crescere so-
 let, ut se ipsa stans sustinere nō possit, neq; progredi usquā, itaq;
 eas si quis quo traicere uelit, in plostrum imponit. In Hispania
 ulteriore in Lusitania cum sus esset occisus, Attilius hispaniensis
 minime mendax, et multarum rerū peritus in doctrina dicebat.
 L. Volūnio senatori missam offulā cum duabus costis q̄ pederet
 tres et uiginti pondo, eiusq; suis à cute ad os pedē & tres digitos
 fuisse. Cui ego. Nō minus res admirāda q̄ quæ nunc est dicta.

in Arcadia scio esse spectatam suam, quæ præ pinguitudine carnis non modo surgere non posset, sed etiam ut in eius corpore forex exesa carne nidum fecisset, et peperisset mures. Hoc etiam in iuuentia factum accepi. Sus ad foeturam quæ sit fecunda animaduertunt ferè ex primo partu, quod non multum in reliquis mutat. In nutritu, quam porcationem appellabant, binis mensibus porcos sinunt cum matribus, sed eos, cum iam pasci possunt, secerunt. Porci, qui nati sunt hyeme, sunt exiles propter frigora, et quod matres aspernantur, propter exiguitatem lactis, quod dentibus sauciuntur propterea mammae, scrofam in sua quæque hara suos ut alat oportet porcos, quo alienos aspernatur, et ideo si conturbati sunt in foetura, fit deterius. Natura diuisus est eius annus bisariam, quod bis parit in anno, quater in mensibus fert uentre, binis nutrit. Haram facere oportet citè trium pedum altam, et latam amplius paulo, ea altitudine abs terra, ne dum exilire uelit prægnans, abortet. Altitudinis modus sit, ut subulcus facile despicere possit, nequis porcellus à matre opprimatur, et ut facile purgare possit cubile. In haris ostium esse oportet, et limen inferius altum palmipedale, ne porci ex hara, cum mater prodit, transilire possint. Quotiescunque haras subulcus purgat, toties singulas arenam inungere oportet, aut quid item quod exugat humorem, et cum pepererit, largiore abatu sustentare, quo facilius lac suppeditare possit, in quibus hordei citè binas libras aqua madefactas dare solent, et hoc quoque conduplicant, ut sit mane, et uesper, si alia, quæ obijciant, non habuerint. Cum porci depulsi sunt à mamma à quibusdam deliciae appellatur, neque iam lactantes dicuntur. Qui à partu decimo die habentur puri, ab eo appellantur ab antiquis sacres, quod tum ad sacrificia idonei dicuntur primum. Itaque apud Plautum in menæchmis, cum insanum quem putat, ut pietur in oppido Epidamno, interrogat, quanti hic porci sunt sacres? Si fundus ministrat, dari solent uina et ea, ac scopi ex uuis. Amisso nomine lactantis, dicuntur nefrendes, ab eo quod nondum fabam fendere possint, id est frangere. Porcus enim graecum nomen est antiquum, sed obscuratum, quod nunc eum uocant χοῖρον. In eorum potu scrofae bis die ut bibant, curant, lactis causa. Parere tot oportet porcos, quot mammae habeat, si minus pariat, fructuariam idoneam non esse, si plures pariat, esse portentum. In quo illud antiquissimum fuisse scribitur, quod sus

quod sus Aeneæ Lauini triginta porcos pepererit albos, itaque quod portenderit factum, triginta annis, ut Lauinienses conderent oppidum Albam. Huius suis, ac porcorum etiam nunc vestigia apparent. Iam ne simulachra eorum aenea etiam nunc in publico posita, et corpus matris ab sacerdotibus, quod in falsura fuerit, demonstratur? Nutricare octonos porcos paruulos primo possunt. incremento facto à peritis dimidia pars remoueri solet, quod neq; mater sola potest sufferre lac, neque cōgenerati alescendo roborari. A partu decem diebus proximis non producant ex hāris matrem prāterquam potum. Prāteritis decem diebus sinūt exire pastum in propinquum locum uillae, ut crebro reditu lacte alere possit porcos. Cum creuerūt, cupiunt sequi matrem, tum domi secernunt à matribus, ac seorsum pascunt, ut desiderium ferre possint parentis, quod decem diebus assequuntur. Subulcus debet consuefacere omnia ut faciant ad bucinam. Primo cum incluserunt, cum bucinatum est, aperiunt, ut exire possint in eū locum, ubi ordeum fūsum in longitudine. Sic enim minus disperit, quā si in acervos positum, et plures facilius accēdūt, ideo ad. XII. conuenire dicuntur, ut syluestri loco dispersi ne dispereant. Castrātur uerres commodissime anniculi, utiq; ne minores, quā semestres, quo facto nomen mutant, atq; è uerribus dicuntur maiāles. De sanitate suum unum modo exempli causa dicam. Porcis Lactentibus si Scrofa lac non potest suppeditare, triticum frictum dare oportet (crudum enim soluit alium) uel ordeum obijci ex aqua, quoad fiant trimestres. De numero in centum sues, decem uerres satis esse putant. Quidam etiam hinc demūt. Greges maiores inaequabiles habent. Sed ego modicum puto centenarium. Aliquot maiores faciūt, ita ut ter quinquagenos habeant porcos in grege, alij duplicant, alij etiam maiorem faciunt. Minor grex, q̄ maior minus sumptuosus, q̄ comites subulcus pauciores querit. Itaq; gregis numerū pastor ab sua utilitate cōstituit, nō ut quot uerres habeat, id enim à natura sumēdū, hāc hic.

De bubus et uacis.

Cap. XII.

AT QVINTVS Lucienus senator homo quamuis humanus, et iocosus introiens familiaris omnium nostrum, sic ep' otis et inquit, Χαίρετε, et Varronem nostrum inquit τοίμεινα
 Varro. b

λαών. Scrofam enim mane salutavi, cum alius eū salutasset, alius
 conuitiatus esset, qui tam sero uenisset ad constitutum. Vides
 bo iam uos inquit, balathrones, & huc asseram meum corium,
 & flagra. Tu uero Muri ueni mihi aduocatus, dum asses soluo
 palilibus, si postea à me repetant, ut testimonium perhibere pos-
 sis. Vacuus Murio, Narra isti inquit eadē, qui sermones sint ha-
 biti, & quid reliqui sit, ut ad partes paratus ueniat. Nos interea
 secundum actum de maioribus adtexamus. In quo quidem meae
 partes, quoniam boues ibi. Quare dicam de bubulo pecore, quā
 acceperim sciētiam, ut si quis quid ignorat, discat, si quis scit, ubi
 nunc labar obseruet. Menas. Vide quid agas inquam Vacca.
 Nam bos in pecuaria, maxima debet esse auctoritate, presertim
 in Italia, quae à bubus nomen habere sit existimata. Graecia. n.
 antiqua (ut scribit Timaeus) tauros uocabat τάλους. à quorū
 multitudine, & pulchritudine, & foetu uitulorum Italiam dixe-
 runt. Alij scripserunt, quod è Sicilia Hercules persecutus sit eo no-
 bilem taurū, qui diceretur Italus. Hic socius hominum in rusti-
 co opere, & Cereris minister. Ab hoc antiqui manus ita abstine-
 ri uoluerunt, ut capite sanxerint, si quis occidisset. Qua in re tes-
 tis Attica, testis Peloponnesus. Nā ab hoc pecore Athenis Buzu-
 ges nobilitatus argis βούργος. Noui inquit Menas maiestatem
 bouum, & ab his dia pleraq; magna, ut Βούσυχον, Βούσωνα,
 Βούλιμον, Βούσιον. Vnam quoq; buumamam. Præterea
 hunc scio esse, in quem potissimum Iupiter se conuertit, cū expor-
 tauit per mare è Phœnice amans Europam. Hunc esse, qui filios
 Neptuni à Menalippa seruauit, ne in stabulo ifantes grex bouum
 obtereret. Deniq; ex hoc putrefacto nasci dulcissimas apes mellis
 matres, à quo eas graeci Βουγόνας appellant, & hinc Plautiū
 locutum esse latine. Cum Hirtium prætorem renunciatū Romā,
 in Senatum scriptum habere. Sed bono animo es, non minus sa-
 tisfaciam tibi, q̄ qui bugoniam scribit. Primum in bubulo genere
 ætatis gradus dicuntur quatuor. Prima uitulorum, secunda iu-
 uencorum, tertia bouum nouelloꝝ, quarta uetuloꝝ. Discernuntur
 in prima uitulus, & uitula, in secunda iuuenas & iuuenca, in
 tertia, & quarta taurus, et uacca. Quæ sterilis est uacca, tau-
 ra appellatur. Quæ prægnans, horda. Ab eo in fastis dies hordi-
 calia nominantur, quod tunc horde boues immolantur. Qui gre-
 gem armentorū emere uult, obseruare debet primum, ut sint hæ

pecudes etate potius ad fructus ferēdos integræ, q̄ iam expertæ. Ut sint bene compositæ, ut integris membris, oblōgæ, amplæ, nigantibus cornibus, latis frontibus, oculis magnis, et nigris, pilosis auribus, compressis malis, sublimisue, gibberi spina leuiter remissa, apertis naribus, labris subnigris, ceruicibus crassis, ac longis, à collo palaribus demissis, corpore amplo bene costato, latis humeris, bonis clunibus, coda p̄fusa usq; ad calcēs, ut habeat inferiorem partem frequentibus pilis subcrispam, compactis cruribus potius breuioribus, q̄ longis, rectis genibus, eminulis distantibus inter se, pedibus non latis, neq; ingredientibus qui displodantur, nec cuius ungulæ diuarent, et cuius ungues sint leues, et pares, coriū attactu non asperū, ac durum, colore potissimum nigro, deinde rubeo, tertio heluo, quarto albo. Mollissimus. n. hic, ut durissimus primus. De medys duobus prior q̄ posterior melior utriq; pluris q̄ nigri, et albi. Neq; non, præterea ut mares seminis boni sint, quorū, et forma est spectanda, et qui ex his orti sunt, ut respondeant ad parentum speciem, et præterea quibus regionibus nati sunt, refert. Boni. n. generis in Italia, pleriq; gallici ad opus. Contra iugatoriū ligustici. Trāsmarini epirotici non solum meliores totius Græciæ, sed et Italiæ, tametsi qdā de italiis, quos propter amplitudinem p̄stare dicunt, ad uictimas faciunt, atq; ad deorū seruant supplicia. Qui sine dubio ad res diuinas p̄pter dignitatem amplitudinis, et coloris præponendi. Quod eo magis fit, quod albi in Italia nō tam frequentes q̄ qui in Thracia ubi alio colore pauci. Eos cum emimus domitos, stipulamur sic. Illoscæ boues sanos esse, noxisq; præstari? Cum emimus indomitos sic. Illoscæ iuuenos sanos recte, deq; pecore sano esse, noxisq; præstari spondes ne? Paulo uerbosius hæc, qui Manilij actiones sequuntur lanij, q̄ ad cultrum bouē emunt, et qui ad altaria, hostiæ sanitatem non solent stipulari. Pascuntur armenta cōmodissime in nemoribus, ubi uirgulta, et frons multa Hyeme cum hybernant, secundum mare, æstu abiguntur in montes frōdosos. Propter foeturā hæc obseruare soleo ante admissuram, mensem unū, ne cibo et potione se impleant, quod existimant facilius macræ cōcipere. Cōtra, tauros duobus mēsis ante admissurā, herba, et palea, ac fœno facio pleniores, et à fœminis secerno. Hēo tauros totidē quot Atticus, ad mīces septuaginta, duos, unū āniculū, aliter bimū. Hoc secūdū astri exortū facio, qd̄ græci uocāt λυγαν, h ū

M. VARRONIS.

fidem nostri. Tum deniq; tauros in gregē redigo. Mas an fœmi-
na sit cōcepta, significat descensu taurus cum inuit, siquidē si mas
est, in dexteriolem partem abit, si fœmina in sinistrolem. Cur
hoc fiat, uos uideritis, qui Aristotelem legitis. Non minores oportet
inire bimas, ut trimæ pariāt, eo melius si quadrimæ. Pleræq;
pariunt in decem annos, quædam etiam in plures. Maxime idoneum
tempus ad cōcipiendum à delphini exortu usq; ad dies.
XL. aut paulo plus. Quæ enim ita cōceperint, temperatissimo
anni tempore pariunt. Vacca enim mensibus decem sunt p̄gnantes.
De quibus admirandum scriptum inueni, exemptis testicu-
lis, si statim admiseris, cōcipere. Eas pasci oportet in locis uiridi-
bus, & aquosis. Cauere oportet, ne aut angustius stent, aut feri-
antur, aut cōcurrant. Itaq; q̄ eas æstate tabani cōcitare solent,
& bestiole quædam minutæ sub cauda, ne cōcitantur, aliqui so-
lent includere septis. His substerni oportet frōdem, aliudue quid
in cubilia, quo mollius conquiescant. Aestate ad aquam appel-
lendum bis, hyeme semel. Cum parere cœperint, secundum stabu-
la pabulum seruari oportet integrum quod egredientes degusta-
re possint, fastidiosæ enim fiunt. Et prouidendum, quò recipiunt
se, frigidus locus ne sit, algor. n. eas, et famis macrescere cogit. In
alimonijs armenticiũ pecus sic contuendum, lactētes cum ma-
tribus ne cubent, obteruntur. n. ad eas mane adigi oportet, et cū
redierint è pastu. Cū creuerint uituli, leuandæ m̄res, pabuli uiri-
do obiciendo in præsepis. Item his, ut ferè in oĩbus stabulis, lapi-
des substernēdi, aut quid item, ne ungulæ putrescāt. Ab equino-
t̄io autumnali unā pascuntur cum matribus. Castrare non oportet
ante bimatum, quod difficulter, si aliter feceris, se recipiunt.
Qui autem postea castrantur, duri, & inutiles fiunt. Item, ut re-
liquis gregibus pecuarijs, delectus quot annis habendus, & reu-
culæ reuiciundæ, quod locum occupant earũ, quæ ferre possunt fru-
ctus. Si qua amisit uitulum, ei oportet supponere eos, quibus non
satis lactis præbent matres. Semestribus uitulis obiciunt fursures
triticeos, & farinam ordeaceam, & teneram herbam, & ut bi-
bant mane, & uesperis curant. De sanitate sunt complura, quæ ex
cripta de Magonis libris, armetarium meum crebro ut aliquid
legat, curo. Numerus de tauris & uacis sic habendus, ut in sexa-
ginta, unus sit anniculus, alter bimus. Quidam habent aut ma-
iorem, aut minorem numerum gregum. Nam apud eum duo

Tauri in septuaginta matribus sunt. Numerū gregum alius alii facit. Quidam centenarium modicum putant esse, ut ego, Atticus centumviginti habet, ut Lucienus. Hec ille.

De asinis.

Cap. XIII.

AT Murius, qui dum loquitur Vaccius, cum Lucieno redisset, Ego inquit, de asinis potissimum dicam, quod sum reatinus, ubi optimi, et maximi fiunt, è quo seminio ego hic procreavi pullos, & ipsis Arcadibus uendidi aliquoties. Igitur asinorum gregem qui facere uult bonum, primum uidendum, ut mares, foeminasq; bona etate sumat, utiq; ut quamdiutissime fructum ferre possit, firmos, omnibus partibus honestos, corpore amplo, seminio bono, ex his locis, unde optimi exeunt, quod faciunt Peloponnenses, cum potissimum eos ex Arcadia emebant, in Italia ex agro reatino. Non enim si murenæ optimæ flutæ sunt in Sialia & Helops ad Rhodō, continuo hi pisces omni mari similes nascuntur. Horum genera duo. Vnum ferum, quos uocant onagros, in Phrygia, & Lycæonia sunt greges multi. Alterum mansuetum, ut sunt in Italia omnes. Ad seminationem onagrus idoneus, quod è fero fit mās, suetus facile, & è mansueto ferus nunquam. Quod similes parentum gignuntur, eligendi, & mas, & foemina cum dignitate ut sint. In mercando item (ut ceteræ pecudes) emptionibus, & traditionibus dominium mutant, & de sanitate, ac noxa solet cauere. Commode pascuntur farre, & fursuribus ordeacis. Admittuntur ante solstitium, ut eodem tempore alternis annis pariāt. Duodecimo enim mense conceptum semen reddunt. Prægnantes opere leuant. Venter enim labore, nationem reddit deteriolem. Marem non disiungunt ab opere, quod remissione laboris fit deterior. In pastu eadem ferè obseruat, quæ in equis. Secundū partum pullos anno non remouent à matre. Proximo anno noctibus patiuntur esse cum his, & leuiter capistris, aliæque re habent uinctos. Tertio anno domare incipiunt ad eas res, ad quas quisq; eos uult habere in usu. Relinquitur de numero, quorum greges non sanè fiunt nisi ij, qui onera portent, ideo quod plerique deducuntur ad molas, aut ad agriculturam, ubi quid uehendum est, aut etiam ad arandum, ubi leuis est terra, ut in campania. Greges fiunt ferè mercatorum, ut eorū, qui è Brundisio, aut Apulia

asellis doffuarijs comportant ad mare oleum, aut uinum, itemq;
frumentum, aut quid aliud.

De equis & equabus.

Cap. XIII.

LVCIENVS, Ego quoq; adueniens aperiam carceres inqt,
& equos emittere incipiam, nec solū mares, quos admissarios ha-
beo, ut Atticus singulos in fœminas denas, è quis fœminas Cō-
modius Equiculus uir fortissimus etiam patre militari iuxta ac
mares habere solebat. Horum equorum, & equarum greges qui
habere uoluerunt, ut habent aliqui in Peloponneso, & in Apu-
lia, primum oportet spectare etatem, quam præcipiunt. Viden-
dum ne sint minores trimæ, maiores decem annorum. Aetas co-
gnosatur equorum, & ferè omnium, qui ungulas indiuisas ha-
bent, & etiam cornutarum, quod equus triginta mensium pri-
mum dentes medios dicitur amittere, duos superiores, et totidem
inferiores. Incipientes quartum agere annum itidem eijciunt &
totidem proximos eorū, quos amiserunt, & incipiunt nasci quos
uocant columellares, Quinto anno incipiente item eodem modo
amittere binos, quos caninos habent, tum renascentes eis, Sexto
anno impleri. Septimo omnes habere solent renatos, & comple-
tos. His maiores qui sunt, intelligi negant posse, præterquam cū
dentes sunt facti brochi, & supercilia cana, & sub ea lacunæ, ex
observatu dicunt eum equum habere annos sexdecim. Forma esse
oportet magnitudine modica, quod nec uastos, nec minutos de-
cet esse. Equas clunibus, ac uentribus latis. Equos ad admissurā
quos uelis habere, legere oportet amplo corpore, formosos, nulla
parte corporis inter se non congruente. Vnde qualis futurus sit
equus, è pullo coniectari potest, si caput habet non magnum, nec
membris confusis, si est oculis nigris, naribus non angustis, auri-
bus applicatis, non angusta iuba, crebra, fusca, subcrispa subte-
nuibus setis implicata in dexteriolem partem cœuicis, pectus la-
tum, & plenum, humeris latis, uentre modico, lumbis deorsum
uersum pressis, scapulis latis, spina maxime duplici, sin minus nō
extenta, coda ampla subcrispa, cruribus, rectis, et equalibus, ge-
nibus rotundis, nec magnis, nec introrsus spectantibus, ungulis du-
ris, toto corpore ut habeat uenas, quæ animaduerti possint, quod
qui huiusmodi sit, & cū est æger, ad medendum est appositus,

corpore multo. De stirpe magni interest, qua sint, q̄ genera sunt multa. itaq; ad hoc nobiles à regionibus dicuntur. In Græcia thessalici equi, à terra appuli, ab R ose a R oseani. Equi boni futuri signa sunt, si cū gregalibus in pabulo contendit, in currendo, aliaue qua re, quo potior sit, si cum flumen traiciendum est, gregi in primis prægreditur, nec respectat alios. Emptio æquina similis ferè ac boum, & asinorum, quod eisdem rebus dominium in emptione mutatur, ut in Manilij actionibus sunt perscripta. Equinum pecus pascendum in pratis potissimum herba. In stabulis, ac præsepibus arido fæno. Cum pepererint, ordeo adiecto bis die danda aqua. Horum fœturæ initium admissiōis facere oportet, ab æquinoctio uerno, ad solstitium, ut partus idoneo tempore fiat. Duodecimo enim mēse die decimo aiunt nasci. Quæ post tempus nascuntur, ferè uitiosa, atq; inutilia existūt. Admittere oportet, cum tempus anni uenerit, bis die mane, & uespere. Peroriga enim appellatur quisquis admittit, eo enim adiutante equa alligata celerius admittitur, neq; equi frustra cupiditate impulsī semen eiciunt. Quoad satis sit admitti ipse significant, quod se defendunt, Si fastidium saliendo est, scyllæ medium conterunt cum aqua ad mellis crassitudinem, tum ea re naturam equæ, cum menses ferunt, tangunt, contra, ab locis equæ nares equi tangunt. Tametsi incredibile, quod usu uenit memoriæ mandandum. Cū equus matrem ut saliret adduci non posset, & eum capite obuoluto peroriga adduxisset. & coegisset matrem inire, cum descendenti uelum dempsisset ab oculis, ille impetum fecit in eū, ac mordicus interfecit. Cum conceperint equæ, uidendum ne aut laborarent plusculū, aut ne frigidis locis sint, quod alior maxime prægnantibus obest. Itaque in stabulis ab humore prohibere oportet humum, clausa habere ostia, ac fenestras, & inter singulas à præsepibus interijcere longurios, qui eas discernant, ne inter se pugnare possint. Prægnantem neque implere cibo, neque esurire oportet. Alternis qui admittunt, diuturniores equos, & meliores pullos fieri dicunt. Itaque ut restibiles segetes essent exustiores, sic quotannis quæ prægnans fiat. In decem diebus secundum partum cum matribus in pabulis prodigendum. Ne ungulas comburat stercus, cauendum. Quinquemestribus pullis factis, cum reducti sunt in stabulum, obijciendum farinam ordeaceam molliam cum fursuribus, & si quid aliud terra natum libenter edent.

Anniculis iam factis dandum ordeum, & fursures, usque quoad erunt lactantes. Neque prius biennio confecto à lacte remouendum. Eosq; cum stent cum matribus, interdum tractandum, ne cū sint disiuncti, ex Terreantur. Eademq; causa ibi frenos suspendendum, ut oculis consuecant & uidere eorum faciem, & è motu audire crepitus. Cum iam ad manus accedere consueuerint, interdum imponere his puerum bis, aut ter primum in uentrē, postea iam sedētem, hæc facere cum sit trimus, tū enim maxime crescere, ac lacertosum fieri. Sunt qui dicant post annum, & sex menses equulum domari posse, sed melius post trimum, à quo tempore farrago dari solet. Hæc enim purgatio maxime necessaria equi no pecori, quod diebus decem facere oportet, nec pati alium ullū cibum gustare. Ab undecimo usq; ad quartum decimum dādum ordeum, quotidie adiūcendo minutatim. Quod quarto die feceris, in eo decem diebus proximis manendum. Ab eo tempore mediocriter exercendum, & cum sudauerit, oleo perungendum. Si friguserit, in equili faciendus ignis. Equi quod alij sunt idonei ad rem militarem, alij ad uecturam, alij ad admissurā, alij ad cursuram, alij ad prædam, num item sunt spectandi ad quæ habendi? Itaque peritus belli alios eligit, atq; alit, ac docet. Aliter quadrigarius, ac desultor. Neque idem, qui uectarios facere uult, neque eodem modo parantur ad ephippium, ut ad prædam, quod ut ad rem militarem, quod ibi ad castra habere uolūt acres. Sic contra in uīs habere malunt placidos, propter quod discriminē maxime institutum, ut castrentur equi. Demptis enim testiculis sūt quietiores, & ideo quod semine carent, y canterij appellati, ut in suis maiales, i gallis gallinæis capi. De medicinis uel plurima sunt in equis et signa morborū, et genera curationum, quæ pastorem scripta habere oportet. Itaque ob hoc in Græcia potissimū medici pecorum ατθιατροι appellati.

De mulis & hinnis.

Cap. XV.

CVM hæc loqueremur uenit à Menate libertus, qui dicat liba absoluta esse, & rem diuinam paratam, si uellent, ueniret illuc, & ipsi pro se sacrificarent. Ego uero inquam, uos ire non patiar ante, quam mihi reddideritis tertium actum, de mulis, de canibus, de pastoribus. Breni oratio de istis inquit Murinus, nam

mulu, & hinni bigeneri, atq; insititū, non suo pte genere ab radi-
 cibz. Ex equa enim, & asino fit mulus. Contra ex equo, et asina
 hinnus. Vterq; eorum ad usum utilis, partu, fructus neuter. Pul-
 lum asininum à partu recentem subiiciunt equæ, cuius lacte am-
 pliores fiunt, quod id lac quam asininum, ac alia omnia dicunt
 esse melius. Præterea educant eū paleis, fæno, ordeo, Matri sup-
 positiciæ quoq; inserviunt, quo equa ad ministerium lactis abum-
 pullo p̄bere possit. Hic ita eductus ab initio, potest admitti, neq;
 enim eum aspernantur propter consuetudinem equinam. Hunc
 minorem si admiseris, & ipse citius senescit, & quæ ex eo concipi-
 untur sunt deteriora. Qui non habent eum asinum, quem sup-
 posuerunt equæ, & asinum admissarium habere volunt, de asi-
 nis quem amplissimum, formosissimūq; possunt, eligunt, quiq; se-
 minio natus sit bono, arcadico, ut antiqui dicebant, ut nos expti-
 sumus, reatino, ubi tricenis, ac quadrigenis nullibus HS admissa-
 rij aliquot uenierunt. Quos enim item ut equos stipulamur
 in emendo, ac facimus in accipiendo, idem qđ dictum est in eqs.
 Hos pasimus præcipue fæno, atq; ordeo, & id ante admissurā
 largius facimus, ut cibo suffundamus vires ad fœturam. Eodem
 tempore, quo equos adducunt, idemq; ut ineant equas perori-
 gas curamus. Cum peperit equa mulum, aut mulam nutrian-
 tes educamus. Hi, si in palustribus locis, atq; uliginosis nati, ha-
 bent ungulas molles. Iidem si exacti sunt æstivo tempore in mon-
 tes, quod fit in agro reatino, durissimis ungulis fiunt. In grege
 mulorum parando, spectanda ætas, & forma. Alterum ut uetū-
 ris sufferre labores possint, alterū ut oculos aspectu delectare que-
 ant. Hisce enim binis coniūctis omnia uehicularia in uis ducunt.
 Hæc me reatino auctore p̄bares mi Atticæ, nisi tu ipse domi equa-
 rum greges haberes, ac mulorum greges uendidisses. Hinnus, q
 appellatur ex equo, et asina, minor est, q̄ mulus corpore, plerūq;
 rubicundior, auribus ut æquis, iubam, et caudam similem asini.
 Item in uetere est (ut equus) menses duodecim. Hosce itē ut equu-
 los & educant, & alunt, et ætatem eorū ex dentibus cognoscūt.

De canibus.

Cap. XVI.

RELINQVITVR inquit Atticus, de quadrupedibus,
 quod ad canes attinet, maxime ad nos, q̄ pecus pasimus lanare.

M. VARRONIS.

Canis enim ita custos pecoris, ut eius, qui eo comite indiget ad se defendendum. In quo genere sunt maxime oves, deinde caprae. Has enim lupus captare solet, cui opponimus canes defensores. In suillo pecore tamen sunt, quae se vindicent sues, uerres, maiales, scrofae. propè enim haec apris, qui in sylvis saepe dentibus canes occiderunt. Quid dicam de pecore maiore? cum sciam mulorum gregem cum pasceretur, eoq; uenisset lupus, ultro mulos circumfluxisse, & ungulis cadendo eum occidisse? & tauros solere diuersos assistere clunibus continuatos, & cornibus facile propulsare lupos? Quare de canibus, quoniam genera duo, unum uenaticum, & pertinet ad feras bestias, ac sylvestres, alterum, quod custodiae causa paratur, & pertinet ad pastorem, dicam & de eo ad formam artis expositam in nouem partes. Primum aetate idonea parandi, quod catuli, & uetuli neque sibi, neque ouibus sunt praesidio, & feris bestijs nonnunquam praeda. Facie debent esse formosi, magnitudine ampla, oculis nigrantibus, auribus, naribus congruentibus, labris subnigris, aut rubicundis, neque resimis superioribus, neque pendulis subtus, mēto suppresso, & ex eo enatis duobus dentibus dextra, & sinistra paulo emiculis superioribus, directis potius, quam brochis, & acutis, quos habent labro tectos, capitibus, & auriculis magnis, ac flaccis, crassis ceruicibus, ac collo, internodijs articulorum longis, cruribus rectis, ac potius uarijs, quam uacijs, pedibus magnis, & altis, qui ingredienti ei displodantur, digitis discretis, unguibus duris, ac curuis, talo nec ut corneo, nec nimium duro, sed ut fermentato, ac molli, a faeminibus summis corpore suppresso, spina neque eminula, neque curua, cauda crassa, latratu graui, hiatu magno, colore potissimum albo, quod in tenebris specie leonina. Præterea faeminas uolunt esse mammosas aequalibus papillis. Item uidendum, ut boni seminijs sint. Itaque à regionibus appellantur lacones, epirotici, salentini. Videndum ne à uenatoribus, aut lanijs canes emas. Alteri, quod ad pecus sequendum inertes, alteri si uiderint leporem, aut ceruum, quod eum potius quam oves sequent. Quare aut à pastoribus empti melior, quae oves sequi consuevit, aut sine ulla consuetudine quae fuerit, canis enim facilius quid assuescit, eaq; firmitior cōsuetudo, quae sit ad pastores, quam quae ad pecudes. Publius Aufidius Pontianus amiterminus, cum greges ouium emisset in Umbria ultima, quibus

gregibus sine pastoribus canes accessissent, pastores, ut deduxerunt in metapontinos saltus, & Heracleæ emporium, inde cum domum redissent, qui ad locum deduxerant, è desyderio hominum diebus paucis postea canes sua sponte, cum dierum multorum uia interesset, sibi ex agris abaria quæsierunt, atque in Umbriam ad pastores redierunt, neque eorum quisquam fecerat, quæ in agricultura Saserna præcepit, Qui uellet se à cane sectari, uti ranam obijciat coctam. Magni interest ex semine esse canes eodem, quod cognati maxime inter se sunt præsidio. Sequitur quartum de emptione, id fit alterius, quod à priore domino secundo traditum est. De sanitate, & noxa stipulationes sunt eadem, quæ in pecore, nisi quod hic utiliter exceptum est. Alij pretium faciunt in singula capita canum. Alij ut catuli sequantur matrem. Alij ut bini catuli unius canis numerum obtineant, ut solent bini agni unius ovis. Plerique ut accedant canes, qui consueverunt esse unà. Cibatus canis propior hominis, quam ovis. Pascitur enim è culina, & ossibus non herbis, aut frondibus. Diligenter ut habeant abaria providendum. Fames enim hos ad querendum cibum ducet, si non præbebitur, & à pecore abducat. Nisi si (ut putant quidam) etiam illuc peruenerint, prouerbium ut tollunt antiquum, ΒΟΥΛΙΜΙΑ ΚΥΩΝ aperiant, de Actæone, atque in dominum asserant dētes. Necnon ita panem ordeaceum dandum, ut non potius eum in lacte des intritum, quod eo consueti cibo uti, à pecore non cito desascunt. Mortianæ ovis non patiuntur uesti carne, ne ducti sapore minus se abstineant. Dant etiam ius ex ossibus, & ea ipsa ossa contusa, dentes enim facit firmiores, et os magis patulum. Propterea quod uehementius diducuntur malæ, acrioresque sunt propter medullarum saporem. Cibus capere consuecunt interdum, ubi pascuntur, uesper, ubi stabulantur. De foetura, principium adnuttendi faciunt ueris principio, tunc enim dicunt catulire, idest ostendere se uelle maritari. Quæ cum admissæ, pariunt arater solstitio, prægnantes enim solent eē ternos menses. In foetura dandum potius ordeaceos quam triticeos panes, magis enim eo aluntur, & lactis præbent maiorem facultatem. In nutritu secundum partum si plures sunt, statim eligere oportet quos habere uelis, reliquos abijcere. Quam paucissimos reliqueris, tam optimi in alendo sunt propter copiam lactis.

Substernitur eis acus, aut quid, item aliud, quod molliore cubili facilius educantur. Catuli diebus viginti uidere incipiunt. Duobus mensibus primis à partu non disiunguntur à matre, sed minutatim desuesiunt. Educant eos plures in unum locum, & irritant ad pugnandum quo fiant acriores, neque defatigari patiuntur, quo fiant segniores. Consuefaciunt quoque ut possint alligari primum leuibus numellis, quas si abrodere conantur, ne id consuefiant facere, uerberibus deterrere solent. Pluribus diebus cubilia substernenda fronde, aut pabulo duabus de causis, ut ne oblinantur, aut perfrigescant. Quidam eos castrant, quod eo minus putant relinquere gregem. Quidam non faciunt, quod eos credunt minus acres fieri, quidam nuabus gratis in aqua tritis perungunt aures, & inter digitos, quod muscæ, & ricini, & pulices soleant (si hoc unguine non sis usus) ea exulcerare, & ne uulnerentur à bestiis, imponuntur his collaria, quæ uocantur mellum, idest angulum circum collum ex corio firmo cum clauulis capitatis, quæ intra capita insuitur pellis mollis, ne noceat collo duritia ferri. Quod si lupus, alius uel quis his uulneratus est, reliquos quoque canes facit, qui id non habent, ut sint in tuto. Numerus canum pro pecoris multitudine solet parari. Ferè modicum esse putant, ut singuli sequantur singulos opiliones, de quo numero alius alium modum constituit. Quod si sunt regiones ubi bestię sint multe, debent esse plures, quod accidit is, qui per calles syluestres longinquos solent comitari in aestiua, et hyberna. Villatico uero gregi in fundum satis esse duos, & id marem, & fœminā. Ita enim sunt assiduiore, quod cum altero idem sit acrior, & si alter idem nenter ager est, ne sine cane grex sit. Cum circūspiceret Atticus nequid præterisset, hoc silentium inquam uocat aliū ad partes.

De pastoribus.

Cap. XVII.

RELIQVVM enim est in hoc actu quot, & quod genus sint habendi pastores. Cossinius ad maiores pecudes ætate superiores, ad minores et pueros, & utroque horum firmiores, qui in collibus uersantur, qui eos, qui in fundo, & quotidie ad uillam redeunt. Itaque in saltibus licet uidere inuentutem, et eam ferè armatam, cum in fundis non modo pueri, sed etiam puellæ pascant. Qui pascunt in saltibus,

greges cogere oportet, in pastione diem totum esse, pascere communiter. Contra, pernoctare ad suum quēq; gregem, esse omnes sub uno magistro pecoris, eum esse maiorem natu potius q̄ alios, & peritiorē q̄ reliquos, quod ijs, qui etate, & scientia p̄stant, animo equiore reliqui parent. Ita tamē oportet etate prestare, ut ne propter senectutem minus sustinere possit labores. Neq; n. senes, neq; pueri collum difficultatem, aut montium arduitatē, atq; asperitatem facile ferunt, quod patiendum illis, qui greges sequuntur, presertim armentitios, ac caprinos, q̄bus rupes, ac syluæ ad pabulandum cordi. Formæ hominum legenda, ut sint firmæ, ac ueloces, mobiles, expeditis membris, qui non solum pecus sequi possint, sed etiā à bestijs, ac prædonibus defendere, qui onera extollere in iumenta possint, qui excurrere, qui iaculari. Non omnis apta natio ad pecuariam, quod neq; basculus, neq; turdulus idonei, galli appositi, sed maxime ad iumenta. In emptionibus dominum legitimum sex ferè res perficiunt, si hæreditatem iustam adiit, si, ut debuit, mancipio ab eo accepit, à quo iure civili potuit, aut si in iure cesserit cui potuit cedere, & id ubi oportuit, aut si usucepit, aut si è præda sub corona emit. Tumue cū in bonis sectione cuius publicæ uenit. In horum emptione solet accedere peculium, aut si exapi & stipulatio, intercedere sanum eum esse, furtis, noxisq; solutum. Aut si mancipio non datur, dupla p̄mitti, aut si ita pacti, simpla. Cibus eorum debet esse interdum separatim uniuscuiusq; gregis. Vespertinus in cœna, qui sunt sub uno magistro, cōmunis. Magistrū providere oportet, ut omnia sequantur instrumenta, quæ pecori, & pastoribus opus sunt, maxime ad uictum hominum, & ad medicinam pecudum. Ad quā rem habent iumenta diffusa domini, alij equas. Alij pro his quid aliud, quod onus dorso ferre possit. Quod ad facturam humanam pertinet pastorum, qui in fundo perpetuo manent, facile est, quod habeant conseruam in uilla, nec hac uenus pastoralis longius quid querit. Qui autem sunt in saltibus, & syluestribus locis pascunt, & non uilla, sed casis repentinos imbres uitāt, his mulieres adiungere, quæ sequantur greges, ac cibaria pastoribus expediant, eosq; assiduiore faciant, utile arbitrati multi. Sed eas mulieres firmas esse oportet, non turpes, quæ in opere, ut in multis regionibus non cedant uiris (ut in illyrico passim uidere licet, quæ uel pascere pecus, uel ad focum asferre ligna, ac cibum cōco-

quere, uel ad casus instrumentum seruare possint. De nutritura hoc dico, easdem ferè & nutrices, & matres. Tremellius, simul aspiciat ad me, & ut te audiui dicere inquit, cum in Lyburniam uenisses, te uidisse matres familias eorū, asserre ligna, & simul pueros quos alerent, alias singulos, alias binos, quæ ostēderent fœtas nostras, quæ in conopeis iacent dies aliquot, eē luridas, mutidas, & contemnendas. Cui ego, Certe inq̃. Nam in Illyrico hoc amplius, prægnantem sepe, cum uenit pariendi tempus, nō longe ab opere discedere, ibiq̃ enixam puerum referre, quem non peperisse, sed inuenisse putes. Nec non etiam hoc quas uirgines ibi appellant, nōnunquam annorum uiginti, quibus mos eorum non denegauit ante nuptias, ut succumberent quibus uellent, & in comitatas ut uagari liceret, & filios haberent ē quibus uellent. Quæ ad ualitudinem pertinet hominum, ac pecoris, ut sine me dico curari possint, magistrū scripta habere oportet. Is enim sine litteris idoneus nō est, q̃ rationes dominicas pecuarias conficere, nec quicquam recte potest. De numero pastorum alij angustius alij laxius constituere solent. Ego in octogenas hirtas oues singulos pastores constitui, Atticus in centenas. In gregibus ouium, sed magnis quos miliarios faciunt quidam, facilius de summa hominū detrabere possunt, quā de minoribus, ut sunt Attici. Tremellius. Septingenarij. n. mei, ut opinor, tu octingenarios habuisti. Nec tamen non ut nos arietum decimam partem. Ad equarum gregem quinquagenarium bini homines, utiq̃ uterq̃ horū ut secum habeat equas domitas singulas in ijs regionibus, in quibus stabularij solent equas abigere, ut in Apulia, & in Lucanis accidit sepe.

De lacte, caseo, & lana.

Cap. XVIII.

Q V O N I A M promissa absoluimus, eamus inquit. Sed inq̃ siquid adieceritis de extraordinario pecudum fructu, & de lacte in eo, & tonsura lanæ, Est enim lac omnium rerum, quas tibi cā capimus, liquentium maxime alibile, & id ouillum, inde caprinum. Quod autem maxime perpurget est equinū, tum asininū, deinde bubulum tum caprinum. Sed horū sunt discrimina quedam, & à pastionibus, & à pecudū natura, & à multu. A pastionibus, quod fit ab ordeo, & stipula, & omnino arido, & firmitate cibo pecude pasta, id alibile. Ad perpurgandum, id quod à

viridi pascuo, & eo magis fluxe ex herba, quæ eadē ipsa sumpta perpurigare corpora nostra solet. A pecudum natura, quod lac melius est à ualentibus, & ab ijs, quæ nondum ueteres sunt, q̄ si est contra. A mulgendo, atq; ortu optimum est id, quod neque emunctum longe abest à mulso, neque à partu continuo est sumptum. Ex hoc lacte casei qui fiunt maximi aibi sunt bubuli, et qui difficillime transeant sumpti. Secundo ouilli minimi aibi, & qui facillime deiciantur, caprini. Est etiam discrimen, utrū casei molles, ac recentes sint, an aridi, & ueteres. Cum molles sunt, magis alibiles, in corpore nō resides, ueteres & aridi cōtra. Caseum facere incipiunt à uergilijs uernis exortis ad æstinas uergilias. Mulgent uere ad caseum faciendum mane, alijs temporibus, meridianis horis, tametsi propter loca, & pabulum disparile, nō usquequaq; idem fit. Lactis duobus congijs addunt coagulum magnitudine oleæ, ut coeat, quod melius leporinum, et hœdinū q̄ agninum. Alij pro coagulo addunt de ficiramo lac, & acetum, & aspergunt item alijs aliquot rebus, qd̄ græci appellant alijs δ'ω'ον, alijs δ'γα'ν'ο'υ'τ'ιο'ν. Non negarim inquam ideo apud diuæ Rumiæ sacellum à pastoribus satam ficum. Ibi enim solent sacrificare lacte pro uino, & pro lactentibus, mammæ enim rumis, siue Rumiæ, ut ante dicebant, à rumi, & inde dicuntur subrumi agni, lactentes, à lacte. Quin aspergi solent sales, melior fossilis q̄ marinus. De tonsura ouium primum animaduerto ante q̄ incipiā facere, num scabiem, aut ulcera habeant, ut, si opus est, ante curentur, q̄ tondeantur. Tonsuræ tempus inter æquinoctiū uernum, & solstitium cū sudare cœperint oues, à quo sudore recens lana tonsa succida est appellata. Tōsas recentes eodem die perungunt oleo, et uino, nō nemo admista cera alba, & adipe skillo. Et si ea tecta solet esse, quā habuit pellem iniectā, eā intrinsecus eadem re punpunt, et tegunt rursus. Siqua in tōsura plagā accepit, eum locū obliniunt picæ ligda. Oues hirtas tondent cititer ordeaceam messem, in alijs locis ante fœnificia. Quidam has in anno bis tōdent, ut in Hispania citiore, ac semestres faciunt tōsuras, duplicē impendūt operā, quod sic plus putant fieri lanæ, quo nomine quidā bis secant prata. Diligentiores tegeticulis subiectis oues tōdere solēt, ne flocci intereāt. Dies ad eā rē sumunt se reni, et ijs id faciūt ferè à quarta ad decimam horam, qm̄ sole calidior tōsa, ex sudore eius lana fit mollior, et pōderosior, et colore

meliore. Quam demptam, et conglobatam alij uellera, alij uel-
 lumia appellant, ex quorum uocabulo animaduerti licet, prius
 lanæ uulsuram quàm tonsuram inuentam. Qui etiam nunc uellunt,
 ante triduo ieiunas habent, quod languidæ minus radices lanæ
 retinent. Omnino tonsores in Italia primum uenisse ex Sicilia di-
 cuntur post Romam conditam anno quadringentesimoquinqua-
 gesimoquarto, ut scriptum in publico ardeæ in litteris extat, eosque
 adduxisse Publium Ticiuum Menam. Olim tonsores non fuisse ad-
 significant antiquorum statuae, quod pleræque habent capillum, et
 barbam magnam. Suscipit Cossinius. Ut fructum omnis est lana ad
 uestimentum, sic capra pilos ministrat ad usum nauticum, et ad
 bellica tormenta, et fabrilia uasa. Neque non quædam nationes ha-
 rum pellibus sunt uestitæ, ut in Cætulia, et Sardinia. Cuius usum
 apud antiquos quoque grecos fuisse apparet, quod in tragædijs se-
 nes ab hac pelle uocantur *δυσπερίαι*, et in comædijs, qui in rus-
 tico opere morantur, ut apud Cæcilium in hypobolimæo habet
 adolescens, apud Terentium in heautontimorumenos senex. Ton-
 dentur, quod magnis uillis sunt in magna parte Phrygiæ, unde
 cilicia, et cetera eius generis ferri solent. Sed quod primum ea
 tonsura in Cilicia sit instituta, nomen id alicas adiecisse dicunt.
 Illi hoc, Neque ab hoc, quod mutaret Cossinius, et simul Vitu-
 li libertus in urbem ueniens ex hortis diuertitur ad nos, et ego ad
 te missus inquit ibam, domum rogatum, ne diem festum faceres
 breuiorem, et mature uenires. Itaque discedimus ego, et Scrofa in
 hortos ad Vitulum Nigrum Turannium. Mox illi partim do-
 mum, partim ad Lenatem.

65

M. TERENTII VARRONIS DE RE RV
STICA AD.Q.PINNIVM DE VIL
LATICIS PASTIONIBVS
LIBER TERTIVS
ET VLTIMVS.

UM DVAE VITAE TRADITae
sint hominum, rustica, et urbana. Q. Pinni,
dubium non est, quin haec non solum loco discre
tae sint, sed etiam tempore diuersam originem
habeant, antiquior enim multo rustica, quod
fuit tempus, cum rura colerent homines, neque
urbem haberent. Etenim uetustissimum op
pidum cum sit traditum graecum, Boeotiae Thebae, quod rex Ogy
ges edificarit, in agro romano Roma, quam Romulus rex. Nam
in hoc nunc denique est, ut dici possit, non cum Ennius scripsit,
Septingenti sunt paulo plus, aut minus anni,
Augusto augurio postquam incluta condita Roma est.
Thebae, quae ante cataclysmum Ogygi conditae dicuntur, et tamen
arriter duo millia annorum et centum sunt. Quod tempus si re
feras ad illud principium, quo agri coli sunt coepti, atque in casis, et
tugurijs habitabant, nec murus, nec porta quid esset sciebant, im
mani annorum numero urbanis agricolae praestant. Nec mirum,
quod diuina natura dedit agros, ars humana edificauit urbes.
Cum artes omnes dicantur in Graecia intra mille annorum reper
tae, agri nunquam non fuerunt in terris, quae coli possint. Neque solum an
tiquior cultura agri, sed etiam melior. Itaque non sine causa maio
res nostri ex urbe in agris redigebant suos ciues, quod et in pace
a rusticis Romanis alebantur, et in bello ab his tuebantur. Nec
sine causa terram eandem appellabant matrem, et cererem, et quae
eam colerent, piam et utilem agere uitam, credebant, atque eos solos re
liquias esse ex stirpe Saturni regis. Cui consentaneum est, quod ini
tia uocantur potissimum ea, quae Cereri sunt sacra. Nec minus
oppidi quoque nomen Thebae indicant antiquiorem esse agrum,
quod ab agri genere non a conditore ei nomen est impositum.
Nam lingua prisca et in Graecia aeoles Boeoty sine afflatu uocant
aeolis Thebas, et in Sabinis quod est Graecia uenerunt Pelasgi, etiam
nunc ita dicunt. Cuius uestigium in agro sabino uia salaria non

Varro.

i

M. VARRONIS.

longe à Reate nulliarius cliuus appellantur Thebæ, Cum agri culturam primo propter paupertatem maxime indiscretam haberent, quod à pastoribus, qui erant orti in eodem agro & serebant, & pascebant, q̄ postea creuerunt, peculia diuiserunt, ac factum ut dicerentur alij agricolæ, alij pastores. Quæ ipsa pars duplex est, tametsi ab nullo satis discreta, qđ altera est uillatica pastio, altera agrestis. Hæc nota & nobilis, quod & pecuaria appellatur, & multum homines locupletat, & ob eam rem aut cōductos, aut emptos habent saltus. Altera uillatica, quod humilis uidetur, à quibusdam adiecta ad agriculturam cum esset pastio neq; explicata tota separatim, quod sciam ab ullo. Itaque cum putarem esse rerum rusticarum, quæ constituta sunt fructus causa tria genera, unum de agricultura, alterum de re pecuaria, tertium de uillaticis pastionibus, tres libros institui. E quis duos scripsi, primum ad Fundaniam uxorem de agricultura, secundum de pecuaria ad Turannium Nigrum. Qui reliquus est tertius de uillaticis fructibus in hoc ad te mitto, quod uisus sum debere pro nostra uicinitate, & amore scribere potissimum ad te. Cum enim uillam haberes opere tectorio, & intestino, ac pauimentis nobilibus lithostrotis spectandam, parū putasses eē, ni tuis quoq; literis exornati parietes essent. Ego quoq; quo ornatioꝝ ea eē posset fructu q̄ factu, quoad facere possem, hæc ad te misi, recordatus de ea re sermones, quos de uilla perfecta habuisset mus. De quibus exponendis, initium capiam hinc.

De uillis & earum uaria specie.

Cap. I.

COMITIIS ædilijs cum sole caldo ego, atq; Axius senator tribulis suffragium tulissemus, et candidato, cui studebamus, uellemus esse præsto, cum domum rediret, Axius mihi, dum diribētur inquit, suffragia, uis potius uillæ publicæ utamur umbra, q̄ priuati candidati tabella, dum ita ædificemus nobis? Opinor inquam non solum quod dicitur, Malum consilium consultori eē pessimum, sed etiam bonum consilium, qui consulit, & qui consulitur, bonum habendum, itaque imus, uenimus in uillam. Ibi Appium Claudium augurem sedentem inuenimus in subfellis, ut consuli, siquid usus poposisset, esset præsto. Sedebat ad sinistram eius Cornelius Merula consulari familia ortus, & Fircellius Pano reatinus, ad dexterā Minutius Pica, & M. Petro

ninus Passer. Ad quē cum accessissemus, Axius Appio subridens, recipis nos inquit, in tuum ornithona, ubi sedes inter aues? Ille, Ego uero inquit te, presertim cuius aues hospitales etiam nūc ruitor, quas mihi apposuisti paucis ante diebus in uilla reatina ad lacum Velini eūti de controuersijs Interaminatum, & reatinore cognituro. Sed non hęc inquit uilla, quāquam edificarint maiores nostri, frugalior, & melior est, quā tua illa perpolita in Reatino. Nunc ubi hic uides atrum, aut aurum? num miniū, aut armonium? num aliquod emblemā, aut lithostrotum? quæ illic omnia contra. Et cum hęc sit communis uniuersi populi, illa solius tua. Hęc quō succedant ē campo ciues, et reliqui omnes, illa quō equæ & asini. Præterea cum ad remp. administrandam hęc sit utilis, ubi cohortes ad delectum consuli adductæ confidunt, ubi arma ostendant, ubi censores censu admittant populum. Tua inquit Axius, hęc in campo martio extremo utilis, & non delitjs sumptuosior, quā omnes omnium reatinæ, tum & oblita tabulis est pictis, nec minus signis ornata. At meam uestigium ubi sit nullum Lysippi, aut Antiphyli uidebis, sed crebrum satoris, & pastoris, & cum uilla non sit sine fundo magno, & eo polito cultura, tua ista neq; agrum habet ullum, neq; bouem, nec equam. Deniq; quid tua habet simile uillæ illius, quam tuus auus, & pater auus habebat? Nec. n. hęc ut illa scenificia uidet arida in tabulato, nec uindemiam in cella, neq; ī granario messē. Nā quod extra urbem est edificiū, nihilo magis, ideo est uilla, q̄ eorum edificiā, qui habitant extra portam flumentanā, aut in emilianis.

Appius subridens, Quoniam ego ignoro inquit, quid sit uilla, uelim me doceas, ne labar in imprudentiam, quod uolo emere a M. Seio in hostiensi, uillam. Quod si ea edificiā uillæ non sunt, quæ asinum tuū, quem mihi quadraginta millibus emptū ostendas apud te, non habēt, metuo ne pro uilla emam ostiæ in litore seianas ædes. Quod edificiū hic me Lucius Merula impulit, ut cuperem hñre, cum diceret nullam se accepisse uillam, quā magis delectatus esset, cū apud eum dies aliquot fuisset. Nec tñ ibi se uidisse tabulam pictam, neq; signū æneum, aut marmoreum ullū, nihilo magis torcula uasa uindemiatoria, aut ferias olearias, aut trapeta. Axius respicit Merulā, & qd igitur inqt est ista uilla? si nec urbana habet ornamenta, neq; rustica mēbra. Cui ille. Nō minus uilla tua erit uilla ad angulū Velini, quā neq; pictor

neq; tector uidit unquam, quam illa in rosea, quæ est polita opere tectorio eleganter, quam dominus habes communem cum asino. Cum significasset nuda, nihilo minus esse uillam eam, quæ esset simplex rustica, quæ eam, in qua esset utrunq; & rustica scilicet, & urbana, & rogasset quid ex his rebus colligeret. Quid inquit, si propter pastiones tuus fundus in rosea probandus sit, et quod ibi pasatur pecus, ac stabulatur, recte uilla appellatur. Hæc quoq; si mali de causa debet uocari uilla, in qua propter pastiones fructus capiuntur magni. Quid enim refert utrum propter oues, an propter aues fructus capias? an ne dulcior est fructus apud te ex bubulo pecore, unde apes nascuntur, quæ ex apibus, quæ ad uillam, in aluearijs opus faciunt? & num pluris nunc tu è uilla illic natos uerres lanio uendis, quæ hic apros miliarios emis? Qui minus ego inquit Axius istas habere possum in reatina uilla. Nisi si apud Seium Siculum sit mel corsicum in reatino, & hic aprum glans cum pasat empticia facit pinguem, illic gratuita exilem. Appius, Posse ad te fieri inquit seianas pastiones non negauit Merula, ego non esse ipse uidi. Duo enim genera cum sint pastionum. Vnum agreste, in quo pecuariæ sunt, alterum uillaticum, in quo sunt gallinæ, ac columbæ, & apes, & cætera, quæ in uilla solent pasca, de quibus & pœnus Mago, & Cassius Dionysius, & alij quid separatim, ac dispersim in libris reliquerunt, quos Seius legisse uidetur, & ideo ex his pastionibus ex una uilla maiores fructus capere, quæ alij faciunt ex toto fundo. Certe inquit Merula. Nam ibi uidi greges magnos anserum, gallinarum, columbarum, gruum, pauonum, nec non glirium, piscium, aprorum, & ceteræ uenationis, ex quibus rebus scriba librarius libertus eius, quæ apparuit Varroni, & me absente patrono, hospitio accipiebat, in annos singulos plus quinquagenam illia è uilla capere dicebat.

Axio admiranti, certe nosti inquam matertera mea fundum in Sabinis, qui est ad quartum & uicesimum lapidem uia salaria à Roma. Quidni inquit? ubi estate diem meridie diuidere soleam, cum eo Reate ex urbe, aut cum inde uenio hyeme noctu ponere castra. Atque in hac uilla qui est ornitho, ex eo uno quinquemillia scio uenisse turdorum denarijs ternis, ut sexagintam illia ea pars uillæ reddiderit eo anno, bis tantum quam tuus fundus ducentorum ingerum Reate reddit. Quid sexagintam illia inquit Axius? LX. LX. derides? sexaginta inquam. Sed ut ad hunc bot

lum peruenias, opus erit tibi aut epulum, aut triumphus alicuius, ut tunc fuit Scipionis Metelli, aut collegiorum cœnæ, quæ tunc innumerabiles, excañdefaciebant annonam macelli. Reliquis annis omnibus si hanc expectabis summam spero non tibi decoquet non ornithon. Neque hoc accedit his moribus, nisi raro, ne decipiaris. Quotus enim quisque est annus, quo non uideas epulum, aut triumphum, aut collegia non epulari, quæ nunc innumerabiles incendant annonam. Sed propter luxuriam inquit, quodammodo epulum quotidianum est intra iannas Romæ. Nonne ite. L. Albutius homo (ut satis) apprime doctus, cuius Luciliano characteres sunt libelli, dicebat in Albano fundum suum pastionibus semper uinci à uilla? agrum enim minus dena millia reddere, uillam plus uicena. Idem secundum mare quo loco uellet, si parasset uillam, se supra centum millia è uilla recepturum, Age non. M. Cato nuper cum Luculli accepit tutelam, è piscinis eius quadraginta millibus sextertijs uendidit pisces? Axius, Merula inquit recipere me quæso discipulum uillaticæ pastionis. Ille. Quin simulac promiseris munera, incipiam inquit. Axius. Ego uero non recuso, uel hodie, & ex ista pastione crebro. Appius. Credo simulac primum ex isto uillatico pecore mortui erunt anseres, aut pauones. Cui ille. Quid enim interest utrum mortuinas editis uolueres, an pisces? quos nisi mortuos estis nunquam? Sed oro te inquit, induce me in uiam disciplinæ uillaticæ pastionis, ac uim, formamque eius exponere Merula non grauari.

Quæ in uilla circūue eā ali uel pasci possint.

Cap. II.

PRIMUM inquit dominum scientem esse oportet eorum animalium, quæ in uilla, circum ue eam ali, ac pasci possunt, ita ut domino sint fructui, ac delectationi. Eius disciplinæ genera sunt tria, ornithones, leporaria, piscinæ. Nunc ornithonas dicam omnium alitum, quæ intra parietes uillæ solent pasci. Leporaria te accipere uolo, non ea, quæ tritani nostri dicebant, ubi soliti leporares sint, sed omnia septa affixa uillæ quæ sunt, & habent inclusa animalia, quæ pascantur. Similiter piscinas dico eas, quæ in aqua dulci, aut salsa inclusos habent pisces ad uillam. Harum singula genera minimum in binas species diuidi possunt. In prima parte ut sint, quæ terra modo sunt contenta, ut sunt pauones, turtures, turdi. Altera species eorum sunt, quæ non sunt contenta terra so-

i iij

M. VARRONIS.

lum, sed etiam aquam requirunt, ut sunt anseres, querquedulae, anates. Sic alterum genus illud uenaticum duas habet diuersas species. Vnam, in qua est aper, caprea, lepus. Altera item extra uillam, quae sunt, ut apes, cochleae, glires. Tertijs generis aquatilis item species duae, partim quae habent pisces in aqua dulci, partim quae in marina. De his sex partibus adhuc ista tria genera artificum comparanda aucupes, uenatores, piscatores, ut ab his emenda, quae tuorum seruorum diligentia tuearis in foetura ad partus, et nata nutrire, saginareque, in macellum ut perueniant. Neque non etiam quaedam assumenda in uillam sine retibus aucupis, uenatoris, piscatoris, ut glires, cocleae, et gallinae. Earum rerum cultura instituta prima, ea, quae in uilla habentur, non solum augures Romani ad auspicia primum pararunt pullos, sed etiam patres familiae rure. Secunda, quae macerie ad uillam uenationis includuntur, et propter aluearia. Apes enim subter subgrundas ab initio uillatico usque tecto. Tertia piscinae dulces fieri coeptae, et ex fluminibus captos recipere ad se pisces. Omnibus tribus his generibus sunt bini gradus, superiores, quos frugalitas antiqua, inferiores, quos luxuria posterior adiecit. Primus enim ille gradus antiquus maiorum nostrorum erat, in quo essent auicaria, duo ducta, in plano cohors in qua pascebantur gallinae, et earum fructus erant oua, et pulli. Alter sublimis, in quo erant columbae in turribus, aut summa uilla. Contra nunc auicaria sunt nomine mutata, quod uocantur ornithones, quae palatum suae domini parauit, ut tecta maiora habeant, quam tum habebant tota uilla, in quibus stabulentur turdi, ac pauones. Sic in secunda parte, ac leporario pater tuus Axi praeterquam lepusculum ex uenatione uidit nunquam. Neque enim erat magnum id septum, quod nunc ut habeant multos apros, ac capras, complura iugera maceris concludunt. Non tum inquit mihi, cum emisisti fundum thysculanum ad M. Pisone in leporario apri fuerunt multi. In tertia parte quae habet piscinam, nisi dulcem, et in ea ductaxat scaros, ac mugiles pisces? Quis contra nunc rhynton non dicit sua nihil interesse, utrum his piscibus stagnum habeat plenum an ranis? Non Philippus cum ad Minidium hospitem cassini diuertisset, et ei ex uicino flumine lupum piscem formosum apposuisset, atque ille gustasset et expuisset, dixit, Peream ni piscem putari esse? Sic nostra aetas inquam, luxuriam propagauit leporaria, ac piscinas protulit ad

mare, & in eas pelagios greges piscium reuocauit. Non propter hos appellati Sergius Orata, & Lucius Murena? Quis enim propter nobilitatem ignorat piscinas Philippi, Hortensij, & Luculorum? Quare unde uelis me incipere Axi dic.

De auibus in genere.

Cap. III.

ILLE, ego uero inquit (ut aiunt post principia in castris). i. ab his potius incipiendum temporibus, quā superioribus, quod ex pauonibus fructus capiuntur maiores, quā ē gallinis. Atque adeo nō dissimulabo, quod uolo de ornithone primum, quod lucriferū hoc nomen turdi, sexaginta enim nullia fircellina exaudere me fecerunt cupiditate. Merula, Duo sunt inquit ornithonis genera. Vnum delectationis causa, ut Varro hic fecit noster sub casino, quod amatores inuenit multos. Alterum fructus causa, quo genere macellarij, & in urbe quidam habent loca clausa, & rure maxime conducta in Sabinis, quod ibi propter agri naturam frequentes apparent turdi. Ex his tertij generis uoluit esse Lucullus coniunctum auarium, quod fecit in Thusculano, ut in eodē tecto ornithonis inclusum triclinium haberet, ubi delicate cōnitaret, & alios uideret in mazonomo positos cōctos, alios uolitantes circa fenestras captos. Quod inutile inuenerunt. Nam non tantum in eo oculos delectant intra fenestras aues uolitantes, quantum offendit, quod alienus odor opplet nares.

De turdis.

Cap. IIII.

SED quod te malle arbitror Axi dicam, de hoc ornithōe, quod fructus causa faciunt, unde nōnulli sumuntur pingues turdi. Igitur testudo (ut peristylum tectum tegulis, aut rete) sit magna, in qua millia aliquot turdorum, ac merularum includere possint. Quidam cum eo adiungunt propter eas aues, alias quoque, quā pingues ueneunt care, ut milliariae, ac coturnices. In hoc tectū aq̄ uenire oportet per fistulā, & eā potius per canales angustas serpere, quā facile extergeri possint. Si. n. late ibi aqua diffusa, & inq̄nat facilius, & bibiū inutilius, et ex eis caduca, quā abundat, & exit per fistulam, facit, ut luto aues laborēt. Ostium hūc humile, & angustū, & potissimū eius generis, quā cochleam appellant, ut solet esse in cauea, in qua tauri pugnare solēt. Fenestras raras, per quas nō uideatur extrinsecus arbores, aut aues, quā earum aspectus, ac desir

derium macrescere facit uolucres inclusas. Tantum luminis habere oportet, ut aues uidere possint, ubi assidat, ubi cibum, ubi aqua sit. Tectorio tecta esse leui circum ostia, ac fenestras, ne qua intrare mus, alia ne quæ bestia possit. Circum huius ædificij parietes intrinsecus multos esse palos, ubi aues assidere possint. Præterea et perticas inclinatas ex humo ad parietem, et in eis transuersas alias gradatim mediis interuallis annexas ad speciem cancellorum scenicorum, ac theatri. Deorsum in terram esse aquam, quam bibere possint. Cibatum offas positas, eæ maxime glomerantur ex fideis, et farre misto. Diebus uiginti ante quam quis tollere uelit turdos, largius dat cibum, et aquæ plus ponit, et farre subtiliore incipit alere. In hoc tecto, caueaq; tabulata habeant aliquot ad perticæ supplementum. Contra hoc auariū est aliud minus, in quo quæ mortuæ ibi sunt aues, ut domino numerum reddat, curator seruare solet. Cum opus sunt ex hoc auario, ut sumantur idoneæ, excluduntur in minusculum auarium, quod est coniunctum cum maiore, ostio, et lumine illustriore, quod secluforium appellant. Ibi cum eū numerum habet exclusum, quæ sumere uult, cæs occidit. Hoc ideo in secluforio clam, ne reliqui, si uideant, despondeant animum, atq; alieno tempore uenditori moriatur. Non enim ut aduenæ uolucres faciunt pullos, ut in agro aconia, in tecto hirundines, sic aut hic, aut illic turdi, qui cum sunt nomine mares, re uera fœminæ quoq; sunt, neq; id non secutum ut esset in merulis, quæ nomine fœminino mares quoq; sunt. Præterea uolucres cum partim aduenæ sint, ut hirundines, et grues, partim uernaculæ ut gallinæ, ac columbæ. De illo genere sunt turdi aduenticio, ac quotannis trans mare in Italiam aduolant circiter æquinoctium autumnale, et eodem reuolant ad æquinoctium uernum. Et alio tempore turtures, ac coturnices immuni numero. Hoc ita fieri apparet in insulis propinquis Pontia, Palmaria, Pandataria. Ibi enim in prima uolatura cum ueniunt, morantur dies paucos requiescendi causa. Idemq; faciunt cum ex Italia trans mare remeant. Appius Axio, si quinq; millia hic conieceris inquit, et erit epulum, ac triumphus, sexaginta millia quæuis statim in fœnus des licebit. Tum mihi, tu dic illud alterū genus ornithonis, qui animi cā constitutus à te sub Cassino fertur, in quo diceris lōge uiasse nō modo archetypon inuentoris nri δευιδοτγο φειον. M. Lenij Strabonis, qui Brundisij hospes noster primus

in peristylo habuit exhedra conclusas aves, quas pasceret obiecto rete, sed etiam Thusculanum magnum ædificium Lucilli. Cui ego, cum habeam sub oppido cassino flumen, quod per uillam fluat liquidum, & altum, marginibus lapideis, latum pedes. LVII. & è uilla in uillam pontibus transatur, longum pedes. DCCCCL. directum ab insula ad Musæum, quæ est à Vinio fluuio, ubi confluit alter amnis ad summum flumen, ubi est Musæum, circum huius ripas ambulatio est sub dino, pedes lata denos. Ab hac ambulatione in agrum uersus, ornithonis locus ex duabus partibus dextra & sinistra maceris altis conclusus. Inter quas locus, qui est ornithonis, patet in latitudinem ped. XLVIII. deformatus ad tabule litterariæ speciem cum capitulo, forma quæ est quadrata, patet in longitudinem ped. LXXII. quæ ad capitulum rotundus est pedes XXVII. Ad hæc, ita ut in margine quasi infimo tabule descripta sit ambulatio, ab ornithone plumula, in qua media sunt canes, quæ iter in aream est. In limine in lateribus dextra, et sinistra porticus sunt primoribus columnis lapideis intermedys arbuticulis humilibus ordinate, cum à summa macerie ad epistylum tecta porticus sit rete canabina, et ab epistylion ad stilobatem hæ sunt anibus omne genus opplete, quibus abus administratur per rete, & aqua riuulo tenui affluit, secundum stilobatis interiorē partē dextra, ac sinistra ad summam aream quadratam, è medio diuersæ duæ non latæ, sed oblongæ sunt piscine ad porticus uersus. Inter eas piscine tantummodo accessus semita in tholum, qui est ultra rotundus columnatus, ut est in æde Catuli, si pro parietibus feceris columnas. Extra eas columnas est sylua manu sata, grandibus arboribus tecta, ut infima perluceat, tota septa maceris altis. Intra tholi columnas exteriores lapideas, et totidem interiores ex abiete tenues, locus est pedes quique latus. Inter columnas exteriores pro pariete reticuli è nervis sunt, ut perspicui in sylua possit, et quæ ibi sunt, neque anis ea transire. Intra interiores columnas pro pariete rete aniarum est obiectum. Inter has, et exteriores gradatim sunt strueta (ut & τει' δ' 104) anium mutulis crebris in omnibus columnis impositis sedilia anium. Intra rete aves sunt omne genus, maxime cantrices, ut lusiniolæ, ac merulæ, quibus aqua ministratur per canaliculum, abus obiectis sub rete. Subter columnarum stilobatem est lapis à falere pedem, & dodrantem altus, ipsum falere ad duos pedes. altum à stagno, latum ad quinq; ut in culitas, & columnellas conuine.

pedibus circumire possint. In fimo intra falere est stagnum cum margine pedali, & insula in medio parua. Circum falere, & natatilia sunt excavata anatum stabula. In insula est columnella, in qua intus axis, qui pro mensa sustinet rotam radiatam, ita ut ad extremum ubi orbile solet esse acutum, tabula cavata sit, ut tympanum in latitudinem duo pedes, & semipedem, in altitudinem palmum. Hæc ab uno puero, qui ministrat ita uertitur, ut omnia unâ ponantur, & ad bibendum, & ad edendum, & ad moueantur ad oēs conuiuas. Ex suggesto faleris, ubi solent esse *πρόδρομοι*, prodeunt anates in stagnum, ac nant, è quo riuus peruenit in duas, quas dixi, piscinas, ac pisciculi ultro, ac citro cōmeant, cum & aqua calida, et frigida ex orbe ligneo, mēsaq; quam dixi, in primis radijs eē epistomijs uersis ad unūquēq; factum, sic ut fluat in conuiuiam. Intrinsicus sub tholo stella lucifer interdiu, noctu hesperus, ita circumeunt ad infimum hemispherium, ac mouentur, ut indicent quot sint horæ. In eodem hemispherio medio arcū cardinem est orbis uentorum octo, ut Athenis in horologio, quod fecit Cyprestes. Ibiq; eminens radius à cardine ad orbem, ita mouetur, ut eum tangat uentum, qui flet, ut intus scire possis. Cum hæc loqueremur, clamor fit in campo. Nos Athletæ comitiorū unâ cum id fieri non miraremur propter studia suffragatorum, & tamen scire uellemus, quid esset, uenit ad nos Pantuleius Parra. Narrat ad tabulam, cum decumberet, quendam deprehensum tesserulas coniciantem in loculum, eum ad consulem tractum à fautoribus competitorum. Pauo surgit, quod eius candidati custos dicebatur deprehensus.

De paonibus.

Cap. V.

A X I V S DE Paone inquit libere licet dicas, quoniam diu scēssit Fircellius, qui secus siquid diceret de his gentilitatis causa fortasse ante eum, duceret ferram. Cui Merula de paonibus nostra memoria inquit, greges haberi cœpti, & uenire magno. Ex his. M. Aufidius Lurco supra sexagena millia nummum in anno dicitur capere. Hi aliquanto pauciores esse debent mares, q̄ fœminæ, si ad fructum spectes, si ad delectationem contra, formosior enim mas. Paonum greges agrestes transmarini esse dicuntur in insulis, Sami in luo Iunonis. Item in Planasia insula M. Pisonis. Hi ad greges constituendos parâtur bona etate, et bona for-

ma. Huic enim natura formæ è uolucris dedit palmam. Ad admissuram hæ minores binæ non idoneæ, nec iam maiores natu. Pascuntur omne genus obiecto frumēto, maxime ordeo. Itaq; Seius his dat in menses singulos, ordeī singulos modios, ita ut in fœtura det uberius, ante q̄ salire incipiant. Is à procuratore ternos pullos exigit, eosq; cum creuerint, quinquagenis denarijs uendit, ut nulla onis hunc assequatur fructū. Præterea oua emit, ac supponit gallinis, ex quibus ex his excussos pullos refert in id tectū, in quo pavones habet, quod magnū pro multitudine pavonū fieri debet, & habere cubilia discreta, tectorio lenata, quo neq; serpens, neq; bestia ulla accedere possit. Præterea locum hñe ante se, quò pastum exeant diebus apertis. Vtrūq; locum purum esse uolunt hæ uolucres. Itaque pastorem earum cum batillo circumire oportet, ac sterces tollere, ac conseruare, quod & ad agriculturā idoneum est, & ad substramen pullorum. Primus hos. Q. Horatius augurali adiciāli, cœna posuisse dicitur, quod potius factum tū luxuriosi, q̄ seueri boni uiri laudabant. Quem cito secuti multi extulerunt eorum pretia, ita ut oua eorum denarijs uenerant quinīs, ipsi facile quinquagenis, grex centenarius facile quadragena millia sextertia ut reddat, ut quidam Albutius aiebat, si in singulos ternos exigeret pullos, persiā sexagena posse.

De columbis.

Cap. VI.

INTEREA uenit apparitor Appiū à consule, & augures ait citari. Ille foras exit è uilla. At in uillam intro inuolant columbæ, de quibus Merula, Axi Si unq̄ πῶδες ἐστὶν οὐρανίου constituisse, has tuas esse putares, quāuis feræ essent. Duo enim genera earū in πῶδες ἐστὶν οὐρανίου esse solent. Vnū agreste, ut alij dicunt saxatile, quod habetur i turribus, ac columinibus uillæ, à quo appellatæ columbæ, quæ propter timorē naturalem summa loca in tectis captāt. Quo fit, ut maxime agrestes sequantur turres, in quas ex agro euolant suapte sponte, ac remeant. Alterū genus colūbarū est clemētius, qd̄ cibo domestico contentū intra limina iannæ solet pasi. Hoc genus maxime est colore albo. Illud alterū agreste sine albo, uario. Ex his duabus stirpibus fit miscellū tertiū genus fructus cā, atq; incedunt in locū unū, qd̄ alij uocāt πῶδες ἐστὶν οὐρανίου, alij πῶδες ἐστὶν οὐρανίου, in q̄ uno sepe, uel quinq; millia sunt incluse. πῶδες ἐστὶν οὐρανίου sit, ut testudo magna camera tectus, uno ostio āgusto

fenestris punicanis, aut lationibus, reticulatis utrinque, ut locus ois sit illustris, ne uer serpens, aliud uer quod animal maleficu introire queat. Intrinsecus quamlenissimo marmorato toti parietes, ac camerae oblinuntur, & extrinsecus circum fenestras, ne mus, aut lacerta qua, adrepere ad columbaria possit. Nihil enim timidius columba. Singulis paribus columbaria sunt rotunda in ordine crebra. Ordines quamplurimi possunt a terra usque ad cameram. Columbaria singula esse oportet, ut hos habeant, quo introire, & exire possint. Intus ternoru palmorum ex omnibus partibus. Sub ordines singulos tabulae fictae, ut sint bipalmes, quo utatur uer stibulo, ac prodeant. Aquam puram esse oportet, quae insuat, unde & bibere, & ubi se lauare possint. Permunda sunt enim haec uolucres. Itaque pastorem columbaria quotquot mensibus crebro oportet euerrere. Est enim quod eum inquinat locum appositum ad agriculturam, ita ut hoc optimu esse scripserint aliquot, siue si columba quid offenderit, ut medeatur, si qua perierit, ut effera tur. Siqui pulli idonei sunt ad uendendu, promat. Item quae foetae sunt, ut certum locum discclusum ab alijs rete habeant, quo transferantur, e quo foras euocare possint matres. Quod quidem faciunt duabus de causis. Vna si fastidiunt aut incluse consenescent, quo libero aere cum exierint in agros redintegrentur. Altera de causa propter illiam. Ipsae enim propter pullos, quos habent, utique redeunt, nisi a coruo occisa, aut ab accipitre interceptae. Quos columbarij interficere solent, duabus uirgis uiscatis defixis in terram inter se curuatis, cum inter eas posuerint obligatum animal, quod intercipere soleant accipitres, qui ita decipiuntur, cum se oblerint uisco. Columbas redire solere ad locu licet aduerte re, quod multi in theatro esse uisitas faciunt, atque ad locu redeunt, quae nisi reuerterentur, non emitterent. Et cibis apponitur circum parietes in canalibus, quas extrinsecus per fistulas supplent. Delectatur milio, tritico, ordeo, piso, faseolis, eruo. Item feras has in turribus, ac summis uillis, qui habent agrestes columbas, quoad possunt imittunt in πῶδες ἐσθλας etate bona, parantque ut nec pullos, neque uetulas, totidemque mares quot foeminas habeant. Nihil colubis foecudius. Itaque diebus quadragenis concipit, et parit, et incubat, et educat, & hoc fere totu annu faciunt. Tantummodo interuallu faciunt a bruma ad aequinoctiu uernu. Pulli nascuntur bini, qui simulac creuerunt, & habent robur, cum matribus pariunt.

Qui saginare solent pullos columbinos, quo pluris uendant, secludunt eos, cum iam pluma sunt tecti. Deinde manducato candido faciunt pane, hyeme hoc bis, æstate ter, mane, meridie, uesper, hyeme demunt cibum medium. Qui iam pinnas habere incipiunt, in nido relinquunt illis cruribus, & matribus, uberius ut cibo uti possint, obiciunt. Eo enim totum diem se, & pullos pasunt. Qui ita educant, celerius pinguiore quam alij fiunt, & candidiores, parentes eorum Romæ, si sunt formosi, bono colore, integri, boni seminis, paria singula uulgo ueneunt ducentis numis, nec non eximia singulis millibus numum, quas nuper cum mercator tanti emere uellet à L. Axio equite Romano, minoris quadringentis denarijs daturum negauit. Axius, Si possem inquit, emere πρὸς ἐγὼ factum, quemadmodum in ædibus esse habere uellem, fictilia columbaria, iam uissem emptum, & misissem ad uillam. Quasi uero inquit Pica, non in urbe quoque sint multi, columbaria qui in tegulis habent. An tibi non uident habere πρὸς ἐγὼ, cum aliquot supra centum millium sextertium habeant instrumentum? è quis alicuius totum emas censeo, et ante quàm ædifices rure, magnum condiscas hic in urbe quotidie lucrum ex asse semissem condere in loculos.

De turturibus.

Cap. VIII.

AXIVS, tu Merula deinceps perge. Ille, Turturibus inquit, locum constituendum proinde magnum, ac multitudinem alere uelis. Eumque item, ut de columbis dictum est, ut habeat ostium, ac fenestras, & aquam puram, ac parietes, & cameras munitas tectorio. Sed pro columbarijs in pariete mutulos, aut palos in ordine, supra quos tegeticulæ cannabinæ sint impositæ. Infimū ordine oportet abesse a terra non minus tres pedes, inter reliquos dodrantes, à summo ad cameram ad semipedem, æque late mutuli à pariete extare possunt, in quibus dies, noctesque pascuntur. Cibari quod sit obiciunt triticū siccum in centenos uicenos turtures ferè semodiū, quotidie euerretes eorum stabula, à stercore ne offendantur, quod item seruatur ad agrum colendum. Ad saginandum appositissimum tempus ariter messeni. Etenim matres eorum tunc optime sunt, cum pulli plurimi gignuntur, qui ad farturam meliores. Itaque eorum fructus id temporis maxime consistit.

A X I V S. Eho, quæ requiro à fæctura affanda, membra de pa-
 lumbis, & gallinis dic fodes Merula, tum de reliquis, siquid ido-
 neum fuerit, rōinari licet. Ille. Igitur sunt, gallinæ quæ uo-
 cantur, generum trium, uillaticæ, & rusticæ, & africanæ, Galli-
 næ uillaticæ sunt, quas deinceps rure habent in uillis. De his qui
 οὐκ ἔστιν ἰσχυρὸν instituire uolunt, ydem adhibita scientia, ac ca-
 ra, ut capiant magnos fructus (ut maxime fæctitauerunt delia) hæc quinque animaduertant oportet. De emptione, cuiusmodi, &
 quamultas parent. De fœtura, quemadmodum admittant, et
 pariant. De ouis, quemadmodum incubent, & excudant. De
 pullis quemadmodum, & à quibus educantur. Hiscæ appendix
 adiutur, pars quæta quemadmodum saginētur. E quis tribus ge-
 neribus proprio noīe uocantur fœminæ, quæ sunt uillaticæ, galli-
 næ, mares galli, capi semimares, quod sunt castrati. Gallos castrāt
 ut sint capi, candenti ferro inurentes calcaria ad infima crura us-
 que dum rumpantur, at quod extat ulcus, obliniunt figlina cre-
 ta. Qui spectat, ut οὐκ ἔστιν ἰσχυρὸν perfectum habeat, sint licet
 ei tria genera, parāda, maxime uillaticas gallinas oportet, è quibus
 in parando eligat fœcundas, plerumque rubicunda pluma, nigris
 pinnis, imparibus digitis, magnis capitibus, crista erecta ampla.
 Hæ enim ad partiones sunt aptiores. Gallos salaces, qui animadu-
 uertunt si sunt lacertosi, rubenti crista, rostro breui, acuto, oculis,
 ravis, aut nigris, palea rubra subalbicāti, collo uario, aut aureo
 lo, fœminibus pilosis, cruribus breuibus, unguibus lōgis, caudis
 magnis et frequētibus pinnis. Itē qui elati sunt, ac uociferant sæpe
 in certamine pertinaces, & qui animalia, quæ nocent gallinis,
 non modo pertimescant, sed et pro gallinis propugnent. Nec tñ
 sequendum in seminio legendo tanagricos, ac medicos, & chal-
 cidicos, qui sine dubio sunt pulchri, & ad præliandū inter se ma-
 xime idonei, sed ad partus sunt steriliores. Si ducētas alere uelis,
 locus septus attribuendus, in quo duæ cauæ cōiunctæ magnæ cō-
 stituendæ, quæ spectent ad exorientē uersus, utraq; in longitudi-
 nem arāter decem pedes, latitudine dimidio minores, altitudine
 paulo humiliores. Vtriusque fenestræ latitudine tripedali, & eo pe-
 de altiores è uiminibus fæctæ raris, ita ut lumen pbeant multum
 neque per eas quicquā ire intro possit, quod nocere solet gallinis. Inter

duas ostium sit, quæ gallinarius curator earum ire possit. In ca-
ueis crebræ perticæ traiectæ sint, ut oēs sustinere possint gallinas.
Contra singulas perticis in pariete exculpta sint cubilia earum,
ante sit (ut dixi) uestibulum septum, in quo diurno tpe esse pos-
sint, atq; in pulvere uolutari. Præterea sit cælla grandis, in qua
curator habitet, ita ut in parietibus circum omnia posita sint cu-
bilia gallinarum, aut exculpta, aut afficta firmiter. Motus enim
cū incubant nocet. In cubilibus, cum parturient, acis substernen-
dum, cū pepererint, tollere substramen, & recens aliud subijcere,
quod pulices, & cætera nasci solent, quæ gallinam conquiescere
non patiuntur, ob quā rem oua aut inæquabiliter maturescunt, aut
consenescent. Quæ uelis incubet, negant plus uiginti q; oport-
tere oua incubare, quæ propter fecunditatem pepererit plura.
Optimum eē partum æquinoctio uerno, ad autūnale, itaq; quæ
ante, aut postea nata sunt, & et prima eo tpe, non supponēda,
& ea, quæ subijcias, potius ē uetulis, q̄ ē pullastris, & quibus su-
bijcias rostra aut ungues non habeant acutos, quæ debēt potius
in conāpiendo occupatæ esse q̄ in cubādo. Appositissimæ ad par-
tum sunt anniculæ, aut bimæ. Si oua gallinis pavonina subijci-
es, cum iā decem dies pavonina fouere cœpit, tum deniq; gallina
cæa subijcere, ut unā excudant. Gallinæis enim pullis bis deni
dies opus sunt, pavoninis ternoueni. Eas includere oportet, ut di-
em, & noctem incubent, præterq̄ mane & uespere dum abus, ac
potio his detur. Curator oportet circumeat diebus interpositis ali-
quot, ac uertere oua, ut æquabiliter concalescāt. Oua plena sint,
atq; utilia, necne, anima duerti aiunt posse, si demiseris in aquā,
quod inane natat, plenum desidit. Qui (ut hoc intelligant) cō-
atiunt, errare, quod in eis uitales uenas confundūt. In ijs idem
aiunt, cum ad lumen sustuleris, quod perlucet, id esse ob inane.
Qui hæc uolūt diutius seruare, pficiāt sale minuto, aut muria,
atq; ita sinūt tres aut q̄tuor horas, eaq; abluta cōdūt in fursures
aut acis. In supponendo oua obseruant, ut sint numero iparia.
Oua, q̄ incubātur, si habeant in se semē pulli, curator quatriduo
postq̄ incubari cœperint, intelligere pōt, si contra lumen tenuit,
& purū uniusmodi esse aiaduenerit, putant eijciendū, & aliud
subijciendū. Excisos pullos subducendū ex singulis nidis, et subij-
ciendū ei, quæ habeat paucos. Ab eaq; si reliqua sint oua pauco-
ra, tollēda, et subijciēda alijs, q̄ non dū excuderint, et minus ha-

M. VARRONIS.

bent triginta pullos. Hoc enim gregem maiorem non faciendum. Obiciendum pullis diebus quindecim primis mane subiecto pulvere (ne rostris noceat terra dura) polentam mistam cum nasturcy semine, & aqua aliquanto ante facta intrita, & ne tū denique in eorum corpore turgescat, aqua prohibendum. Quando de clunibus coeperint habere pinnas, è capite, & è collo eorum crebro eligendi pedes, Sæpe. n. propter eos consenescent. Circum caueas eorum incendendum cornu æruinum, ne qua serpens accedat, quarum bestiarum ex odore solent interire. Prodigendi in solem, & sterquilinum, ut se uoluntate possint, quod ita alibiliores fiunt. Neque pullos tantum, sed omne ὄρνιθος cum estate, tū utiq; cum tempestas est, molle, atq; apricum eligi debet inteto supra rete, quod prohibeat eas extra septa uolare, & in eas inuolare extrinsecus acapitrem, aut quid aliud. Euitare item caldore, & frigus oportet, quod utrunq; his aduersum. Cum iam pinnas habebunt, consuefaciendum, ut unam aut duas gallinas sectentur. Ceteræ ut potius ad pariendum sint expeditæ q̄ in nutritu occupatæ. Incubare oportet incipe secundū nouam lunā, quod ferè q̄ ante, pleraq; nō succedunt. Diebus ferè uiginti excidunt. De q̄bus uillaticis (qm̄ uel nimirū dictum) breuitate reliqua compensabo. Gallinæ rusticæ sunt in urbe raræ, nec ferè mansuetæ sine cauea uidentur Romæ, similes facie non his uillaticis gallinis nostris, sed Africanis aspectu, ac facie incontaminata. In ornatibus publicis solent poni cum psittacis, ac merulis albis item alijs id genus rebus inusitatis. Neq; ferè in uillis oua, ac pullos faciunt, sed in syluis. Ab his gallinis dicif insula Gallinaria appellata, quæ est in mari thurisco secundum Italiam contra montes Ligusticos, uintimillium albingaunium, alij ab his uillaticis inuectis à nautis ibi feris factis procreatis. Gallinæ africane sunt grædes, uariæ, gibberæ, quas μελαγγεῖδες appellant græci. Hæ nouissimæ in triclinium ganearium introierunt è culina propter fastidium hominum. Veneunt propter penuriam magno. De tribus generibus, gallinæ saginantur maxime uillaticæ. Eas includunt in locū tepidum, & angustum, & tenebrosū, quod motus earum, & lux pinguitudini inimica, electis ad hanc rem maxinis gallinis, nec continuo his, quas melicas appellant falso, quod antiqui ut thetinthelim dicebāt, sic medicam melicam uocabāt. Hæ primo dicebantur quia ex Media propter magnitudinem erant allatæ, quæq; ex

quæq; ex his generatæ postea propter similitudinē. Amplas oēs ex his, euulsis ex alis pinnis, et cauda faciunt turundis ordeaceis partim admistis ex farina loliacea, aut semine lini ex aqua dulci. Bis die cibum dant, obseruantes ex quibusdam signis, ut prior sit concoctus, q̄ secundum dent. Dato cibo, tum perpurgāt caput nequos habeant pedes, rursus eas concludunt. Hoc faciunt usque ad dies vigintiquinq;. Tum deniq; pingues fiunt. Quidā ex triticeo pane intrito in aquam misto uino bono, & odorato faciunt, ita ut diebus viginti pingues reddant, ac teneras. Si in faciēdo nimio cibo fastidiunt, remittendum in datione pro portione, sic ut decem primis præssit, in posterioribus, ut diminuat eadem ratione, ut uigessimus dies, & primus sit par. Eodem modo palumbes faciunt, ac reddunt pingues.

De anseribus.

Cap. IX.

TRANSI inquit Axius nunc in illud genus, quod uos philogetæ uocatis ἀμφίβιον, quod non est ulla uilla, ac terra contentum, sed requirit piscinas, quas, quia ibi anseres aluntur, noie χηνοβοσκείον appellatis. Horum greges Scipio. Metellus, & M. Seius habent magnos aliquot. Merula, Seius inquit, ita greges comparauit anserum, ut hos quinq; gradus obseruaret, quos in gallinis dixi. Hi sunt de genere, de sætura, de ouis, de pullis, de sagina. Primum iubeat seruum in legēdo obseruare, ut eēnt ampli, & albi, quod plerunq; pullos similes sui faciunt. Est enim alterū genus uarium, quod seruum uocatur, nec cum his libenter congregatur, nec æque sit mansuetus. Anseribus ad admittendū tempus aptissimum est à bruma, ad pariendum, & incubandū à Cal. Martij usq; ad solstitium. Saliunt serē in aqua, dū se mergunt in flumen, aut piscinam. Singulæ non plus quater in anno pariunt. Singulis ubi pariunt, faciūndum haras quadratas circū binos pedes, & semipedem. Eis substernendum palea. Notandū earum oua aliquo signo, quod aliena non excidunt. Ad incubandū supponunt plerunq; nouem, aut undecim. Qui hoc minus septem, qui hoc plus quindecim. Incubat tempestatibus dies triginta, tepidioribus uigintiquinque. Cum excudit, quinq; diebus primis patiuntur esse cū matre. Deinde quotidie serenū cum est, producant in prata in piscinas, aut paludes, hisq; faciunt haras supra terrā aut subtus, in quis non includāt plus uicenos pullos.

Varro.

k

M. VARRONIS.

Easq; cellas provident ne habeant in solo humorem, sed habeant molle substramen è palea, alia ne qua re, né ue eò accedere possint mustellæ, alia ne bestia, quæ noceant. Anseres pascunt in humidis locis, ubi pabulum ferunt, quod aliquem fructum ferat, seruntq; his herbam, quæ vocatur seris, quod ea aqua tacta etiam cum est arida, fit viridis. Folia eius decerpentes dant, ne si comederint, ubi nascitur, aut obterendo perdant, aut ipsi cruditate pereant. Voraces enim sunt natura. Quo temperandum ijs, qui propter cupiditatem sæpe in pascendo si radicem prenderint, quam educere uelint è terra, obrumpunt collum. Perimbecillum enim id, ut caput molle. Si hæc herba non est, dādum ordeum, aut frumentum aliud. Cum est tempus farraginis, dādum ut in satu seris dixi. Cum incubant, ordeum his intritum in aqua apponendum. Pullis primum biduo polenta, aut ordeum apponitur, tribus proximis nasturtium viride confectum minutatim ex aqua in uas aliquod. Cū autem sunt inclusi in haras, aut speluncas, ut dixi, uictui obijciunt his polentam ordeaceam, aut farraginē, herbam ne teneram aliquā conisam. Ad saginādum eligūt pullos circiter sexquimensē qui nati sunt, eos includunt in saginario, ibiq; polentam, & pollinem aqua madefacta dant cibum, ita ut perinde se saturant. Secundum cibum large ut bibāt faciunt potestatem. Sic curati circiter duobus mensibus fiunt pingues quotcūq; sumpserunt. Locus solet purgari, quod ipsi amāt locum purum, neq; ipsi ullum, ubi fuerint, relinquunt purum.

De anatibus.

Cap. X.

QVI autem uolunt greges anatū hñe, & constituere VEOARO
TEOPEION primum locū, quis est facultas, eligere oportet palustrem, quod eo maxime delectatur, si id non, potissimum ibi, ubi sit naturalis aut lacus, aut stagnum, aut manufacta pisana, quo gradatim descendere possint. Septū altum eē oportet, ubi uersentur, ad pedes. XV. ut uidistis ad uillā Sei, quod uno ostio claudatur, arcū totū parietem intrinsecus crepido lata, in qua secundū parietem sint tecta cubilia, ante ea uestibulū exæquatū tectorio opere testaceo. In eo perpetua canalis in quā et cibus ponit, et immittitur aqua, sic. n. cibum capiunt. Omnes parietes tectorio leuigantur, ne feles, alia ne quæ bestia introire ad nocendū possit, id septum totum rete gradibus maculis integitur, ne eò inuolare

aquila possit ne ne ex ea euolare anas. Pabulum his datur tritum, ordeum, uinacei, uuae, nonnunquam et ex aqua cammari, et quaedam huiusmodi aquatilia. Quae in eo septo erunt piscinae, in eas aquam large influere oportet, ut semper recens sit. Sunt item non dissimilia alia genera, ut querquedulae, phalarides, sic pedices, quae, ut Archelaus scribit, uoce maris audita, concipiunt. Quae ut superiores, neque propter fecunditatem, neque propter suauitatem saginatur, sed sic pascendo fiunt pingues. Quod ad uillaticarum pastionum primum actum pertinere sum ratus, dixi.

De leporibus.

Cap. XI.

INTEREA redit Appius, et punctanti, nos ab illo, et ille a nobis quid esset dictum, ac factum, Appius sequitur inquit, actus secundi generis, affictitius ad uillam qui solet esse, ac nomine antiquo a parte quadam leporarium appellatum. Nam neque solum lepores in eo includuntur sylua, ut olim in iugero agelli, aut duobus, sed etiam cerni, aut capreae in iugeribus multis Q. Fuluius leporarium dicitur habere in Tarquinienensi septum, iugerum. XL. in quo sunt inclusa non solum ea, quae dixi, sed etiam oues ferae, etiam hoc maius hic in statonensi, et quidam in locis alijs. In Gallia uero transalpina. T. Pompeius tantum septum uenationis, ut circiter triginta milia passuum locum inclusum habeat. Praeterea in eodem consepito habere solet, de animalibus coclearia, atque aluearia, atque etiam dolia, ubi habeat glires conclusos. Sed horum omnium custodia incrementum, et pastio aperta, praeterquam de apibus. Quis enim ignorat septa esse maceris, ita esse oportere in leporario, ut tectorio tecta sint, et sint alta. Alterum ne feles, aut meles, alia ne quae bestia intrare possit, alterum ne lupo transilire. Ibique esse latebras, ubi iterdum lepores delitescant in uirgultis, atque herbis, et arbores patulis ramis, quae aequale impediunt conatus. Quis item nescit, paucos si lepores mares in faeminas intromiserit, breui tempore fore ut impleatur? tanta fecunditas huius quadrupedis. Quatuor enim modo si intromiseris in leporarium, breui solet repleri. Fit enim saepe cum habent catulos recentes, alios in uentre habere reperiatur. Itaque de his Archelaus scribit, annorum quot sint si quis uelit scire, inspicere oportere foramina naturae, quod sine dubio alius habet alio plura. Hos quoque nuper institutum ut saginarent pleraque, cum exceptos esse leporario concludant in

M. VARRONIS.

caueis, & loco clauso faciant pingues. Eorum ergo tria genera ferè sunt. Vnum Italicum hoc nostrum pedibus primis humilibus posterioribus altis, superiore parte pulla, uentre albo, auribus longis, qui lepus dicitur cum prægna sit, tamen concipere. In Gallia transalpina, & Macedonia fiunt permagni. In Hispania, et in Italia mediocres. Alterius generis est, quod in Gallia nascitur ad alpes, qui hoc ferè mutant, quod toti candidi sunt. Hi raro perferuntur Romam. Tertij generis est, quod in Hispania nascitur, similis nostro lepori ex quadam parte, sed humile, quem cuniculum appellant. Lucius Aelius putabat ab eo dictum leporem à celeritudine, quod leuipes esset. Ego arbitror à græco uocabulo antiquo, quod eo Aeoles Bæotij leporem appellabant. Cuniculi dicti ab eo, quod sub terra cuniculos ipsi facere soleant, ubi lateant in agris. Horum omnium tria genera, si possis, in leporario habere oportet, duo enim utiq; te habere puto, & quod in Hispania annis ita fuisti multis, ut inde te cuniculos persecutos credam.

De apris.

Cap. XII.

APROS quidem hñe posse in leporario, nec magno negotio tibi est, captiuos, & ciues, qui ibi nati sint, & pingues solere fieri scis inq; Axi. Nam quæ fundum in Thusculano emit hic Varro, à M. Pisone uidisti ad bucinam inflatam certo tpe apros, & capreas cōuenire ad pabulum, cū è superiore loco è palestra effunderetur apris glans, capreis uicia aut qd aliud. Ego uero inquit ille apud Q. Hortensium cum in agro laurenti essem, ibi istuc magis τρεφυινός fieri uidi. Nā sylua erat (ut dicebat) supra quinquaginta iugerum maceria septa, qd non leporarium, sed ἀγριότοπος appellabat. Ibi erat locus excelsus, ubi triclinio posito cœnabamur. Quintus Orphea uocari iussit, qui cū eò uenisset cum stola, et athara, & cātare eēt iussus, bucinā inflauit, ubi tanta circumfluxit nos cernorū, aproū, & ceterarū quadrupedū multitudo, ut nō minus formosum mihi uisum sit spectaculum, q̄ in circō maximo ædiliū non sine africanis bestiis cum fiunt uenationes.

De cochleis.

Cap. XIII.

AXIUS tuas partes (inquit) subleuauit Appius o Merula noster. Quod ad uenationē pertinet, breuiter secundus transactus

est actus. Nec de cocleis, ac gliribus quero, quod reliquum est, neq; enim magnum emolumentum esse potest. Non istuc tam simplex est inquit Appius, q̄ tu putas o Axi noster. Nā & idoneus sub dio sumendus est locus coclearijs, quem totum circū aqua claudas, ne quas ibi posueris ad partum, non liberos earum, sed ipsas queras. Aqua inquam cludenda, ne fugitiarius sit parandus locus. Is melior, quem & non coquit sol, & tangit ros. Quē si naturalis non est, ut ferē non sunt in aprico loco, neq; habeas in opaco, ubi facias, ut sunt sub rupibus, ac mōtibz, quorum aluuant radices lacus, ac flumī, manufactere oportet rosidum, q̄ sit, si adduxeris fistulam, & in eam papillas imposueris tenues, quæ eructent aquam, ita ut in aliquem lapidem incidat, ac late diffuset. Paruus his cibus opus est, & is sine administratore. Et hūc dum serpit, non solum in area reperit, sed etiam si riuus non prohibet in parietes stantes inuenit. Deniq; ipse ex gruminātes ad propalam uitam diu producant, cum ad eam rem pauca laurea folia intericiant, & aspergant fursures non multos. Itaq; cocus has uiuas an mortuas coquat, plerunq; nescit. Genera coclearum sunt plura, ut minutæ albulæ, quæ afferuntur è reatino, & maxime quæ de illyrico apportantur, & mediocres, quæ ex Africa afferuntur. Non quod in his regionibus quibusdam locis, eæ magnitudinibus non sint dispariles, nam & ualde amplæ sunt, quædā ex Africa, quæ uocantur solitanæ, ita ut earum calices quadrantes octoginta capere possint, & sic in alijs regionibus eadē inter se collatæ & minores sunt, & maiores. Hæ in fœtura pariunt innumerabilia. Earum semen minutum, ac testa molli, diuturnitate obdurescit, magnis insulis in areis factis, magnum bolum deferunt æris. Has quoq; saginare solent ita, ut ollam cū foraminibus incrustent sapa, & farre, ubi pascantur, quæ foramina habeat, ut intrare aer possit. Viuax enim earum natura.

De gliribus.

Cap. XIII.

GLIRARIUM autem dissimili ratione habetur, qđ non aqua, sed maceria locus sepitur. Tota lepide, aut tectorio intrinsecus incrustatur, ne ex ea crepere possit. In eo arbusculas esse oportet, quæ ferant glandem, quæ, cum fructum non ferunt, intra maceriam iacere oportet glādem, & castaneā, unde saturi fiant. Facere his caueas oportet laxiores, ubi pullos parere possint. Aquā

oportet esse tenuem, quod ea non utuntur multum, & aridū locum quærunt. Hi saginantur in dolijs, quæ etiam in uillis habet multi, quæ figuli faciunt multo aliter, atq; alia, quod in lateribus eorum semitas faciunt, & cauum, ubi cibum constituent. In hoc dolium addunt glandē, aut nūces inglandes, aut castaneā. Quibus i tenebris, cū cumulatim positū ē i dolijs, sūt pingues.

De apibus.

Cap. XV.

APPIVS, Igitur relinquitur, inquit, de pastione uillatica tertius actus de pisanis. Quid tertius inquit **AXIUS**? An quia tu solitus es in adulescentia tua domi mulsum non bibere ppter parsimoniam, nos mel negligemus? **Appius** nobis, uerum dicit inquit. Nam cum pauper cum duobus fratribus, & duabus sororibus essem relictus, quarum alteram sine dote dedi **Lucillo**, a quo hereditate me cessa primum, et primum mulsum domi meæ bibere cœpi ipse, cum interea nihilominus penè quotidie in conuiuio omnibus darem mulsum. Præterea meum erat non tuum, eas nouisse uolucres, quibus natura plurimum ingenij, atq; artis tribuit, itaq; eas melius me noscē, q̄ te, ut scias, de incredibili earum animi natura audi, **Merula**, ut cætera fecit, i socrōs, quæ sequi meliturgi soleant, demonstrabit. Primum apes nascuntur partim ex apibus, partim ex bubulo corpore putrescēto. Itaq; **Archelaus** in epigrammate ait eas esse.

Βοὸς φαίνοντες ποιοῦν μέν τε κύνες.

Idem.

ἡ τῶν μέν σφῆκες γένεα μόχων δὲ μέλιται.

ἡ τῶν μέν σφῆκων γένεσις μόχοι δὲ μελιτῶν.

Hæ apes nō sunt solitaria natura, ut aquilæ, sed ut hoīes. Quod si hoc faciunt et graculi, at non idem quod hic, societas operis, & ædificior, quod illic non est. Hic ratio, atq; ars, ab his opus facere discunt, ab his ædificare, ab his cibaria condere. Triā. n. habent, domus, opus, neq; idem quod abis cera, neq; quod ea mel, nec quod mel domus, nā in fauo cella ex angulis totidem, quot habet ipsa pedes (quod geometræ ἐξ ἄγωνον fieri in orbi rotundo ostendunt) ut plurimum loci includant. Foris pascuntur, intus fauos melle faciunt, quod dulcissimum qdem est & dys, & hominibus acceptū, quod fauus uenit in altaria, & mel ad principia conuiuij, & in secundā mensam administratur. Hæ ut hominū ciuitates, quod hic est & rex, & imperiū, et societas, qd sequuntur.

omnia pura. Itaq; nulla harū affidit in loco inquinato, aut eo, qui male oleat, neq; ē in eo, qui bona olet unguēta, itaq; his unctus qui accesserit, pungunt. Non ut muscæ liguriunt, qđ nemo has uidet (ut illas) in carne, aut sanguine, aut adipe. Ideo modo confidunt, in quo est sapor dulcis, minime malefica, quod nullius opus uellicans facit deterius. Neq; ignaua, ut non ei, q̄ eius opus conetur disturbare, resistat. Neq; tñ nescia suæ imbecillitatis, quæ cum cā musarum esse dicantur uolucres, q̄ & si quando displicat, te sunt, cymbalis, & plausibus, numero reducunt in locum unū. Et ut his dijs Heliconæ, atq; olympon attribuerunt hoies, sic his floridos, & incultos natura attribuit montes. Regem suū sequuntur quocūq; it, & fessum subleuant, et si nequit uolare, subcollāt, quod eñ seruare uolunt. Neq; ipsæ sunt inficientes, nec nō oderūt inertes. Itaq; impetētes à se eijciunt fucos, quod hi neq; adiunāt, & consumunt mel. Quos uocificantes plures persequunt. Etiam pauca extra ostium aluei obthurant oīa, qua uenit inter fauos spiritus, quā *ἐρίδακην* appellant græci. Omnes ut in exercitu uiuunt, atq; alternis dormiunt, & opus faciunt pariter, & ut colonias mittunt. Hiq; duces conficiunt quedā ad uocem ut imitatione tubæ, tñ id faciunt, cū inter se signa pacis, ac belli habeant. Sed o Merula Axius noster ne, dū hæc audit, physicā addiscat, quod de fructu nihil dixi, nūc cursu lampada tibi trado. Merula, de fructu inq; hoc dico, qđ fortasse an tibi satis sit Axi, anthorem habeo nō solum, qui aluearia sua locata habet quotannis quinis millibus pondo mellis, sed et hunc Varronē nostrū, quē audiui dicētem, duos milites se habuisse in Hispania fratres ueianios ex agro falisco locupletes, qbus cū à patre relicta esset parua uilla, et agellus nō sanè maior ingero uno, hos circū uillam totā alueariū seisse, et hortū habuisse, ac reliquū thymo, et cythiso obseuisse, et apiastro, qđ aliū *μελίφυλλον*, aliū *μελιάρόφυλλον*, qđā *μέλιον* appellāt. Hos nunq̄ minus, ut peræque ducerent dena millia sextertia ex melle recipere esse solitos, tum eos & uelle expectare, ut suo potius tpe mercatorem admitterēt, quā celerius alieno. Dic igitur inq; Merula, ubi et cuiusmodi facere me oporteat alueariū, ut magnos capiā fructus. Ille. *μελιτῶνας* ita facere oportet, quos aliū *μελιτσοφεία* appellāt, eadē rē qđā mellaria. Primum secundū uillā, potissimū ubi nō resonēt imagines. Hic. n. sonus harum fugæ causam existimatur esse. Præterea procerū esse

M. VARRONIS.

oportet aere temperato, neq; æstate feruido, neq; hyeme non aprico, ut spectet potissimum ad hybernos ortus, quæ propè se loca habeat ea ubi pabulum sit frequens, & aqua pura. Si pabulū naturale non est, ea oportet dominum ferere, quæ maxime sequuntur apes, ea sunt, rosa, serpyllū, apiastrū, papauer, faba, lens, pisum, ozymū, cyperū, medica, & maxime cythisum, qđ ualētibus utilissimum est. Et enim ab æquinoctio uerno florere incipit, & permanet ad alterum æquinoctiū autumnī. Sed ut hoc aptissimū ad sanitatem apiū, sic ad mellificiū thymum. Propter hoc siculum mel fert palmā, qđ ibi thymū bonum, et frequens est. Itaque qđā thymum contundūt in pila, & diluunt in aqua tepida, ea cōspergunt oīa seminaria consita apium cā. Quod ad locū pti-
net, hoc genus potissimū eligendum iuxta uillam, non quod nō in uille portici quoq; quidam (quo tutius essent) aluearia collo-
carint. Alios ubi sint, aliū faciunt ex uiminibus rotundas, aliū è li-
gno, ac corticibus. aliū ex arbore caua, aliū fictiles, aliū ēt ex ferulis
quadratas longas pedes citrater ternos, latas pedem, sed ita uti-
cum parum sit qua compleant, eas coangustent, ne in uasto loco
& inani despōdeant animū. Hæc oīa uocant à mellis alimonio,
alios, quas ideo medias uidentur facere angustissimas, ut figurā
imitentur earum. Fictiles fimo bubulo obliniunt intus, & extra
ne asperitate absterreantur, easq; alios, ita collocant in mutilis
parietis, ut ne agitentur, ne ue inter se contingant. Cū in ordinē
sint positæ, sic interuallo interposito, alterum, & tertiū ordinem
infra faciunt, & aiunt potius hinc demi oportere, q̃ addi quar-
tum. Media aluo, in qua introeāt apes, faciunt foramina parua
dextra, ac sinistra. Ad extrema, qua mellarij fauum eximere pos-
sint. opercula imponūt aluis. Optimæ sunt corticæ, deterrimæ fi-
ctiles, qđ & frigore hyeme, et æstate calore uehementissime cōmo-
uentur. Verno tpe, & æstiuo serè ter in mense mellarius inspicere
debet fumigans leuiter eas, & à spuratis purgare aluū, & uer-
miculos eijcere. Præterea ut animaduertat, ne reguli plures exi-
stant inutiles. n. sunt propter seditiones, et, ut quidā dicunt, tria
genera cū sint duam in apibus, niger, nuber, uarius (ut scribit
Menecrates) duo niger, & uarius, q̃ ita melior, ut expediat mel-
lario cū duo sunt eadē aluo, interficere nigrū, quē sūt cū altero
rege esse seditiosum, et corrūpere aluum, quod fuget, aut cū mul-
titudine fuget. De reliqs apibus optima est parua, uaria, rotunda

da. Fur, qui uocatur ab alijs *fucus*, alter est, lato uentre. *Vespa*, quæ similitudinem habet apis, neq; socia est operi, & nocere solet morsu, quam apes à se secernunt. Eæ differunt inter se, quæ feræ, & cicures sunt. Nunc feras dico, quæ in syluestribus locis passitant, cicures, quæ in cultis. Syluestres minores sunt magnitudine, & pilosæ, sed opifices magis. In emendo emptorē uidere oportet ualeant, an sint agræ. Sanitatis signa, si sunt frequentes in examine, & si nitidæ, & si opus, quod faciunt, est æquabile, ac leue. Minus ualentium signa, si sunt pilosæ, & horridæ, ut puluerulentæ, nisi opificij eas urget tempus. Tū enim propter laborem asperantur, & macescunt. Si transferendæ sunt alui in alium locum, id facere diligenter oportet, & tempora, quibus id potissimum facias, animaduertendū, & loca, quò transferas, idonea prouidendum. Tempora, ut uerno potius q̄ hyberno, q̄ hyeme difficulter consuescunt, quò sunt translata manere, itaq; fugiunt plerunq; . Si è bono loco transtuleris eò, ubi idonea pabulatio non est, fugitiuæ sunt. Nec si ex aluo in aluum in eodem loco transtuleris, negligenter faciendū. Sed & ea aluus in qua transituræ sunt apes, apiastro perfricanda, q̄ illcium hocillis, & faui melliti itus ponendi, à faucibus non longe, ne si nō animaduenterint inopiā escæ habuisse dicatur. At cū sunt apes morbidæ ppter primores uernos pastus, q̄ ex floribus nudis græcæ, & cornu sunt, celiacas fieri dicunt, atq; urina pota refici. De his, ppolim uocant, è quo faciunt ad foramen introitus protectū in aluum maxime æstate. Quam rem etiā noīe eodē mediā utunt in emplastris. Propter quam rem èt carius in sacra uia, q̄ mel uenit. Erythacem uocant, quo fauos extremos inter se cōglutinant, qđ est aliud melius ppoli, itaq; in hoc uim esse illiciendi. Quo circa examen ubi uolūt cōsidere, eū ramum, aliam ue quā rem obliniūt hoc, admisto apiastro. Fauus est, quē fingunt multatū è cera, cū singula cana sena latera habeāt, quot singulis pedes dedit natura. Neq; quæ afferunt ad quatuor res faciendas propolim, erythacem, fauum, mel, ex ijsdem oībus rebus carpere dicunt simplex ministeriū, qđ è malo punico, & asparago abñ carpant solum, ex olea arbore ceram, è fico mel, sed non bonum. Duplex ministerium præberi, ut è faba, apiastro, cucurbita, brassica cerā, & abum. Nec nō aliter duplex, quod fit è malo, & pyro syluestri, cerā, & mel. Item aliter duplex, q̄ è papauere ceram, et mel. Triplex ministerium

quoque fieri uti ex nucæ græcæ, & è lapsana cibū, mel, cerā. Itē ex alijs floribus ita carpere, ut alia ad singulas res sumant, alia ad plures. Nec non ē alind discrimen sequantē in carptura, aut eas sequat, ut in melle, qđ ex alia re faciunt liqudum mel, ut ex fiseris flore, ex alia cōtra, spissum, ut è rore marino. Sic ex alia re, ut è fico mel insuane, è cythiso bonū, è thymo optimum. Cibi ps quoque potio, & ea his aqua liquda, unde bibant, esse oportet, eamque pro pinquā, quæ præterfluat, aut in aliquē locum insuat, ita ut ne altitudine descendat duos, aut tres digitos, in qua aqua iaceant teste, aut lapilli, ita ut extent paulū, ubi assidere, & bibere possint. In qua diligenter habenda cura, ut aqua sit pura, quod ad mellificiū bonum uehementer pdest. Quod nō oīs tempestas ad pastū prodire lōgius patitur, præparādis his cibis, ne tū melle solo cogant uiuere, aut relinquere exinanitas alios. Igitur fisorū pinguium circiter decem pondo decoquunt in aquæ congijs sex, quas coctas in offas propē apponūt. Alij aquā mulsam in uasculis propē ut sit curāt. In quā addunt lanā purpureā, per quā sugant uno tpe, ne potu nimiū impleantur, aut ne incidāt in aquā. Singula uasa ponūt ad alios singulas, & hac supplent. Alij ficum, & uuā passam cum pinserunt, affundunt sapa, atque ex eo factas offas apponūt. Id tempestatibus, & hyeme cū in pabulum prædere nō possunt. Cū examē exiturū est, qđ fieri solet, cū adnatæ prospere sunt multæ, ac pgeniē ueteres emittere uolūt in coloniā, ut olim crebro Sabini fecerunt propter multitudinē liberorū, duo solent præire signa. Vnū, qđ superioribus diebus maxime uespertinis multæ ante foramen (ut uuæ) aliæ ex alijs pēdent cōglobatæ. Alter, qđ cum iā euolatūre sunt, aut ēt inceperunt, consonāt uehementer, pinde ut milites faciunt, cū castra mouēt, quæ primo tum exierunt in conspectu uolitant, reliquas quæ nondum congregatæ sunt expectantes, dum conueniāt. Cum à mellario id fecisse sunt animaduerse, iaciundo in eas puluerem, & circum tinniendo ære, pterritas quō uoluerit pducet. Nō lōge inde ramum, uel qđ aliud oblinunt erichacæ, atque apiastro, ceterisque rebus, quibus delectant. Vbi cōsederunt, afferunt aliuū propē eis de illicijs illitā intus, et ppē apposita, fumo leui arcūdato cogūt eas intrare. Ut in nouā coloniā cū introierint, pmaneāt adeo libenter, ut ēt si proximā posueris illam aliuū, unde exierunt tū nouo domalio potius sint cōtentæ. Quod ad pastiones ptinere sumra

tus, qm̄ dixi, nunc iā cuius cā adhibetur ea cura, de fructu dicā.

De apium fructu.

Cap. XVI.

EXIMENDORVM fauorum signū sumunt ex ipsis, cum plenas aluos habent, & cū illos geminauerint, ex apibus coniecturā capiunt si intus faciunt bombum, & cum intro eunt, ac foras, trepidant, & si opercula alui cū remota sint, fauorū foramina obducta uident mellis membranis. Cum sunt repleti melle, in eximendo quidā dicunt oportere nouē partes tollere, decimā relinquare. Quod si oē eximas, fore ut discedant. Alij hoc plus relinquant, q̄ dixi, ut in aratis q̄ faciunt restibiles segetes, plus tollunt frumenti ex internallis, sic in aluis, si nō quotannis eximas, aut nō quoq; multum, & magis his assiduas habeas apes, et magis fructuosas. Eximendorū fauorum primum tempus esse putāt uergiliarū exortu. Secundum æstate exacta, ante q̄ totus exoriatur arcturus. Tertium post uergiliarum occasum, & ita si fecunda sit aluis, ut ne plus tertia pars eximatur mellis, reliquum hyemationi relinquat, si uero aluis non sit fertilis ubi quid eximat, exēptio cū est maior, neq; uniuersam, neq; palā facere oportet, ne deficiant animum. Fauorum, qui eximuntur, si qua pars mellis nihil habet, aut habet inquinatum, cultello præsecatur. Prouidendum ne infirmiores à ualentioribus opprimātur. Eo enim minuitur fructus. Itaq; imbecilliores secretas subiiciunt sub alterum regem. Quæ crebrius inter se pugnabūt, aspergi eas oportet aqua mulsa. Quo factō non modo desistunt pugna, sed et conferiunt se lingentes, eo magis si mulso sunt asperse, quo propter odorem auidius applicant se, atq; obstupescunt potantes. Si ex alio minus frequentes euadunt, ac subsidit aliqua pars, suffumigādum, & propē fumus apponēdus bene olentiū herbarū maxime apiastrī, & thymī. Prouidendū uehemēter ne ppter æstū, aut ppter frigus dispereant. Siquando subito imbri in pastu sunt oppressæ, aut frigore subito ante q̄ ipsæ pviderint (id fore quod accidit raro, ut decipiantur) & imbris guttis uberius offensa iacent pstratæ, & afflictæ, colligendū eas in uas aliquod, et reponendū in tecto loco, ac tepido, pno ad meridiē q̄ maxime tēpestate bona, et uas ipm̄ cinere factō ē filicinis lignis infricādū paulo plus caldo q̄ tepidiore. Deinde concutiendū leuiter, ut manu nō tangas & ponēdæ in sole. Quæ. n. sic cōciliatæ concaluerūt, restitunt se,

ac reuiviscunt, ut solet similiter fieri in musis aqua necatis. Hoc faciundum secundum alios, ut reconciliatæ ad suum quæq; opus & domicilium redeant.

De piscinis.

Cap. XVII.

INTER EA redit ad nos Pavo, & si uultis inquit anchoras tollere, latistabulis sortitio fit tribuum, accepti sunt à præcone renunciari quem quæq; tribus fecerint ædilem. Appius confestim surgit, ut ibidē candidato suo gratularetur, ac descēderet in hortos. Merula, Tertium actum de pastionibus uillatis postea inquit tibi reddam Axi. Consurgentibus illis, Axis mihi, resperet antibus nobis, q̄ & candidatum nostrum uenturū sciebamus. Non labores inquit hoc loco discessisse Merulam. Reliqua enim ferē mihi sunt nota. Quod cum piscinarum genera sint duo, dulcium, & salinarum, alterum apud plebem, & sine fructu, ubi lymphæ aquā piscinis nostris uillatis ministrant. Ille autem maritimæ piscinæ nobilem, quibus Neptūnus, ut aquā, sic & pisces ministrat, magis ad oculos ptinent, q̄ ad uesticam, & potius maris supium domini exinaniant, q̄ replent. Primum. n. ædificant magno, secūdo implentur magno, tertio aluntur magno. C. Hirrius circum piscinas suas, ex ædificijs duodenamillia sextertia capiebat. Eam oēm mercedem esis, quas dabat piscibus, consumebat. Non mirum. Vno tpe enim meminī hunc Cæsari sex millia murenarum mutua dedisse in pondus, & propter piscium multitudinem quadragies sextertio uillam uenisse. Quare nostra piscina ac mediterranea plebeia recte dicat̄ dulcis, & illa amara. Quis enim nostrum non una contentus est hac piscina? Quis contra, maritimas non ex piscinis singulis plures coniunctas habet? Nam ut Pausias, et ceteri pictores eiusdem generis loculatas magnas habēt arculas, ubi diuersi colores sint discreti, sic hi loculatas habent piscinas, ubi dispares disclusos habeant pisces, quos perinde ut sacri sint, ac sanctiores quā illi in Lydia, quos sacrificanti tibi Varro ad tibianem græcum gregatim uenisse dicebas ad extremum litus, atq; arā, q̄ eos capere auderet nemo, cū eodem tpe insulas ludinorum ibi corrosas uidisses. Sic hos pisces nemo cocus in ius uocare audet. Qu. Hortensius familiaris noster, cum piscinas haberet magna pecunia ædificatas ad baulos, ita sæpe cū eo ad uillā fui, ut illum scīā semp in cenā pisces puteolos mittere

emptum solitum. Neq; satis erat eum nō pasā piscinis, nisi eos ipse pasceret ultro. Ac maiorem curam sibi haberet, ne eius esurirēt nulli, q̄ ego habeo, ne mei in rosea esuriant asini, & qdē utraq; re, & cibo, & potione, cum nō paulo sumptuosius, q̄ ego his ministraret victum. Ego enim uno serulo, ordeo nō multo, aqua domestica, meos multitudine alo asinos. Hortensius primum q̄ ministrarent piscatores habebat complures, qui pisciculos minutos aggerebant frequenter, ut à maioribus absumerentur. Præterea salsamenta in eas piscinas emptitia coniiciebat, cum mare turbaretur, uti per tempestatē suis piscibus ē macello cætariorū uti ē mari obsonium præberet, cum neq; euerriculo illi in litus educere possent uinam saginā plebeiæ cœnæ piscēs. Celerius uoluntate Hortensij ex equili educeres rhedarios, ut tibi haberes, mulos, quā ē piscina barbatum nullum. At inquit ille, non minor cura eius erat de egrotis piscibus, q̄ de minus ualentibus seruis. Itaq; minus laborabat, ne seruus æger, q̄ aquam frigidam biberent sui piscēs. Etenim hac incuria laborare aiebat. M. Lucillum, & piscinas eius despiciebat, q̄ æstinaria idonea non haberet, ac in residem aquam, & locis pestilentibus habitarent piscēs eius. Contra ad Neapolim L. Lucillus, postea quam perfodisset montem, ac maritima flumina immisisset in piscinas, quæ reāprocæ fluerent, ipse Neptuno non cederet de piscatu, factum esse enim ut amatos piscēs suos uideatur propter æstus eduxisse in loca frigidiora, ut appuli solent pecuarij facere, q̄ propter calores in montes sabinos pecus ducunt. In Baiano autem tanta ardebat cura, ut architecto permiserit, ut suam pecuniam consumeret, dummodo perdueretur specus ē piscinis in mare, obiectaculo quo æstus bis quotidie ab exorta luna ad proximam nouam introire, ac redire rursus in mare posset, ac refrigerare piscinas. Nos hæc. At strepitus à dextra, & eccum recta candidatus noster designatus edilis. Cui nos occurrimus, & gratulati in capitolij prosequimur, ille inde eundo suam domum, nos nostram. Opinionis nostræ sermonē de passionē uillatica summam hunc, quem exposui, habeto.

FINIS.

L. IVNII MODERATI COLVMELLAE
DE RE RVSTICA CAPITA LIB. I.

Præcepta, quæ sequantur, qui rustificari uelint.	Cap.	I.
Qualiter dispositus fundus maxime probet.	Cap.	II.
Quæ præcipue respiciendo agro ante quàm ematur, notanda sunt.	Cap.	III.
De salubritate regionum.	Cap.	IIII.
De aqua.	Cap.	V.
De positione uillæ.	Cap.	VI.
De diuisione mæbroꝝ uillæ & primũ de granarijs.	Cap.	VII.
De torcularibus.	Cap.	VIII.
De cortinalibus & apothecis uini.	Cap.	IX.
Quæ circa uillã facienda sunt.	Cap.	X.
De officijs patrisfamilias.	Cap.	XI.
De pecore, & pecorum magistris.	Cap.	XII.
Qualis corporaturæ māapia, cuiq; opĩ cōtribuēda sunt.	C.	XIII

CAPITA SECVNDI LIBRI.

Terrã nec senescere, nec fatigari, si stercoret.	Cap.	I.
Quot sunt genera terreni.	Cap.	II.
Quæ cura adhibēda sit bubus ab opa disjunctis.	Cap.	III.
Quo anni tpe campi arãdi sint, & quō.	Cap.	IIII.
Exilis terra quomodo stercoretur.	Cap.	V.
De generibus seminum.	Cap.	VI.
De generibus leguminum.	Cap.	VII.
Quod sit seminandi tempus.	Cap.	VIII.
Quot seminũ modios ingerũ postulet, et mediinæ seminũ.	C. 2.	
Quod solum cuiq; legumini cōueniat.	Cap.	X.
De genere pabulorum, & de medica, uicia, farragine, auena fæno græco, eruo, & cicera.	Cap.	XI.
Quemadmodum, & quot operis unumquodq; frumentum, & legumen colatur.	Cap.	XII.
Pro modo cuiusq; agri quot opæ designent.	Cap.	XIII
Quæ legumina aruis nocēat, quæq; prosint.	Cap.	XIIII.
De generibus stercoris.	Cap.	XV.
Quibus temporibus agri stercorãdi sunt.	Cap.	XVI.
Quemadmodum ex aruo prata fiant.	Cap.	XVII.

- Quemadmodum facta prata colantur. Cap. XVIII.
 Quēadmodū succisum fœnū tractari, et cōdi debeat. Ca. XIX.
 De area constituenda. Cap. XX.
 De messe faciēda, & de tritura. Cap. XXI.
 Quæ p̄ serias liceat agricolæ, et quæ nō liceat facere. Ca. XXII.

CAPITA LIBRI TERTII.

- Quod genus vitis cōueniat cuiq; solo & statui cœli. Cap. I.
 Quæ vites suburbanis regionibus ad escam conferen-
 de sunt. Cap. II.
 Nihil magis rusticis cōuenire, q̄ vitem colere. Cap. III.
 Quæ obseruare decet, q̄ vineas instituit. Cap. IIII.
 Quali solo, & quō vitiarium faciendū sit. Cap. V.
 Qualis et ex qbus partibus vitis malleolus legēdus sit. Ca. VI.
 Quomodo fœcūditatē vitis explores. Cap. VII.
 Quæ spectanda sit qualitas in eo solo, quod vineis destina-
 ueris. Cap. VIII.
 Quomodo amineas feraces facias. Cap. IX.
 Ex qua vitis parte semina eligenda sunt. Cap. X.
 Quæ spectādæ qualitates ī eo solo, qd̄ vineæ destinaueris. c. XI.
 Quæ Iulius græcinus tradiderit de terra vineali. Cap. XII.
 Quomodo terra pastinetur. Cap. XIII.
 Quot modis vitis ponet̄, aut in puincijs, aut in Italia. C. 14.
 Meliorē esse positionē pastinato solo q̄ nouali. Cap. XV.
 Quæ mēsurā pastinādi soli abūde sit vineis. Cap. XVI.
 Quemadmodū, & quo tpe vitis serenda sit. Cap. XVII.
 Quæ obseruare debet qui vitem ponit. Cap. XVIII.
 Quā longus debet esse malleolus. Cap. XIX.
 Quo genera vitium ponenda sint. Cap. XX.
 Vtrū distinctis generibus vitium horti cōserendi sint. Cap. XXI.

CAPITA QVARTI LIBRI.

- Contra opinionem Attiæ, & Celsi non esse satis altos scrobes
 bipedaneos vineatis seminibus. Cap. I.
 Non oportere uiniradijs duos palos uestire, sed singula semina
 singulis adminiculis esse contribuenda. Cap. II.
 Nouam consitionem vineæ, nisi magna, & assidua cultura ad
 inuetur, celeriter interire. Cap. III.

Prosterni uitem in scrobem, & recuruatam, usq; ab imo solo restam calamo applicari oportere.	Cap.	IIII.
A consitione omnibus mensibus fodiendum, & curandū ne herba nascentur, & uiniradices ad unam materiam redigendos.	Cap.	V.
De pāpinatione malleolis, & uiniradiabus facienda.	Cap.	VI.
Tempestiuam esse pāpinationem, qua digito palmites deiciuntur.	Cap.	VII.
Per autumnum ablaqueandā esse uineā.	Cap.	VIII.
Quemadmodū ablaqueata uinea putet.	Cap.	IX.
Quod sit optimum tempus putandi.	Cap.	X.
Quomodo malleolus rescandus sit.	Cap.	XI.
Quemadmodū pedanda sit uinea, & de canterio.	Cap.	XII.
Quomodo uitis alliganda sit.	Cap.	XIII.
Malleolis ingū imponendum, & quā alte canterius allenandus sit.	Cap.	XIIII.
Quemadmodum nouella uinea frequentanda est, & propagines faciendae sint.	Cap.	XV.
Quo tempore uiniradix transferenda sit.	Cap.	XVI.
Quomodo ingum faciendum sit.	Cap.	XVII.
Quomodo in hortulos uinea diuidēda sint.	Cap.	XVIII.
De positione ingi, & quatenus à terra leuandū.	Cap.	XIX.
De cura, & inō alligandarū uitium.	Cap.	XX.
Nouella uinea quomodo putāda sit.	Cap.	XXI.
Quēadmodū ueteranae uineae restituantur.	Cap.	XXII.
Quemadmodū eadem putentur.	Cap.	XXIII.
Quae bonus uinitor in constituta iam uinea uitare, aut sequi debeat.	Cap.	XXIIII.
De figura falsis uineaticae.	Cap.	XXV.
De cura adminiculandae, iugādāq; uineae.	Cap.	XXVI.
Quae bonus uinitor in cōstitutā iam uinea uitare, aut sequi debeat.	Cap.	XXVII.
Quō pāpinari, & quot fossuris uinea excoli debeat.	Cap.	28.
De inferendis uitibus, & infitione tuēda.	Cap.	XXIX.
De rōne pedaminū, uiminū, et de salictō.	Cap.	XXX.
De genista.	Cap.	XXXI.
De arundinetis.	Cap.	XXXII.
De castaneis, & castanetis.	Cap.	XXXIII.
		CAPITA

CAPITA QVINTI LIBRI.

Quemadmodū datas formas agroꝝ metiri debeas.	Cap. I.
De uarijs agroꝝ formis, & eoꝝ dimensionibus.	Cap. II.
Inter uites pāgendas quot pedes relinquēdi sint.	Cap. III.
De cultura provincialium uinearum.	Cap. IIII.
Repetitio eoꝝ q̄ dicta sunt p singula genera.	Cap. V.
De ulmaris faciendis.	Cap. VI.
De arbusto gallico.	Cap. VII.
De generibus olearum.	Cap. VIII.
De seminarijs oliuarum faciendis.	Cap. IX.
De arboribus pomiferis.	Cap. X.
De insitione arborum.	Cap. XI.
De cythiso.	Cap. XII.

CAPITA SEXTI LIBRI.

De bubus parandis, atq; emendis, earūq; forma.	Cap. I.
De bubus domandis.	Cap. II.
De boum cura, & cibarijs.	Cap. III.
De uitijs boum, & medicinis.	Cap. IIII.
Quæ sint, quibus pestilentia ingruit gregi, & quæ remedia adhibenda.	Cap. V.
Quod remedium adhibet bovi cruditate laborāti.	Cap. VI.
Quo remedio sedatur dolor uentris, & intestinorum pecoris.	Cap. VII.
De uitiosis incrementis linguae.	Cap. VIII.
De febre boum.	Cap. IX.
De tussi boum.	Cap. X.
Suppurationis remedia.	Cap. XI.
Claudicanti bovi, quod remediū adhibeatur.	Cap. XII.
Ad scabiem remedia, & ad morsum rabiosi canis, uel lupi, nec non & ad coriaginem.	Cap. XIII.
Ad exulcerationē pulmonis, & palati tumorē.	Ca. XIIII.
Ad talū, seu ungulā lesam remedia.	Cap. XV.
Ad conuulsos armos, et cornua præfracta.	Cap. XVI.
Ad ictus serpentis, & noxiōꝝ animalium.	Cap. XVII.
Remedia ad haustam hirudinem.	Ca. XVIII.
De machina faciēda, qua clausa iumenta curentur.	Cap. XIX.

Colu.

1

De tauri forma.	Cap. XX.
De forma uaccæ.	Cap. XXI.
Quot annis delectus faciendus.	Cap. XXII.
De conseptis, & stabulis faciendis.	Cap. XXIII.
Quæ etas idonea ad admissuram.	Cap. XXIIII.
Remedia ad lumbricos uitulorum.	Cap. XXV.
De castrandis uitulis.	Cap. XXVI.
De equis.	Cap. XXVII.
De etate admissarij, & q̄s pullus generetur.	Cap. XXVIII.
De indole, & forma equi.	Cap. XXIX.
De cura, & medicina equorum.	Cap. XXX.
Ad tussim.	Cap. XXXI.
Ad intertriginem, & scabiem.	Cap. XXXII.
Ad muscas, & oculorum dolores.	Cap. XXXIII.
Ad fastidia abor̄, & labē pestiferā remedia.	Ca. XXXIIII.
De equarum rabie.	Cap. XXXV.
De mulis.	Cap. XXXVI.
Ad temperandā sēuitiā admissarij in libidinē furētis.	Cap. 37.
De medicinis eorum.	Ca. XXXVIII.

CAPITA SEPTIMI LIBRI.

De asello.	Cap. I.
De ouibus emendis, tuendisq̄.	Cap. II.
De arietibus eligendis.	Cap. III.
De ouibus tectis.	Cap. IIII.
Medicinæ pecoris ouilli.	Cap. V.
De caprino pecore.	Cap. VI.
De medicina caprarum.	Cap. VII.
Casēi faciendi ratio.	Cap. VIII.
De suibus, & eorum medicinis.	Cap. IX.
De mediana suum.	Cap. X.
De castratione suum.	Cap. XI.
De canibus.	Cap. XII.
De morbis, & medicinis canum.	Cap. XIII.

CAPITA OCTAVI LIBRI.

De uillatis passionibus.	Cap. I.
De gallinarū gñibus, gallis cohortalibus parādis.	Cap. II.

De gallinarijs constituendis.	Cap. III.
De cibarijs gallinarum.	Cap. IIII.
De seruandis, & supponendis ouis.	Cap. V.
De ouis.	Cap. VI.
De gallinis faciendis.	Cap. VII.
De palubis, et colubis faciendis, et colubarijs constituendis.	Ca. 8.
De alendis turturibus.	Cap. IX.
De turdis educandis.	Cap. X.
De paonibus educandis.	Cap. XI.
De numidicarum, & rusticarum gallinarum educatione.	Cap. XII.
De anibus, quas graeci ἀμφίβια, & latini duplidis uitae appellant.	Cap. XIII.
De anseribus educandis, et anserario constituendo.	Ca. XIII.
De anatibus, querquedula, & similibus.	Cap. XV.
De piscinis, & piscibus alendis.	Cap. XVI.
De positione piscinae.	Cap. XVII.

CAPITA NONI LIBRI.

De uinarijs faciendis, et includendis pecudibus feris.	Cap. I.
De apibus.	Cap. II.
Quot genera sint apum, & quod ex ijs optimum.	Cap. III.
Quales pastiones, et q sitis pastionum apium esse debeat.	Cap. 4.
De sedibus apium eligendis.	Cap. V.
De uasis alueorum probandis.	Cap. VI.
Quemadmodum aluei collocandi sint.	Cap. VII.
De comparandis apibus, & quemadmodum syluestria examina capiantur.	Cap. VIII.
Quemadmodum uernacula examina obseruantur, & in aluos condantur.	Cap. IX.
Quae sit forma regis apum.	Cap. X.
Quomodo apum paucitas emendetur.	Cap. XI.
De condendo examine, et eius fuga inhibenda.	Cap. XII.
Remedia apum laborantium morbo.	Cap. XIII.
Quid quoq; tempore faciant apes, & quid earum curator facere debet.	Cap. XIII.
De melle conficiendo, & quando castrari debent alui.	Cap. XV.
De cera facienda.	Cap. XVI.

LIBER DECIMVS CARMINA
CONTINET DE CVL-
TV HORTORVM.

CAPITA VNDECIMI LIBRI.

Quæ intra uillam agi debeant ab homine officio uilli-
cationis preposito. Cap. I.

Quid quoq; mense faciendum sit, temporibus accommo-
dando opera. Cap. II.

Prosa de cultu hortorum, & herbis hortensibus. Cap. III.

CAPITA DVODECIMI LIBRI.

Cura rei domesticæ, & præcepta, quæ uillica exequi
debeat. Cap. I.

Quemadmodum tractare debeat penora, siue cæl-
laria. Cap. II.

Distributio instrumenti, et suppellectilis. Cap. III.

Quæ & qualia uasa parare debeat penoribus, & sal-
gamis condiendis. Cap. IIII.

Quemadmodum ex uino uapido acetum fiat. Ca. V.

Quomodo muria dura fiat. Cap. VI.

Quæ p quatuor anni tpa herbæ, & quō cōdiant. Cap. VII.

Oxygala quomodo fiat. Cap. VIII.

Conditura lactucæ. Cap. IX.

Cape, pyrorum, & malorum, cæterorumq; pomorum
compositio. Cap. X.

De mella facienda, qua in condituris utunt. Cap. XI.

De aqua mulsa facienda. Cap. XII.

De caseo in usus domesticos seruando, & de quibusdam
herbis condiendis. Cap. XIII.

De malis, & pyris in sole siccandis. Cap. XIIIII.

De fias aridis. Cap. XV.

De uuis passis faciendis, & sorbis seruandis. Cap. XVI.

De aceto ficulneo faciundo. Cap. XVII.

Quæ præparanda sint uindemiæ. Cap. XVIII.

De pluribus generibus conditurarum, quibus uinum con-
firmatur. Cap. XIX.

De sapa, & defruto coquendis. Cap. XX.

- De defruto, quod adiungitur in uinū ad uetustatē. Cap. XXI.
 Pias liqdæ alterū medicamen, quo mustū cōdias. Cap. XXII.
 De picæ, qua utuntur Allobroges ad conditurā uini picati. C. 23.
 De picæ nemeturica ad condituras. Cap. XXIII.
 De aqua falsa, uel muria ad uina cōdienda. Cap. XXV.
 Remedia acēscētis uini. Cap. XXVI.
 De uino dulci faciēdo. Cap. XXVII.
 De alijs salubribus cōdituraru generibus. Cap. XXVIII.
 Quemadmodum mustum semper dulce tanquam recens
 permaneāt. Cap. XXIX.
 Optima uini curatio, & remedia lāguentis uini. Cap. XXX.
 Si quod aīal in mustū ceciderit, et interierit, remedia. C. XXXI.
 Vinum ex marrubio. Cap. XXXII.
 Vinum scylliten. Cap. XXXIII.
 De aceto scyllitico. Cap. XXXIII.
 Vinum absynthiten, & hyssopiten, & abrotoniten, & re/
 liquarum notarum quomodo fiat. Cap. XXXV.
 De musto tortino. Cap. XXXVI.
 Vinum simile græco facere. Cap. XXXVII.
 Vinum myrtiten quomodo facias. Cap. XXXVIII.
 Passum quemadmodum fiat. Cap. XXXIX.
 Lora optima quomodo fiat. Cap. XL.
 Mustum lixiuum quomodo fiat. Cap. XLI.
 De conditura cydoniorum. Cap. XLII.
 De caseo condendo. Cap. XLIII.
 Vne ollares quemadmodū cōponantur, et seruentur. Cap. 44.
 Mala granata quemadmodū seruentur. Cap. XLV.
 Mala orbiculata, sextiana, melimela, & alia genera quo/
 modo seruentur. Cap. XLVI.
 De conditura inulæ. Cap. XLVII.
 Sampsa quemadmodum fiat. Cap. XLVIII.
 De epityro. Cap. XLIX.
 Nigræ oliuæ conditura. Cap. L.
 Sirapa quomodo fiat. Cap. LI.
 Oleum quemadmodum fiat. Cap. LII.
 De oleo gleuano. Cap. LIII.
 Oleum ad unguenta quēadmodū facias. Cap. LIIII.
 De salsura suillæ carnis. Cap. LV.

Rapa, & napos quemadmodum condias.	Cap.	LVI.
Sinapim quemadmodum facias.	Cap.	LVII.
Oleris atri, & siferis radicem quemadmodum condias.	Cap.	58.
Moretum, oxyporum, uel ut alij, oxygarum quemadmodum componas.	Cap.	LIX.

CAPITA LIBRI DE ARBORIBVS.

De uitiario faciendo.	Cap.	I.
Qualia semina, et quando legas.	Cap.	II.
Quemadmodum semina eligas, & de habitu terre.	Cap.	III.
De generibus uinearum.	Cap.	IIII.
Quemadmodum uites coli debeant.	Cap.	V.
De ressecanda uinea uetere & propaganda.	Cap.	VI.
De propagatione.	Cap.	VII.
De insitionibus fructuosis, quæ uites fecundas faciunt.	Cap.	8.
Vt una complura genera acinorum habeat.	Cap.	IX.
Vindemiam quomodo putes.	Cap.	X.
De pampinatione.	Cap.	XI.
De fossura.	Cap.	XII.
Ne rubigo uineam uexet.	Cap.	XIII.
Ne formica uitem ascendat.	Cap.	XIIII.
Ne sorices, aut uolucra uitem ledant.	Cap.	XV.
De arbutis.	Cap.	XVI.
De oliuetis.	Cap.	XVII.
De pomario constituendo.	Cap.	XVIII.
De scrobibus faciendis.	Cap.	XIX.
Quomodo semina legas.	Cap.	XX.
Quando ficus serenda sit.	Cap.	XXI.
De nucæ serenda.	Cap.	XXII.
De malo punica serenda.	Cap.	XXIII.
De pyro.	Cap.	XXIIII.
De malis ferendis.	Cap.	XXV.
De insitione arborum.	Cap.	XXVI.
Quod omnium generum surculi, omnibus arboribus inferi possint.	Cap.	XXVII.
De cythiso.	Cap.	XXVIII.
De salice, & genesta, & arundine.	Cap.	XXIX.
De uiola, & rosa.	Cap.	XXX.

84

LVCII IVNII MODERATI
COLVMELLAE DE RE
RVSTICA LIBER
PRIMVS.

SAEPE NUMERO CIVITATIS
nostrae principes audio culpantes modo agro-
rum infœcunditatē, modo cœli permulta iā
tempora noxiam frugibus intemperie, quos-
dam etiam prædictas querimonias uelut ra-
tione certa mitigantes, quod existiment uber-
tate nimia prioris æui defatigatum, & effœ-
tum solum neque pristina benignitate præbere mortalibus alimē-
ta. Quas ego causas Publi Siluine procul à ueritate abesse certū
habeo, quod neque fas est existimare humi naturā, quā primus il-
le mundi genitor perpetua fœcunditate donauit, quasi quodā mor-
bo sterilitate affectam, neque prudentis est credere tellurem, quæ di-
uinam, & æternā inuentam sortita cōmunis omnium parens di-
cta sit, quæ & cuncta peperit semper, et deinceps paritura sit, ue-
lut hominem consenuisse. Nec posthæc reor intempantia cœli nobis
ista, sed nostro potius accidere uitio, quod rem rusticam pessimo cuique
seruorum uelut carnifici noxiæ dedimus, quam maiorum nostrorum opti-
mus quisque optime tractauerit. Atqui ego satis mirari nō possum
quod ita dicendi cupidi seligant oratorem, cuius imitentur eloquen-
tiam, mensurari, & numerorum modum rimantes placitæ discipuli-
næ cōsectentur magistrū, uocis, & cantus modulatore, nec minus
corporis gesticulatore scrupulosissimæ requirant saltationis, ac
musicæ rōnis studiosi. Iamque quod edificare uelint, fabros & archite-
ctos aduocent, quod nauigia mari cōcredere, gubernandi peritos, quod
bella moliri, armorum, & militiæ gnaros, et ne singula persequar,
ei studio, quod quis agere uelit, cōsultissimū rectorem adhibeat.
Denique animi sibi quisque formatorem, præceptoremque uirtutis è cœ-
tu sapientium arcessat. Sola res rustica, quæ sine dubitatione pri-
ma, & quasi consanguinea sapiētiae est, tam discipulis egeat, quā
magistris. Adhuc. n. scholas Rhetorum, et (ut dixi) geometrarum,
musicorumque, uel quod magis mirandū est, cōtemptissimorum ui-
tiorum officinas gulosis cōdiendi cibos, et luxuriosius fercula struē-
di, capitumque, & capilloꝝ conannatores nō solum eē audiui, sed.

COLVMELLAE.

& ipse uidi Agricolationis neq; doctores qui se profiterent, neq;
 discipulos cognoui. Cum et si praedictarum artium professoribus
 ciuitas egeret, tamen sicut apud priscos florere posset respu. Nam
 sine ludicris artibus, atq; etiam sine cauidiciis olim satis felices fue-
 re, futuræq; sunt urbes. At sine agricultoribus nec consistere morta-
 les, nec ali posse manifestum est, quo magis prodigij simile est, qd
 accidit, ut res corporibus nostris, uitæq; utilitati maxime conueni-
 ens minimam usq; in hoc tempus consumatione haberet, idq; sper-
 neref genus amplificandi, retinendiq; patrimonij, quod omni cri-
 mine caret. Nā cetera diuersa, & quasi repugnātia dissident à
 iusticia. Nisi æquius existimamus cepisse p̄dam ex militiā, q̄ no-
 bis nihil sine sanguine, et cladibus alienis affert. An bellū posis,
 maris, et negociationis alea sit optabilior, ut rupto naturæ fœde
 re terrestre animal homo, uentorū, & maris obiectus iræ, se flucti-
 bus audeat credere, semperq; ritu uolucrū, longinqui litoris pere-
 grinus. ignotū pererret orbē? An fœneratio probabilior sit et his
 inuisa, qbus succurrere uidet? Sed ne caninum quidē (sicut dixe-
 re ueteres) studium p̄stantius locupletissimum quenq; ad latrādī,
 & cōtra innocentes, ac pro nocentibus neglectum à maioribus,
 à nobis et concessum intra mœnia, & in ipso foro latrocinij? An
 honestius duxerim mercenarij saluatoris mendacissimum aucu-
 pium circūuolitātis limina potētiorū, somniumq; regis sui rumo-
 ribus augurantis, neq; n. roganti quid agatur intus rīdere serui
 dignantur. An putem fortunatius à cathenato repulsum ianito-
 re sepe nocte sera foribus ingratissimè adiacere, miserrimoq; famula-
 tu per dedecus, fasium decus, & imperiū profuso tñ patrimonio
 mercari? Nā nec gratuita seruituti, sed donis repēditur honor, q̄
 si & ipsa, & eorū similia bonis fugienda sunt, superest (ut dixi)
 unū genus liberale, & ingenuū rei familiaris augendæ, quod ex
 agricolatione contingit. Cuius p̄cepta si uel temere ab indoctis,
 dum tñ agroꝝ possessoribus, antiquo more administrarentur, mi-
 nus iacturæ paterent res rusticæ. Nam industria dominorū cum
 ignorantie detrimentis multa pensaret. Nec quorū cōmodū age-
 retur, tota uita uellent imprudentes negocij sui conspici, eoq; di-
 scendi cupidiores agricolationē pernoscerent. Nunc & ipsi p̄dia
 nostra colere dedignamur, & nullius momenti duāmus peritissi-
 mum quenq; uillicū facere, uel si nesciam, certe quenq; uigoris ex-
 perrecti, quo celerius, quod ignoret, addiscat. Sed sine fundum lo

cuples mercatus est, è turba pedisequorum, lecticariorumq; desertissimum annis, & uiribus in agrum relegat (cum istud opus non solum scientiam, sed & uiridem ætatem cum robore corporis ad labores sufferendos desideret) siue mediæ facultatû dominus ex mercenarijs aliquem iam recusantem quotidianum illud tributum, qui uectigalis esse non possit, ignarum rei, cui præfaturus est, magistrum fieri iubet. Quæ cum animaduertam sepe mecum retractans, ac recogitans, q̄ turpi consensu deserta exoleuerit disciplina ruris, uereor, ne flagitiosa, & quodammodo pudenda, ingenuis aut inhonesta sit. Verum cum plurimis monimētis scriptorum admonear apud antiquos nostros fuisse gloriæ curam rusticationis (ex qua Quintius Cincinnatus obsessi consulis, et exercitus liberator, ab aratro uocatus ad dictaturam uenerit, ac rursus fasibus depositis, quos festinantius uictor reddiderat, q̄ sumperat imperator, ad eosdem iuuenços, & quatuor iugerum auitum herediolum redierit. Itemq; C. Fabritius, & Curius Dentatus, alter Pyrrho finibus Italiæ pulso, domitis alter Sabinis accepta, quæ uiritim diuidebantur captiui agri, septem iugera, nō minus industriæ coluerit, q̄ fortiter armis quæsierat. Et ne singulos intempestiue nunc persequar, cum tot alios Romani generis intuear memorabiles duces hoc semp duplici studio floruisse, uel defendendi, uel colendi, patrios, quæsitos ue fines) intelligo luxuriæ, & delitijs nostris pristinum morem, uirilemq; uitam displicuisse. Omnes enim (sicut. M. Varro iam temporibus auorū cōquestratus est) patres familiæ falce, & aratro relictis intra murum correpimus, & in circis potius, ac theatris, q̄ in segetibus, & uinetis manus mouemus, attonitiq; miramur gestus effœminatorū, quod à natura sexum uiris denegatum muliebri motu mentiantur, decipiantq; oculos spectantiū. Mox deinde ut apti ueniamus ad ganeas, quotidianam cruditatem laconicis excoquimus, & exucto sudore sitim quærimus, noctesq; libidinibus, & ebrietatibus, dies ludo, uel somno consumimus. Ac nosmetipsos duamur fortunatos, quod nec orientem solem uidemus, nec occidentem, itaq; istam uitam socordem persequitur uoletudo. Nam sic inueniunt corpora fluxa, & resoluta sunt, ut nihil mors mutatura uideat. At mehercule uera illa Romuli proles assidujs uenatibus, nec minus agrestibus operibus exercitata, firmissimis præualuit corporibus, ac militiâ belli, cum res postulauit, facile sustinuit dur-

COLVMELLAE.

rata pacis laboribus, semperq; rusticam plebem praeponit urbanæ. Ut enim qui in uillis intra consepata morarentur, q̄ qui foris terram molirentur, ignauiores habitos, sic eos, qui sub umbra ciuitatis intra mœnia desides cunctarentur, q̄ qui rura colerent ad ministrarent ne opera colonorum seigniores uisfos. Nundinarum et conuentus manifestum est propterea usurpatos, ut nonis tantummodo diebus urbanæ res agerentur, reliqs administrarent rustice, illis. n. temporibus (ut ante iā diximus) procures ciuitatis in agris morabantur, et cū consilium publicū desiderabatur, à uillis arcesserant in senatum. Ex quo q̄ eos euocabant, uiatores nominati sunt. isq; mos dum seruatus est perseuerantissimo colendo rû agro studio, ueteres illi Sabini Quirites, atq; Romani, quāquā inter ferrū, et ignes, hostiasq; incursionibus uastatæ fruges, largius tñ condidere, q̄ nos, quibus diuturna permittente pace prolatare licuit rem rusticam. Itaq; in hoc Latio et saturnia terra, ubi dii cultus agro progeniem suā docuerant, ibi nūc ad hastā locamus, ut nobis ex transmarinis prouincijs aduehat frumentum, ne fame laboremus, et uindemias condimus ex insulis Cycladibus, ac regionibus beticis, galliisq;. Nec mirū cum sit publice cōcepta, et cōfirmata iam uulgaris existimatio rē rusticā sordidum opus, et id esse negotium, quod nullo egeat magisterio præcepto ue. At ego, cū aut magnitudinē totius rei quasi quandā uastitatē corporis, aut partiū eius uelut singulorū membrorū numerum recenseo, uereor, ne supremus ante me dies occipet, q̄ uniuersam disciplinā ruris possim cognoscere. Nam qui se in hac scientia perfectū uolet profiteri, sit oportet rerū naturæ sagacissimus, declinationū mundi nō ignarus, ut exploratū habeat, quid cuiq; plagæ conueniat, qd repugnet, syderum ortus, et occasus memoria repetat, ne imbribus, uentisq; iminentibus opainchoet, laboremq; frustret. Cœli, et anni præsentis mores intueatur, neq; enim semper eundē uelut ex præscripto habitū gerunt, nec oībus ānis eodem uultu uenit æstas, aut hyems, nec pluuium semper est uer, aut humidus autūnus. Quæ prænoscere sine lumine animi, et sine exquisitissimis disciplinis non quēquam posse crediderim. Iam ipsa terræ uarietas, et cuiusq; soli habitus, quid nobis neget, quid promittat, paucorū est discernere. Contēplatio uero cunctarū in ea disciplina partium qñ cuiq; contingit, ut et segetum, arationumq; peraperet usum, et uarias, dissimillimasq;

terrarum species pernosceret, quarum nonnullæ colore, nonnullæ
 qualitate fallunt, atq; in alijs regionibus nigra terra, quam pul-
 lam uocant, ut in Campania, est laudabilis, in alijs pinguis ru-
 brica melius rñdet, quibusdam (sicut in Africa Numidia) putres
 arenæ fœcūditate uel robustissimum solū uincunt. In Asia, My-
 siaq; densa, et glutinosa terra maxime exuberat, atq; in his ipsis
 habere cognitū qd recuset collis, qd campestris positio, qd cultus,
 quid syluester ager, quid humidus, et graminosus, quid siccus, et
 spurcus, rōne quoq; dispicere, et in arboribus, uinetisq; quorū in-
 finita sunt genera, cōserendis, ac tuendis, et in pecoribus paran-
 dis, conseruandisq; qm et hanc adsumimus quasi agriculturæ
 partem, cum separata sit ab agricolatione pastoralis sciētia, nec
 ea tñ simplex. Quippe aliud exigit equinum, atq; aliud bubulū
 armentum, aliud pecus ouillum, et in eoipso dissimilem rōnem
 postulat tarentinum, atq; hirtū, aliud caprinū, et id ipsum ali-
 ter curatur mutilum, et raripilum, aliter cornutū, et setosum,
 quale est in Ciliā. Porculatoris uero, et subulā diuersa profes-
 sio, diuersæ pastiones, nec eundē glabræ sues, densæq; cœli statū,
 nec eandem educationē, cultū ue quærunt. Et ut à pecoribus re-
 cedam, quorū in parte auium cohortalium, et apium cura posi-
 ta est, qd tanti studiū fuit, ut super ista, quæ enumerauimus, tot
 nosset species insitionum? tot putationum? tot pomorū, holerūq;
 cultus exercere? tot generibus ficoꝝ, sicut rosarijs impēderet curā,
 cum à plerisq; et maiora negligantur? quanquā et ista iam non
 minima uectigalia multis esse cœperunt. Nam prata, et salicta,
 genistæq; et arundines quāuis tenuem nihilo minus aliquā de-
 siderant industriā. Post hanc tam multarū, tamq; multiplicium
 rerū prædicationem non me pterit, si quem desideramus agricolā
 quemq; describimus, exegero à ptiapibus agrestiū operū, tarda-
 tum iri studia discētiū, qui tā uariæ, tamq; uastæ scientiæ de-
 speratione cōterriti nolent experiri, quod se asseq posse diffident.
 Verūtñ quod i oratore iā M. Tullius rectissime dixit, par est eos,
 qui generi humano res utilissimas conquirere, et perpēsas, explo-
 ratasq; memoriæ tradere concupierint, cuncta tentare. Nec si uel
 illa pstantis ingenij uis, uel inclytarum artium defecerit instru-
 mentum, confestim debemus ad otium, et inertia deuolui, sed qd
 sapienter sperauimus, perseueranter consecrari. Summum. n. cul-
 men affectantes satis honeste uel in secundo fastigio cōspiciemur.

An latiae musae non solos adytis suis Accium, & Virgiliū receperet, sed eorū & proximis, & procul à secundis sacras concessere sedes? Nec Brutum, aut Caelium, Pollionem, ne cum Messala, & Catulo deterruere ab eloquentiae studio fulmina illa Ciceronis. Nā neq; ille ipse Cicero territus cesserat tonantibus Demostheni, Platoniq; nec parens eloquentiae deus ille Mæonius uastissimus fluminibus facundiae suae posteritatis studia restinxerat. Ac ne minoris quidem famae opifices pro tot iam secula uidemus laborem suum destituisse, qui Protogenē, Appellemq; cum Parrasio mirati sunt. Nec pulchritudine Iouis olympi, Mineruq; phidiacae sequentis aetatis attonitos piguit experiri Bryaxim, Lysippū, Praxitelem, Policletū, quod efficere, aut quousq; progredi possent. Sed in omni genere scientiae, & summis admiratio, ueneratioq; et inferioribus merita laus contingit. Accedit huc quod ille, quem nos perfectum esse uolumus agricolā, siquidē artis consummata non sit, & in uniuersa rerū natura sagacitatem Democriti, uel Pythagorae non fuerit confectus, & in motibus astroꝝ, uentorūq; Metonis providentiam, uel Eudoxi, et in pecoris cultu doctrinā Chironis, ac Melapodis, et in agroꝝ, soliūq; molitione Triptolemi, aut Aristei prudentiam, multū tamen profecerit, si usu Tremellios, Safernasq; & Stolones nostros equauerit. Potest. n. nec subtilissima, nec rursus, quod aiunt, pingui Minerua res agrestis administrari. Nā illud procul uero est, quod pleriq; crediderunt, facillimam esse, nec ullius acuminis rusticationem. De cuius uniuersitate nihil attinet plura nunc differere, quandoquidem cunctae preeseius destinatis aliquot uoluminibus explicandae sunt, quas ordine suo tunc demum persequar, cum praefatus fuero quod reor ad uniuersam disciplinam maxime pertinere.

Præcepta, quae sequantur qui rustificari uelint. Cap. I.

QVI studium agricolationi dederit, antiquissima sciat haec sibi aduocanda, prudentiam rei, facultatem impendendi, uoluntatem agendi. Nā is demum cultissimū rus habebit (ut ait Tremellius) qui & colere sciet, et poterit, et uolet, neq; n. scire, aut uelle, cui quod satis fuerit sine sumptibus, quos exigunt opera. Nec rursus faciendi, aut impendendi uoluntas profuerit sine arte, quia caput est in omni negotio nosse, quod agendum sit, maximeq; in agricultura, in qua uoluntas, facultasq; atra scientiam sepe magnā dominis afferunt iacturā, cum imprudenter facta opera frustrantur impensas. Itaque diligens paterfamilias,

cui cordi est ex agri cultu certam sequi rationem rei familiaris augenda, maxime curabit, ut et etatis suae prudētissimos agricolas de qua; re consulat, et commentarios antiquorū sedulo scrutetur, atq; aestimet qd eorū quisq; senserit, quid praeceperit. An uniuersa quae maiores prodiderunt, huius temporis culturae respondeant, an aliqua dissonent. Multos enim iam memorabiles authores cōperi persuasum habere longo aui situ qualitatem cœli, statumq; mutari, eorumq; consultissimum astrologiae professorem Hipparchum prodidisse, tempus fore, quo cardines mundi loco mouerentur, idq; etiam non spernendus author rei rusticae Salserna uidetur adcredidisse. Nam eo libro, quem de agricultura scriptum reliquit, mutatum cœli statum sic colligit, quod quae regiones antea propter hyemis assiduam uiolentiam nullam stirpem nitis, aut oleae deposita custodire potuerint, nunc mitigato iam, & in tepe scēte pristino frigore largissimis oliuitatibus, liberiq; uindemys exuberent. Sed haec siue falsa, seu uera rō est, litteris astrologiae cōcedatur. Cetera non dissimulanda erunt agro cultori praecepta rusticationis, quae cū plurima tradiderint Pœni scriptores, multa tñ ab his falso prodita coarguunt nostri coloni, sicut Tremellius, qui querens id ipsum tñ excusat, qd Italiae, & Africae solum, cœliq; diuersae naturae nequeat eosdē prouentus hēre. Quaecunq; sunt aut, quae propter disciplinam ruris nostrorū temporū cum prisca discrepent, nō detertere debēt à lectione discētem. Nam multo plura reperiunt apud ueteres, quae nobis probanda sint, q̄ quae repudianda. Magna quippe est graecorū turba de rusticiis rebus p̄apiens, cuius princeps celeberrimus uates non minimū professioni nostrae contulit Hesiodus bæotius. Magis deinde eā inuere fontibus orti sapientiae Democritus Abderites, Socraticus Xenophon, Tarentinus Architas, peripatetici magister, ac discipulus Aristoteles cū Theophrasto. Siculi quoq; non mediocri cura negotiū istud prosecuti sunt Hieron, & Epicharmus discipulus, Philometor, et Attalus, Athenae uero scriptorū frequentiam pepererunt, è q̄s probatissimi authores Chæreas, Aristadros, Amphilocheus, Euphrō, Chrestus Euphrōis, nō, ut multi putāt, Amphipolites, q̄ & ipse laudabilis habet agricola, sed indigena soli attia. Insula quoq; curā istā celebrauerunt, ut testis est Rhodius, Epigenes, Chius Agathocles, Euagon, & Anaxipolis Thasus. Vnius quoq; de septem Biantis illius populares Manāder,

COLVMELLAE.

Diodorus in primis sibi uendicauerunt agricolationis prudentiā. Nec his cedere Milesy Bacchius, et Mnasseas, Antigonus Cymeus Pergamennus, Apollonius, Dion colophonius, Hegesias maronites. Nā qdem Diophanes bithynius uticensem totū Dionysii Pœni Magonis interpretē p multa diffusum uolumina, sex epitomis circūscripsit. Et alij tñ obscuriores, quorū patrias non accēpimus, aliquod stipendiū nostro studio contulerunt. Hi sunt Androtion, Aeschrius, Aristomenes, Athenagoras, Crates, Dadis, Dionysius *Ἐπίφρων*, Euphorion. Nec minori fide p uirili pte tributū nobis intulerūt Lysimachus, et Cleobolus, Menestratus, Pleutiphanes, persis, Theophilus. Et ut agricolationē Romana tandē ciuitate donemus (nā adhuc istis authoribus græcæ gētis fuit) iā nunc. M. Catonē Censoriū illū memoremus, q eā latine loqui primus instituit. Post hūc duos Salsernas patrē, & filiū, q eā diligentius erudierūt, ac deinde Scrofam Tremelliū, qui eam eloquentē reddidit, et. M. Terentiū, q expoliuit, mox Virgiliū, q carmine quoq; potentē fecit. Nec postremo quasi pedagogi eius meminisse dedignemur Iulij Higini. Verūtamen, ut Carthaginiensem Magonē rusticationis parentē maxime ueneremur. Nā huius octo, & uiginti memorabilia illa uolumina ex senatusconsulto in latinū sermonē cōuersa sunt. Non minorē tñ laudem meruerunt nostrorū tēporū uiri Cornelius Celsus, et Iulius Atticus. Quippe Cornelius totū corpus disciplinæ qnq; libris cōplexus ē. Hic de una specie culturæ ptinentis ad uites singularem librū edidit. Cuius uelut discipulus duo uolumina similiū pceptorū de uineis Iulius Græcinus composita facietius, et eruditius posteritati tradēda curauit. Hos igif Publi Siluine prius q cū agricolatiōe contrahas, aduocato in consiliū, nec tñ sic mente dispositus uelut summā totius rei sententijs eorū consecutus, qppe eiusmodi scriptorū monumenta magis instruunt, q faciunt artificē. Vsus, et experientia dominantur in artibus, neq; est ulla disciplina, in qua nō peccādo discatur, nā ubi qd perperā administratum cesserit improspere, uitatur quod sefellerat, illuminatq; rectam uia docētis magisteriū. Quare nostra pcepta non cōsumare scientiam, sed adinuare promittunt, nec statim quisquā compos agricolationis erit his perlectis rōnibus, nisi & obire eas uoluerit, & per facultates potuerit. Ideoq; hæc uelut adminicula studiosis pmittimus, non profutura p se sola, sed cū alijs. Ac ne ista qdem pæsidia, ut

diximus, nō assiduus labor, et experientia uillici, non facultates, ac uoluntas impendendi tū pollent, q̄tum uel una præsētia domini, quæ nisi frequens operibus interuenerit, ut in exercitu cum abest impator, cuncta cessant officia, maximeq; reor hoc significātem poenū Magonē suorū scriptorū primordium talibus auspiciatū sententijs. Qui agrū parabit, domum uendat, ne malit urbanum, q̄ rusticum larem colere, cui magis cordi fuerit urbanū domitiliū, rustico prædio nō erit opus, qđ ego præceptū, si posset his temporibus obseruari, non immutarem. Nunc quoniam plerosq; nostrum ciuilis ambitio sepe euocat, ac sepius detinet euocatos, sequitur, ut suburbanum prædium commodissimum esse putem, quo ut occupato quotidianus excursus facile post negotia fori contingat. Nam qui longinqua ne dicam transmarina rura mercantur, uelut hæredibus patrimonio suo, et quod grauius est uini cedunt suis, quoniam qđem et illi tam longa dominorum distantia corrumpuntur, et corrupti post flagitia, quæ commiserunt, sub expectatione successorū rapinis magis, q̄ culturæ student.

Qualiter dispositus fundus maxime probetur. Cap. II.

CENSEO igitur in propinquo agrum mercari, quod et frequēter dominus ueniat, et frequentius se uenturum, q̄ sit uenturus, denūciat. Sub hoc. n. metu cū familia uillicus erit in officio. Quicquid uero dabit occasione ruri moret, q̄ non sit mora se gnis, nec umbratilis, nā diligentē patremfamilias deæt agri sui particularas oēs, et omni tpe anni frequentius circumire, quo prudentius naturam soli siue in frondibus, et herbis, siue iam maturis frugibus cōtempletur, nec ignoret quicquid in eo recte fieri poterit, nam illud uetus est, et Catonis, agrū pessime mulctari, cuius dñs, qđ in eo faciendū sit, nō docet, sed audit uillicū, quapropter uel a maioribus traditū possidenti, uel empturo fundū præcipua cura sit scire, qđ maxime regionis genus p̄betur, ut uel careat inutili, uel merætur laudabile. Quod si uoto fortuna subscripserit, agrū habebimus salubri cœlo, uberi gleba, pte cāpestri, pte alia collibus uel ad orientē, uel ad meridiē molliter deuexis, terrenisq; alijs cultis atq; alijs syluestribus, et aspīs, nec pcul a mari, aut nauigabili flumine, quod deportari fructus, et p qđ merces inuehi possint. Cāpus i prata, et arua, salictaq; et arūdineta digestus, edificio subiaceat. Colles aliq; uacui arboribus, ut solis segetibus seruiant, q̄ tū

COLVMELLAE.

modice siccis, ac pinguibus campis melius, q̄ p̄cipitibus locis pro-
ueniunt. Ideoq; etiam celsiores agri frumentarii planities habe-
re, & quam mollissime deuexi, ac simillimi debent esse campestri
positioni, alij deinde colles oliuetis, uinetisq; & earum futuris pe-
damentis uestiantur, materiam, lapidemq; si necessitas ædifican-
di coegerit, nec minus pecudibus pascua præbere possint. Tum
rivos decurrentis in prata, & hortos, & salicta, uinæ aquæ salie-
tes demittant, nec absint greges armentorum, ceterorumq; qua-
drupedum culta & dumeta pascentium, sed hæc positio, quam
desideramus, difficilis, et rara paucis cōtingit. Proxima est huic
quæ plurima ex his habet, tolerabilis, quæ non paucissima.

Quæ præcipue respiciendo agro, ante quàm ematur, notanda
sunt.

Cap. III.

PORCIVS quidem Cato censebat in emendo agro præci-
pue duo esse considerata, salubritatem cœli, & ubertatem lo-
ci, quorum si alterum deesset, ac nihilo minus quis uellet incole-
re, mente esse captum, atq; cum ad agnatos, & gentiles deducen-
dum. Neminem enim sanum debere facere sumptus in cultura ste-
rilis soli, nec rursus pestilenti quamuis feracissimo pinguiq; agro,
cum incertum sit an dominum sinat ad fructus peruenire. Nam
ubi sit cum orco ratio ponenda, ibi non modo perceptionem fru-
ctuum, sed & uitam colonorum esse dubiam, uel potius mor-
tem quæstu certiore. Post hæc duo principalia, subiungebat il-
la non minus intuenda, uiam, aquam, uicinum. Multum con-
ferre agris iter commodum, primum, quod est maximum, ipsam
præsentiam domini, qui libentius commeaturus sit, si uexatione
uiæ non reformidet, deinde ad uehenda, & exportanda utensili-
a, quæ res frugibus conditis auget pretium, & minuit impen-
sas rerum inuectarum, quia minoris apportentur eò, quò facili ni-
si perueniatur. Nec non nihil esse etiam paruo uehi, si conductis
iumentis iter facias, quod magis expedit, q̄ tueri propria. Seruos
quoq; qui secuturi patrem familias sint, non ægre iter pedibus in-
gredi, de bonitate aquæ ita omnibus clarum est, ut pluribus nō
sit differendum. Quis enim dubitet eam maxime probatam ha-
beri, sine qua nemo nostrum uel prosperæ, uel aduersæ uoletudi-
nis uitam proroget? de uicini comodo non est quidem certum,
quem nonnunquam mors, aliæq; nobiscum diuersæ causæ mutāt.

Et ideo

Et ideo quidam respuunt Catonis sententiam, qui tamen multū uidentur errare, nam quemadmodum sapientis est fortuitos casus magno animo sustinere, ita dementis est ipsum sibi malum facere fortunam, quod facit, qui nequam uicinum suis numis parat, cum, à primis cunabulis (si modo liberis parentibus est oriūdus) audisse potuerit

μηδ' ἂν βοῦς ἀπόλοιτ', εἰ μὴ γέ τ' ὦν κακός ἐιν.

quod non solum de boue dicitur, sed etiam de omnibus partibus rei nostræ familiaris, adeo quidem, ut multi prætulerint carere penatibus, & propter iniurias uicinorum sedes suas profugerint, nī si aliter existimamus diuersum orbem gentes uniuersas petūssere, licto patrio solo, Achæos dico, et Hiberos, Albanos quoq; nec minus Siculos, & ut primordia nostra contingam, Pelasgos, Aborigines, Arcadas, q̄ quia malos uicinos ferre non potuerant. Ac ne tantum de publicis calamitatibus loquar, priuatos quoq; memoria tradidit, & in regionibus Græciæ, & in hac ipsa hesperia detestabiles fuisse uicinos, nisi Autolicus ille cuiquam potuit tolerabilis esse conterminus, aut Auentini montis incola, Palatinis ullum gaudium finitimis suis Cacus attulit. Malo enim prætorum, q̄ præsentium meminisse, ne uicinum meum nominem, qui nec arborem prolixiorem stare nostræ regionis, nec inuiolatū seminarium, nec pedamenti quicq̄ adnexam uineæ, nec etiā pecudes negligentius passi finit. Iure igitur q̄tū mea fert opinio). M. Porcius talem pestem uitare censuit. Et in primis futurū agricolam præmonuit, ne sua sponte ad eam perueniret. Nos ad cetera præcepta illud adiūimus, quod sapiens unus de septem in perpetuum posteritati pronunciauit μέτρον ἄριστον, Adhibendum modum, mensuramq; rebus, idq; ut non solum aliud acturis, sed & agrum paraturis dictum intelligatur, ne maiorem quàm ratio calculorum patiat, emere uelit, nam huc pertinet præclara nostri poetæ sententia.

Laudato ingentia rura. Exiguum colito.

Quod uir eruditissimus (ut mea fert opinio) traditum uetus præceptum numeris signauit, quippe acutissimam gentem Pænos dixisse cōuenit. Imbecillio rem agrum, q̄ agricolam esse debere, qm̄ cum sit colluctandum cum eo, si fundus præualeat, allidi dominum. Nec dubium quin minus reddat laxus ager non recte cultus, q̄ angustus eximie. Ideoq; post reges exactos lianiana illa

Colu.

m

septena iugera, quæ plebis tr. uiritim diuiserat, maiores quæstus antiquis retulere, quæ nunc nobis præbent amplissima ueruacta, tanta quidem Curius Dentatus, quem paulo ante retulimus, prospero ductu parta uictoria ob eximiam uirtutem deferente populo premij nomine quinquaginta soli iugera supra consularem, triumphalemque fortunam putauit esse. Repudiatoque publico munere populari, hac plebeia mensura contentus fuit. Mox et cum agrorum uastitatem uictoriæ nostræ, et internitiones hostium fecissent, criminis tamen senatori fuit, supra quinquaginta iugera possedisse. Suaque lege. C. Licinius damnatus est, quod agri modum, quem in magistratu rogatione tribunitia promulgauerat, immodica possidendi libidine transcendisset, nec magis quam superbum uidebatur tamen locum detinere, quia flagitiosum quos hostis profugiendo desolasset agros, nouo more ciuem Romanum supra uires patrimonij possidendo deferere. Modus ergo, qui in omnibus rebus, etiam parandis agris adhibebitur, tantum enim obtinendum est, quantum est opus, ut emisse uideamur, quo potiremur, non quo oneraremur ipsi, atque alijs fruendum eriperemus, more præpotentium, qui possident fines gentium, quos ne circumire quoque ualent, sed proculcandos pecudibus, et uastandos, ac populandos feris derelinquunt, aut occupatos nexu crurum, et ergastulis tenent. Modus autem erit sua cuique moderata uoluntas, facultasque. Neque enim satis est, ut iam prius dixi, possidere uelle, si colere non possis.

De salubritate regionum.

Cap. IIII.

SEQUITUR deinceps cæsonianum præceptum, quo fertur usus etiam Cato, mercaturis agrum esse reuiscendum sæpius eum, quem uelint mercari. Nam prima inspectione neque uitia, neque uirtutes abditas ostendit, quæ mox retractantibus facilius apparerent. Inspectionis quoque uelut formula nobis a maioribus tradita est. Agri pinguis, ac leti, de cuius qualitate dicemus suo loco, cum de generibus terræ differemus. In uniuersum tamen quasi testificandum, atque sæpius prædicandum habeo, quod primo iam punico bello dux inclytissimus. M. Attilius Regulus dixisse memoratur, fundum, sicuti ne fecundissimi quidem soli, cum sit insalubris, ita nec effæti, si uel saluberrimus sit, parandum, quod Attilius ætatis suæ agricolis maiore cum auctoritate suadebat pitus usu. Nam pupinæ pestilentis simul, et exilis agri cultorem fuisse

em loquuntur historiae. Quapropter cum sit sapientis non ubiq;
emere, nec aut ubertatis illecebris, aut deliciarū concinnitate de-
api, sic uere industrij patrisfamilias est quicquid aut emerit, aut
acceperit, facere fructuosum, atq; utile, quoniam et grauioris cœ-
li multa remedia priores tradiderunt, quibus mitigetur pestifera
lues, & in exili terra cultoris prudentia, ac diligentia maciem so-
li uincere potest. Hæc autem consequemur, si uerissimo uati, uel
ut oraculo crediderimus dicenti.

Ventos, & uarium cœli prædiscere morem

Cura sit, ac patrios cultusq; habitusq; locorum.

Et quid quæq; ferat regio, & quid quæq; recuset.

Nec contenti tamen auctoritate uel priorum, uel præsentium co-
lonorū nostra prætermiserimus exempla, nouaq; quæ temptaue-
rimus, experimenta. Quod etsi per partes nonnunquam dāno-
sum est, in summa tñ sit compendiosum, quod nullus ager sine p-
fectu colitur, simul attentando possessor efficiat, ut in id formetur,
quod maxime præstare possit, ea res etiam feracissimos agros uti-
liores reddit. Itaq; nusquam experimentorū uarietas omittenda
est. Longeq; etiam in pingui solo magis audendum, qm nec labo-
rem, nec sumptum frustratur effectus. Sed quoniam refert qualis
fundus, & quomodo colatur, tñ uilla qualiter ædificetur, & q̄
utiliter, disponatur. Multos. n. deerrasse, memoria prodidit, sicut
præstantissimos uiros. L. Lucullū, & Q. Scæuolam, quorū alter
maiores, alter minus amplas, q̄ postulauit modus agri, uillas ex-
truxit, cum utrūq; sit cōtra rē familiarem. Diffusiora. n. cōsepta
non solum pluris ædificamus, sed etiam impensis maioribus tue-
mur, at minora cum sunt, q̄ postulat fundus, dilabitur fructus,
nam & humide res, & sicce, quas terra progenerat, facile uitiā-
tur, si aut non sunt, aut propter angustias, incommoda sunt te-
cta, quibus inferātur. Pro portione etiam facultatum, quā optime
paterfamilias debet habitare, ut & libentius rus ueniat, & de-
gat in eo. Iucūdius utiq; uiro si ē matrona comitabit, cuius ut
sexus, ita animus est delicatior, q̄ obrē amœnitate aliqua deme-
renda erit, quo patientius moretur cū uiro. Eleganter igit̄ ædi-
ficet agricola, nec sit tamen ædicator, atq; aræ idem tantū com-
plectatur, quod ait Cato, q̄tum ne uilla fundum quærat, ne ue
fundus uillam, cuius uniuersum situm qualem oporteat esse, nūc
explicitabimus, quod inchoatur ædificium, sicut salubri regione,

ita saluberrima parte regionis debet constitui, nam circumfusus aer, atq; corruptus plurimas affert corporibus nostris causas offensarum. Sunt quaedam loca, quae solstitijs minus concalescunt, sed frigoribus hyemis intolerabiliter horret, sicut Thebas ferunt Boeotias. Sunt quae tepent hyeme, sed aestate saeuissime candent, ut affirmant euhoicam Caladem. Petatur igitur aer calore, & frigore temperatus, quem ferè medius obtinet collis, quod neq; depressus hyeme pruinis torpet, aut torret aestate uaporibus, neq; elatus in summa montium perexiguus uetorum motibus, aut pluuijs omni tempore anni seuit. Haec igitur est medijs collis optima positio, loco tamen ipso paululum intumescente, ne cum à uertice torrens imbribus conceptus effluerit, fundamenta conuellat.

De aqua.

Caput. V.

SIT Autem uel intra uillam, uel extrinsecus inductus fons perennis, lignatio, pabulumq; uicinum. Si deerit fluens unda, putealis quaeratur in uicino, quae non sit haustus profundi, non amari saporis, aut falsi, haec quoq; si deficient, & spes arctior aquae manantis coegerit, uastae cisternae hominibus, piscinaeq; pecoribus instruantur, colligendae aquae tandem pluuiali, quae salubritati corporis est accommodatissima, sed ea sic habetur eximia, si fictilibus tubis in contexta cisternam deducatur, huic proxima fluens aqua est montibus oriunda, si per saxa praecipit deuoluitur, ut est in guarano campaniae. Tertia putealis, uel collina, uel quae non infima ualle reperitur. Deterrima palustris, quae pigro lapsu repit. Pestilens, quae in palude semper consistit. Hic idem tamen humor quauis nocentis naturae, temporibus tamen hyemis edomitus imbribus mitescat, ex quo caelestis aqua maxime salubris intelligitur, quod etiam uenenati liquoris eluit perniciem, sed hanc potui probatissimam diximus. Ceterum ad aestuum temperandos calores, & amoenitatem locorum, plurimum conferunt salientes rini, quos (si conditio loci patietur) qualescunq; dummodo dulces, utique perducendos in uillam censeo. Sin summotus longius à collibus erit amnis, & loci salubritas, editiorq; situs ripae permittet superponere uillam profluenti, cauendum tamen erit, ut à tergo potius, quam praese flumen habeat, et ut aedificij frons auersa sit ab infestis eius regionis uentis, & amicissimis aduersa, cum plerique amnes aestate uaporatis, hyeme frigidis nebulis caligent, quae nisi ui maiore

inspirantiū uentorū submouentur, pecudibus, hominibusq; con-
 ferunt pestem. Optime aut salubribus, ut dixi locis ad oriētem,
 uel ad meridiem, grauib; ad septentrionem uilla conuertitur,
 eademq; semp mare recte conspiciat, cum pulsatur, ac fluctu resper-
 gatur, nunquam ex ripa, sed paulum summotā a litore. Nā prae-
 stat a mari longo potius intervallo, q̄ breui refugisse, quia media
 sunt spatia grauioris halitus, nec paludem quidem uicinam esse
 oportet aedificijs, nec inuētā militarem uia, quod illa caloribus
 noxium uirus eructat, & infestis aculeis armata gignit aīalia, q̄
 in nos densissimis examinibus inuolant. Tum ē natricum, serpē-
 tiūq; pestes hyberna destitutas uligine, cœno, & fermentata col-
 lūie uenenatas emittit, ex quibus saepe contrahuntur cœi mor-
 bi, quorū causas ne medici quidem perspicere queunt, sed & anni
 toto tpe situs, atq; humor instrumētum rusticum, suppellectilēq;
 & inconditos, conditosq; fructus corrumpit. Hæc aut prætereun-
 tium uiatorū populationibus, & assiduīs diuertentium hospitij
 infestat rem familiarem propter quæ censeo eiusmodi uitare incō-
 moda, nullamq; nec in uia, nec pestilenti loco, sed procul, & edi-
 tiore situ condere, ut frons eius ad orientem æquinoctialem dire-
 cta sit. Nam eiusmodi positio medium, temperatumq; libramen-
 tum uentorū hyemaliū, & æstiuorū tenet, quantoq; fuerit aedifi-
 cij solum pronius orienti, tanto et æstate liberius capere p̄flatus,
 & hyemis p̄cellis minus infestari, et matutino regelari ortu pote-
 rit, ut concreti rores liquecant, qm̄ ferè pestilens habet, quod est
 remotum, ac sinistrum soli, & apricis flatibus, qbus si caret nulla
 alia uis pōt nocturnas pruinas, et quodcūq; rubiginis, aut spur-
 citiæ resedit, siccare, atq; detergere, hæc aut cum hominibus affe-
 runt p̄niciem, tum & armentis, & uirentibus, eorūq; fructibus.
 Sed quisquis aedificia uolet in decliuius areis extruere, semp ab
 inferiore pte auspiciet, q̄a cū ex depressiore loco fuerint orsa funda-
 menta, non solum superficiem suā facile sustinebunt, sed & p̄ ful-
 tura, & substructione fungent̄ aduersus ea, quæ mox si forte nil-
 lam prolatare libuerit, ad superiorem partem applicabunt, qp̄
 pe ab imo p̄strueta ualenter resistent contra ea, quæ postmodum
 superposita incumbent, at si summa pars cliui fundata, p̄priam
 molem suscepit, qcq̄ ab inferiore mox apposueris, fissum erit,
 rimosumq;. Nā nouū cum ueteri adstruitur, rimosoq; recens, aedi-
 cū quasi surgenti reluctans oneri cedit, et quod prius extructum

imminebit cædenti paulatim degravatum pondere suo præceptis attrahetur. Igitur id structuræ vitium cum primum statim fundamenta iaciuntur, evitandum est.

De positione villæ.

Cap. VI.

MODVS aut, membrorumq; numerus aptetur uniuerso conscripto, & diuidat in tres partes, urbanā, rusticā, et fructuariā. Urbana rursus in hyberna, & æstiva sic digeratur, ut spectent hyemalis temporis cubacula brumalem orientem, cœnationes æquinoctialem occidentem. Rursus æstiva cubacula spectent meridiem æquinoctialem, sed cœnationes eiusdem temporis prospectent hybernū orientem, Balnearia occidenti æstivo aduertant, ut sint post meridiem, & usq; in vespertinū illustra. Ambulationes meridiano æquinoctiali subiectæ sint, ut & hyeme plurimū solis, & æstate minimū recipiant. At in rustica parte magna, & alta culina ponatur, ut et cōtignatio careat incendiū piculo, et in ea cōmode familiares omni tempore anni morari queant. Optime solutis seruis cellæ meridiem æquinoctialem spectantes fiant, vinctis q̄ saluberrimū subterraneū ergastulū, plurimis sitq; id angustis illustratū fenestris, atq; à terra sic editis, ne manu cōtingi possint. Pecudibus fiant stabula, quæ neq; frigore, neq; calore infestent, domitis armētis duplicia bubilia sint, hyberna, atq; æstiva. Cæteris aut pecoribus, quæ intra villā esse cōuenit ex parte tecta loca, ex parte sub dio parietibus altis circumsepta, ut illic per hyemem, hic per æstatem sine uiolentia ferarū cōquiescant. Sed omnia stabula sic ordinent, neq; humor influere possit, & ut quisq; q̄ ibi cōceptus fuerit, q̄ celerime dilabatur, ut nec fundamenta parietū corrūpantur, nec ungule pecudū. Lata bubilia eē oportebit ped. X. vel minime nouē, quæ mensura et ad procubendū pecori, & in gario ad circūeundū laxa ministraria pbeat. Nō altius edita eē p̄sepia cōuenit, q̄ ut bos, aut iumentum sine incōmodo stans uesa possit. Villico iuxta ianuā fiat habitatio, ut intrantiū, exeuntiumq; cōspectum habeat. Procuratori supra ianuā ob easdem cās, & is tñ uillicū obseruet ex uicino. Sitq; utriq; proximum horreū, quod conferatur oē rusticū instrumentū, & intra id ipsum clausus locus, quod ferramenta condantur. Bubulis, pastoribusq; cellæ ponant iuxta sua pecora, ut ad eorū curā sit opportunus excursus. Omnes tñ q̄ proxime alter ab altero debet habitare, ne uillici diuersas p̄tes circūcūtis sedulitas distendatur, et ut inter se diligētia, et negligētia cuiusq; testes sint.



De diuisione membroꝝ uillæ & primū de granarijs. Ca. VII.

PA R S aut fructuaria diuidit̃ in cellā oleariā, torculariā, cellā uinariā, defrutariā, fœnilia, paleariaq; et apothecas, et horrea, ut ex ijs, q̃ sunt in plano, custodiā recipiāt humidat̃ reꝝ tāq̃ uini, aut olei uenaliū. Siccæ aut res cōgerāt̃ tabulatis, ut frumētā, fœnū, frondes, paleæ, ceteraq; pabula, sed granaria, ut dixi scalis adeant̃, & modici fenestellis aq̃lonibus inspirent̃. Nā ea cœli positio maxime frigida, et minime humida est, q̃ utraq; penitatem cōditis frumētis afferunt. Eadē rō est in plano sitæ uinariæ cellæ, q̃ summota paul̃ esse debet à balneis, furno, sterquilinio, reliquisq; imundicijs tetrū odorem spirātibus, nec minus à asteris, aquis ue salientibus, ex q̃bus q̃ extrahit̃ humor, uinū corrūpit. Neq; me p̃terit sedē frumētis optimā quibuscūq; uideri horreū camera contectū, cuius solū terrenū prius, q̃ cōsternat̃ p̃fossū, & amurca recenti nō salsa madefactū, uelut signinum opus pauculis cōdensant̃. Tum deinde cū exaruit simili modo paucimēta testacea, q̃ pro aqua receperint amurcā mistam calā, & arenæ supsternunt̃, & magna ui pauculis inculcant̃, atq; expoliunt̃, omnesq; parietū, et soli iuncturæ testaceis puluinis fibulant̃. Nā ferē cum his partibus ædificia rimas egerunt, caua præbent, et latebras subterraneis aīalibus. Sed & lacubus distinguunt̃ granaria, ut separatim quæq; legumina ponant̃. Parietes oblinuntur amurca subactō luto, cui pro paleis admista sunt arida oleastri, uel si ea nō sunt, oleæ folia. Deinde cū p̃dictum tectoriū inaruit, rursus amurca resp̃git̃, qua siccata, frumētū īfert̃. Ea res ab noxia circulionū, & similiū aīaliū cōmodissime n̄r conditas fruges defendere, q̃ nisi diligēter repositæ sint, celeriter ab ijs cōsumunt̃. Sed id genus horrei, qđ scripsimus, nisi sit in sicca positione uillæ, quic granū robustissimū corrūpit situ, q̃ si nullus adsit, possunt et defossa frumēta seruari, sicut trās marinis q̃busdā puincijs, ubi puteor̃ in modū, quos appellant Syros, exhausta humus, editos à se fructus recipit. Sed nos in n̄ris regionibus, q̃ redūdant uligine, magis illā positionē pensilis horrei, & hanc curā paucimentorū, & parietum probauimus, qm̄ (ut retuli) sic emunita sola, et latera horreor̃ phibent circulionem, qđ genus exitij cū inādit, multi opinant̃ arceri posse, si exese fruges in horreo uentilent̃, et quasi refrigerent̃. Id autē falsissimum est, neq; enim hoc factō expel-

m iij

luntur animalia, sed immiscetur totis acervis, qui si maneant immoti, summis tantum partibus infestantur, quoniam infra mensuram palmi non nascitur circulio, longeq; prestat id solum, quod iam initiatum est, quod totum periculo subijcere, nam cum exiger usus, facile est eo sublato, quod initiatum erit, integro inferiore uti, sed haec, & si extrinsecus, non tamen intempestive uideor hoc loco retulisse.

De torcularibus.

Cap. VIII.

TORCVLARIA praecipue, cellaeq; oleariae calidae esse debent, quia commodius omnis liquor uapore soluitur, ac frigoribus magis constringitur. Oleum, quod minus provenit, si congelatur, fracescat, sed ut calore naturali est opus, qui contingit positione caeli, & declinatione, ita non est opus ignibus, aut flammis, quoniam fumo, & fuligine sapor olei corrumpitur. Propter quod torcular debet a meridiana parte illustrari, necesse ne habeamus ignes, lucernamq; adhibere, cum premetur olea.

De cortinalibus & apothecis uini.

Cap. IX.

CORTINALE ubi defrutum fiat nec angustum, nec obscurum sit, ut sine incommodo minister, qui sapam decoquet, uersari possit. Fumarium quoq; quo materia (si non sit iam pridem cesa) festinato siccescit, in parte rustica uillae fieri potest iunctum rusticis balneis, nam eas quoq; refert esse, in quibus familia, sed tamen feris lauetur. Neq; enim corporis robori conuenit frequens usus earum. Apothecae recte supponentur his locis, unde plerumq; fumus earum exoritur, quoniam uina celerius uetustescunt, quae summi quodam tenore praecoque maturitatem trahunt. Propter quod & aliud tabulatum esse debet, quo admoneantur, ne rursus nimia suffitione medicata sint. Quod ad uillae pertinet situm, proutque eius dispositionem, satis dictum est.

Quae circa uillam facienda sunt.

Cap. X.

CIRCA uillam deinceps haec esse oportebit, furnum, & pistrium, quantum futurus numerus colonorum postulauerit. Piscinas minimum duas, alteram, quae anseribus, ac pecoribus seruiat, alteram, in qua lupinum, uimina, & uirgas, atque alia, quae sunt usibus nostris apta maceremus. Sterquilinia quoque duo sint, unum, quod noua purgamenta recipiat, et in annum conseruet, alterum, ex quo uetera uelantur, sed utrumque more piscinarum deuexum leni cliuo, & extrin-

Etum, panitumq; solo, ne humorem transmittant. Plurimū enim refert non assiccato succo finum vires continere, & assiduo macerari liquore, ut siqua interiecta sint stramentis, aut paleis, spinarum, uel graminum semina intereant, nec in agrum exportata, segetes herbidas reddant. Ideoq; periti rustici quicquid ouilibus, stabulisq; conuersum pgefferunt, superpositis uirgis tegūt, nec arefcere uentis sinunt, aut solis in cursu patiunt exuri. Area, si competit, ita constituenda est, ut uel à domino, uel certe à procuratore despiā possit. Ea q; optima est silice constrata, quod et celeriter frumenta deteruntur, non cedente solo pulsibus ungularū tribularumq; & eadem euentilata mundiora sunt, lapillisq; carent, & glebulis, quas per trituram ferè terrena remittit area. Huic autem nubilarium applicari debet, maximeq; in Italia ppter inconstantiam cœli, quo collata semitrita frumenta protegantur, si subitanens imber inçesserit. Nam in transmarinis quibusdam regionibus, ubi æstas pluuiæ caret, superuacuum est. Pomaria quoq; & hortos oportet septo circumdari, & esse in ppinquo, atq; in ea parte, quò possit omnis stercorata colluuiæ cortis balineorumq; et oleis expressa amurcæ sanies influere, nam eius modi quoq; lætatur alimentis, & olus, & arbor.

De officijs patrisfamilias.

Cap. XI.

HIS Omnibus ita uel acceptis, uel compositis præcipua cura dñi requirit, cum in cæteris rebus, tū maxime in hominibus. Atq; hi uel coloni, uel serui sunt soluti, aut uincti. Comiter agat cū colonis, faciliq; se præbeat, & auarius opus exigat, q̄ pensiones, qm̄ & minus id offendit, & tñ in uniuersum magis prodest. Nā ubi sedulo colitur ager, plerunq; compendium, nunquam (nisi si cœli maior uis, aut prædonis inçessit) detrimentum affert, eoq; remissionem colonus petere nō audet. Sed nec dñs in unaquaq; re, cui colonum obligauerit, tenax esse iuris sui debet, sicut in diebus pecuniarū, ut lignis, et cæteris paruis accessiōibus exigēdis, quarum cura maiorem molestiam, q̄ impensam rusticis affert. Nec sanè est uindicādū nobis qcquid licet. Nam summum ius antiqui summam putabant crucem. Nec rursus in totum remittendum; qm̄ uel optima nomina non appellādo, fieri mala fœnerator Alphius dixisse uerissime fertur. Sed & ipse nostra memoria ueterē consularem, uirumq; opulētissimum. L. Volusium asseuerantem.

audiui felicissimum fundum esse, qui colonos indigenas haberet, & tanquam in paterna possessione natos iam inde à cunabulis longa familiaritate retineret. Ita certe mea fert opinio rem maiorem esse frequentem locationem fundi, peiorem tamen urbanum colonum, qui per familiam manult agrum, quam per se colere. Salserna dicebat ab eiusmodi homine ferè pro mercede litè reddi. Propter quod operam dandam esse, ut & rusticos, & eosdem assiduos colonos retineamus, cum aut nobismetipsis non liceat, aut per domesticos colere non expedierit, quod tamen non euenit, nisi in his regionibus, quæ gravitate cæli, solique sterilitate vastantur. Ceterum cum mediocris adest, & salubritas, & terræ bonitas, nunquam non ex agro plus sua cuique cura reddidit, quam coloni, nunquam non etiam villi, nisi si maxima uel negligentia serui, uel rapacitas interuenit. Quæ utraq; peccata plerumque uitio domini uel comitti, uel foueri nihil dubium est, cum liceat aut cauere, ne talis præficiatur negotio, aut iam præpositus, ut submoneatur, curare. In longinquis tamen fundis, in quos non est facilis excursus patrisfamilias, cum omne genus agri tolerabilius sit sub liberis colonis, quam sub uilliciis seruis habere, tum præcipue frumentarium, quem minime sicut uineas, aut arbutum colonus euertere potest, & maxime uexant serui, qui boues elocant, eosdemque, & cetera pecora male pascunt, nec industrie terram uertunt, longeque plus imputant seminis iacti, quam quod seuerint. Sed nec quod terræ mandauerint sic adiuuant, ut recte proueniat, idque cum in aream contulerunt, per trituram quotidie minuunt uel fraude, uel negligentia. Nam & ipsi diripiunt, & ab alijs furibus non custodiunt. Sed nec conditum cum fide, rationibus inferunt, ita fit, ut & actor, & familia peccent, et ager sæpius infametur, quare talis generis prædium, si (ut dixi) domini præsentia cariturum est, censeo locandum.

De Pecore, & pecorum magistris.

Cap. XII.

PROXIMA est cura de seruis, cui quæque officio præponere conueniat, quosque, & qualibus operibus destinare. Igitur præmonere, ne uillicum ex eo genere seruorum, qui corpore placuerunt, instituamus, ne ex eo quidem ordine, qui urbanas, ac delicatas artes exercuerit. Socors, et somniculosum genus id mancipiorum otiosum, campo circo, theatris, aleæ, popinæ, lupanaribus consuetum, nunquam non easdem ineptias somniat, quas cum in agriculturam transtulit,

non tantum in ipso seruo, quantum in uniuersa re detrimenti do-
 minus capit. Eligendus est rusticiis operibus ab infante duratus,
 & inspectus experimentis. Si tñ is non erit, de ijs præficiatur, qui
 seruitutem laboriosam tolerauerunt. Iamq; is transcenderit et a-
 tem primæ iuuentæ, nec dum senectutis attigerit, illa ne et aucto-
 ritatem detrahat ad imperiũ, cum maiores dedignentur parere
 adolescentulo. Hæc ne laboriosissimo succubat operi. Mediæ igit
 sit ætatis, & firmi roboris, peritus rerũ rusticarum, aut certe ma-
 xime curæ, quo celerius addiscat. Nā non est nostri negotij alter
 imperare, et alterum docere, neq; enim recte opus exigere ualet,
 qui quid, aut qualiter faciendum sit, ab subiecto, disat. Potest et
 illitteratus, dūmodo tenacissimæ sit memoriæ, rem satis commode
 administrare. Eiusmodi villicũ Cornelius Celsus ait, sepius nũ-
 mos domino, q̃ librum asferre, quia nescius litterarũ, uel ipse mi-
 nus possit rationes consingere, uel per alium propter conscientia
 fraudis timere. Sed qualicunq; villico contubernalis mulier assi-
 gnanda est, quæ contineat eum, et in quibusdam rebus tamẽ ad-
 iuuat. Idemq; actori præcipiendum est, ne conuictum cum dome-
 stico, multoq; minus cum extero habeat. Nonnunquam tñ eum,
 quem assidue sedulum, & fortem in operibus administrandis co-
 gnouerit, honoris causa mensæ suæ die festo digne adhibere. Sa-
 crificia nisi ex præcepto domini ne fecerit. Aruspices, sagasq; , quæ
 utraq; genera uana superstitione rudes animos ad impensas, ac de-
 inceps ad flagitia compellunt, ne admiserit, neq; urbem, neq; ul-
 las nundinas nouerit, nisi emendæ, uedendæ ue pertinentis ad se
 rei cā. Villicus enim (qđ ait Cato) ambulator esse non debet, nec
 egredi terminos, nisi ut addiscat aliquam culturā, & hoc si ita
 in uicino est, ut cito remeare possit. Semitas, nouosq; limites in
 agro, fieri ne patiat, ne ue hospitẽ nisi amicũ, familiaremq; do-
 mini necessarium receperit, ut ab his arcendus, ita exhortandus
 est ad instrumentorũ, ferramentorũq; curam, ut duplicia, q̃ nume-
 rus seruorũ exigit, refecta, & reposita custodiat, nequid a uicino
 petendum sit, quia plus in operis seruorũ, q̃ in pretio rerum ei
 modi consumitur. Cultam, uestitamq; familiam magis utiliter,
 quàm delicate habeat, munitamq; diligenter a uento, frigore,
 pluuiæq; , quæ cūcta prohibentur, pellibus manicatis, centonibus
 cōfectis, uel sagis cucullis, id si fiat, nullus dies tã intolerabilis ē,
 quo non sub diuo moliri aliquid possit. Nec tñ operis agrestis sit

COLVMELLAE.

artifex, sed & animi, quantum seruale patit ingenium, uirtutibus instructus, ut neq; remisse, neq; crudeliter imperet. Semperq; aliquos ex melioribus foueat, parcat tñ etiam minus bonis, ita ut potius timeant eius seueritatem, q̃ crudelitatem detestentur. Id contingere poterit, si maluerit custodire subiectos, ne peccent, q̃ negligentia sua cõmittere, ut puniat delinquentes. Nulla est autem maior uel nequissimi hominis custodia, q̃ operis exactio, ut iusta reddant, ut uillicus semp se representet. Sic enim & magistri singulorū officiorū sedulo munia sua exequentur, & ceteri post fationem operis quieti, ac somno potius, q̃ delitijs operā dabunt. Iam illa uetera, sed optimi moris, quæ nūc exoleuerūt, utinam possint obtineri, ne conseruo ministro quoquam nisi in re domini utatur, ne cibum nisi in conspectu familiæ capiat, ne uel alium, q̃ q̃ ceteris præbet, sic enim curabit, ut & panis diligēter confiat, & reliqua salubriter apparentur. Ne extra fines nisi à se missum, progredi sinat. Sed nec ipse mittat nisi magna necessitate cogente. Ne uel negotietur sibi, pecuniamq; domini aut animalibus, aut rebus alijs promercalibus occupet. Hæc. n. negotiatio curam uillicii auocat, nec unquam patitur eum cum rationibus domini paria facere. Sed ubi numeratio exiget, rem pro nūmis ostendit. In uniuersum tñ hoc maxime obtinendum ab eo est, ne quid se putet scire, quod nesciat, quæratq; semp addiscere, quod ignorat. Nam cum multum prodest perire quid facere, tum plus obest pperam fecisse. Vnum enim, ac solum dominatur in rusticatione, quicquid exigit rō cultura semel facere, quippe cum emendat uel imprudentia, uel negligentia iam res ipsa decoxit. Nec in tñ postmodum exuberat, ut & rem amissam restituat, et quæstum temporis præteritorū resarciat. In ceteris seruis hæc ferè præcepta seruanda sunt, quæ me custodisse non pœnitet, ut rusticos, qui modo non incommode se gessissent, sæpius quàm urbanos, familiarisq; alloquerer, & cum comitate domini leuari perpetuum laborem eorum intelligerem. Nonnunquam etiam iocarer, et plus ipsis iocari permetterem. Iam illud sæpe facio, ut quasi cum peritioribus de aliquibus operibus nouis deliberem, & p hoc cognoscam cuiusq; ingenium quale, quamq; sit prudens. Tum etiā libentius eos id opus aggredi uideo, de quo se cum deliberatum, & consilio ipsorum susceptum putant, nam illa solēnia sunt omnibus circūspectis, ut ergastuli mancipia recognoscant. Ut explo-

rent, an diligenter uincta sint, an ipse sedes custodiae satis tuta, munitaeque sint, num uillicus aut alligauerit quempiam domino nesciente, aut reuinxerit, nam utrumque maxime seruare debet, ut & quem paterfamilias tali poena mulctauerit, uillicus nisi eiusdem permissu compedibus non eximat, & quem ipse sua sponte uinxerit ante, quam sciat dominus, non resoluat, tantoque curiosior inquisitio patrisfamilias debet esse pro tali genere seruorum, ne aut in uestiarijs, aut in ceteris praebitis iniuriose tractentur, quanto & pluribus subiecti, ut uillicis, operum magistris, ut ergastularijs, magis obnoxij perpetiendis iniurijs, & rursus seuitia, atque auaritia laesi magis timendi sunt. Itaque diligens dominus, cum & ab ipsis, tum et ab solutis, quibus maior est fides, quaerat an ex sua constitutione iusta percipiant. Atque ipse panis, potionisque bonitatem gustu suo exploret, uestem, manicas, pedumque, tegmina recognoscat. Saepem etiam querendi potestatem faciat de ijs, qui aut crudeliter eos, aut fraudulenter infestent. Nos quidem aliquando iniuste dolentes, tam uindicamus, quam animaduertimus in eos, qui seditionibus familiam concitant, qui calumniatur magistros suos, ac rursus premio prosequimur eos, qui strenue, atque industrie se gerunt. Faeminis quoque fecundioribus, quarum in sobole certus numerus honorari debet, otium nonnunquam, & libertatem dedimus, cum complures natos educassent, nam cui tres erant filij, uacatio, cui plures, libertas quoque contingebat. Haec enim iusticia, & cura patrisfamilias multum confert augendo patrimonio. Sed & illa meminerit, cum e ciuitate remeauerit, deos penates adorare, deinde, si tempestiuum erit, confestim, si minus, postero die fines oculis perlustrare, & oes partes agri reuifere, atque aestimare, nunquid absentia sua de disciplina, & custodia remiserit. Num aliqua uitis, num arbor, num fruges absint, tum etiam pecus, & familiam recenseat, fundique instrumentum, & suppellectilem, quae cuncta si per plures annos facere instituerit, bene moratam disciplinam, cum senectus aduenerit, obtinebit. Nec erit ulla eius etas annis ita confecta, ut spernatur a seruis.

Qualis corporaturae mancipia, cuique operi contribuenda sunt.

Cap. XIII.

DICENDVM Etiam est, quibus operibus, quemque habitum corporis, aut animi contribuendum putemus. Magistros pecoribus

bus oportet preponere sedulos, ac frugalissimos, ea res utraque plusq[ue] corporis statura, roburq[ue] confert huic negotio, qm̄ id mini-sterium custodiae diligentis, et artis officium est. Bubulco quis ne-cessaria, non tñ satis est indoles mentis, nisi eum uastitas uocis, et habitus metuendum pecudibus effiat. Sed temperet uires clemē-tia, qm̄ terribior debet esse, q̄ senior, ut et obsequantur eius im-peris, et diutius perennent boues non confecti uexatione simul operum, uerberumq[ue]. Sed quæ sint magistroꝝ munia, quæq[ue] bu-bulcoꝝ, suo loco repetam. Nūc ammonuisse satis est, nihil in his, in illis plurimum referre uires, et proceritatem. Nam lōgissimū quēq[ue] aratorem (sicut dixi) faciemus, et propter id, quod paulo ante retuli, et quod in re rustica nullo minus opere fatigat prolixior, quia in arando stinē penē rectus innititur, mediastinus qualiscunq[ue] status pōt esse, dūmodo perpetiēdo labori sit idoneus. Vineæ nō sic altos, quemadmodum latos, et lacertosos uiros exigunt, nā is habitus fossuris, et putationibus, cæterisq[ue] earum culturis magis aptus. Minus in hoc officio, q̄ in cæteris agricolar-tio frugalitatem requirit, quia et in turba, et sub monitore uinitor opus facere debet. Ac plerūq[ue] uelocior animus est improboꝝ ho-minum, q̄ desyderat huius operis conditio, non solum enim for-tē, sed et acuminis strenui ministrū postulat. Ideoq[ue] uineta plu-rimum per alligatos excolunt. Nihil tñ eiusdem agilitatis homo frugi non melius, q̄ nequam faciet. Hoc interposui, nequis existit-met in ea me opinione uersari, quā malim per noxios, q̄ per inno-centes rura colere. Sed et illud censeo ne cōfundant opera fami-liæ, sic ut oēs omnia exequant. Nam id minime conducit agrico-læ, seu quia nemo suū proprium aliquod esse opus credit, seu quia, cum enixus est non suo, sed cōmuni officio proficiat, ideoq[ue] labori multū se subtrahit, nec tñ uiritim malefactum deprehenditur, qd̄ sit à multis, propter quod separandi sunt aratores à uinitoribus, et uinitores ab aratoribus, uq[ue] à mediastinis. Classes et non ma-iiores, q̄ denu[m] hominum faciundæ, quas decurias appellauerunt antiqui, et maxime probauerūt, quod is numeri modus in opere cōmodissime custodiretur, nec præeuntis monitoris diligentiam multitudo confunderet. Itaq[ue] si latior est ager, in regiones deducendæ sunt eæ classes, diuidundumq[ue] ita opus, ut neq[ue] singuli, bi-niue sint, qm̄ dispersi non facile custodiunt. Nec tñ supra decem, ne rursus ubi nimia turba sit, id opus ad se pertinere singuli non

existiment. Hæc ordinatio non solum conatatur emulationem, sed & deprehendit ignavos. Nam cum certamine opus exatetur, tum in cessantes animaduersio iusta, et sine quærela uidetur adhiberi. Sed nimirum dum quæ maxime providenda sunt agricolæ futuro præcipimus, de salubritate, de uia, de uicino, de aqua, situ uillæ, fundi modo, colonorum, & seniorum generibus, officiorum, operumque distributione, tempestine per hæc ad ipsum iam terræ cultum peruenimus, de quo pluribus libro insequente mox differemus.

LVCII IVNII MODERATI
COLVMELLÆ DE RE
RVSTICA LIBER
SECUNDVS.

Terram nec senescere, nec fatigari, si stercoretur. Cap. I.

q VAERIS EX ME Publi Siluine, quod ego sine cunctatione non recusor docere, cur priore libro ueterum opinionem ferè omnium, quid de cultu agrorum locuti sunt, à principio confestim repulerim, falsamque sententiam repudiauerim consentium longo æui situ, longique iam temporis exercitatione fatigatam, et effectam humum consenuisse. Nec te ignoro cum & aliorum illustrium scriptorum, tum præcipue Tremellij authoritatem reuereri, qui cum plurima rusticarum rerum præcepta simul eleganter, & scite memorie prodiderit, uidelicet illectus nimio fauore priscorum de simili materia differendum, falso credidit parentem omnium terram, sicut muliebrem sexum ætate anili iam confectam, progenerandis esse foetibus inhabilem. Quod ipse quoque confiterer, si in totum nullæ fruges prouenirent. Nam & hominis tum demum declaratur sterile senium, non cum desinit mulier trigeminos, aut geminos parere, sed cum omnino nullum conceptum edere ualet. Itaque transactis inuenta temporibus, et si longa uita superest, partus tantum annis denegatus, non restituitur. At è contrario seu sponte, seu quolibet casu destituta humus, cum è repetita cultu, magno fœnore censationis colono respondet. Non ergo est, exiguarum frugum causa terræ uetustas, si modo cum semel inuasit senectus, regressum non habet, nec renirescere, aut repubescere potest, sed ne lassitudo quidem

COLVMELLAE.

foli minuit agricolæ fructum, neq; enim prudentis est adduci tanquam in hominibus nimia corporis exeritatione, aut oneris aliquis pondere, sic cultibus, & agitationibus agrorum fatigationem succedere. Quid ergo est inquis, quod assenerat Tremellius intacta, & sylvestria loca, cum primum cœperint cultu exuberare, mox deinde non ita respondere labori colonorum? Videt sine dubio quid eueniat, sed cur id accidat, non peruidet, neq; enim icircorudis, & modo ex sylvestri habitu in aruū transducta fœcundior haberi terra debet, quod sit requietior, & iunior, sed quod multorum annorum frondibus, & herbis, quas suapte natura p̄generabat, uelut saginata largioribus pabulis facilius edendis, educandisq; frugibus suffiat. At cum perrupta rastro, et aratris radices herbarum, ferroq; sucasa nemora frondibus suis desierunt alere matrem, quæq; temporibus autumnī frutetis, & arboribus delapsa folia superiaciebantur, mox conuersa uomeribus, & inferiori solo, quod plerūq; est exilius permista, atq; absumpta sunt, sequitur, ut destituta pristinis alimētis macrescat humus. Non igitur fatigatione, quemadmodum plurimi crediderunt, nec senio, sed nostra scilicet inertia minus benigne nobis arua respondent. Licet enim maiorem fructum percipere, si frequenti, & tempestiua, & modica stercoreatione terra resoueatur, de cuius cultu disturos nos priori uolumine polliciti iam nunc differemus.

Quot sint genera terreni, quot deinde species generibus subiungantur, quod solum maxime probetur. Cap. II.

CALLIDISSIMI rusticarum rerum Siluine genera terreni tria esse dixerunt, campestre, collinum, montanum. Campū non æquissima situm planicie, nec perlibrata, sed exigue prona. Collem clementer, & molliter assurgentem. Montem non sublimem, & asperum, sed nemorosum, & herbidum maxime probauerunt. His autem generibus singulis senæ species contribuunt, soli pinguis, uel macri, soluti, uel spissi, humidi, uel siccī, quæ qualitates inter se mistæ uiciis, & alternatæ plurimas efficiunt agrorum uarietates, eas enumerare non est artificis agricolæ. Neq; n. artis officium est per species, quæ sunt innumerabiles, enagari, sed ingredi per genera quæ possunt, & cogitatione mentis, & ambitu uerborum facile copulari. Recurrēdum est igitur ad qualitatum inter

tum inter se dissidentium, quasi quasdam coniunctiones, quas greci συγγίως ἐναγτιότητων, nos discordantium comparationes tolerabiliter dixerimus. Atque etiam significandum est ex omnibus, quæ terra progeneret, plura campo magis, quàm colle, plura pingui solo, quàm macro letari. De sicaneis, et riguis non comperimus utra numero uincant, cum utique penè infinita sint, quæ siccis, quæque humidis locis gaudent, sed ex his nihil non melius resoluta humo, quàm densa provenit, quod noster quoque Virgilius cum, et alias fecundi arui laudes retulisset, adiecit.

Et cui putre solum, namque hoc imitamur arando.

Neque enim aliud est colere, quàm resolvere, et frementare terram, ideoque maximos questus ager præbet, idem pinguis, ac putris, quæ cum plurimum reddat, minimum possit, et quod postulat, exiguo labore, atque impensa conficiatur. Præstantissimum igitur tale solum iure dicatur. Proximum deinde huic pingui ter densum, quod impensam coloni, laboremque magno fœturi remunerat. Tertia est ratio loci rigui, quia sine impensa fructum reddere potest. Hanc primam Cato esse dicebat, qui maxime redditum pratorum cæteris anteponebat, sed nos de agitatione terræ nunc loquimur, non de situ. Nullum deterius habetur genus, quàm quod est siccum pariter, et densum, et macrum, quia cum difficulter tractetur, tum ne tractatum quidem gratiam refert, nec relictum pratibus, vel pascuis abunde sufficit. Itaque hic ager siue exercetur, siue cessat, coloris non est poenitendus, ac tanquam pestilens refugiendus. Nam ille mortem facit, hic teterrimam comitem mortis famem. Si tamen grecis camœnis habemus fidem clamitantibus. λιμὸς δ' οὐκ ἔστι 50ν θάψεν, καὶ τὸ ὄψον ἐπὶ πᾶσι. Sed nunc potius uberius soli meminimus, cuius demonstranda est duplex ratio, culti, et sylvestris, de sylvestri regione in aruorum formam redigenda prius dicemus, quoniam est antiquius facere agrum, quàm colere. Incultum igitur locum consideremus, siccus, an humidus, nemorosus arboribus, an lapidibus confragosus, iuncturae sit, an gramine uestitus, ac filicibus, alijsue frutetibus impeditus, si humidus erit, abundantia uliginis, ante siccetur fossis, earum duo genera cognovimus cæcarum, et patentium, spissis atque cretosis regionibus apertæ relinquunt, at ubi solutior humus est, aliquæ sunt patentibus, quædam etiam obcæcantur, ita ut in patentibus ora hiantia cæcarum competant, sed et patentibus latius, et apertas summa parte, de-

Colu.

n

COLVMELLAE.

clinesq; & ad solum coarctatas, imbricibus supinis similes facere conueniet, nam quarum recta sunt latera, celeriter aquis uiciantur, & superioris soli lapsibus replent. Operta rursus obcari debebunt, sulcis in altitudinem tripedaneam depressis qui cum parte dimidia lapides minutos, uel nudam glarea receperint, aequetur superiecta terra, quae fuerat effossa. Vel si nec lapis erit, nec glarea, sarmentis connexus uelut funis informabit in eam crassitudinem, quam solum fossae possit anguste, quasi accommodatam coarctatamq; capere. Tum primum contendet, ut super calcatis cupressinis, uel pineis, aut si ea non erunt, alijs frondibus terra contegat, in principio, atq; exitu fossae more ponticulorū binis saxis tantūmodo pilarum uicē constitutis, & singulis superpositis, ut eiusmodi constructio ripam sustineat, ne praecludat humoris illapsu, atq; exitu. Nemorosi, frutetosiq; tractus duplex cura est, uel extirpandis radicibus arboribus, & remouendis, uel (si rare sint) tñ succidendis, incendendisq; & inarandis, at saxosum facile est expedire lectione lapidum, quorū si magna est abundantia, uelut quibusdam substructionibus partes agri sunt occupandae, ut reliquae emundent, uel in altitudinem sulco depresso lapides obruendi, quod tñ ita faciendum erit, si suadebit operarum uilitas. Iunci, & graminis pnicies repastinatio est, filias frequens extirpatio, quae uel aratro fieri potest, qm̄ intra biennium sepius conuulsa moriunt, celerius ēt si eodem tpe stercores, & lupino, uel faba conseras, ut cum aliquo reditu medearis agri uitio. Nāq; cōstat filicem sationibus, & stercoratione facilius interimī. Verū & si subinde nascentem salce deidas, quod uel puerile opus est, intra praedictum tempus uiuacitas eius absūmit. Sed iā expediēdi rudis agri rōnem sequit̄ cultorum noualium cura, de qua mox quid censeam profitebor, si quae ante discenda sunt aruorū studio sis praecipero. Plurimos antiquorum, qui de rusticijs rebus scripserunt, memoria repeto, quasi cōfessa, nec dubia signa pinguis, ac frumentorū fertilis agri prodidisse, dulcedinem soli ppriam, herbarum, & arborū prouentum, nigrum colorem, uel cinereum. De ceteris ambigo, de colore satis admirari nō possum cum alios, tñ Cornelium Celsum, non solum agriculationis, sed uniuersae naturae prudentem uirum, sic & sententia, & uisu deerrasse, ut oculis eius tot paludes, tot etiam campi salinarum nō occurrerēt, qbus ferē contribuant praedicti colores. Nullum enim temere uidemus

locum, qui modo pigrum contineat humorem, non eundem uel nigri, uel cinerei coloris, nisi forte in eo fallor ipse, quod non putē aut in solo limosae paludis, & uliginis amarae, aut in maritimis areis salinarū gigni posse leta frumenta, sed est manifestior hic antiquorū error, q̄ ut pluribus argumentis conuincendus sit, non ergo color tanq̄ certus auctor, testis est bonitatis aruorū. Et ideo frumētarius ager, idest pinguis magis, alijs qualitatibus aestimā- dus est. Nam ut fortissimae pecudes diuersos, ac penē innumerabi- les, sic etiam robustissimae terrae plurimos, & uarios colores sorti- te sunt. Itaq; considerandum erit, ut solum, quod excolere desti- namus, pingue sit. Per se tñ id parum ē, si dulcedine caret, quod utrunq; satis expedita nobis rōne contingit discere, nam perexi- gua conspergit aqua gleba, manuq; subigit, ac si glutinosa est, & quouis leuissimo tactu pressa inheresat, & piis in morem ad digitos lentescat habendo, ut ait Virgilius. Eademq; illisa humo non dissipat, ea res admonet nos inesse tali materiae naturalē suc- cum, & pinguitudinem. Sed & si uelis scrobibus egestam humū recondere, et recalcare, cum aliquo quasi fermento abundauerit, certum erit eē eam pingue, cum defuerit exilem, cum aquauerit, mediocrem, quāquam ista, quae nunc retuli, nō tam uera possunt uideri, q̄ si sit pullula terra, quae melius prouentu frugum appro- batur. Sapore quoq; sic dignoscemus, si ex ea parte agri, quae ma- xime displicebit, effossae glebae, & in fictili uase madefactae dulci aqua permisceantur, ac more feculenti uini diligenter colatae gu- stu explorent. Nam qualem traditum ab eis retulerit humor sa- pore, talem esse dicemus eius soli, sed citra hoc experimentum multa sunt, quae & dulcem terram, & frumentis habilem signifi- cent, ut iuncus, ut calamus, ut gramen, ut trifoliū, ebulum, rubi, pruni syluestres, & alia complura, quae ēt indagatoribus aqua- rum nota, non nisi dulcibus terrae uenis educant. Nec contentos esse nos oportet prima specie summi soli, sed diligenter exploran- da est inferioris materiae qualitas, terrena nec ne sit. Frumentis aut sat erit, si aequae bona suberit bipedanea humus, arboribus al- titudo quatuor pedū abūde ē. Hec cū ita explorauerimus, agrū sationibus faciūdis expediemus. Is aut nō minimū exuberat, si cu- riose, et sate subigit, quare antiquissimi ferē oēs formam huius operis conscribere, quā uelut scita legemq; in profundis agris sequant agricolae. Igitur in opere bonae arte iūctos habere con-

COLVMELLAE.

uenit, quo speciosius ingrediantur sublimes, & elatis capitibus, ac minus colla eorum labefactentur, ingumq; melius aptum ceruicibus insidat. Hoc enim genus iuncturae maxime probatum est. Nam illud, quod in quibusdam prouincijs usurpatur, ut cornibus illigetur ingum, ferè repudiatum est ab omnibus, qui praecepta rustici conscripserunt, neq; inmerito, plus enim queunt pecudes collo, & pectore conari, q̃ cornibus. Atq; hoc modo tota mole corporis, totoq; pondere nituntur, at illo retractis, & resupinis capitibus excruciantur, ægreq; terræ summam partem leui admodum uomere sauciant. Et ideo minoribus aratris moliuntur, qui non ualent alte perfossam noualium terram rescindere, quod cum sit omnibus uirentibus plurimum confert, nam penitus aruis sulcatis maiore incremento segetum, arborumq; foetus grandescunt. Et in hoc igitur à Celso dissentio, qui reformidans impensam, quæ scilicet largior est in amplioribus armentis, censet exiguis uomerebus, & dentalibus terrā subigere, quo minoris formæ bubus ad ministrari id possit, ignorans plus esse redditus in ubertate frugū, q̃ in pendij, si maiora mercemur armenta, p̃sertim in Italia, ubi arbustis, atq; oleis consitus ager altius resolui, ac subigi desyderat, ut & summæ radices uitium, olearumq; uomerebus rescindatur, quæ si maneant, frugibus obsint, & inferiores penitus subacto solo facilius capiant humoris alimētum. Potest tñ illa Celsi ratio Numidiæ, et ægypto conuenire, ubi plerunq; arboribus uiduum solum frumentis seminat. Atq; eiusmodi terram pinguibus arenis putrem ueluti cinerem solutam, quis leuissimo dente moueri satis est. Bubulum aut per profissum ingredi oportet, alternisq; uersibus obliquum tenere aratrum, & alternis recto, plenoq; sulcare, sed ita necubi cradum solum, & immotum relinquat, quod agricolæ scanum uocant. Boves, cū ad arborem uenerint, fortiter retinere, ac retardare, ne in radicē maiore nisu uomis impactus colla cōmoueatur, ne uel aut cornu bos ad stipitem uehementius offendat, aut extremo iugo truncum delibet, ramumq; deplantet. Voce potius, q̃ uerberibus terreat ultimaq; sint opus recusantibus remedia, plagæ. Nunq̃ stimulo lacessat inuencum, quod retractam calatrorsumq; eum reddit, nonnunq̃ tñ admoneat flagello, sed nec in media parte uersuræ consistat, detq; requiem in summa ut spe cessandi totum spatium bos agilius enitatur. Sulcum aut ducere longiorē, q̃ pedum centum uiginti, contrarium pecori est.

quā plus æquo fatigatur, ubi hunc modum exæssit. Cum uentum erit ad uersurā, in priorem partē ingū ppellat et boves inhibeat, ut colla eorum refrigescant, quæ celeriter conflagent (nisi assidue refrigerentur) & ex eo tumor, ac deinde ulcera inuadunt. Nec minus dolabra, quā uomere bubulcus utatur, & præfractas stirpes, summasque radices, quibus ager arbusto consitus implicat, omnes refodiat, ac persequatur.

Quæ cura adhibenda sit bubus ab opere disiunctis. Cap. III.

BOVES Cum ab opere disiunxerit, substrictos confricat, manibusque comprimat dorsum, & pellem reuellat, nec patiatur corpori adherere, quia id genus morbi maxime est armentis noxiū. Colla subigat, merumque faucibus (si æstuauerint) infundat. Satis autem est singulis binos sextarios præbere. Sed ante ad præsepia boves religari non expedit, quā sudare, atque anhelare desierint, cum deinde tempestiue potuerint uesci, non multum, nec uniuersum cibū, sed partibus, et paulatim præbere conuenit. Quæ cum assumpserint ad aquā duci oportet, sibiloque allectari quo libētius bibāt, tū demum reductos largiori pabulo satiare. Hactenus de officio bubulci dixisse abunde est, sequitur, ut tempore quoque subigendi arui præcipiamus.

Quo anni tempore campi arandi sint, & quomodo. Ca. IIII.

PINGVES campi, qui diutius continent aquā, profunden di sunt anni tempore iam incalescēte, cum omnes herbas ediderint, neque adhuc earum semina maturuerint, sed tam frequētibus, densisque sulcis arandi sunt, ut uix dignoscatur in utram partem uomere actus sit, quā sic omnes radices herbarum perruptæ necantur. Sed & compluribus iterationibus sic resoluatur uerna actum in puluerem, ut uel nullam, uel exiguam desideret occasionem, cum seminauerimus, nam ueteres Romani dixerunt male subactū agrum, qui satis frugibus occandus sit, eum porro an recte aret, frequenter explorare debet agricola. Nec tamen uisu, qui fallit non nunquam, superfusa terra latentibus scamnis, uerū etiam tactu, qui minus decipit, cum solidi rigoris admota pertica transversis sulcis inserit, ea si equaliter, ac sine offensione penetravit, manifestum est totū solum deinceps esse motum, sin aut subeunti durior aliqua pars obstitit, crudum uerna actū esse demonstrat. Hoc cum sæpius bubulci fieri uident, non committunt scamina facere. Igitur.

COLVMELLAE.

uliginosi campi profandi debent post idus mensis Aprilis. Quo
 tpe cum arati fuerint diebus interpositis circa solstitiū, quod ē no
 no uel octauo Calendarū iuliarum, iteratos esse oportebit, ac de
 inde circa Septembris Calen. tertiatis, cum id tempus ab æstiuo
 solstitio cōuenit inter peritos rei rusticæ non esse arandum, nisi si
 magnis (ut sit nonnunq̃) ac subitaneis imbribus, quasi hybernis
 pluuijs terra p̃maduerit. Quod cum accidit, nihil prohibet, quo
 minus mense Iulio uerna cta subigant, sed quancūq; arabi
 tur, obseruabimus, ne lutosus ager tractet, ne ue exiguis nimbis
 semimadidus, quā terrā rustici uariā, cariosamq; appellant, ea ē
 cū post longas siccitates leuis pluuia superiore partem glebarū
 madesat, inferiore nō attingit. Nā q̃ limosa uersant arua, toto
 anno desinunt posse tractari, nec sunt habilia semēti, aut occatio
 ni, aut sationi. At rursus, q̃ uariæ subacta sunt, cōtinuo triennio
 sterilitate afficiunt. Medium igit̃ temperamentū maxime sequa
 mur in aradis agris, ut neq; succo careant, nec abūdēt uligine.
 Quippe nimius humor (ut dixi) limosos, lutososq; reddit, at quæ
 siccitatibus aruerunt, expediri p̃be non possunt, nā uel respuitur
 duritia soli dens aratri, uel si qua parte penetrauit, non minute
 diffindit humū, sed uastos cespites cōuellit, qbus obiacentibus im
 peditū aruum minus recte pōt iterari, quia ponderibus glebarū,
 sicut aliquibus obstātibus fundamētis uomis à sulco repellit, quo
 euenit, ut in iteratione quoq; scamna fiant, & bones iniquitate
 opis maxime mulctent. Accedit huc, quod omnis humus quīs læ
 tissima, tñ inferiorem partem ieiuniorē habet, eamq; attrahunt
 exaritate maiores glebæ. Quo euenit, ut infœcūdiior materia mi
 sta pinguiori segetem minus uberem reddat, tum ē ratio rustici
 aggrauat̃ exiguo profectu operis. Iusta. n. fieri nequeunt, cū in
 duruit ager. Itaq; siccitatibus censeo, quod iam profissum ē, ite
 rare, pluuiamq; opiri, quæ madesacta terra, facilem nobis culturā
 præbeat. Sed ingerū talis agri quatuor operis expedit, nā cōmo
 de profundiū duabus, una iterat̃, tertiatur dodrante, in lirā sta
 tim redigitur quadrāte operæ. Liras aut̃ rustici uocant easdē por
 cas, cum sic aratū est, ut inter duos latius distantes sulcos medius
 cumulus siccam sedē frumentis p̃beat. Colles pinguis soli peracta
 satione trimestri, mense Martio, si uero tepor cœli, siccitasq; regio
 nis suadebit, Februario, statim p̃sāndēdi sunt. Deinde de Aprilē
 medio usq; in solstitiū iterādi tertiādiq; Septēbri, circa ægnoctiū,

ac totidem operis, quot uliginosi campi excolitur iugerum talis agri, sed in arando maxime est observandum, semper ut transversus mons sulcetur. Nam hac ratione difficultas acclivitatis infringitur, laborque pecudum, et hominum commodissime sic minuit. Paulum tamen quotiescumque iterabitur, modo in elatiora, modo in depressiora cliui obliquum agi sulcum oportebit, ut in utraque partem rescindamus, nec eodem uestigio terram moliamur. Exilis ager planus, qui aquis abundat, primum aretur, ultima in parte mensis Augusti. Subinde Septembri sit iteratus, paratusque sementi circa æquinoctium. Expediitior autem labor eiusmodi solo est, eo quod pauciores impenduntur operæ, nam tres uni iugero sufficiunt. Item graciles cliui non sunt æstate arandi, sed circa Septembres Calendas, quoniam si ante hoc tempus prosinditur, effæta et sine succo humus æstivo sole perurit, nullasque virium reliquias habet. Itaque optime inter Calendas, et idus Septembris aratur, ac subinde iteratur, ut prius pluvius æquinoctialibus conseri possit, neque in lira, sed sub sulco talis ager seminandus est.

Exilis terra quomodo stercoretur.

Cap. V.

PRIVS tamen, quam exilem terram iteremus, stercoreare conveniet, nam eo quasi pabulo gliscit. In campo rarius, in colle spissius, acervi stercoris instar quinque modiorum disponentur, atque in plano pedes internalli quoquo versus octo, in cliivo duobus minus relinquitur, qui sat erit, sed id nobis decrescente luna fieri placet, nam ea res herbis liberat segetes. Iugerum autem desiderat, quod spissius stercoreat, uehes quatuor et viginti, quod rarius, duodeviginti. Disiectum deinde primum in arari, et obrui convenit, ne solis halitus vires amittat, et ut permista humus predicto alimento pinguescat. Itaque cum in agro disponent acervi stercoris, non debet maior modus eorum dissipari, quam quem bubula eodem die possint obruere.

De generibus seminum.

Cap. VI.

QUONIAM Sementi terram docuimus preparare, nunc seminum genera persequemur. Prima, et utilissima sunt hominibus frumenta, triticum, et semen adorem. Tritici genera complura cognouimus. Verum ex his maxime serendum est, quod robus dicitur, quoniam et pondere, et nitore præstet. Secunda conditio est habenda siliginis, cuius species in pane præcipua, potere deficitur.

n iii

COLVMELLÆ.

Tertium erit trimestre, cuius usus agricolis gratissimus. Nā ubi propter aquas, aliam uē cām matura satio est omīssa, præsidium ab hoc petitur. Id genus est filiginis. Reliquæ tritici species, nisi siquos multiplex uarietas frugum, & inanis delectat gloria, superuacue sunt. Adorei autē plerūq; uidimus in usu genera quatuor. Far, quod appellat clusinum candoris nitidi. Far, quod uocatur uēnuculum rutilum, atq; alterum candidum, sed utrunq; maioris ponderis, q̄ clusinum. Semen trimestre, quod dicitur halic astrum, idq; pondere, & bonitate est præcipuum. Sed hæc genera tritici, & adorei ppter ea custodienda sunt agricolis, quod raro quisquam ager ita situs est, ut uno semine contenti esse possimus, interueniente parte aliqua uel uliginosa, uel arida. Triticū autē sicco loco melius coalescit. Adoreū minus infestat humore.

De generibus leguminum.

Cap. VII.

LEGVMINVM genera cum sint complura, maxime grata, & in usu hominum uidentur, faba, lenticula, pisum, phaselus, cicer, cannabis, milium, panicū, sesama, lupinū, linum ē, & ordeum, quia ex eo ptisana est. Item pabulorum optima sunt medica, & fœnum græcum, nec minus uicia. Proxima deinde cicera, & eruum, & farrago, quæ est ex ordeo, sed de his prius differemus, q̄ nostra cā seminant, memores antiquissimi præcepti, quomone mur, ut locis frigidis nouissime, tepidis celerius, calidis ocys sine metamur. Nunc autem proinde, ac si temperatæ regioni præcepta dabimus.

Quod sit seminandi tempus.

Cap. VIII.

PLACET nostro poetæ adoreū, atq; ē triticū non ante seminare, q̄ occiderint uergiliæ, qd̄ ipsum numeris sic edisserit.

At si triticam in messem, robustaq; farram

Exercabis humum, solisq; instabis aristas,

Ante tibi eorū Atlantides abscondantur.

Abscidunt autē

altero & trigesimo die post autumnale æquinoctium, quod ferè conficitur nono Calendas Octobris, propter quod intelligi debet tritici satio dierum sex & quadraginta ab occasu uergiliarū, qui fit ante diem. IX. Calen. Nouemb. ad brumæ tpa. Sic. n. seruant prudentes agricolæ, ut quindecim diebus prius, q̄ conficiat bruma, totidemq; post eam confectam neq; arent, neq; uitem, aut ar-

borem putent. Nos quoq; non ambigimus in agro temperato, et minime humido sementem sic fieri debere. Cæterum locis uliginosis, atq; exilibus, aut frigidis, aut et opacis plerunq; citra Calen. Octobris seminare cōuenire, dum sicca tellure licet, dum nubila pendent, ut prius conualescant radices frumentorum, q̄ hybernis imbribus, aut geliadijs, pruinis' ne infestent'. Sed quis tempestiue sementis confecta erit, cauebitur tamen, ut patentes liras, crebrosq; sulcos aquarios, quos nonnulli elices uocant, faciamus, & oēm humorem in colliquias, atq; inde extra segetes deriuemus. Nec ignoro quosdam ueteres auctores præcepisse, ne seminarent agri, nisi cū terra pluuijs permaduisset. Quod ego, si tempestiue competat, magis conducere agricolæ nō dubito. Sed si (quod euenit nonnunq̄) feri sunt imbres, quis sitienti solo recte semen cōmittitur, idq; et in quibusdam puincijs, ubi status cœli talis est, usurpatur. Nam quod sicco solo ingestum, & inocatum est, perinde ac si repositum in horreo non corrumpit'. Atq; ubi uenit imber, multorū dierum sementis uno die surgit. Tremellius q̄dem asseuerat, prius q̄ impluerit, ab auibus, aut formicis sata edi, ubi æstiuis serenitatibus ager aret. Idq; et sæpius nos experti, uerum adhuc esse comperimus. Magis apte tamen in eiusmodi agris adorem, q̄ triticum serit, quoniam folliculum, quo continet', firmū & durabilem aduersus longioris temporis humorem habet.

Quot seminum modios ingerum postulet, & mediæ seminum.
Cap. IX.

INGERVM agri pinguis plerunq; modios tritici quatuor, mediocris quinque postulat. Adorei modios nouem, si est lætum solum, si mediocre, decem desyderat. Nam quis de mensura minus auctoribus conuenit, hanc tñ uideri cōmodissimam docuit noster usus, quem si quis sequi recusat, utatur præceptis eorū, qui uberem campum in singula ingera tritici quinque, & adorei octo modys obserere præcipiunt. Atq; hac portione mediocribus agris semina præbenda censeant. Nobis ne istam q̄dem quā prædiximus, mensurā semp placet seruari, quod eam uariat aut loci, aut t̄pis, aut cœli conditio. Locū, cum uel in campis, uel collibus frumentū seritur, atq; his uel pinguibus, uel mediocribus, uel macris. Temporis, cum autūno, aut et ingruente hyeme frumenta iacimus. Nā prima semētis rarius serere p̄mittit, nouissima spissius postulat. Cœli,

COLVMELLAE.

cum aut pluuium, aut siccum est. Nam illud idem, quod prima
 sementis, hoc quoque ultima desyderat. Omne aut frumentum ma-
 xime campo patente, et ad solem prono, apricoque, et soluto la-
 tatur. Collis. n. quauis granum robustius aliquanto, minus tamen
 tritici reddit. Densa, cretosaque, et uliginosa humus, filiginem, et
 far adorem non incommode alit. Ordeum nisi solutum, et siccum lo-
 cum non patitur. Atque illa uicibus annoque requietum, agitatumque
 alternis, et quae letissimum uolunt arum. Hoc nullam mediocritatem
 postulat, nam uel pinguiissima uel macerrima humo iacet. Illa post
 continuos imbres, si necessitas exigat, quis adhuc limoso, et ma-
 dente solo sparseris, iniuriam sustinent. Hoc si luto comiseris, emo-
 rit. Siliginis, aut uel tritici, si mediocriter cretosus, uliginosus ue-
 ager est, et paulo plus, quam ut prius iam dixi, quinque modijs ad sa-
 tionem opus est, at si siccus, et resolutus locus, idemque uel pinguis,
 uel exilis est, quatuor, quam et est contrario macer tantumde seminis
 possit. Nam nisi rare conseritur, uanum, et minutam spicam facit, at
 ubi ex uno semine pluribus culmis fruticauit, etiam ex rara segete
 densam facit. Inter cetera quoque non ignorare debemus quintam
 partem seminis amplius occupare agrum consitum arbusculo, quam uacuum,
 et apertum. Atque adhuc de satione autumnali loquimur, hanc
 enim potissimum duimus. Sed et est altera, cum cogit necessitas,
 trimestrem uocant agricolae. Ea locis pingelidis, ac niuosis, ubi aestas
 est humida, et sine uaporibus recte committitur. Ceteris admodum
 raro rident, quam tamen ipsam celeriter, et utique ante equinoctium
 uernum conueniet peragere. Si uero locorum, et caeli conditio patietur,
 quanto maturius seuerimus, tanto commodius proueniet. Neque enim
 est ullum (sicut multi crediderunt) natura trimestre semen, quippe
 idem iactum autumno melius respondet. Sed sunt nibilo minus quae-
 dam alijs potiora, quae sustinent ueris tepores, ut siligo, et ordeum
 galathicum, et halicastro, granumque fabae marsicae. Nam cetera ro-
 busta frumenta semper ante hyemem feri debent in regionibus tem-
 peratis. Solet aut salsam nonnunquam, et amaram uliginem uomere
 terra, quae quis matura iam sata manente noxio humore corrumpit,
 et locis glabrentibus sine ulla stirpe seminum areas reddit. Ea gla-
 breta signis adhibitis notari conuenit, ut suo tempore uitij eiusmodi
 medeamur, nam ubi uel uligo, uel aliqua pestis segetem enecat, ibi
 columbinum stercus, uel si id non est, folia cupressi conuenit spargi, et
 inarari. Sed antiquissimum est omnem inde humorem facto sulco, de-

ducere, aliter uana erunt prædicta remedia. Nonnulli pelle hyæ-
næ satoriā trimodiā uestiunt, atq; ita ex ea, cum paulū immora-
ta sunt semina iaciunt, non dubitantes prouentura, quæ sic sata
sint. Quædā ē subterraneæ pestes adultas segetes radiabus subse-
dis enecāt. Id ne fiat remedio est aquæ mistus succus herbæ, quā
rustici sedum appellant, nā hoc medicamine una nocte semina
macerata iaciuntur. Quidā cucumeris anguinei humorē expres-
sum, & eiusdē tritam radicem diluunt aqua, similiq; rōne made-
facta semina terræ mandant. Alij hac eadē aqua, uel amurca in-
sulsa, cum cœpit infestari seges, perfundunt sulcos, & ita noxia
animalia summouent. Illud deinceps præcipiendum habeo, ut de
messis segetibus iam in area futuro semini consulamus. Nā quod
ait Celsus, ubi mediocris est fructus, optimam quanq; spicā leger-
e oportet, separatimq; ex ea semen reponere. Cum rursus ampli-
or messis prouenerit, quicquid exteretur, capisterio expurgādum
erit, & semper quod propter magnitudinem, ac pondus in imo
subsederit, ad semen reseruādum. Nā id plurimum prodest, quia
quāuis celerius locis humidis, tamen etiam siccis frumenta dege-
nerant, nisi cura talis adhibeatur, neq; enim dubium est, ex robu-
sto semine posse fieri nō robustum. Quod uero protinus exile na-
tum sit, nūquam robur accipere manifestum est. Ideoq; Virgilius
cum & alia, tum & hoc de seminibus præclare sic differuit.

Vidi ego lecta diu, & multo spectata labore

Degenerare tamen, ni uis humana quotannis

Maxima quæq; manu legeret, sic omnia fatis

In peius ruere, ac retro sublapsa referri.

Granū aut rutilū si cū diffissum est, eundē colorē interiorē habet,
integrū eē nō dubitamus. Quod extrinsecus albidū, intus ē con-
spiciē candidū, leue, ac uanū intelligi debet, nec nos tanq; opta-
bilis agricolis fallat filigo. Nā hoc tritici uitiū est, et quis cādore
p̄stet, pōdere tñ uincit. Vex in humido statu cœli recte puenit,
et iō locis manātibus magis apta ē. Nec tñ ea lōge nobis, aut ma-
gna difficultate regrenda est, nā oē triticū solo uliginoso post ter-
tiā sationē cōuertit in filiginē. Proximus ē his frumētis usus or-
dei, qđ rustici hexasticū, quidā ē cantherinū appellant, qm̄ &
alia animalia, quæ ruri sunt, melius q̄ triticū, et hoīem salubrius
q̄ malū triticū pascat. Nec aliud in egenis rebus magis inopiā de-
fendit. Seritur soluta, siccatq; terra, et uel præualida, uel exili, qđ

constat arua segetibus eius macescere, propter quod pinguiſſimo agro, cuius nimis uiribus noceri non possit, aut macro, cui nihil aliud cōmittitur. Altero sulco seminari debet post æquinoctium media ferè sementi, si leto solo, si gracili maturius. Iugerū quinque modij occupabunt. Idq; ubi paulum maturuerit, festinantius, q̄ ullum aliud frumentum demetendū erit. Nam & fragili culmo, & nulla uestitum palea granum eius celeriter decidit, ysdemq; de causis facilius terit, q̄ cætera. Sed cum eius messem sustuleris, optimum est noualia pati anno cessare, si minus stercore saturare, et oē uirus, quod adhuc inest terræ, propulsare, alterū quoq; genus ordeī est, quod alij distichū, galathicum nonnulli uocant, ponderis, & candoris eximij, adeo ut tritico mistum egregia cibaria familiæ præbeat. Serit quā p̄guissimis, sed frigidis locis circa Martium mensem. Melius tñ respondet, si clementia hyemis permittit, cum seminat circa Idus Ianuarias. Iugerum sex modios postulat. Inter frumenta etiam panicum, & milium ponenda sunt, quamuis iam leguminibus ea contribuerim. Nam multis regionibus abarijs eorū coloni sustinent. Leuem, solutamq; humum desyderant. Nec in sabuloso solo sed in arena quoq; proueniunt modo humido cælo, uel riguo solo, nam siccū, cretosumq; reformidant. Ante uer feri non possunt, qm̄ teporibus maxime lætant, ultima tamen parte Martij mensis cōmodissime terræ committunt. Nec impensa graui sationem cultoris onerant, quippe sextarijs ferè quatuor iugerum implent. Frequentem tamen exigunt sarritionem, & runcationem, ut herbis liberent. Ea cū spicas ediderunt, prius q̄ semina hient aestibus, manu carpunt, & suspensa in sole cum assicata fuerint, recondunt. Atq; ita reposita perennant diutius, q̄ cætera. Panis ex milio conficit, qui ante q̄ refrigerat, sine fastidio potest absumi. Panicum pinsitum, & euolutum fursure, sed & milium quoq; pultem, quis in copia, maxime cum lacte non fastidiendam præbet.

Quod solum cuiq; legumini conueniat.

Cap. X.

QVONIAM de frumentis abunde præcepimus, de leguminibus deinceps differamus. Lupini prima ratio est, quod & minimum operari absunt, & uilissime emittunt, & maxime ex us, q̄ ferunt, iuuat agrū. Nā uineis iā emaciatis, et aruis optimū stercus præbet, ac uel effecto solo prouenit, uel repositū in granario pa-

titur autum. Boves per hyemem coctum, maceratumq; probe alit. Famem quoq; si sterilitas annonæ inæssit hominibus, commode propulsat. Spargitur statim ex area. Atq; id solum omnium leguminum non desyderat requiem in horreo, siue Septembri mense ante æquinoctium, seu protinus à Calendis Octobris crudis notualibus ingeras. Et qualitercūq; obruas, sustinet coloni negligētiam. Teporem tamen autumnus desyderat, ut celeriter confirmetur. Nam si non ante hyemem conaluerit, frigoribus affligitur. Reliquum quod seminis superest, in tabulatum, quò fumus peruenit, optime reponis, qm̄ si humor inuasit, uermes gignit, qui simulatq; osilla lupinorum ad ederunt, reliqua pars enasa nō potest. Id, ut dixi, exilem amat terram, & rubricam præcipue. Nā cretam reformidat, limosoq; non exit agro. Ingerum decem modij occupant. Ab hoc recte phaselus terræ mandabitur, uel in ueruacto, uel melius pingui, & restibili agro. Nec amplius quatuor modis ingerum obseritur. Similis quoq; ratio est pisi, quod tñ facilem, & solutam terram desyderat, tepidumq; locum, & celum frequentis humoris. Eadem mensura ingerum, uel modio minus, q̄ phaselum licet obserere primo tempore sementis ab æquinoctio autumnali. Fabæ pinguiissimus locus, uel stercoreatus destinatus, & si ueruactum erit in ualle situm, quod à superiore pte succum accipit, prius tñ iacemus semina, deinde profandemus terram, profassamq; in liram reuocabimus, occabimusq; quo altius largiore humo contegat. Nā id plurimum refert, ut radices enatorum seminum penitus dimersæ sint. Sin autem proxima messis, occupandum erit restibile, defectis stramentis, quatuor & uiginti uehes stercoreis in ingerum disponemus, dissipabimusq;. Et similiter cum semē crudo solo ingesserimus, inarabimus, imporcaturq; occabimus, quāuis sint, qui negent locis frigidis oportere occari fabam, quia extantes glebæ à geliadys adhuc eam teneram uindiciant, & aliquem teporem frigore laboranti præbeant. Sunt et qui putent in aruis hanc eandem uicē stercoreis fungi, qđ sic ego interpretor, ut existimem non satiōibus eius pinguescere humū, sed minus hanc, q̄ cætera semina nim terræ consumere. Nam certum habeo frumentis utiliore agrum eē, qui nihil, quam q̄ istā siliquam pximo anno tulerit. Ingerum agri (ut Tremellio) quatuor (ut nobis uidet) fabæ sex occupāt modij, si solum pingue sit, si mediocre, paulo amplius. Ea q; nec macrum nec nebulosum lo-

cum patitur. Densa tamen humo saepe cōmode respondet. Media sementi pars seri, & pars ultima debet, quæ septimūcialis satio dicitur. Tempestiua, frequentius, nonnunquam tñ sera, melior est. Post brumam parum recte serit, pessime uere, quīs sit etiā trimestris faba, quæ mense Februario seratur, quinta parte amplius, q̄ matura, sed exiguas paleas nec multā siliquā facit. Veteres itaq; rusticos plerūq; dicentes audio, malle se matura fabalia, q̄ fructū trimestris. Sed quocunq; tempore anni seret, opera danda erit, ut quantum destinauerimus in sationem, tantum quintadecima luna si tamen ea non transcurret eo die solis radios, quod græci *ἑκαταευσί* uocant. Si minus quartadecima utiq; adhuc crescente lumine spargatur, et si confestim totum semen operiri non poterit. Nihil. n. nocēbit ei nocturnis roribus, alijs' ne ex causis, dñ a pecore, & auibus uindictæ. Priscis aut rusticis, nec minus Virgilio prius amurca, uel nitro macerari eam, & ita seri placuit. Latior ut fœtus siliquis fallacibus esset, Et quamuis igni exiguo properata maderent. Nos quoq; sic medicatam comperimus, cū ad maturitatē pducta sit minus à circulione infestari. Sed & illud qđ deinceps dicturi sumus experti præcipimus, silente luna fabam uellito ante lucē. Deinde cum in area exaruerit, confestim prius q̄ luna incrementum capiat, excussam, refrigeratamq; in granarium conferto. Sic condita à circulionibus erit innoxia. Maximeq; ex leguminibus ea, & sine iumentis teri, & sine uento purgari expeditissime sic poterit. Modicus fasciculorum numerus resolutus in extrema parte areæ collocetur, quem per longissimum eius, mediumq; spaciū tres uel quatuor homines promoueant pedibus, & baculis furcillis' ne cotūdant. Deinde cum ad alterā partem areæ peruenerint in acervum culmos regerant. Nam semina excussa in area iacebunt, superq; ea paulatim eodem modo reliqui fasciculi excutientur. Ac durissimæ quidem acus reiectæ, sepe ratæq; erunt à cudentibus, minutæ uero quæ de siliquis cum faba resederunt, aliter se cernent. Nam cum acervus paleis, granisq; mistus in unū fuerit congestus, paulatim ex eo uentilabris per longius spatium iactet, quo pacto, palea quæ leuior est, citra decidet, faba, quæ longius emitteat, pura eo perueniet, quò uentilator eam iaculabit. Lentem sementi media, crescente luna usq; in duodecimam, solo tenui, & resoluta, uel pingui, & sicco maxime loco, seri cōuenit,

nam in flore facile luxuria & humore corrumpit, quæ ut celeriter pdeat, & ingrandescat, ante quæ feratur, fimo arido permisceri debet, & cum ita quatuor, aut quinque diebus requieverit spargi. Sationes eius duas seruamus, alteram maturam per mediam sementim, seriore alteram mense Feb. Iugerum agri paulo plus, quam modius occupat. Ea ne circulionibus absumat (nam etiam dum est in filiqua estur) curandum erit, ut cum extrita sit, in aqua demittatur, & ab inani, quæ p̄tinus innatat, separetur solida, tum in sole siccat, & radice silphij trita cum aceto aspergat, defriceturque, atque ita rursus in sole siccata, & mox refrigerata recondatur, si maior est modus, in horreo, si minor, in uasis olearijs, salsamentarijsque, quæ repleta cum statim gypsata sunt, quandoque in usus prompserimus, integram lentè repiemus. Potest tamen etiam citra istam medicatiōem cineri mista comode seruari. Lini semē, nisi magnus est eius in ea regione, quā colis, proventus, & p̄cipue proritat, serendū nō est, agris enim p̄cipue noxiū est, itaque pinguiſſimum locū, & modice humidum posat. Seritur à Calendis Octobris in ortum aquilæ qui est. VII. Idus Decembris, Iugerum agri octo modijs obserit. Nonnullis placet macro solo quamſpississimum semen eius comitti, quo tenue linum proveniat. Idem est si lato solo serat, mense Februario, decem modios in iugerum iacere oportere dicunt. Sesama, quæ rigant maturius, quæ carent humore, ab æquinoctio autumnali serenda sunt, in Idus Octobris, putre solū, quod campani pullū uocant, plerūque desyderant, nō deterius tamen etiam pinguibus harenis, uel congestitia humo pueniunt, tantumque seminis, quantum milium panicūque, interdum etiam duobus sextarijs amplius in iugerum spargit. Sed hoc quidē semē aliciæ, syriæque regionibus ipse uidi mense Iunio, Iulioque conseri, et per autumnum cum pmaturuerit, tolli. Cicercula, quæ piso est similis, mense Ianuario, aut Februario feri debet lato loco, cælo humido. Quibusdam tamen Italiæ locis ante Calen. Nouemb. feritur. Tres modij iugerum implent. Nec ullū legumen minus agro nocet, sed raro respondet, quoniam nec siccitates, nec austros in flore sustinet, quæ utraq; incōmoda ferè eo tpe anni sunt, quo deflorescat, Cicer, quod arietinū uocat, itemque alterius generis, quod punicum, feri mense Martio toto potest, cælo humido, loco quāletissimo. Nā est id terram lædit, atque ideo improbatur à callidioribus agricolis, quod tamen si feri debeat pridie macerandū erit, ut celerius ena-

COLVMELLAE.

scatur. Iugero modij tres abunde sunt. Cannabis solum pingue stercoratumq; & riguum, uel planum, atq; humidum, & alte subactum deposat. In quadratum pedem seruntur grana sex eius seminis arcturo exoriente, quod est ultimo mense Februario circa sextum aut quintum Calendarum Martij. Nec tamen usq; in æq noctium uernum, si sit pluuius cœli status, improbe seret. Ab his leguminibus ratio est habenda napos, raporumq; nam utraq; rusticos implent. Magis tamen utilia rapa sunt, quia & maiore incremento proueniunt, & non hominem solum, uerum etiã bo ues pascunt, præcipue in gallia, ubi hiberna cibaria prædictis pe cundibus id olus præbet, solum putre, & solutum res utraq; desy derat, nec densa nascit humo. Sed rapa campis, & locis humi dis letant. Napus deuexam amat, & siccam, tenuiq; propiorẽ terram. Itaq; glareosis, sabulosisq; aruis melior exit, lociq; ppriet tas utriusq; semen commutat. Nanq; in alio solo rapa biennio fata conuertuntur in napum, in alio napus raporum accipit spei ciem. Riguis locis utrũq; recte ab solstitio serit, sicis ultima parte mēsis Augusti, uel prima Septembris. Subactum solum pluribus iterationibus aratri uel rastri, largoq; stercore satiatum postulat. Nam id plurimum refert, non solum q; melius ea pueniunt, sed q; etiam post fructum eorum sic tractatum solum segetes opimas facit. Iugerum agri non amplius quatuor sextarijs rapos seminis obserendum est, quarta parte amplius naps spargendũ, q; non in uentrem latefcunt, sed tenuem radicem deorsum agunt. Atq; hæc hominum causa serenda censemus, illa deinde pecudũ.

De genere pabulorum, et de medica, uicia, farragine, auena, fœ no græco, eruo, & cicera. Cap. XI.

PABVLO RV M genera complura, sicut medicam, & uici am, farraginem quoq; ordeaceam, & auenam, fœnum græcũ, nec minus eruum, & cicera. Nam cetera neque enumerare, ac minus serere dignamur, excepta tamen cythiso, de qua dice mus in ijs libris, quos de generibus firculorum cōscripsimus. Sed ex ijs, quæ placent, eximia est herba medica, quod cum semel seritur, decem annis durat, quod per annum deinde recte quater, in terdum etiam sexies demetitur, quod agrũ stercorat, quod omne emaciatum armentum ex ea pinguescit, quod ægro tanti pecori remediũ est, q; ingerũ eius toto anno tribus equis abũde sufficit. Seritur,

Seritur, ut deinceps præcipiemus. Locum, in quo medicam proximo uere saturus es, proſindito circa Calendas Octobris, & cum tota hyeme putrefcere ſinito. Deinde Calendis Feb. diligenter iterato, & lapides omnes egerito, glebasq; offringito. Poſtea circa Martium menſem tertiato, & occato. Cum ſic terram ſubegeris, in morem horti areas latas pedum denum, longas pedum quinquagenū facito, ut per ſemitas aqua miniſtrari poſſit. Aditusq; utraq; parte runcantibus pateat, deinde uetus ſtercus inuato, atq; ita menſe ultimo Aprilis ſerito tantum, quantum ut ſinguli cyathi ſeminis locum occupent decem pedum longum, & quinq; latum, quod ubi ſeceris ligneis raſtris (id enim multum confert) ſtatim iacta ſemina obruantur, nam celerrime ſole adurunt. Poſt ſationem ferro tangi locus non debet. Atq; ut dixi, ligneis raſtris ſarriendus, & idētidem runcandus eſt, ne alterius generis herba inualidam medicam perimat. Tardius meſſem primam eius facere oportebit, cum iam ſeminum aliquā partem eiecerit. Poſtea q̄ uoles teneram, cum proſiluerit, deſecare licet, et iumentis præbeas. Sed inter initia parcius dum conſueſcant, ne nouitas pabuli noceat. Inflat enim, et multum creat ſanguinem. Cū ſecueris aut, ſepius eā rigato. Paucos deinde poſt dies, ubi cœperit fruticare, omnes alterius generis herbas eruncato. Sic culta, ſexies in anno demeti poterit, & permanebit annis decem. Viciæ autem due ſationes ſunt. Prima, quam pabuli cauſa circa æquinoctium autumnale ſerimus, ſeptem modios eius in unum iugerū. Secunda, qua ſex modios menſe Ianuario, uel etiam ſerius iacimus ſemini progenerando. Vtraq; ſatio poteſt cruda terra fieri, ſed melius proſaſſa, idq; genus præcipue non amat rores, cum ſeritur. Itaq; poſt ſecundam diei horam, uel tertiam ſpargendum eſt, cum iā omnis humor ſole uento uel deterſus eſt, neque amplius proſci debet, q̄ qd̄ eodem die poſſit opiri. Nā ſi nox inceſſit, quātulocunq; humore prius q̄ obruatur corrumpitur. Obſeruandū erit, ne ante quintam & uigeſimam lunam terræ mandetur. Aliter ſatæ ferè lima æm nocere comperimus. Farraginem in reſtibili ſtercoratiſſimo loco, & altero ſulco ſerere conuenit. Ea ſit optima, cum cantheri ni ordeï. X. modijs iugerum obſeritur circa æquinoctium autumnale, ſed impendentibus pluuijs, ut conſita, rigataq; imbribus celeriter prodeat, & confirmetur ante hyemis uiolentiam, nam frigoris cū alia pabula deſecerūt, ea bubus, cæterisq; pecudibus

Colu.

o

COLVMELLAE.

optime defecta præbetur, & si depascere sæpius uoles, usq; in men-
sem Maium sufficit, quod si etiam semen uoles ex ea percipere, à
Calen. Martijs pecora depellenda, & ab omni noxa defendēda
est, ut sit idonea frugibus. Similis satio auenæ, quæ autumno sa-
ta, partim cæditur in fœnum, uel pabulum, dum adhuc uiret,
partim semini custoditur. Fœnum græcum (quod siliquam uocāt
rustia) duo tempora sationum habet, quorum alterum est Sptē-
bris mensis (cum pabuli causa feritur) iisdem diebus, quibus uicia
circa æquinoctium, alterum aut mensis Ianuarij ultimo, uel pri-
mo Februarij, cū in messem seminatur, sed hac rōne iugerum sex
modijs, illa septem occupamus, utraq; cruda terra non incōmo-
mode sit, daturq; opa, ut spisse aret, nec tñ alte, nā si plus quatu-
or digitis adobrutū est semen eius, non facile prodit, propter qđ
nonnulli prius qđ ferant, minimis aratris prosindunt, atq; ita
iaciunt semina, & sarculis adobruunt. Eruium aut lætatur loco
macro, nec humido, quia luxuria plerūq; corrumpit. Potest &
autūno feri, nec minus post brumam, Ianuarij parte nouissima,
uel toto Februarij, dum ante Calē. Martias, quem mensem uni-
uersum negant agricolæ huic legumini cōuenire, quod eo tpe sa-
tum pecori sit noxium, & præcipue bubus, quos pabulo suo ceres-
brofos reddat, quinque modijs iugerum obserit. Cicera bubus erui
loco, fresa datur in Hispania bætica, quæ cum suspensa mola di-
uisa est, paulum aqua macerat, dum lentescat. Atq; ita mista pa-
leis subtritis pecori prebet. Sed erui duodecim libræ satisfaciunt
uni ingo, cicera sexdecim, eadem hominibus non inutilis, neque
iniucunda est. Sapore certe nihilo differt à cicerula, colore tantū
discernit. Nam est obsoletior, et nigro propior, feritur primo uel
altero sulco mense Martio, ita ut postulat soli lætitia, quod eadē
quatuor modys, nonnunquam & tribus, interdum etiā duobus,
ac semodio iugerum occupat.

Quemadmodum, & quot operis unumquodq; frumentum,
& legumen colatur. Cap. XII.

Q V O N I A M quando quicq; ferendum sit persecuti sumus.
nunc quēadmodū quotq; operis singula eorū, quæ retulimus col-
lenda sint, demonstrabimus. Peracta sementi, sequens cura ē sar-
ritionis, de qua nō cōuenit inter auctores. Quidam negant eam
quicquam proficere, quod frumenti radices sarculo detegantur,

aliquæ etiam succidantur, ac si frigora inæsserint post sarritiõem gelu frumenta enecentur. Satius autem esse ea tempestiue runcari, & purgari. Pluribus tamen sarriri placet, sed neque eodẽ modo, neq; iisdem temporibus usquequaq; fieri. Nam in agris siccis & apriis, simulac primum sarritionem pati queant segetes, debere eas permota terra adobruui, ut fruticare possint, quod ipsum ante hyemem fieri oportere, deinde post hyemem iterari. In locis autem frigidis, & palustribus plerunq; transacta hyeme sarriri, nec adobruui, sed plana sarritione terram pmoueri. Multis tamen nos regionibus aptam esse hyemalem sarritionem comperimus, dũtaxat ubi & siccitas cœli, et tepores permittunt. Sed nec istud ubiq; fieri censemus, uerum incolarum consuetudine uti. Sunt. n. regionum propria munera, sicut Aegypti, & Africa, qbus agricola post sementem, ante messem, se getem non attingit, quoniã cœli conditio, & terræ bonitas ea est, ut uix ulla herba exeat, nisi ex semine iacto, siue q̃a rari sunt imbres, seu quia qualitas humi sic se cultoribus præbet. In ijs autem locis, ubi desyderatur sarritio, non ante sunt attingendæ segetes, etiam si cœli status pmittit, quàm cum sata sulcos contexerint. Triticumq; & adonion cum quatuor fibras habere cœperint, ordeum cum quinque, faba & cætera legumina cum quatuor digitis à terra extiterint, recte sarrientur. Excepto tamen lupino, cuius semini contraria est sarritio, quoniam unam radicem habet, quæ siue ferro succisa est, seu uulnerata, totus frutex emoritur. Quod etiam si non fieret, supernacius tamen esset cultus, cum sola hæc res adeo non infestetur herbis, ut ipsa herbas perimat. At aliæ segetes, quæ uel humide moueri possunt, melius tñ siccæ sarriuntur, quoniam sic tractatæ non infestantur rubigine, hordeum uero nisi siccissimum tangi non debet. Fabam multi ne sarriendam quidem putant, quod & manibus, cum maturuerit ducta secernat à cætera rûcatione. & internatæ herbæ fœno referuent. Cuius opinionis etiam Cornelius Celsus ē, qui inter cæteras dotes eius leguminis hanc quoq; enumerat, quod sublata faba fœnum ex eodẽ loco secari posse dicat. Sed mihi uidet̃ pessimi agricolæ cõmittere, ut satis herba pueniat. Frugibus. n. plurimum detrahif, si relinquit̃ runcatio. Neq; .n. est rustici prudētis magis pabulis studere pecudũ, q̃ abis hominũ, cum presertim liceat illa quoq; cultu pratorũ consequi, adeoq; fabam sarriendã censeo, ut existimem debere et ter sarriri.

nam sic cultam comperimus non solum multiplicare fructū, sed exiguam portionem in ualulis habere. Freseque eius & expurgata modium penè tam plenum esse, quàm integræ, cum uix minuat mensura detractis putaminibus, atque in totum (sicut ante iam diximus) hyberna sarritio plurimum inuat diebus serenis, ac siccis post brumam confectam, mense Ianuario si geliadia non sint, ea porro sic debet fieri, ne radices satore lædantur, et ut potius adobruantur, cumulisque exaggerentur, ut latius se frutex humi diffundat. id prima sarritione fecisse proderit, secunda oberit, quia cum pullulare desint frumentum, putrescat si adobrutum est. Nihil itaque amplius in iteratione, quàm remoliri terra debet equaliter, eamque transacto æquinoctio uerno statim peragi oportet intra dies uiginti, ante, quàm seges in articulum eat, quoniam serius sarrita corrumpitur insequentibus aestiuis siccitatibus, & caloribus. Subiungenda deinde est sarritioni runcatio, curādumque ne florentem segetem tangamus, sed aut antea, aut mox cum defloruerit. Omne autem frumentum, & hordeum, quicquid denique non duplici semine est, spicula à tertio ad quartum nodum emittit, & cum tota edidit octo diebus deflorescat, ac deinde gradescat diebus quadraginta, quibus post florem ad maturitatem deuenit. Rursus quæ duplici semine sunt, ut faba, pisum, lenticula, diebus quadraginta florent, si mulque grandescunt.

Pro modo cuiusque agri quot opæ designentur. Cap. XIII.

ET UT IAM perensemus quot operis in arcam perducantur ea, quæ terræ credidimus. Tritici modij quatuor uel quinque bubulcorum operas occupant quatuor, occatoris unam, sarritoris duas primum, & unam cum iterum sarriuntur, runcatoris unam, messoris unam & dimidia, in totum summa operarum decem, et dimidia. Siliginis modij quinque totidem operas desiderant. Sesami modij nouem, uel decem, totidem opas, quot tritici modij quinque possulant. Hordei modij quinque bulbula operas tres exigunt, occatorem unam, sarritoriā unam & dimidiam, messoriā unam, summa operarum sex & dimidia. Fabæ modij quatuor, uel sex, in uerna æto duas operas bubulcorum detinent, at in restibili unam. Occatant sexquiopera. Sarriunt sesquiopera, iterum sarriuntur una opera, et tertio una, metunt una, summa fit operarum octo, uel septem. Viciæ modij sex, uel septem, in uerna æto bubulcorum duas ope-

ras uolunt, in restibili unam, item occantur una opera metuntur una, summa fit operarum quatuor, uel trium. Erui modij quinq; totidem operis conserunt, occant una, item singulis sarriuntur, runcant, metunturq; cuncta sex operas occupant. Siliquæ modij sex, uel septem totidem operis obruunt, metuntur una. Phaseoli modij quatuor obruunt totidem operis, occantur una, metuntur una. Cicera, uel cicercula modij quatuor opas bubulcorum tres postulant, occantur opera una, runcant una, uellunt una. Summa fit sex oparum. Lentis sexq; modius totidē opas desyderat, occant una, sarritur duabus, runcatur una, uellit una. Summa fit operarum octo. Lupini modij decem obruunt una, occantur una, metuntur una. Milij sextarij quatuor, totidemq; pania bubulcorum opas occupant quatuor, occant operis tribus, sarriunt tribus, quot operis carpantur incertum est. Ciceris modij tres operis totidem seminantur, occant duabus, sarriuntur una, runcant una, uelluntur tribus. Summa fit decem operarum. Lini decem modij, uel octo, quatuor iugis conserunt, occantur opis tribus, runcant una, uellunt tribus. Summa fit undecim oparum. Sesami sextarij sex tribus iugis a profissione colunt, occant operis quatuor, sarriunt quatuor, & sarriunt iterum duabus, metunt duabus. Summa fit operarum quindecim. Cannabis serit, ut supra docuimus, sed incertum est quantam impensam, curamq; desyderet. At medica obruit non aratro, sed, ut dixi, ligneis rastellis. Iugerum agri eius occatur duabus, sarritur una, metitur una. Hac consumatione operarum colligitur, posse agrum ducentorum iugerum subigi duobus iugis bouum, totidemq; bubulcis, & sex mediastinis, si tñ uacet arboribus, at si sit arbusum eundem modum. Saferna tribus hominibus adiectis affeuerat probe satis excoli, quæ nos ratio docet sufficere posse iugum bouum tritici centum uiginti q; modijs totidēq; leguminum, ut sit in assem autumnalis satio modiorum ducentorum quinquaginta, et post hanc nihilo minus cōserat trimestriū modios quinq; & septuaginta. Hoc deinde sic probat. Semina, quæ quarto sulco serunt, in iugeribus uiginti q; desyderāt bubulcorum operas. CXV. nā profandit is agri modus (quis durissimi) quinquaginta operis, iteratur quinq; & uiginti, tertiatur, & conserit quadraginta. Cætera legumina occupant opas. LX. idest menses duos. Pluiales quoq; & feriarum computant, quibus non aratur, dies quinq; & quadraginta, item peracta sementi,

quibus requiescunt, dies. XXX. Sic in asse fiunt octo menses, & dies decē. Supersunt tñ de anno tres reliqui menses, & dies quique, & uiginti, quos absūmamus, aut in satione trimestrium, aut in uecturis fœni, & pabulorū, & stercore, aliorumq; utensilium.

Quæ legumina aruis noceant, quæq; prosint. Cap. XIII.

SED EX ijs, quæ retuli, seminibus, idem Salserna putat alijs stercorari, & inuari agros, alijs rursus peruri, & emaciari. Stercorari lupino, faba, uicia, eruo, lente, cicercula, piso. De lupino nihil dubito, atq; et de pabulari uicia, si tñ eam uiridem defectā confestim aratrum subsequatur, & quod falx reliquerit prius, q̄ inarescat, uomis resandat, atq; obruat. Id enim credit pro stercore, nam si radices eius defecto pabulo relictæ inaruerint, succum omnem solo auferent, uimq; terræ absument. Quod etiam in faba, ceterisq; leguminibus, quibus terra gliscere uidet̄, uerisimile est accidere, ut nisi protinus sublata messe eorū proficiat, nihil ijs segetibus, quæ deinceps in eo loco seminari debent, profuturū sit. Ac de ijs quoq; leguminibus, quæ uellunt. Tremellius obesse maxime ait solo uirus cicercis, & lini, alterum q̄a sit falsæ, alterū q̄a sit feruidæ naturæ. Quod etiā Virgilius significat dicendo. Vrit enim lini campum seges, urit auenæ, Vrint lætheo persusa papauera somno. Neq; enim dubium, quin et ijs seminibus infestetur ager, sicut et milio, & panico, sed omni solo, quod prædictorum leguminum segetibus fatiscit, una præsens medicina est, ut stercore adiues, et absumptas vires hoc uelut pabulo refoueas. Nec tantum propter semina, quæ sulcis aratri committuntur, uerū etiam propter arbores, ac uirgulta, quæ maiorem in modum letantur eiusmodi alimento, quare si est, ut uidet̄, agricolis utilissimum, diligentius de eo dicendum existimo, cum prisca auctoribus quamuis non omiffa res, leni tamen admodum cura sit prodita.

De generibus stercoreis. Cap. XV.

TRIA Igitur stercoreis genera sunt præcipua, quod ex auibus, quod ex hominibus, quod ex pecudibus confit. Animum primum habetur, quod ex columbarijs egeritur. Deinde quod gallinæ, cæteræq; uolucres edunt, exceptis tñ palustribus, aut nantibus, ut anatis, & anseris, nam id noxium quoq; est. Maxime tñ colum-

binum probamus, quod modice sparsum terram fermentare com-
perimus. Secundum deinde quod homines faciunt, si & alijs uil-
le purgamentis immisceat, qm̄ per se naturæ est feruentioris, &
icarco terram perurit. Aptior est tñ furculis hominis urina, quā
sex mensibus passus fueris ueterascere, si uitibus, aut pomorū arbo-
ribus adhibeas, nullo alio magis fructus exuberat, nec solū ea res
maiores facit prouentum, sed et saporem, & odorem uini, pomo-
rumq; reddit meliorem. Potest & uetus amurca, quæ salem nō ha-
bet, permista huic cōmode frugiferas arbores, & præcipue oleas
rigare. Nam per se quoq; adhibita multum iuuat. Sed usus utri-
usq; maxime per hyemem est, & adhuc uere ante aestiuos uapo-
res, dum et uites, & arbores ablaqueatae sunt. Tertium locū obti-
net pecudum stercus, atq; in eo quoq; discrimen est, nam optimū
existimat, quod asinus facit, qm̄ id animal lentissime mādīt, iōq;
facilius concoquit, & bene confectū, atq; idoneū protinus aruo si-
mum reddit. Post hæc, quæ diximus, ouillum, & ab hoc caprinū
est, mox ceterorū iumentorū, armentorumq;. Deterrimum ex om-
nibus suillū habetur. Quinetiā satis, pfuit cineris usus, et fauillæ.
Fruites uero lupini sucasus optimi stercoris uim p̄bet. Nec igno-
ro quoddā esse ruris genus, in quo neq; pecora, neq; auis haberi
possint, attamen inertis est rustici eo quoq; loco de sua stercore. Li-
cet enim quālibet frondem, licet ē uepribus compitisq; congesta
colligere. Licet filicem sine iniuria uicini, etiam cū officio decider-
e, & pmiscere cum purgamentis cortis. Licet depressa fossa, qua-
lem stercore reponēdo primo uolumine fieri p̄cepimus, cinerem,
cœnumq; cloacarum, & culmos, ceteraq; quæ euerrunt, in unū
congerere, sed eodē medio loco robustam materiē defigere conue-
nit, nāq; ea res serpentū noxam latere in stercore prohibet. Hæc
ubi uiduus pecudibus ager, nā ubi greges quadrupedū uersant,
quædā quotidie, ut culina, & caseale, qdā pluuijs diebus, ut bu-
bilia, et ouilia debent emundari. At si tñ frumentarius ager ē,
nihil refert genera stercoris separari sin aut furculo, & segetibus,
atq; etiam pratis fundus est dispositus generatim quoq; reponen-
dum est, sicut caprarum, & auium. Reliqua deinde in prædictū
locū concium congerenda, & assiduo humore satiāda sunt, ut
herbarum semina culmis, ceterisq; rebus immista putrescant.
Aestiuis deinde mensibus nō aliter, ac si repastines, totū sterqui-
linū rastris pmisceri oportet, quo facilius putrescat, & fit aruis

idoneum. Parū autē diligentes existimo esse agricolas, apud quos minores singulae pecudes tricenis diebus minus, q̄ singulas, itēq; maiores denas uebes stercoris efficiunt, totidemq; singuli hoīes, q̄ non solum ea purgamenta, q̄ ipsi corporibus edunt, sed & q̄ colunt uies cortis, & edificiū quotidie gignit, cōtrahere, & congerere possunt. Illud quoq; præcipiendū habeo, stercus omne, quod tēpestine repositū anno requienerit, segetibus esse maxime utile. Nam & uires adhuc solidas habet, & herbas nō creat. Quanto autē uetustius sit, minus prodesse, qm̄ minus ualeat. Itaq; pratis quā recentissimum debere iniici, quod plus herbarū progeneret, idq; mense Februario luna crescente fieri oportere, nā ea quoque res aliquantum fœni fructum adiunuat, de cætero usus stercoris qualis in quaq; re debeat esse, tum dicemus, cum singula persequimur.

Quibus temporibus agri stercorandi sunt. Cap. XVI.

INTERIM Qui frumentis arua præparare uolet, si autūno sementem facturus est, mense Septembri, si uere, qualibet parte hyemis modicos acernos Luna decrescente disponat, ita ut plani loci ingerum duodeniginti, clinosi quatuor & uiginti uebes stercoris teneant, & ut paulo prius dixi, nō antea dissipet cumulos, q̄ erit saturus. Si tñ aliqua causa tempestinam stercoratiōem facere prohibuerit, secunda ratio est, ante q̄ sarrias more seminantis ex aniaris puluerem stercoris p̄ segetem spargere. Si & is nō erit, caprinum manu iacere, atq; ita terrā sarculis permiscere, ea res letas segetes reddit. Nec ignorare colonos oportet, sicuti refrigerare agrum, q̄ non stercoret, ita peruri si nimium stercoret, magisq; conducere agricolæ frequenter id potius, q̄ immodice facere. Nec dubium, quin aquosus ager maiorem eius copiā, siccus minorē desyderet, alter quod assiduus humoribus rigens hoc adhibito regelat, alter quod p̄ se tepens siccitatibus, hoc assumpto largiore torret, propter quod nec deesse ei talem materiā, nec superesse oportet. Si tñ nullum genus stercoris suppetet ei multum proderit fecisse, quod. M. Columellam patrum meum doctissimum, & diligentissimum agricolam sepenumero usurpasse memoria repeto, ut sabulosis locis cretam ingereret, cretosis, ac nimium densis, sabulum, atq; ita non solū segetes letas excitaret, uerū etiam pulcherrimas uineas efficeret. Nam idem negabat stercus uitis ingerendum, quod saporem uini corrumpere, melior

remq; censebat esse materiam uindemijs exuberādis, congestitiā,
uel de uepribus, uel deniq; aliam quālibet arcessitam, & adue-
ctam humum. Iam uero (ut ego reor) si deficiat omnibus rebus
agricola, lupini certe præsidium expeditissimum nō deesse, quod
cum exili loco circa idus Septembris sparserit, & inarauerit, idq;
tempestine uomere, uel ligone succiderit, uim optimę stercoratio-
nis exhibebit. Sucadi autem lupinum sabulosis locis oportet, cū
secundum florem, rubricosus, cum tertium egerit. Illic dum tene-
rum est conuertit, ut celeriter ipsum putrescat, pmisceaturq; gra-
ali solo. Hic iam robustius, quod solidiores glebas diutius sustine-
at, & suspendat, ut eā solibus aestiuis uaporatę resoluantur.

Quemadmodum ex aruo prata fiant.

Cap. XVII.

ATQVE Hęc arator exequi poterit, si non solum, quę retu-
li, genera pabulorum prouiderit, uerū etiam copiā fœni, quo me-
lius armēta tueat, sine quibus terram cōmode moliri difficile ē,
& ideo necessarius ei cultus est etiam prati, cui ueteres Romani
primas in agricoltatione tribuerunt. Nomen quoq; indiderūt ab
eo, quod protinus esset paratum, nec magnū laborem desyderā-
ret. M. quidē Porcius & illa cōmemorauit, quod nec tempestatis
bus affligeret, ut alię partes ruris, minimiq; sumptus egens, per
oēs annos pberet redditum, neq; eū simplicem, cū ē in pabulo nō
minus redderet, q̄ in fœno. Eius igit animaduertimus duo gene-
ra, quorū alterum est siccanum, alterū rignum. Lato, pinguiq;
campo nō desyderat influens riuus, meliusq; habet fœnum, qđ
suapte natura succoso gignit solo, q̄ quod irrigatum aquis elia-
tur, quę tñ sunt necessarię, si macies terrę postulat, nā & in den-
sa, & resoluta humo quāuis exili, pratum fieri potest, cū facultas
irrigandi dat. Ac nec cāpus concanę positionis esse, neq; collis
prærupti debet, ille ne collectā diutius cōtineat aquā, hic ne sta-
tim præcitem fundat. Potest tñ mediocriter acclinis, si aut pin-
guis est, aut rignus ager, pratū fieri. At planities maxime talis
probat, quę exigue prona nō patit diutius imbres, aut influen-
tes riuos inorari, aut siq; eā supuenit humor, lente prepit. Itaq;
si palus in aliqua pte subsidēs restagnat, sulcis deriuāda ē. Quip-
pe aquarū abūdantia, atq; penuria graminibus æque est exitio.

Quemadmodum facta prata colantur.

Cap. XVIII.

COLVMELLAE.

CULTVS autem pratorum magis curæ, q̃ laboris est. Primum ne stirpes, aut spinas, ualidiorisq; incrementi herbas inesse patiamur, atq; alias ante hyemē, & per autumnū extirpemus, ut rubos, uirgulta, iūcos, alias per uer euellamus, ut intuba, ac solstitiales spinas, ac neq; suem uelimus impasci, quoniam rostro suffodiat, & cespites exaltet, neq; pecora maiora, nisi cum sicissimum solū est, quoniā demergunt ungulas, et atterunt, sandūtq; radices herbarū. Tum deinde macriora, & pendula loca mēse Februario luna crescente fimo inuāda sunt. Omnesq; lapides, et siqua obiacent falibus obnoxia colligi debent, ac longius exportari, summittiq; pro natura locorū, aut tēporius, aut serius. Sūt etiam quēdā prata situ uetustatis obducta ueteri, uel crasso musco, qbus mederi solent agricolæ seminibus de tabulato superiectis, uel ingesto stercore, quorū neutrum tantū prodest, quātum, si cinerem sepius ingeras, ea res muscum enecat. Attamē pigriora sunt ista remedia, cum sit efficacissimum de integro locū exarare. Sed hoc, si prata cœpimus, facere debemus. Sin autē noua fuerint instituenda, uel antiqua renouanda (nā multa sunt, ut dixi, quæ negligentia exolescant, & fiant sterilia) ea expedit interdum etiam frumenti causa exarare, q̃a talis ager post lōgam desidiā letas segetes affert. Igitur eū locum, quē prato destinauerimus, æstate profissum, subactumq; sepius per autumnum rapis, uel napis, uel etiam faba conseremus, insequente deinde anno, frumento, tertio diligēter arabimus, omnesq; ualidiores herbas, & rubos, & arbores, quæ interueniunt radicibus extirpabimus, nisi, si fructus arbusi id facere nos prohibuerit. Deinde uiciam permista seminibus fœni seremus, tum glebas sarculis resoluemus, & inducta crate cœquabimus, grumosq; quos ad uersuram plerunq; tractæ faciunt crates, dissipabimus ita, ut necubi ferramentum fœnisece possit offendere. Sed eam uiciam non conuenit ante desecare, quā permaturuerit, & aliqua semina subiacenti solo iecerit. Tum fœniseam messorē oportet inducere, & desectam herbam religare, & exportare, deinde locum rigare, si fuerit facultas aquæ, si tamen terra densior est, nam in resoluta humo non expedit inducere maiorem uim riuorum, prius q̃ conspissatum, & herbis colligatum sit solum, quoniam impetus aquarum proluit terram, nudatisq; radicibus gramina non patitur coalescere, propter quod nec pecora quidem oportet teneris

adhuc & subsidentibus pratis immittere, sed quoties herba profuerit salubus desecare. Nam pecudes (ut ante iam dixi) molli solo infigunt ungulas, atq; interruptas non sinunt herbarum radices serpere, & cōdensare. Altero tamē anno minora pecora post fœnificia pmitteremus admitti, si modo siccitas, et conditio loci patietur. Tertio deinde cum pratum solidius, ac durius erit, poterit etiam maiores recipere pecudes, sed in totum curandum est, ut secundum Favonij exortum, mense Februario, circa Idus immistis seminibus fœni, macriora loca, & utiq; celsiora stercorentur, nam editior cliuus præbet etiam subiectis alimentum, cum superueniēs imber, aut manu riuus perductus, succum stercoris in inferiorem partē secum trahit, atq; ideo ferè prudentes agricolæ etiā in aratis collem magis, q̄ uallem stercoreant, quoniā, ut dixi, pluuiæ semper omnem pinguiorē materiam in ima deducunt.

Quēadmodū succisum fœnū tractari, & cōdi debeat. C. XIX.

FOENVM autem demetitur optime, ante q̄ inarescat, nam & largius percipitur, & iucundiorē cibum pecudibus præbet. Est autem modus in siccādo, ut neq; per aridum, neq; rursus uiride colligatur, alterum quod omnē succum, si amisit, stramenti uicem obtinet, alterum quod si nimium retinuit, in tabulato putrescit, ac sepe cum concaluit, ignem creat, & incendiū, nonnunquam etiam cum fœnum æcidimus, imber oppressit, quod si permaduit, inutile est uidum mouere, meliusq; patiemur superiorem partem sole siccare, tunc demum conuertemus, & utrūq; siccatum coartabimus in striam, atq; ita manipulos uinciemus, nec omnino cunctabimur, quo minus sub tectum congeratur, uel si non competit, ut, aut in uillam fœnum portetur, aut in manipulos colligatur. Certe quicquid ad eum modum, quo debet, siccatum erit, in metas extrui cōueniet, easq; ipsas in angustissimos uertices exacui. Sic. n. cōmodissime fœnum defenditur à pluuijs, quæ etiam si non sint, non alienum tamen est prædictas metas facere, ut si quis humor herbis inest, exudet, atq; excoquatur in acervis, propter quod prudentes agricolæ, quamuis iam illatum tectū, non ante componunt, q̄ per paucos dies temere congestum, in se concoqui, & deferuescere patiātur. Sed & iam fœnificia sequitur cura messis, quā, ut recte possimus percipere, prius instrumenta præparanda sunt, quibus fruges coguntur.

COLVMELLAE.

De Area constituenda.

Cap. XX.

ARE A quoq; si terrena erit, ut sit ad trituram satis habilis, primum radatur, deinde confodiatur, pmistisq; paleis cū amurca, quæ salem non acceperit extergeat, nam ea res à populatione murum, formicarumq; frumenta defendit, tum æquata paniculis, uel molari lapide condensetur, & rursus subiectis paleis inculcetur, atq; ita solibus siccanda relinquatur. Sunt tamen qui potius adiacentium fabalium partem triturae destinant, areamq; demessa faba, & lecta expoliunt, nam dum à pecudibus legumina proculcant, herbae etiam ungulis atteruntur, atq; ita glabre fiat, & sit idonea frumentis area.

De messe facienda, & de tritura.

Cap. XXI.

SED CVM matura fuerit seges, ante q̄ torreatur uaporibus æstiuæ syderis, qui sunt uastissimi portum caniculae celeriter demetatur. Nam dispendiosa est cunctatio, primum quod auibus prædam, cæterisq; animalibus præbet, deinde quod grana, & ipsæ spicae culmis arentibus, et aristis celeriter decidunt, si uero procelle uentorum, aut turbines inceserint, maior pars ad terram defluit. propter quæ recrastinari nō debet, sed æqualiter flauentibus iam satis, ante q̄ ex toto grana indurescant, cū rubicundū colorē traxerunt, messis facienda est, ut potius in area, & in acervo, q̄ in agro grandescant frumenta, cōstat. n. si tempestine decisa sint, postea capere incrementum. Sunt autē metēdi genera cōplura, multi falibus uericulatis, atq; ijs, uel rostratis, uel denticulatis medium culmū secant, multi mergis, alij pectinibus spicam ipsam legunt, idq; in rara segete facillimum, in densa difficillimum est. Quod si falibus seges cū parte culmi demessa sit p̄tinus in acervum, uel in nubilariū congerit, & subinde opportunius solibus torrefacta p̄terit, sin autē spicae tantummodo reuise sunt, possunt in horreū cōferri, et deinde p̄ hyemem, uel baculis excuti, uel exteri pecudibus, at si cōpetit, ut in area terat frumentū, nihil dubium est, quin equis melius, q̄ bubus ea res conficiat, et si pauci inga sunt, adijcere tribulā, & trahā possis, quæ res utraq; culmos facillime cōminuit. Ipse autē spicae melius fustibus tunduntur, uannisq; expurgant. At ubi paleis immista sunt frumenta, uento separent, ad eam rem fauonius habet eximius, q̄ lenis, æqua-

lisq; æstiuis mensibus perflat, quem tamen operiri lenti est agricola, quia dum expectatur, sæua nos hyems deprehendit. Itaque in area detrita frumenta sic sunt aggeranda, ut omni flatu possint exærni. At si compluribus diebus undiq; filebit aura, uannis expurgent, ne post nimiam uentorum se gnitiem uasta tempestas irritum faciat totius anni laborem, pura deinde frumenta, si in annos reconduntur, repurgari debent, nam quanto sunt expolitiora, minus à circulionibus exeduntur, sin protinus usui destinantur, nihil attinet repoliri, satisq; est in umbra refrigerari, & ita granario inferri. Leguminum quoq; non alia cura est, q̄ reliquorum frumentorum, nam ea quoq; uel statim absunt, uel recodunt. Atq; hoc supremum est aratoris emolumentum papiendorum seminum, quæ terræ crediderat.

Quæ p̄ ferias liceat agricolæ, & q̄ nō liceat facere. Ca. XXII.

SED CVM tam otij, q̄ negotij rationem reddere maiores nostri censuerunt, nos quoq; monendos esse agricolas existimamus, quæ ferijs facere, quæq; non facere debeant. Sunt enim (ut ait poeta) quæ festis exercere diebus.

Fas, & iura sinunt, riuos deducere nulla
Religio uetuit, se geti prætere sepe,
Insidias auibus moliri, incendere uepres,
Ballantumq; gregem fluuio mersare salubri.

Quamquā pontifices ne gent se getē ferijs sepi debere. Vetāt quoq; lanarum cā lauare oues, nisi p̄pter medianam. Virgilius, qd̄ liceat ferijs flumine abluere gregem præcepit, & iccirco adiecit fluuio mersare salubri. Sunt enim uitia, quorū cā pecus utile sit lauare. Ferijs aut̄ ritus maiorū etiam illa permittit, far pinsere, facēs incidere, candelas sebare, uineam cōductam colere, pisanas, lacus, fossas ueteres tergere, & purgar̄, prata sialire, stercorea equare, fœnum in tabulata componere, fructus oliueti conductos cogere, mala, pyra, ficos pandere, caseum facere, arbores serendi cā, collo, uel mulo clitellario asferre, sed iuncto aduehere nō permittit, nec apportata serere, neq; terrā apire, neq; arborē collucare, sed ne sementē qdem administrare, nisi prius Catulo feceris, nec fœnum secare, aut uindicare, aut uehere. Ac ne uindemiā qdem cogi per religiones pontificū ferijs licet, nec oues tondere, nisi si Catulo feceris. Desutum quoq; facere, & de frutare uinum licet. Vnas,

COLVMELLAE.

itemq; oliuas conditui legere licet. Pellibus oues uestiri non licet. In horto qcquid olerū causa facias, omne licet. Ferijs publicis hominem mortuū sepelire non licet. M. Porcius Cato, mulis, equis, asinis nullas esse ferias dixit. Idemq; boues permittit coniungere lignorū, et frumētōrū aduehēdorū cā, nos apud pōtifices legimus ferijs tm̄ denicalibus mulos iungere nō licere, ceteris licere. Hoc loco certum habeo quosdā cum solēnia festorū p̄censuerim, desyderaturos lustrationum, ceterorumq; sacrificiorū, quae pro frugibus sunt, morem prisca usurpatum, nec ego abnuo docēdi curā, sed differo in eum librum, quem componere in animo est, cū agricolationis totam disciplinam prae scripsero. Finem interim p̄sentis disputationis faciam, dicturus exordio sequēte, quae de uineis, arbutisq; prodidere ueteres auctores, quaeq; ipse mox comperi.

LVCII IVNII MODERATI COLVMELLAE DE RE RUSTICA LIBER TERTIVS.

Quod genus uitis conueniat cuiq; solo, et statui cœli. Cap. I.

ACTENVS ARVORVM CVLTus, ut ait praestantissimus poeta. Nihil enim prohibet nos. P. Siluine de iisdem rebus dicturos celeberrimi carminis auspiciari principia. Sequitur arborum cura, quae pars rei rusticae uel maxima est. Earum species diuersae, et multiformes sunt, quippe uarij generis (sicut auctor idem refert) nullis hominum cogentibus ipsae sponte sua ueniunt, multae etiam nostra manu fatae procedunt, sed quae non ope humana gignuntur, syluestres, ac ferae, sui cuiusq; ingenij semina gerunt. At quibus labor adhibetur, magis aptae sunt frugibus. De eo igitur prius genere dicendum est, quod nobis alimenta praebet. Idque tripartito diuiditur. Nam ex surculo uel arbor proceedit, ut olea, uel frutex, ut palma campestris, uel tertium quiddam quod nec arborum, nec fruticem proprie dixerim, ut est uitis. Hanc nos ceteris stirpibus iure praepōnimus non tamen fructus dulcedine, sed etiam facilitate, per quam omni penè regione, et omni declinatione mundi, nisi tamen glaciale, uel perferuida, curae mortalium rñdet. Tamq̃

felix campis, q̄ collibus provenit, & in densa non minus, q̄ in re-
 soluta, sepe etiam gracili, atq; pingui terra, siccaq; , & uligino-
 sa. Tum sola maxime utranq; patit̄ intemperie cœli, uel sub axe
 frigido, æstiuo, p̄cellosoq;. Refert tñ cuius generis, aut quo habi-
 tu uitem pro regionis statu colere censeas, neq; .n. oī cœlo, solo ue
 cultus idem, neq; est idem stirpis eius genus, quodq; præcipuū est
 ex omnibus non facile dictu ē, cum suum cuiq; regioni magis, aut
 minus aptum esse doceat usus. Exploratum tamen habebit pru-
 dens agricola genus uitis habile campo, quod nebulas, pruinaq;
 sine noxa perfert, cœliq; siccitatem, uentosq; patitur, pingui, &
 uberi dabit agro gracilem uitem, nec natura nimis fœcundam,
 macro feracem, terræ dense uehementem, multaq; materia fron-
 dentem, resolutu, & læto solo rari sarmenti, humido loco sciet nō
 recte mandari fructus teneri, & amplioris aëni, sed callosi, et an-
 gusti, frequentisq; uinacēi, sicco recte contribui diuersæ quoq; na-
 turæ semina. Sed & post hæc non ignorabit dominus loci plus
 posse qualitatem cœli frigidam, uel calidam, siccam, uel rosida,
 grandinosam, uentosamq;, uel placidam, serenā, uel nebulosam.
 Frigidaq; aut nebulosa duorum generum uites aptabit, seu præ-
 coques, quarum maturitas frugum præcurrit hyemem, seu firmi,
 duriq; aëni, quarum inter caligines uuæ deflorescunt, & mox ge-
 licidijs, ac pruinis, ut aliæ caloribus mitescunt, uentoso quoq;, et
 tumultuoso statu cœli fidentes easdem tenaces, ac duri aëni com-
 mittet, rursus calido uberioresq; teneriores concredet, sicco desti-
 nabit eas, quæ pluuijs, aut continuis roribus putrescunt, rosido,
 quæ siccitatibus laborāt, gradinoso, quæ folijs duris, latisq; sunt,
 quo melius protegant fructum, nam placida, et serena regio nul-
 lam non recipit, commodissime tamen eam, cuius uel uuæ, uel
 aëni celeriter decidunt. At si uoto est eligendus uineis locus, &
 status cœli, sicut censeat uerissime Celsus, optimum est, si luum, nec
 densum nimis, nec resolutum, soluto tamen ppius, nec exile, nec
 lætissimum, proximum tamen uberi nec campestre, nec præeps
 simile tamen edito campo, nec siccam, nec uliginosum, modicæ
 tamen rosidum, quod fontibus non in summo, non in profundo
 terræ scaturiat, sed ut uicinum radicibus humorem subministret,
 eumq; nec amarum, nec falsum, nec saporem uini corrumpat, &
 incrementa uirentium ueluti quadam scabra rubigine coerceat,
 si modo credimus Virgilio dicenti.

COLVMELLAE.

• Salsa autem tellus, & quæ perhibetur amara
 Frugibus infelix, ea nec mansuescit arando.
 Nec baccho genus, aut pomus sua nomina seruat.
 Cælum porro neq; glaciæ, uinea (sicut prædixi) nec rursus æstuo-
 sum desyderat. Calido tñ potius q̃ frigido lætatur, imbribus ma-
 gis, q̃ serenitatibus offenditur, & solo sicco, q̃ nimis pluuio ē ami-
 cior, perflatu modico, leniq; gaudet, procellis obnoxia est. Atque
 hæc maxime probabilis est cæli, & soli qualitas.

Quæ uites suburbanis regionibus ad escam conferendæ sunt.

Cap. II.

VITIS autem uel ad escam, uel ad effusionem deponit̃. Ad
 escam non expedit instituere uineta, nisi cum tam suburbanus est
 ager, ut ratio postulet inconditum fructum mercatibus uelut po-
 mum uendere, quæ cum talis est conditio, maxime præcoques, &
 duraciæ, tum deniq; purpureæ, & bumasti, dactyliq; , & rho-
 diæ, libycæ quoq; & cærauniæ, nec solum quæ incunditate sapor-
 is, uerū etiam quæ specie commendari possint, conseri debent, ut
 stephanitæ, ut tripedanæ, ut unciariæ, ut cydonitæ. Item quarū
 uue temporibus hyemis durabiles uasis conduntur, ut uenniculæ,
 ut, nuper in hos usus exploratæ, numisianæ. At ubi uino consuli-
 mus, uitis eligitur, quæ & in fructu ualet, & in materia, quod
 alterum ad redditus coloni, alterum ad diuturnitatem stirpis plu-
 rimum confert. Sed ea tum præcipua est, si nec nimis celeriter spō-
 det, & primo quoq; tēpore deflorescit, nec nimis tarde mitescit,
 quinetiam pruinas, & caliginem, & carbunculum facile propul-
 sat, eademq; nec imbribus putrescit, nec siccitatibus abolescit, ta-
 lis nobis eligatur uel mediocriter fœcunda si modo is locus habe-
 tur, in quo gustus nobilis, pretiosusq; fluit, nam si sordidus, aut
 uilis est, feracissimam quāq; serere conducit, ut multiplicatiōe fru-
 gum redditus augeatur. Ferè autem omni statu locorum campe-
 stria largius uinum, sed incundius afferunt collina, quæ tamē ip-
 sa modico statu cæli magis exuberāt aquiloni prona, sed sunt ge-
 nerosiora sub austro, nec dubium quin sit ea, nonnullarum uitiū
 natura, ut pro locorum situ bonitate uini modo uincat, modo su-
 peretur. Solæ traduntur amineæ excepto cæli statu nimis frigido,
 ubicunq; sint etiam si degenerent, sibi comparatæ, magis, aut mi-
 nus probi gustus uina p̃bere, et ceteras omnes sapore præcedere.

Eæ, cum

Eæ, cum sint unius nominis, non unam speciẽ gerunt. Duas germanas cognouimus, quarum minor ocysus, et melius deflorescit, habilis arbori, nec non ingo, illa pinguem terram, hæc mediocrẽ desyderat, longeq; præcedit maiorem, quia & imbres, & uentos fortius patitur, nam maior celeriter in flore corrumpitur, & magis in ingis, q̃ in arboribus, ideoq; non est uineis apta, uix etiam arbusto, nisi p̃pingui, et uuida terra, nã nec mediocri ualet, multoq; minus in exili, prolixarum frequẽtia materiarum, foliorũq; & uuarum, & acinorum magnitudine dignoscitur, internodijs quoq; rarior, largis fructibus a minore superatur, gustu non uinitur, & hæc quidem utræq; amineæ. Verũ & aliæ duæ geminæ, quæ ab eo q̃ duplices uuas exigunt, gemellæ uocantur, austerioris uini, sed æque perennis. Earum minor uulgo notissima, q̃ppe campaniæ celeberrimos uestiui colles, surrentinosq; uestit. Hilari inter æstiuos fauonijs flatus, austris affligit. Cæteris itaq; partibus Italiæ non tam uineis, q̃ arbusto est idonea, cum prædictis regionibus cõmodissime ingum sustineat materiã, fructumq; nisi quod duplicem non absimilem minori germanæ ægerit, sicut maior gemina minori germanæ, quæ tamen minor hoc melior est, quod fecundior etiam mediocri solo, nam illam nisi præpingui terræ, non respondere iam dictum est. Lanatam quoq; amineam quidam maxime probant, quæ hoc uocabulum nõ ideo usurpat, q̃ sola ex omnibus amineis, uerum q̃ præcipue canescit lanugine. Sanè boni uini, sed leuioris, q̃ superiores, crebram quoq; materiam fundit, atq; ideo propter pampini densitatem sæpe parum recte deflorescit, eademq; maturo fructu celeriter putrescit. Super hunc numerum, quem retulimus, singularis habet aminea, maiori geminæ non dissimilis, primũ specie pampini, & trunci, sed uini sapore aliquanto inferior, quãuis generosissimus sit, p̃xime præferenda etiam proprijs uirtutibus, nam & feracior est, & flore melius exuitur, spissasq; & albidas uuas, ac tumidioris acini gerit, gracili aruo non defasat. Atq; ideo inter uberrimas uites numeratur. Nomentanæ uini nobilitate subsequuntur amineas, fecunditate uero etiam præueniunt, quippe cum se frequẽter impleant, & id, quod ediderunt, optime tueatur. Sed earum quoq; feracior est minor, cuius & folium parcius sanditur, & materia non ita rubet, ut amineis, a quo colore rubellianæ nuncupatur, eademq; fecinæ, q̃ plus q̃ cæteræ fecis afferunt. Id tñ incommo-

Colu.

p

dum repensant uinarum multitudine, quas & in iugo, sed & in arbore melius exhibent. Ventos, & imbres ualenter sufferunt, & celeriter deflorescunt, & ideo citius mitescunt, omnis incommo- di patientes, præter caloris, nam quia minuti acini, et duræ cutis uuas habent, æstibus contrahuntur. Pingui aruo maxime gau- dent, q̄ ubertatem aliquam natura gracilibus, & exilibus uuis præbere ualet. Frigidum ac rosidum solum, & cœlum cōmodissi- me sustinent, eugenie dum sunt in albano colle, nam mutato lo- co uix nomini suo respondent, nec minus allobrogicæ, quarū ui- ni incunditas cum regione mutatur. Magnis etiam dotibus tres apianæ commendantur, omnes feraces, iugoq̄, & arboribus satis idoneæ, generosior tamen una, quæ nudis folijs est, nam duæ la- natæ quāuis frondibus, & palmitum pari facie fluxuræ, quali- tate sunt dispariles, cum tardius altera recipiat cariem uetusta- tis. Pingui solo feracissimæ, mediocri quoq̄ fœcundæ, præcoquis fructus. Ideoq̄ frigidis locis aptissimæ uini dulcis, sed capiti ner- uis, uenisq̄ non aptæ, nisi mature lectæ, pluuijs, uentisq̄, & api- bus afferunt prædam, quarum uocabulo propter hanc ex popu- lationem cognominantur. Atq̄ hæ pretiosi gustus celeberrimæ. Possunt tamen etiam secundæ notæ uites prouentu, & ubertate commendari, qualis est biturica, qualis basilica, quarum mino- rem cocolumem uocant hispani, longe omnium primis utraq̄ p- ximæ. Nam & uetustatem uinum earum patitur, & ad bonita- tem aliquam per annos uenit. Iam uero ipse fœcunditate præ- stant omnibus, quas ante retuli, tum etiam patientia, quippe tur- bines, imbresq̄ fortissime sustinent, & commode fluunt, nec defici- unt macro solo. Frigora melius, q̄ humores sustinent, humores cō- modius, q̄ siccitates, nec caloribus tamen contristant. Visula de- inde ab his, & minor argitis terræ mediocritate latentur, nam in pingui nimis uiribus luxuriant, in macra tenues, & uacue fructu ueniunt. Amiciores iugo, q̄ arboribus, sed argitis etiam in sublimibus fertilis uastis materijs, & uuis exuberat, humillimis tabulatis aptior. Visula breuem materiam & latum folium exi- git, cuius amplitudine fructus suos optime aduersus grandinem tuetur, qui tñ nisi primo quoq̄ tempore maturi legantur, ad ter- ram decidunt, humoribus etiam priusquam defluat putrescunt. Sunt & heluolæ, quas nōnulli uarias appellant, neq̄ purpureæ, neq̄ nigre ab heluo (nisi fallor) colore uocitæ, melior est nigri

or abundantia uini, sed hæc sapore pretiosior, color acinorum in neutra conspicitur æqualis, utraq; candidi musti alterna uicæ acinorum plus, aut minus afferunt, melius arborem, sed & iugum cōmode uestiunt, mediocri quoq; solo fœcundæ, sicut p̄tiæ minor, & maior, sed eæ generositate uini magis cōmendantur, & frequētibz materis frondent, & cito maturescunt. Albuels utilior, ut ait Celsus, in colle, q̄ in campo, in arbore, q̄ in iugo, in summa arbore q̄ in ima, ferax & materiæ frequentis, & uuæ, nam quæ græculæ uites sunt, ut mareoticæ, thasiæ, psythiæ, sophortiæ, sicut habent probabilem gustum, ita nostris regionibus & raritate uuarum, & acinorum exiguitate minus fluunt, inercicula tamen nigra, q̄ quidā græci amethyston appellant, potest in secūda quasi tribu esse, q̄ & boni uini est, & innoxia, unde etiā, nomen traxit, q̄ iners habetur in tentandis neruis, quibz gustu nō sit hebes. Tertium gradū facit earum Celsus, quæ fœcunditate sola cōmendatur, ut tres heluenaciæ, quarū duæ maiores nequaq; minori bonitate, & abundantia musti pares habent, eaz altera, quā gallicarū incolæ emarcum uocant, mediocris uini, & altera, quā longam appellant, eademq; anaram sordidi, nec tam largi q̄ ex numero uuarū, quarū prima specie promittit. Minima & optima ē tribus facillime folio dignoscitur, nā rotundissimū omnium id gerit, atq; est laudabilis, q̄ siccitates maxime pfert, q̄ frigora sustinet, dum tñ sine imbribus sit, q̄ nōnullis locis etiā uinum eius in uetustatem diffundit, q̄ præcipue sola acerrimum quoq; solū fertilitate sua cōmendat, at spionia dapsilis musto, & amplitudine magis uuarū, q̄ numero fertilis, ut oleginia, ut murgentina, eadēq; pōpeiana, ut numisiana, ut uenacula eadēq; sarpula, atq; sticula, ut nigra fregellana, ut merica, ut retica, ut oīum, quas cognouimus copiosissima arcelata maior, à multis argitis falso existimata. Nā has nuper mihi cognitās pgulanā dico, & irtiollā, fereolanāq; non facile asseuerem quo gradu habendæ sint, qd̄ etsi satis fœcundas scio, nondum tñ de bonitate uini, quod afferūt indicare potui, unam etiam præcoquem uitem nobis ante hoc tempus incognitam græci cōsuetudine dracontion uocitari comperimus, quæ fœcunditate incūditate uel arcelatæ, basilicæq; & bituricæ comparari possit, generositate uini amineæ. Multa p̄terea sunt gñā uitiū, quarū nec numerū, nec appellatiōes cū certa fide referre possumus. Neq; n. ut ait poeta, numero cōprehēderē refert.

Quem qui scire uelit, libya uelit æquoris idem

Discere q̄ multæ zephyro uersentur harenæ.

Quippe uniuersæ regiones, regionumq̄; penè singulæ partes habent propria uitium genera, quæ consuetudine sua nominant, q̄dam etiam stirpes cum locis uocabula mutauerunt, quædam propter mutationes locorum, sicut supradiximus, etiam à qualitate sua discesserunt, ita ut dignosci nō possint, ideoq̄; in hac ipsa Italia, ne dicam in tam diffuso terrarum orbe uicinæ etiam nationes nominibus earum discrepant, uariantq̄; uocabula, quare prudētis magistri est, eiusmodi nomenclationis aucupio quō potiri nequeat, studiosos nō demorari, sed illud in totum præcipere, quod & Celsus ait, & ante eum. M. Cato, nullum genus uitium conferendum esse nisi fama, nullum diutius conseruandum nisi experimento p̄batum, atq̄; ubi multa inuitabunt regionis cōmoda, ut nobilem uitam conseramus, generosam requiremus inq̄t. Iulius græcū, ubi nihil erit, aut non multum, quod proritet feracitatem, potius sequemur, quæ non eadem portione uinatur precio, q̄ uincit abundantia, sed de hac sententia q̄q̄ & ipse paulo ante id censuerim, quid tamen arcanius indicem, suo loco mox dicā. Propositum est enim docere qua ratione uinæ pariter feraces, et præiosæ fluxuræ possint constitui.

Nihil magis rusticis conuenire, q̄ uitam colere. Cap. III.

NUNC Prius, q̄ de satione uitium differam, nō alienum puto uelut quoddam fundamentum iacere disputationi futuræ, ut ante perpensum & exploratum habeamus, an locupletet patremfamilias uinearum cultus, et enim penè adhuc supernacium de his conferendis præcipere, dū prius est, qd̄ nondū concedatur, an omnino sint habendæ, idq̄; adeo plurimi dubitent, ut multi refugiant, & reformident talem positionem ruris, atq̄; optabiliorē pratorum possessionem, pascuorumq̄; uel siluæ cædæ indicent, nam de arbusto etiam inter auctores non exigua pugna fuit, abnuente Salserna genus id ruris, Tremellio maxime, probante, sed & hanc sententiam suo loco æstimabimus, interim studiosi agriculture hoc primum docendi sunt, uberrimum eē redditum uinearum, atq̄; ut omittam ueterem illam felicitatem aruorū, quibus & ante iam M. Cato, & mox Terentius Varro prodidit singula ingera uinearum sexcenæ urnas uini præbuisse, id enim maxi

me affeuerat in primo libro rerum rusticarum Varro, nec una regione provenire solitum, uerum & in fauētino agro, & in gallico, qui nunc pyceno contribuitur, ijs certe temporibus, nomena na regio celeberrima fama, illustris, & præcipue, quā possidet Seneca uir excellentis ingenij, atq; doctrinæ, cuius in prædijs uinearum iugera singula culleos octonos reddidisse plerunq; comperitum est, nam illa uidentur prodigialiter in nostris ceretanis accidisse, ut aliqua uitis apud te excederet uuarum numerum duorum nullium, & apud me octogenæ stirpes insitæ intra biennium septenos culleos peræquarent, ut primæ uinæ centenas amphoras iugeratim præberent, cum prata, & pascua, & syluæ, si centenos sextertios in singula iugera efficiant, optime domino cōsulere uideant, nam frumenta maiore quidem parte Italiæ quando cum quarto respōderint, uix meminisse possumus, cur ergo res infamis est? non quidem suo, sed hominum inquit uitio Græcinus, primū q̄ in explorandis seminibus nemo adhibet diligentiam, & ideo pessimi generis pleriq; uineta conserunt, deinde sata non ita enutriunt, ut ante conualescant, ac profiliant, q̄ retorrescant, sed & si forte adoleuerint, negligenter colunt. Iā illud à principio nihil referre censent, quem locū conserant, imo et seligunt deterrimam partem agroꝝ, tāquam sola sit huic stirpi maxime terra idonea, quæ nihil aliud ferre possit, sed ne ponendi quidem rōnem, aut perspiciunt, aut perspectā exequunt, tum etiam dotem .i. instrumentum raro uineis præparant, cum ea res si omissa sit, plurimas operas, nec minus arcam patrisfamilias semper exhauriat. Frustrum uero pleriq; quiberrimum præsentem consecantur, nec prouident futuro tempori, sed quasi planè in diem uiuant, sic imperant uitibus, & eas ita multis palmitibus onerant, ut posteritati non consulant. Hæc omnia uel certe plurima ex his cum cōmiserint, quiduis malunt, q̄ suam culpam confiteri, querunturq; nō respondere sibi uineta, quæ uel per auaritiam, uel insatiam, uel per negligentiam perdiderunt, at si qui cum scientia sociauerint diligentiam, non ut ego existimo tricenas, uel quadragenas certe, sed ut Græcinus minimum computās, licet inquit amphoras uicenas, perāpient ex singulis iugeribus, omnis istos, qui fœnū suum, & olera amplexantur, incremento patrimonij facile superabunt, nec in hoc errat, quippe ut diligens ratioinator calculo posito uidet id genus agricolatiōis maxime rei familiari condu-

COLVMELLAE.

cere. Nam ut amplissimas impensas vineæ poscant, non tñ excedunt septem iugera unius operam uinitoris, quem uulgus qdem parui æris, uel de lapide noxiu posse cōparari putat, sed ego plurimorū opinionī dissentiens, pretiosum uinitorem in primis eē censeo, isq; licet sit emptus sex uel potius sextertius octomillibus, cum ipsum solum septem iugerum totidem millibus numorum partum, vineasq; cum sua dote. i. cum pedamētis, & uiminibus binis millibus in singula iugera positas duco. Fit tum in assem cōsumatum pretium sextertiorum. XXIX. millium, huc accedūt semisses usurarū sextertia tria millia, & quadringenti octuaginta numi biēni t̄pis, quo uelut infantia uinearum cessat à fructu. Fit in assem summa sortis & usurarum. XXXII. nullium quadringētorū. LXXX. numorū, quod quasi nomen si, ut fœnerator cum debitore, ita rusticus cū uineis suis fecerit, eius summa, ut in perpetuum prædictā usuram semissium dominus constituat, p̄cipere debet in annos singulos mille septingentos quadraginta sextertios numos, qua cōputatione uināt tñ reditus. VII. iugerum secundū opinionem Græcīni, usuram triginta duorū milliu quadringētorū octoginta numorum. Quippe, ut deterrimi generis sint vineæ, tñ si cultæ singulos utiq; culleos uini, singula earū iugera peræquabūt, utq; trecentis numis quadragenæ urnæ ueneāt (qđ minimum pretium est annonæ) cōsumant tñ septem cullei sextertia duo millia & centum numos, ea porro summa excedit usuram semissium, atq; hic calculus, quem posuimus, Græcīni rationem continet, sed nos extirpanda uineta censemus, quorū singula iugera minus, q̄ ternos culleos præbent, & adhuc tñ sic cōputauimus, quasi nullæ sint uiniradices, quæ de pastinato eximantur, cum sola ea res oēm impensam terreni p̄tio suo liberet, si modo non prouincialis, sed italicus ager est, neq; id cuiq; dubium eē debet, cum & nostrā, et Iulij attici rōnē dispexerit. Nos iam. n. uicena millia malleolorū per vineæ iugē inter ordines pangimus. Ille minus quatuor millibus depōit, cuius ut uincat rō, nullus tñ uel iniquissimus locus non maiorem quæstum reddet, q̄ acceperit impensam. Sit qdem, ut cultoris negligentia sex millia seminum intereant, reliqua tñ decem millia tribus millibus numorū libenter, et cum lucro redemptor emerit, quæ summa tertia parte superat duo millia sestertia, q̄ti constare iugerum uinearum prædiximus, quanq̄ nostra cura in tñ iam processit, ut non inuiti se

stertijs sexcētis numis, singula millia uiniradicis à me rustici mer-
centur, sed uix istud alius præsiterit, nā nec quisq; nobis facile cre-
diderit, tantam in agellis esse nostris abundantiam uini, q̄tā-
tu Siluine nouisti. Mediocre itaq; uulgatumq; pretium uiniradi-
cis posui, quo celerius nullo dissentiente perduci possent in nostrā
sententiam, qui propter ignorantiam genus hoc agricolationis
reformidant. Sine ergo pastinationis reditus, seu futurarum spes
uindemiarum cohortari nos debet ad positionem uinearū, quas
cum docuimus rationis esse conferere, nunc institutionis earum
præcepta dabimus.

Quæ obseruare debet, qui uineas instituit. Cap. IIII.

CVI Vineta facere cordi est, præcipue caueat, ne alienæ potius
curæ, q̄ suæ credere uelit, ne ue meretur uiniradicem. Sed genus
sirculi probatissimum domi conserat, faciatq; uitiarium, ex quo
possit agrum uineis uestire, nam quæ peregrina ex diuersa regio-
ne semina transferuntur, minus sunt familiaria nostro solo, q̄ uer-
nacula, eoq; uelut alienigena reformidant mutatam cœli, lociq;
positionem. Sed nec certam generositatis fidem pollicentur, cum
sit incertum, an is, qui conseruerit ea, diligenter exploratum, p-
batumq; genus sirculi deposuerit, quāobrem biennij spatium lon-
gum esse minime existimandum est, intra quod utiq; tempestiui-
tas seminum respondet, cum semper (ut dixi) plurimum retulerit
exquisiti generis stirpem deposuisse. Post hæc deinde meminerit
accurate locum uineis eligere, de quo cum indicauerit, maximā
diligentiam sciat adhibendam pastinationi, quam cum perege-
rit, non minore cura uitem conserat, & cum seruerit, summa se-
dulitate culturæ seruiat. Id enim quasi caput, et columen est im-
pensarum, quoniam in eo consistit, melius, an segnius terræ man-
dauerit paterfamilias pecuniam, q̄ in otio tractare. Igitur unū
quodq; eorum, quæ proposui, suo iam persequar ordine.

Quali solo, & quomodo uitiarium faciendum sit. Cap. V.

VITTIARIUM neq; ieiuna terra, neq; uliginosa faciendum
est, succosa tñ, & mediocri potius, q̄ pingui, tametsi ferè oēs au-
ctores huic rei latissimum locū destinauerunt, quod ego minime
reor esse pro agricola, nā depositæ stirpes ualido solo, quis celeri-
ter comprehendant, atq; profoliant, tamen cum sint uiniradices

facta, prius q̄ transferantur, retorrescant, nec adolescere queunt. Prudētis autem coloni est ex deteriori terra potius in meliorem, q̄ ex meliore in deteriolem transferre. Propter quod mediocritas in electiōe loci maxime probatur, quoniam in confinio boni, maliq; posita est. Sive enim post modum necessitas postulauerit tempestina semina ieiuno solo cōmittere, non magnam sentient differentiam, cum ex mediocri terra in exilem translata sunt, sive leuior ager conferendus est, longe celerius in ubertate coalescant. Rursus tenuissimo solo uitariū facere minime rōnis est, qm̄ malleologi pars maior deperit, & q̄ superest tarde fit idonea trāslationi. Ergo mediocris & modice siccus ager uitario est aptissimus, isq; bipalio prius subigi debet, quæ est altitudo pastinationis, cum in duos pedes, & semissem conuertitur humus, ac deinde tripedaneis relictis spatij, per quæ semina excolantur, in singulis ordinibus, qui duænos quadragenos pedes obtinent sexcenteni malleoli pangendi sunt. Is numerus cōsumat per totū ingerū seminum millia quatuor et uiginti. Verū hanc curā puenit inquit sitio, & electio malleologi, nam, ut sæpe iā retuli, quasi fundamentum est, p̄dictæ rei, probatissimum genus stirpis deponere.

Qualis, et ex quibus partibus uitis malleolus legendus sit. Cap. VI.

SED Electio dupliciter facienda est, non. n. solum fecundā esse matrem satis est, ex qua semina petuntur, sed adhibenda ratio est subtilior, ut ex his partibus trunci sumant, quæ et genitales sunt, & maxime fertiles. Vitis autem fecunda, cuius progeniem studemus submittere, non tantum debet eo æstimari, q̄ uuas complures exigit, potest enim trunci uasitate id accidere, & frequentia palmitum, nec tamen eam feracem dixerim, cuius singulæ uuæ in singulis sarmentis conspiciuntur, sed si per unumquēq; pampinum maior numerus uuarum dependet, si ex singulis gemmis cō pluribus materijs cum fructu germinat, si deniq; etiā è duro uirgam cum aliquibus racemis atat, si etiam nepotum fructu grauida est, ea sine dubitatione ferax destinari debet legendo malleolo. Malleolus aut nouellus est palmes innatus prioris anni flagello, cognominatusq; à similitudine rei, q̄ in ea parte, quæ deciditur ex uetere sarmēto prominens utrinq; malleoli speciem p̄bet. Hunc ex fecundissima stirpe legendū censemus omni tpe, quo uineæ putantur, ac super terrā gemmis tribus uel quatuor extatis

bus diligenter obruendum loco modice humido non uliginoso, dum tamen antiquissimum sit consyderare, ne uitis, ex qua is sumitur, ancipitem floris habeat euentum, ne difficulter acinis ingrandescat, ne aut p̄coquis aut seræ maturitatis fructum afferat, nam illa uolucris, hæc etiam tempestatibus hyemis infestat. Tale porro genus nō una comprobatur uindemia, potest. n. uel anni prouentu, uel alijs de causis etiam naturaliter infœcūda uitis semel exhibere. Sed ubi plurimum uelut emeritis annorū stipendijs fides surculo constitit, nihil dubitandum est de fœcunditate, nec tamen ultra quadriennium talis extenditur inquisitio, id enim tempus ferè uirentium generositatem declarat, quo sol in eandem partem signiferi per eosdem numeros redit, per quos cursus sui principium cœperat, quem circuitum meatus dierum integrorum mille quadringentorum sexaginta annis ἀποκταί/ 5 α σ ι υ uocant studiosi rerum cœlestium.

Quomodo fœcunditatem uitis explores.

Cap. VII.

SE D certum habeo Publi Siluine iam dudum te tacitum requirere, cuius generis sit ista fœcunda uitis, quā nos tā accurate describimus, ac ne de ijs aliqua significet, quæ uulgo nō habentur feracissimæ, plurimū nāq; bituricam, multi spioniam, quidā basilicam, nonnulli arælacam laudibus efferunt. Nos quoq; hæc genera nō fraudamus testimonio nostro, sunt. n. largissimi uini, sed proposuimus docere uineas eiusmodi conferere, q̄ nec minus uberes fructus p̄dictis generibus afferant, & sint pretiosi saporis, uelut aminei, uel certe nō p̄cul ab eo gustu, cui nostræ sententiæ scio penè omniū agricolarū diuersam esse opiniōem, quæ de amineis inueterata longo iā tpe conualuit, tanquā naturali, & ingentia sterilitate laborantibus, quo magis nobis ex alto repetita compluribus exemplis firmanda ratio est, quæ desidia, nec minus imprudentia colonorū dānata, & uelut ignorantie tenebris obcæcata luce ueritatis caruit, quare nō intempestiuum est nos ad ea p̄uerti, quæ uidentur hunc publicum errorem corrigere posse.

Quæ spectanda sit qualitas in eo solo, quod uineis destinaueris.

Cap. VIII.

IGITUR Si rerum naturam Publi Siluine uelut acrioribus mentis oculis intueri uelimus, reperiemus parem legem fœcundi-

COLVMELLAE.

tatis eam dixisse uirentibus, atq; hominibus, ceterisq; animalibus, nec sic alijs nationibus, regionibus ne proprias tribuisse doctes, ut alijs in totum similia munera denegaret, quibusdā gentibus numerosam prognerandi sobolem dedit, ut Aegyptijs, & Aphris, quibus gemini partus familiares, ac pene solennes sunt, sed & Italiā generis esse uoluit eximiae fecunditatis Albanas curiatie familiæ trigeminorū matres. Germaniā decorauit altissimorum hominum exeratibus, sed & alias gentes nō in totum fraudauit præcipue stature uiris. Nam & M. Tullius Cicero testis est Romanū fuisse ciuem Næuium Pollionē pede longiorem q̄ quenquam longissimum, & nuper ipsi uidere potuimus in apparatu pompæ arcensium ludorum indee gentis hominem proceriorem celsissimo germano. Transeo ad pecudes. Armentis sublimibus insignis menania est, liguria p̄uis. Sed & menaniæ bos humilis, & liguriæ nonnunquam taurus eminentis stature conspicitur. India perhibetur molibus ferarum mirabilis, parit̄ in hac terra uastitate belluas prognerari quis neget? cū intra mœnia nostra natos animaduertamus elephantos. Ad genera frugum redeo. Mysiā, Libyamq; largis aiunt abundare frumentis, nec tñ appulos, campanosq; agros opimis defici segetibus. Tmolon, & Coryaon florere croco, Indeam & Arabiā pretiosis odoribus illustrē haberi, sed nec nostrā ciuitatem prædictis egere stirpibus, quippe cū pluribus locis urbis, iam casiā frondentē conspicimus, iam tuream plantā, florentesq; hortos myrrha, & croco. His tamen exemplis nimis admonemur curæ mortaliū obsequētissimam esse Italiā, quæ penè totius orbis fruges adhibito studio colonorū ferre didicerit, quo minus addubitemus de eo fructu, qui uelut indigena, peculiarisq; et uernaculus est huius soli. Neq; n. dubiū est massiā, surrentiniq; & albani, atq; æcubi agri uites omniū, quas terra sustinet, in nobilitate uini principes esse.

Quomodo amineas feraces facias.

Cap. IX.

FOECUNDITAS ab his forsan desideratur, sed & hæc adiuuari pōt cultoris industria. Nā si, ut paulo ante retuli, benignissima rerū omniū parēs natura quasq; gentes, atq; terras ita muneribus proprijs ditauit, ut tñ ceteras nō in uniuersum similibus dotibus fraudaret. Cur eam dubitemus etiā in uitibus prædictam legem seruasse, ut quicq; earū genus aliquod præcipue fœ

cundum esse uoluerit, tanq̃ bituricum, aut basilicum, non tamen sic amineum sterile reddiderit, ut ex multis millibus eius ne paucissimæ quidē uites fœcundæ, tanq̃ in italicis hominibus albanae illæ sorores reperiri possint. Id aut̃ cum sit uerisimile, tum etiam uerum esse nos docuit experimentū, cum & in ardeatino agro, quem multis tēporibus ipsi ante possedimus, & in carseolano, itemq̃ in albano generis aminei uites huiusmodi notæ habuerimus numero quidē perpauca, uerum ita fertiles, ut in ingo singulae ternas urnas præberent, in pergulis aut̃ singulae denas amphoras peræquarent. Nec incredibilis debet in amineis hæc fœcunditas uideri, nam quæ admodū Terentius Varro, & ante eū, M. Cato possent affirmare, sexcentenas urnas priscis cultoribus singula uineaꝝ ingera fuisse, si fœcunditas amineis defuisset? quas plerūq̃ solas antiqui nouerant, nisi putamus ea, quæ nuper, ac modo planè longinquis regionibus acersita notitiæ nostræ sunt tradita, biturici generis, aut basilici uineta eos coluisse, cum uetustissimas quasq̃ uineas adhuc existimemus amineas. Siquis ergo tales, quales paulo ante possedisse me retuli, amineas pluribus uindemijs exploratas notet, ut ex his malleolos feracissimos eligat posset is pariter generosas uineas, et uberes efficere. Nihil. n. dubium est, quin ipsa natura sobolem matri similem esse uoluerit. Vnde etiam pastor ille in Bucolicis ait.

Sic canibus catulos similes, sic matribus hædos Noram.

Vnde sacrorū certaminum studiosi perniciosissimarum quadrigarū semina diligenti obseruatione custodiunt, & spem futurarum uictoriarū concipiunt propagata sobole generosi armēti, nos quoq̃ pari ratione uelut olympionicarum equarū, ita feracissimarum aminearum seminibus electis largæ uindemiæ spem capiamus, neq̃ est, quod tēporis tarditas quenq̃ deterreat, nā quicquid moræ est, in exploratione surculi absimitur. Cæterū cum fœcunditas uitis comprobata est, celerime insitionibus ad maximū numerū perduatur, eius rei testimoniū tu præcipue Publi Siluine perhibere nobis potes, cū pulchre memineras à me duo ingera uineaꝝ intra tps biennij ex una pcoque uite, quā in æretano tuo possides, insitione facta, cōsumata. Quem nam igitur existimas uitium numerum intra tantundē temporis interfieri posse duorum ingerū malleolis, cū sint ipsa duo ingera unius uitis pgenies? Quare si, ut dixi, laborē, & curā uelinis adhibere, facile prædicta rōne,

tam feraces aminei generis uineas cōstituemus, q̄ biturici, aut ba-
 filia, tantum retulerit, ut in transferendis seminibus similem sta-
 tum cœli, lociq̄, et ipsius uitis habitum obseruemus, qm̄ plerunq̄
 degenerat surculus, si aut situs agri, aut aeris q̄litas repugnēt,
 aut etiam si ex arbore in iugum defertur. Itaq̄ de frigidis in fri-
 gida, de calidis in similia, de uineis in uineas transferemus, ma-
 gis tamen ex frigido statu stirps aminea potest calidum sustine-
 re, q̄ ex calido frigidum, quoniam omne uitis genus tum maxime
 prædictum naturaliter lætatur tepore potius, q̄ frigore. Sed &
 qualitas soli plurimum iuuat, ut ex macro, aut mediocri trāsdu-
 catur in melius, nam quod assuetum est pingui, nullo modo ma-
 ciem terræ patitur, nisi sepius stercores. Atq̄ hæc de cura eligēdi
 malleoli generatim præcepimus, nūc illud proprie specialiter, ut
 non solum ex fecundissima uite, sed etiam è uitis parte feracissi-
 ma semina eligantur.

Ex qua uitis parte semina eligenda sunt.

Cap. X.

FERACISSIMA autem semina sunt, non ut ueteres au-
 ctiores tradiderunt, extrema pars eius, quod caput uitis appellāt,
 idest ultimum, & productissimum flagellum, nam in eo quoque
 falluntur agricolæ. Sed erroris est causa prima species, & nume-
 rus uinarum, qui plerunq̄ conspiciatur in productissimo sarmento,
 quæ res nos decipere non debet. Id enim accidit non palmitis in-
 genita fertilitate, sed loci opportunitate, quia reliquas trūci par-
 tes humor omnis, & alimentum, qd̄ à solo ministratur, transcur-
 rit, dum ad ultimum perueniat, naturali enim spiritu omne ali-
 mentum uirentis, quasi quædam anima per medullam trūci uelu-
 ti per siphonem, quem diabetem uocant mechanici, trahit in sum-
 mum. Quò cum peruenerit, ibi consistit, atq̄ consumitur. Vnde
 etiam materiæ uehementissimæ reperiuntur aut in capite uitis, aut
 in crure uicino radicibus, sed & eæ stirpes, quæ è duro citantur, du-
 plia ex cā probatæ sunt, quod à foetu uacant, quodq̄ ex proximo
 terræ integro, atq̄ illibato succo aluntur, & illæ fertiles, ac firmæ,
 quia è tenero prorepunt, & quicquid (ut supra dixi) ad eas ali-
 menti puenit, indiuiduum est. Mediæ sunt macerrimæ, q̄a trans-
 currit hinc pte aliqua interceptus, illinc à se tractus humor. Non
 debet igitur ultimum flagellū quasi fecundum obseruari, etiā si
 plurimum afferat, siq̄dem loci ubertate in fructum cogitur, sed id

farmentum, quod media uite situm, non importuna quidem parte deficiat, ac numerofo foetu benignitatem suam ostendit. Hic furculus translatus rarius degenerat, cum ex deteriore statu meliorem sortitur, siue enim pastinato deponitur, siue trunco inseritur, largioribus satiatur alimentis, q̄ prius, cum esset in egeno. Itaq; custodiemus, ut à prædictis locis, quos humeros rustici uocant, semina legamus, tamen quæ attulisse fructum antea animaduertimus, nam si foetu uacua sint, quamuis laudabilem partē uitis, nihil censemus ad feracitatem conferre malleolo, quare uitiosissima est eorum agricolarum opinio, qui minimum referre credūt, quot uuas farmentum habuerit, dum ex uite fertili legatur, & non ex duro trunco enatum, quod pampinarium uocant. Hæc autem opinio, quæ orta est ex insatia seminum eligendorum, primum parum fecundas uineas, deinde etiam nimis steriles reddit. Quis enim omnino iam per tam longam seriem annorum agricolæ malleolum legenti præcepit ea, quæ paulo ante retulimus? Immo quis non imprudentissimum quenq; & eum, qui nihil aliud operis facere ualeat, huic negotio delegat? Itaq; ex hac consuetudine ueniunt imprudentissimi ad rem maxime necessariam, deinde etiam infirmissimi, nam & inutilissimus quisq; ut dixi, qui nullum alium laborem ferre queat, huic officio applicatur. Is porro etiam siquam scientiam eligendi malleoli habet, eam propter infirmitatem dissimulat, aut seponit, & ut numerum, quæ uillicus imperauit, explere possit, nihil curiose, nihil religiose administrat, unumq; est ei propositum peragere operis sui pensum, cum tamen & ut sciat, & quod sit exequatur, hoc solum præceptum à magistris accepit, ne pampinariam uirgam deplâtet, cætera omnia ut seminibus contribuat, nos autem primum rōnem, secuti, nunc etiam longi temporis experimentum, nō aliud semē eligimus, nec frugiferum esse duimus, nisi quod in parte genitali fructum attulerit, nam illud quidem, quod loco sterili lætū robustumq; sine foetu præssit, fallacem fecunditatis imaginem præfert, nec ullam generandi uim possidet. Id proculdubio uerum esse ratio nos adinonet, si modo ut in corporibus nostris propria sunt officia cuiusq; membri, sic et frugiferarum stirpium partibus propria munia. Videmus hominibus inspiratam uelut aurigam, rectoricemq; membrorum animam, sensusq; iniectos ad ea discernenda, quæ tactu, naribus, auribusq; & oculis indagantur, pedes

COLVMELLAE.

ad gressum compositos, brachia ad cōplexū, ac ne per omnes vi-
ces ministeriorū uagetur insolenter oratio, nihil aures agere ua-
lent, quod est oculorum, nihil oculi, quod aurium, nec generādi
quidem data est facultas manibus, aut plantis, sed quod homi-
nibus ignotum uoluit esse genitor uniuersi uentre protexit, ut di-
uina præditur ratione rerum æternus opifex, quasi quibusdam se-
cretis corporis in arcano, atq; operto sacra illa spūs elementa, cū
terrenis primordijs misceret, atq; hanc animantis machinæ spēm
effingeret. Hac lege pecudes, ac uirgulta progeniuit, hac uitium
genera figurauit, quibus eadem ipsa mater, ac parens primū ra-
dices uelut fundamenta quædā iecit, ut ijs quasi pedibus insister-
ret. Truncū deinde superposuit uelut quādam staturā corporis,
& habitus. Mox ramis, diffudit quasi brachijs. Tum caules, et pā-
pinos elicit, uelut palmas, eorūq; alios fructu donauit, alios frō-
de sola uestiuit ad protegēdos, tutandosq; partus. Ex his igitur,
ut supra diximus, si non ipsa membra genitalia cōceptu, atq; fœ-
tu grāuida, sed tanq̃ tegmina, & umbracula eorum, quæ fructi-
bus uidua sunt, legerimus, umbræ scilicet non uindemiæ labora-
bimus. Quid ergo est cur quāuis non sit è duro pampinus, sed è
tenero natus, si tamen orbis est, etiam in futurum, quasi sterilis
damnatur à nobis? Modo enim disputatio nostra colligebat uni-
cuiq; corporis parti propriū eē attributum officiū, quod scilicet
ei conuenit, ut malleolo quoq; qui opportuno loco natus est, fœ-
cunditatis uis, adsit, etiā si interim cesset à partu, nec ego abne-
rim in hoc me instituisse argumentari, sed & illud maxime profi-
teor palmitem, quāuis frugifera parte enatum, si fructū nō attu-
lerit, ne uim quidem fœcunditatis habere, nec hoc illi sententiæ re-
pugnat. Nam & homines quosdā non posse generare, quamuis
omniū membroꝝ numero cōstante, manifestum est, ne sit incredi-
bile, si genitali loco uirga nata fructu careat, cariturā quoq; fœ-
tu. Itaq; ut ad consuetudinem agricolarū reuertar, eiusmodi sur-
culos, qui nihil attulerint, spadones appellant, quod nō facerent,
nisi eos suspicarentur inhabiles frugibus, quæ & ipsa appellatio
rationem mihi subiciat non eligendi malleolos quamuis probabi-
li parte uitis enatos, si fructum non tulissent, quanquam & hos
sciam non in totum sterilitate affectos, nā confiteor pampinarios
quoq; cum è duro proreperint, tempore anni sequentis acquire-
re fœcunditatē, & ideo in rescēm submitti, ut p generare possit.

Verum eiusmodi partum comperimus, non tam ipsius reseis, quæ materni esse muneris, nam quia inheret stirpi suæ, quæ est natura ferax, mistus adhuc parentis alimentis, & fecundi partus seminibus, ac uelut altriciis uberibus eductus, paulatim fructum ferre condiscit. At quæ citra naturæ quandam pubertatem, immatura, atque intempestiua planta direpta trunco uel terræ, uel etiâ stirpi rease inseritur, quasi puerilis ætas, ne ad coitum quidē, ne dum ad conceptum habilis uim generandi uel in totum perdit, uel certe minuit. Quare magnopere censeo in eligendi seminibus adhibere curam, uti fructuosa parte uitis palmites legamus eos, qui futuram fecunditatem iam toto fructu promittunt. Nec tamen contenti simus singulis uuis, maximeque probemus eos, qui numerosissimis foetibus conspiciuntur. An non opilionem laudabimus ex ea matre sobolem propagatam, quæ geminos enixa sit, & caprarium summittentem foetus earum pecudum, quæ trigemino partu commendantur? uidelicet quasi semper sit parentum fecunditati proles responsura, & nos sequamur in uitibus hanc ipsam rationem, tanto quidem magis, quod comperit habeamus naturali quadam malignitate desistere interdum, quam uis diligenter probata semina, idque nobis poeta uelut surdis ueritatis indulget dicendo.

Vidi lecta diu, & multo spectata labore

Degenerare tamen, ni uis humana quotannis

Maxima quæque manu legeret, sic omnia fatis

In peius ruere, ac retro sublapsa referri.

quod non tamen de seminibus leguminum, sed in totam agricolationis rationem dictum esse intelligendum est. Si modo longi temporis observatione comperimus, quod certe comperimus, eum malleolum, qui quatuor uuas tulerit, deputatum, & in terram depositum à fecunditate materna sic degenerare, ut interdum singulis, nonnunquam etiâ binis uuis minus afferat. Inquit autem censemus defecturos eos, quæ binos, aut ferè singulos foetus in matre tulerint, cum et feracissimi translatione sepe reformident, itaque huius rationis demonstratorem magis esse me, quam inuentorem libenter profiteor, neque existimet fraudari maiores nostros laude merita, nam id ipsum censuisse eos non dubium est, quæ nullo alio sit scripto proditum, exceptis quæ retulimus metris Virgilij. Et hic tamē ut de seminibus leguminum præcipiatur. Cur. n. aut è duro natam uirgam, aut etiâ ex fecundo

malleolo, quem ipsi probassent, deorsum sagittam repudiabant, si nihil interesse ducebant, ex quo loco semina legerentur? Nunc, quia uim fecunditatis certis quasi membris inesse non dubitabant, idcirco pampinarium, et sagittam uelut inutiles ad deponendum prudentissime damnauerunt. Quod si ita est, nihil dubium est multo magis ab his improbatum esse etiam illum palmitem, qui frugifero loco natus, fructum non attulisset. Nam, si sagittam, id est superiorem partem malleoli, uituperandam censebant, cum esset eadem pars surculi frugiferi, quanto magis uel ex optima uitis parte natum flagellum, si est sterile improbatum ab his, ratio ipsa declarat? Nisi tamen (quod est absurdum) crediderunt id translatus, et abscissum a sua stirpe, destitutumque materno alimento, frugiferum, quod in ipsa matre neque fuisset. Atque haec et forsitan pluribus dicta sunt, quae exigebat ratio ueritatis, minus tamen multis, quae postulabat praeuere detorta, et inueterata opinio rusticorum.

Quae spectandae qualitates in eo solo, quod uineae destinaueris.

Cap. XI.

NUNC ad reliquum ordinem propositae disputationis redeo. Sequitur hanc eligendi malleoli curam, pastinationis officium, si tamen ante de qualitate soli constiterit, nam eam quoque plurimum et bonitati, et largitati frugum conferre nihil dubium est, ac prius quam ipsum perspiciamus, illud antiquissimum censemus, rudem potius eligendum agrum, si sit facultas, quam ubi fuerit seges, aut arbus, nam de uinetis, quae longo situ exoleuerunt, inter omnes auctores constitit, pessima esse si reserere uelimus, quod et inferius solum plurimis radiibus sit impeditum, ac uelut irretitum, et adhuc non amiserit uirus, et cariem illam uetustatis, quibus herbata quasi aliquibus uenenis humus torpeat. Quam ob causam syluestris ager praecipue est eligendus, qui etiam si frutetis, aut arboribus obsessus est, facile extricatur, quod suapte natura quaecumque gignuntur, non penitus nec in profundum radices agunt, sed per summum terrae dispergunt, atque deducunt, quibus ferro recisis, atque extirpatis, parum, quod superest, inferioris soli rastris licet effodere, et in fermentum congerere, atque componere, si tamen rudis terra non sit, proximum est uacuum arboribus aruum, si nec hoc est, rarissimum arbustum, uel oliuetum quod non fuerit maritum,

uineis

uineis destinatur. Vltima est, ut dixi, conditio restibilis uineæ, nā si necessitas facere cogit, prius quicquid est residuæ uitis extirpari debet, deinde totum solum sicco fimo, aut, si id nō sit, alterius generis quā recentissimo stercoreari, atq; ita conuerti, & diligentissime refoffas omnes radices in summum regeri, atq; comburi. Tunc rursus uel stercore uetusto, quia non gignit herbas, uel de uepribus egesta humo pastinatum large cōtegi. At ubi pura noualia arboribus sunt libera, considerandum est, ante q̄ pastinemus, sircularis, nec ne sit terra, idq; facillime explorat p stirpes, quæ sua sponte proueniunt. Neq; enim est ullum tādī uidiuum solum uirgultis, ut non aliquos surculos progeneret tanq̄ pyros syluestres, & prunos, uel rubos certe. Nā hæc quāuis genera spinarum sint, solent tamen fortia, & lata, & grauida fructu consurgere. Igit si non retorrída, & scabra, sed leuia, & nitida, & prolixa, fœcūdaq; uiderimus, eam intelligemus esse terram sircularē. Sed hoc in totū ad illud, quod uineis præcipue est idoneum, proprie considerandum, ut prius retuli, si facilis est humus, & modicæ resoluta, quam diximus pullam uocari, nec quia sola ea, sed quia sit habilis maxime uinetis. Quis enim uel mediocris agricola nesciat etiam durissimū tophum, uel carbunculum, simulatq; sunt cōfracti, et in summo regesti tempestatibus, gelu ue, nec minus æstiuis putrescere caloribus, ac resolui, eaq; pulcherrime radices uitium p æstatem refrigerare, succumq; retinere, quæ res alendo sircularo sunt accommodatissimæ. Simili quoq; de causa probari solutā glareā, calculosumq; agrū, & mobilem lapidē, si tñ hæc pingui glebæ permista sunt, nam eadem ieiuna maxime culpantur. Est aut (ut mea fert opinio) uineis amicus etiam filex, cui superpositum est modicum terrenū, quia frigidus, & tenax humoris p ortum caniculæ non patitur sitire radices. Higinius quidem secutus Tremellium præcipue montium ima, quæ a uerticibus defluētent humum reaperint, uel ēt ualles, quæ fluminum alluuiæ, et inundationibus concreuerint, aptas esse uineis assenerat, me non dissentiente. Cretosa humus utilis habet uiti, nam per se ipsa creta, qua utuntur figuli, quamq; nōnulli argillam uocant, inimicissima est, nec minus ieiunus sabulo, & qcquid, ut ait Iulius Atticus, retorrīdū sircularū facit. Id aut solum uel uliginosum est, uel salsum, uel amarū, et uel siticulosum, et per aridum. Nigrū tñ, et rutilum sabulonem, qui sit humida terre permistus, probauerunt

Colu.

9

COLVMELLAE.

antiqui, nam carbunculosum agrum, nisi stercore iuues, macras vineas efficere dixerunt. Grauis est rubrica, ut idem Atticus ait, & ad comprehendēdū radicibus iniqua. Sed alit eadem uitem, cum tenuit, uerum est in opere difficilior, quod neq; humentem fodere possis, quod sit glutinosissima, nec nimium siccam, quia ultra modum prædura.

Quæ Iulius Græcinus tradiderit de terra uineali. Cap. XII.

SED ne nunc per infinitas terreni species euagemur, nō intempestine cōmemorabimus Iulij Græcini conscriptam uelut formulam, ad quam posita est limitatio terræ uinealis. Idem. n. Græcinus sic ait. Esse aliquam terram calidam, uel frigidam, humidā, uel siccam, raram, uel densam, leuem, aut grauem, pingue, aut macram, sed neq; nimium calidum solum posse tolerare uitem, quia inurat, neq; prægelidum, qm̄ uelut stupentes, & congelatas radices nimio frigore moueri non sinat, neq; humidum, qm̄ cum se promunt uites, modico tepore euocant humorem terræ iusto maiorem, qui putrefacit deposita semina. Rursus nimiam siccitatem destituere plantas dicit naturali alimento, aut in totum necare, aut scabras, & retorridas facere. Per densam humum cœlestes aquas non sorbere, nec facile perflari, facillime perumpi, et præbere rimas, quibus sol ad radices stirpiū penetret, eademq; uelut cōclausa, et coarctata semina comprimere, atq; strangulare. Raram supra modum uelut per infundibulum transmittere imbres, & sole, ac uento penitus siccari, atq; exarescere. Graue terram uix ulla cultura uinabilem, leuem uix ulla sustineri, pinguis simam, & letissimā luxuria, macrā, ac tenuem ieiunio laborare. Opus est inquit inter has tā diuersas inæqualitates magno temperamento, qđ in corporibus quoq; nostris desyderatur, quorū bona ualetudo calidi, & frigidi, humidi, & aridi, densi, et rari, certo, & quasi examinato modo cōtinet. Nec tñ hoc temperamentum in terra, quæ uineis destinet, pari momento libratum esse debere ait, sed in alterā partem propensius, ut calidior terra sit, q̄ frigidior, siccior q̄ humidior, rarior q̄ densior, & si qua sunt his similia, ad quæ contemplationem suam dirigat, qui uineas instituet. quæ cuncta (sicut ego reor) magis prosunt, cum suffragat etiā status cœli, cuius regionem, quam spectare debeant uineæ, uetus est dissensio, Salserna maxime probante solis ortum, mox deinde me-

ridiem, tum occasum, Tremellio Scrofa præcipuam positionē meridianam censente, Virgilio de industria occasum sic repudiāte. Ne'ue tibi ad solem uergant uineta cadentem.

Democrito, & Magone laudantibus cœli plagam septentrionalem, quia existiment ei subiectas feracissimas fieri uineas, quæ tamen bonitate uini superentur. Nobis in uniuersum præcipere optimum uisum est, ut in locis frigidis meridiano uineta subijciantur, tepidis orienti aduertantur, si tamen non infestabuntur austris, eurisq; uelut oræ maritimæ in Bætica. Sin autem regiones prædictis uentis fuerint obnoxie, melius aquiloni, uel fauonio committentur, nam feruētibus provincijs, ut Aegypto, et Numidia, uni septetrioni rectius opponentur, quibus omnibus diligenter exploratis, tum demum pastinationem suscipiemus.


Quomodo terra pastinetur.

Cap. XIII.


EUVS autem ratio cum Italia generis futuris agricolis, tum et provincialibus tradenda est, quoniam in longinquis, & remotis ferè regionibus istud genus uertendi, & subigendi agri minime usurpat, sed aut scrobibus, aut sulcis uineæ plerumque conseruntur. Scrobibus uineta sic ponunt. Quibus uitem mos est scrobibus depondere ferè per tres longitudinis pedes, perque duos in altitudinē cauato solo quantum latitudo ferramenti patitur, malleolos utringue iuxta latera fossarum consternunt, & aduersis scrobium frontibus curuatos erigunt, duabusque gemis supra terram eminere passi reposita humo cetera coequant, quæ faciunt in eadem linea intermissis totidem pedum scânis, dum pagant ordinem. Tum deinde relicto spatio prout cuique mos est uineas colendi, uel aratro, uel bidente, persequentes ordinem insistant. Et si fossore tantum terra uersetur, minimum est quinque pedum interordinium, septem maximum, sin bubus, & aratro, minimum est septem pedum, satis amplum decem. Nonnulli tamen omnem uitem per decem pedes in quincuncem disponunt, ut more noualiū terra transuersis, aduersisque sulcis profundat. Id genus uineta non conducit agricolæ, nisi ubi latissimo solo uitis amplo incremento consurgit. At qui pastinationis impensam reformidant, sed aliqua tamen parte pastinationem imitari student, paribus alternis omissis spatijs, senum pedum latitudinis sulcos dirigunt, fodiuntque, & exaltant inter tres pedes, ac per latera fossarum uitem, uel malleolum disponunt.

Auarius quidam dupondio & dodrante altum sulcum, latum
 pedum quinque faciunt, deinde ter tanto amplius spatium crudū
 relinquunt, atque ita sequentem sulcum infodiunt, quod cum per de
 finitum uinetis locum fecerint in lateribus sulcorum uiuificantes,
 uel decisos quam recentissimos palmites nouellos erigunt, confitis
 compluribus inter ordinaria semina melleolis, quos postea aqua
 conualuerint crudo solo quod emissum est, transuersis scrobibus per
 pagent, atque ordinent uinea paribus internallis, sed ea, quas re
 tulimus, uinearum sationes, pro natura, & benignitate cuiusque
 regionis aut usurpanda, aut repudianda sunt nobis. Nunc pa
 stinandi agri propositum est rationem tradere. Ac primum ex omni
 siue arbuscino, siue syluestri loco, quē uineis destinauerimus, omnis
 frutex, atque arbor erui, & summoneri debet, ne postea fossorē mo
 retur, ne uel iam pastinatum solum iacentibus molibus imprima
 tur, et exportantium ramos, atque truncos ingressu proculceat. Neque
 enim parum refert si spensissimum esse pastinatum, & si fieri pos
 sit, uestigio quoque inuiolatum, ut mota equaliter humus nouelli
 seminis radiabus quacumque in partem prorepserint, molliter ce
 dat, ne incrementa durtia sua reuerberet, sed tenero uelut nu
 tritio sinu recipiat, & cœlestes admittat imbres, eosque alendis se
 minibus dispenset, ac suis omnibus partibus ad educandam pro
 lem nouam conspiret. Campestris locus alte duos pedes, et semis
 sem infodiendus est, acclinis regio tres. Præruptior uero collis uel
 in quatuor pedes uertendus, quoniam cum à superiore parte in inferio
 rem detrabitur humus, uix iustum pastinationi præbet regestrum,
 nisi multo editiorem ripam, quam in plano feceris. Rursus depressis
 uallibus minus alte duobus pedibus deponi uineam non placet.
 Nam præstat non conferere, quam in summa terra suspendere. Nisi ta
 men si scaturigo palustris obuia (sicut in agro rauennate) plus,
 quam sesquipedem prohibeat infodere. Primum autem prædicti ope
 ris exordium est, non ut huius temporis plerique faciunt agricolæ,
 sulcum paulatim exaltare, & ita secundo, uel tertio gradu pue
 nire ad destinatam pastinationis altitudinem. Sed protinus equali
 ter linea posita rectis lateribus perpetuam fossam educere, et post
 tergum motam humum componere, atque in tantum deprimere,
 donec altitudinis mensuram datam æperit, tum per omne spati
 um gradus equaliter mouenda linea est, obtinendumque ut eadē
 latitudo in imo reddatur, quam cœpta est in summo, opus est autem

perito, ac uigilāte exactore, qui ripam erigi inbeat, sulcumq; ual-
 cuari, ac totum spatium crudi soli cum emota iam terra commit-
 ti, sicut præcepi superiore libro, cum arandi rationem traderem,
 monendo necubi scamna omittantur, & quod est durum, sum-
 mis glebis obtegatur, sed huic operi exigendo quasi quandā ma-
 chinam commenti maiores nostri, regulam fabricauerunt, in cui-
 us latere uirgula prominens ad eam altitudinem, qua deprimi
 sulcum oportet, contingit summam ripæ partem. Id genus men-
 suræ ciconiam uocant rustici.



Sed ea quoq; fraudem recipit, quoniam plurimum interest, utrū
 eam pronam, an rectam ponas, nos itaq; huic machine quasdā
 partes adieciimus, quæ contenditūm litem, disputationemq; di-
 rimerent, nam duas regulas eius latitudinis, qua pastinator sul-
 cum facturū est in speciem græcæ literæ. X. decussauimus, atque
 ita mediæ parti, qua regulæ committuntur, antiquam illam ci-
 coniam infiximus, ut tanquam suppositæ basi ad perpendiculū
 normata insisteret, deinde transuersæ quæ est in latere uirgulæ fa-
 brilem libellam supposuimus.



Sic compositum organum, cum in sulcum demissum est, litem dāmini, et conductoris sine iniuria deducit, nā stella, quā diximus græcæ litteræ faciem obtinere, pariter inæ fossæ solum metit, atq; perlibrat, quia siue pronum, seu resupinum est, positione machinæ deprehenditur, quippe prædictæ uirgulæ supposita libella alterutrum ostēdit, nec patit exactorē operis decipi, sic p̄mensum, & perlibratū opus in similitudinē uernaculi semp̄ procedit, tūq; spatij linea p̄mota occupatur, q̄tū effossus sulcus longitudinis, ac latitudinis obtinet, atq; id genus p̄parandi soli probatissimū ē.

Quot modis uitis ponat̄ aut in p̄uincijs, aut in Italia. C. xiii.

SEQVITVR opus uineæ cōserendæ, q̄ uel uere, uel autūno tempestiue deponit̄. Vere melius, si aut pluuius, aut frigidus status cœli est, aut ager pinguis, aut campestris, & uliginosa planities, rursus autūno si sicca, si calida est aeris qualitas, si exilis, atq; aridus campus, si macer, p̄ruptus uel collis, uernæq; positionis dies ferē quadraginta sunt ab idibus februarijs usq; in æquoctiū, rursus autūnalis ab idibus Octob. in Cal. Decembres. Sationis autē duo genera malleoli, uel uiuiradijs, qd̄ utrūq; ab agricolis usurpatur, & in p̄uincijs magis malleoli, neq; enim seminarijs student, nec usum habent faciendæ uiuiradijs, hanc sationem cultores Italiæ pleriq; iure improbauerunt, cum plurimis dotibus p̄stet uiuiradix, nam minus interit, cum & calorem, & frigus, et ceteras tempestates p̄pter firmitatē facilius sustineat, deinde adulescit maturius, ex quo euenit, ut celerius quoq; sit tēpestina edendis fructibus, tum ēt nihil dubium est sæpius translatus, potest tamen malleolus protinus in uicem uiuiradijs conferi soluta & facili terra, ceterum densa, & grauis utiq; uitem desyderat.

Meliolem esse positionē pastinato solo, q̄ nouali. Cap. XV.

SERITVR ergo prius in emundata, innocataq; et æquata pastinatione, macro solo quinis pedibus inter ordines omissis, mediocri, sentis, in pingui uero septenium pedum spatia danda sunt, quo largiora uacent interualla, per quæ frequentes, prolixæq; materiæ diffundantur, hæc in quincuncem uinearum metatio expeditissima rōne conficitur, quippe linea per totidem pedes, quot destinaueris interordiniorum spatijs purpura, uel quolibet alio conspicuo colore insuitur, eaq; sic denotata per repastinatum inten-

ditur, & iuxta purpuram calamus defigit, atq; ita paribus spatij ordines diriguntur, quod deinde cum est factum, fossor insequitur, scrobemq; alternis omissis per ordinem spatij à calamo ad proximum calamū non minus altum q̄ duos pedes & semissem planis locis refodit, acclinibus in dupondium & dodrantem, præcipitibus ēt in tres pedes, in hanc mensuram scrobibus depressis uiradices ita deponuntur, ut à media scrobe singulæ & in diuersum sternant, & cōtrarijs frontibus fossarum ad calamos erigantur. Satoris aut officium est primum græcentissimam, et si fieri possit, eodē momento, quo serere uelit, de seminario transferre plantam diligenter exemptam & integram, deinde eam uelut ueteranam uitam totam ex putare, & ad unam materiā firmissimā redigere, nodosq; & cicatrices allenare, siquæ ēt radices (q̄ maxime cauendum est, ne fiat in eximendo) laborauerint, eas amputare, sic deinde curuatam deponere, ne duarū uitium radices implicentur, id enim uitare facile est per inum solum iuxta diuersa latera fossarum dispositis paucis lapidibus, qui singuli non excedant quinquelibræ pondus. Hi uidentur (ut Mago prodit) & aquas hyemis, & uapores æstatis propulsare radiabus, quem secutus Virgil. tutari semina, & muniri sic præcipit, aut lapidē bibulū, aut squallētes infode cōchas, et paulopost. Iamq; repleti

Qui saxo super, atq; ingentis pondere testæ

Urgerent, hoc effusus munimen ad imbres,

Hoc ubi hiulca siti findit canis æstifer arua.

idemq; pœnus auctor probat uinacea permista stercorei depositis seminibus in scrobē uires mouere, quod illa prouocent, & eliciāt nouas radículas, hoc per hyemem frigentē, & humidā scrobibus inferre calorē tempestiuū, ac p æstatem uirentibus alimentum, et humorem præbere. Si uero solum, cui uitis cōmittitur, uidef exilē, lōgius accersitam pinguem humū scrobibus inferre censef, q̄ an expediat, regionis annonæ, operarumq; ratio nos docebit.

Quæ mensura pastinādi soli abunde sit uineis. Cap. XVI.

EXIGVE humidum pastinatum sationi conuenit, melius tñ uel arido, q̄ lutofo semen cōmittitur, idq; cum supra summā scrobem compluribus internodijs productū est, quod de cacumine superest, duabus gemmis tñ supra terram relictis amputat, et ingesta humo scrobis cōplet. Coæquato deinceps pastinato, malleo

lus ordinarijs uitis interserendus est, eumq; sat erit medio spatio, quod uacat inter uites per iniam lineam depangere. Sic. n. melius & ipse conualescet, & ordinarijs seminibus modice uacuum solum ad culturam praebebit iter. In eadem deinde linea, in qua uiradix obtinebit ordinem suum, praesidium cum quorum ex numero propagare possit in locum demortuae uitis, quinq; malleoli pangendi sunt, per spatium pedis, isq; pes a medio interordinio sumitur, ut ab utraq; parte paribus intervallis distent, tali consuetudine Iulius Atticus abunde putat esse malleolorum sexdecim millia. Nos tamen plus quatuor millibus conserimus, quia negligentia cultorum magna pars deperit, & interita seminum cetera, quae uirent, rarefunt.

Quemadmodum, & quo tempore uitis serenda sit. Cap. XVII.

DE positione furculi non minima disputatio fuit inter auctores. Quidam totum flagellum sicut erat matri detractum crediderunt factioni conuenire, idq; per gemas quas, uel etiam senas partiti complures taleolas terrae mandauerunt. Quod ego minime probor, magisque assentior his auctoribus, qui negauerunt esse idoneam frugibus superiorem partem materiae, solamq; eam, quae est iuncta cum uetere sarmento, probauerunt. Ceterum omnem sagittam repudiauērunt. Sagittam rusticam uocant nouissimam partem furculi, siue quia longius recessit a matre, & quasi emicuit, atq; profuuit, seu quia cacumine attenuata praedicti teli speciem gerit. Hanc ergo prudentissimi agricolae negauerunt conseri debere, nec tamen sententiae suae rationem nobis prodiderunt, uidelicet quod ipsis in re rustica multum callentibus propterea erat, & ante oculos penè exposita. Omnis. n. foecundus papinns intra quintam, aut sextam gemmam fructu exuberat, reliqua parte quousque longissima uel cessat, uel per exiguos ostendit racemos, quia ob causam sterilitas cacuminis iure ab antiquis incusata est. Malleolus autem sic ab eisdem pangebatur, ut nouello sarmento pars aliqua ueteris haereret, sed hanc positionem dānauit usus, nam quicquid ex uetere materia relictum erat, depressum, atq; obrutum celeriter humore putrescebat, proximasq; radices teneras, & uix dum prumpentes uitio suo enecabat, quod cum acciderat superior pars seminis retorrescebat. Mox Iulius Atticus, & Cornelius Celsus etatis nostrae celeberrimi auctores patrem, atq; filium Salsernam secuti, quicquid residui fuit ex uetere palma per ipsam commissuram, qua nascitur materia noua, resecuerunt, atq; ita cum suo capitulo sarmentum depresserunt.

Quæ obseruare debet, qui uitem ponit.

Cap. XVIII.

SED Iulius Atticus prætorto capite, & recuruato, ne pastinū effugiat, prædictum semen demersit. Pastinum uocant agricolæ, ferramentum bifurcum, quo semina pāguntur, unde etiā repastinata dictæ fuere uineæ ueteres, quæ refodiebantur. Hæc enim propria appellatio restibilis uineti erat, nunc antiquitatis imprudēs cōsuetudo quicquid emoti soli uineis præparatur, repastinatum uocat, sed ad ppositum, uitiosa est (ut mea fert opinio) Iulij Attici satio, quæ contortis capitibus malleolū recipit, eiusq; rei uitandæ non una ratio est. Primum, quod nulla stirps ante q̄ deponatur, uexata, & infracta melius provenit, q̄ quæ integra, & inuiolata sine iniuria deposita est, deinde quicquid recurruum, et sursum uersus spectās, demersum est, cum tempestiuum eximitur, in modum hami repugnat obluenti fossori, & uelut uncus infixus solo ante q̄ extrahatur, prærumpitur, nā fragilis est ea parte materia qua torta & recuruata cum deponeretur, cœperat uitium, propter quod perfractam maiorem partem radicem amittit. Sed ut incommoda ista prætereā, certe illud, qd̄ est inimicissimum, dissimulare nequeo, nam paulo ante cum de summa parte sarmenti disputarem, quam sagittam dixeram uocari, colligebā fore intra quintam, uel sextam gemmam, quæ sint proximæ ueteri sarmento fructus mediū. Hanc ergo fecundam partem consumit, qui cōtorquet malleolū, qm̄ et ea pars, quæ duplicatur, tres gemmas, uel quatuor obtinet, & reliqui duo, uel tres fructuarij oculi penitus in terrā deprimantur,mersiq; nō materias, sed radices creant, ita euenit, ut quod in salicto cōserendo uitaueramus, id sequamur in eiusmodi malleolo, quē necesse est facere lōgiore, si uolumus detortū depangere, nec dubiū, qn̄ gēma cacumini proxima, q̄ sunt in fecūda, in eo relinquānt, ex qbus pāpini pullulant uel steriles, uel certe minus feraces, quos rustici uocāt racemarios. Quid qd̄ plurimū interest, ut malleolus, q̄ deponit ea pte, qua est à matre decisus, coalescat, & celeriter cicatricē ducat, nā si id factum nō est, uelut per fistulā, ita per apertam uitis medullam nimius humor trahitur, idēq; truncū cauat, unde formicæ, alijsq; animalibus, quæ putrescunt crura uitium, latebræ præbentur. Hoc aut̄ euenit retortis seminibus. Cum. n. per exemptionem imæ partes eorū perfractæ sunt, apertæ medullæ deponūtur, atq;

irrepētibus aquis, prædictisq; animalibus celeriter senescunt, quare pāgendi optima est ratio recti malleoli, cuius inimum caput, cū consertum est bifurco pastini, angustis faucibus ferramenti facile cōtinetur, ac deprimitur, idq; sarmentum sic depressum citius coalescit. Nam & radices è capite, quarensum est, æque mittit, quæ cum excreuerunt, cicatricem obducunt, & alioquin plaga ipsa deorsum spectans non tantum recipit humorem, quantum illa, q̄ reflexa, & resupina more infundibuli per medullam transmittit quicquid aquarum cœlestium superfluit.

Quàm longus debet esse malleolus.

Cap. XIX.

LONGITUDO, quæ debeat esse malleoli, parum certa est, quoniam siue crebras gemmas habet, breuior faciendus est, seu raras longior, attamen nec maior pede, nec dodrante minor eē debet, hic ne per summa terræ sitiatur æstatibus, ille ne depressus altius cum adoleuerit, exemptionem difficilem præbeat, sed hæc in plano, nam in clinosis, ubi terra decurrit, potest palmipedalis deponi. Vallis & uliginosi campi situ serimus etiam trigemmem, qui est paulo minor dodrante, longior utiq; semipede, usq; non ab eo trigemmis dictus est, quod oīno triū oculorū ē, cum ferè circa plagam, qua matri absassus est, plenus sit gemmarum, sed quod his exceptis, quibus est frequens in ipso capite, tres deinceps articulos, totidemq; gemmas habet, super cætera illud quoq; siue malleolū, siue uiniradicem ferentem præmoneo, ne semina exarescant, immodicum uentum, solemq; uitare, qui uterq; nō incōmode arcæ obiectu uestis, aut cuiuslibet dēsi tegminis. Verūtamen p̄stat eligere sationi silentis uel certe placidi spiritus diem, nam sol umbraculis facile depellit, sed illud etiam, quod non dum tradidimus, ante q̄ disputationi clausulā imponamus, dicendum est, an plurimum generum uites habendæ sint, eaq; separatæ, & distinctæ specialiter, an confusæ, et mistæ caternatim, prius differemus de eo, quod primum proposuimus.

Quot genera uinum ponenda sint.

Cap. XX.

PRUDENTIS igitur agricolæ est uitem, quam præcipue p̄bauerit, nulla interueniente alterius notæ stirpe conferere, numerumq; quā maximum eius semp̄ augere, sed prudentis est, diuersa

quoque genera deponere, neque enim unquam sic mitis, ac temperatus est annus, ut nullo incommodo uexet aliquod uitis genus, siue enim siccus est, id, quod humore proficit, contristatur, seu pluuus, quod siccitatibus gaudet, seu frigidus, et pruinofus, quod non est patiens uredinis, seu feruens, quod uaporem non sustinet. Ac ne nunc mille tempestatum iniurias persequar, semper est aliquid, quod uineas offendat, igitur si unum genus seuerimus, cum id aciderit, quod ei noxium est, tota uindemia priuabimur. Neque enim ullum erit subsidium, cui diuersarum notarum stirpes non fuerint, at si uarij generis uineta fecerimus, aliquid ex ijs inuolutum erit, quod fructum perferat. Nec tamen ea causa nos debet compellere ad multas uitiu uarietates, sed quod iudicauerimus eximium genus, id quanta multitudinis possumus, efficiamus, quod deinde proximum a primo, tum quod est tertiae notae, uel quartae, quodque eatenus uelut lectarum quoddam contenti simus tetarteo. Satis est enim per quatuor, uel summum quinque genera uindemiae fortunam opperiri. De altero, quod mox proposueram, nihil dubito, quin per species digerendae uites, deponendaeque sint in proprios hortos, semitis, ac decumanis distinguenda, nec quod ipse potueram a meis familiaribus obtinere, ut ante me quisquam eorum, qui quammaxime id probauerit, effecerit. Est enim omnium rusticorum operum difficillimum, quia et summam diligentiam legendis desiderat seminibus, et nonnihil discernendis, in quo maxima plerumque felicitate, et prudentia opus est, sed interdum (quod ait diuinus auctor Plato) rei nos pulchritudo trahit, uel ea consuetudini, quae propter infirmitatem commortalis naturae consequi nequeamus. Istud tamen si aetas suppetat, et scientia, facultasque cum uoluntate congruant, non aegerrime perficiemus, quamuis non omnino minimo aetatis spatio perseuerandum sit, ut magnus numerus per aliquot annos discernatur, neque enim omne tempus permittit eius rei iudicium, nam uites, quae propter similitudinem coloris, aut trunci, flagellorum uel dignosci nequeunt, maturo fructu, folijsque declarantur, quam tamen diligentiam nisi per ipsum patrem familias exhiberi posse non affirmauerim, nam credidisse uillico, uel etiam uinitori secordis est, cum quod longe sit facilius, adhuc perpauissimis agricolis contigerit, ut nigri uini stirpe careant, quamuis color uuae possit uel ab imprudentissimo deprehendi.

Vtrum distinctis generibus uitiū horti cōserendi sint. Ca. XXI.

ILL A Tamen una mihi ratio suppetit, celerrime quod ppo-
suimus efficiendi, si sint ueteranae uineae, ut separatorum sirculo-
rum cuiusque generis singulos hortos inferamus, sic paucis annis
multa nos millia malleolorum ex insitis percepturos, atq; ita di-
screta semina per regiones consituros, nihil dubito. Eius porro fa-
ciendae rei nos utilitas multis de causis compellere potest, & ut à
leuioribus ināpiam, primū quod ad oēm rationem uitae non so-
lum agricolationis, sed cuiusq; disciplinae, prudentem delectant
impensius ea, quae proprijs generibus distinguuntur, q̄ quae passim
uelut abiecta, & quodam aceruo confusa sunt. Deinde quod uel
alienissimus rusticae uitae, si in agrū tempestiue consitum ueniat,
summa cū uoluptate naturae benignitatem miretur, cum istinc bi-
turicae fructibus opimae, hinc pares ijs heluolae rudent, illinc arcel-
lae, rursus illinc spioniae basilicae ue conueniant, qbus alma tellus
annua uice (uelut eterno quodam puerperio) laeta, mortalibus
distenta musto demittit ubera inter q̄ fauente libero foetis palmi-
tibus, uel generis albi, uel flauentis, ac rutili, uel purpureo nitor
re micantis, undiq; uersicoloribus pomis grauidus collucet autū-
nus, sed haec quis plurimū delectent, utilitas tñ uināt uolupta-
tem. Nā & paterfamilias libentius ad spectaculū rei suae quāto
est ea luculentior descēdit, & quod de sacro numine poeta dicit.
Et quocunq; deus circum caput egit honestum.

Verum quocunq; domini praesentis oculi frequenter accessere, in
ea parte maiorem in modum fructus exuberat. Sed omitto illud,
quod in descriptis ēt uitibus cōtingere pōt, illa, quae sunt maxime
spectanda, psequar. Diuersae notae stirpes nec pariter deflorescūt,
nec ad maturitatem simul pueniunt. Quam ob cām, qui separa-
ta generibus uineta nō habet, patiaē alterū incommodū necesse
est, ut aut serū fructum cū praecoq; eleuet, quae res mox acorem fa-
ciat, aut si maturitatem serotini expectet, amittat uindemiā pco-
quē, quae plerūq; populationibus uolocrū, pluuijsq; aut uētis la-
cessita dilabit. Si uero iteriectibus carpere cuiusq; generis fructū
aueat, primū necesse est, ut uindemiatorum aleam subeat, neq; n.
singulis totidē antistites dare pōt, q̄ obseruent, quiq; p̄cipiant, ne
acerbae uuae cū maturis demetant, deinde ēt quarum uitiū matu-
ritas cōpetit, cum diuersae notae sint, melioris gustus ab deteriore

corrumpitur, confususq; in unum multarū sapor, uetustatis impatiens sit, atq; ideo necessitas cogit agricolā musti annonam expedire, cum plurimum pretio accedat, si uenditio uel in annum, uel in aestatem certe differri possit. Iam illa generū separatio summam cōmoditatem habet, qđ uinitor suam cuiq; facilius putationē reddet, cū sit cuius notā sit hortus, quē deputet, idq; in uineis nō cōsemineis obseruari difficile est, quia maior pars putationis p id tempus administratur, quo uitis neq; folium notabile gerit, ac multū interest plures ne, an pauciores materias p natura cuiusq; stirpis uinitor summittat, prolixis ne flagellis inatet, an angusta putatione uitē coerceat. Quin ēt quam cœli partem spectat genus quodq; uineti plurimū refert, neq; n. omni calido statu, nec rursus frigido latet, sed est proprietas in sirculis, ut alij meridia no axe cōualecant, qā rigore uitiant, alij septentrionem desyderent, qā cōtristent aestu, quidam temperamento latent orientis. uel occidentis. Has differentias seruat pro situ, et positioe locor, qui genera p hortos separat. Illā quoq; non exiguā sequit utilitatem, quod & laborem uindemiæ minorē patit, & sumptum. Nā & quæ maturescere incipiunt, tēpestine legunt, & quæ nondum maturitatem æperūt uinæ, sine dispendio differunt. Nec pariter uetus, atq; tēpestinus fructus pāpitat uindemiam, cogitq; plures opas q̄to cūq; pretio cōducere. Iā & illud magnæ dotis ē posse gustum cuiusq; generis non mistū, sed uerē merū condere, ac separatim reponere siue est ille bituricus, seu basilicus, seu spionicus, quæ genera cū sic diuisa sunt, qā nihil interuenit diuersæ naturæ, quod repugnet, p potus tñ nobilitant, neq; enim post annos quindecim, uel paulo plures dephendi pōt ignobilitas in gustu, qm̄ ferē omne uinum post id tempus eam qualitatem sortit, ut uetustate acquirat bonitatem. Quare, ut dicere instituimus, utilissima est generū dispositio, quam si tñ obtinere non possis, secunda est ratio, ut diuersæ notæ non alias conseras uites, q̄ quæ saporein consimilem, fructumq; maturitatis eiusdem præbeant. Potest iā (si te cura pomorū tangit) ultimis ordinibus in ea uineti finire, q̄ subiacet septētrionibus, ne cū increuerint, obumbrent, cacumina sicorū, pirorum, ue, et malorū depangere, quæ uel inseras interposito biēniū spatio, uel, si generosa sint, adulta trāsferas. Hæc de positioe uinearū. Supest pars antiquissima, ut præcipiamus ēt cultus earum, de quibus sequēti uolumine pluribus differemus.

LVCII IVNII MODERATI
COLVMELLAE DE RE
RVSTICA LIBER
QVARTVS.

Contra opinionem Attici, & Celsi non esse satis altos scrobes bipedaneos vineaticis seminibus. Cap. I.

VM DE VINEIS conferendis librum à me scriptum Publi Siluine cōpluribus agri colationis studiosis relegisses, quosdam reperi-
tos eē ais, qui cætera quidem nostra præcepta laudassent, unum tamen, atq; alterum reprehendissent, quippe seminibus vineaticis nimum me profundos censuisse fieri scrobes adiecto dodrante super altitudinem bipedaneam, quam Celsus, & Atticus prodiderant, singulasq; uiniradices singulis adminiculis parum prudenter contribuisse, cum permiserint ydem illi auctores minore sumptu gemmis diductis duo continua per ordinem uestire pedamenta, quæ utraq; ambiguan magis habent estimationem, quàm ueram. Etenim (ut quod prius proposui prius resellam) si contenti bipedanea scrobe futuri sumus, quid ita censemus altius pastinare tam humili mensura uitem posituri? Dicit aliquis, ut sit inferior tenera subiaccens terra, quæ non arceat, nec duritie sua repellat nouas irrepentes radículas. Istud quidē contingere potest etiam si ager bipalio moueatur, & deprimantur semina in regesto, quod est fermentatum, plus dupondio semisse, nam semper in plano refusus egesta humus tumidior est, q̄ gradus soli crudi, nec sanè positio seminum sibi altum cubile subster-
ni desyderat. Verum abunde est semipedaneam consitis resolutā uitibus terram subiicere, quæ uelut hospitali, atq; etiam materno sinu recipiat incrementa uirētium. Exemplum eius rei capiamus in arbussto, ubi cum scrobes defodimus, admodum exigui pulueris uiniradia subiicimus. Verior igitur causa est depressius pastinandi, qm̄ ingata uineta melius consurgunt altioribus demissa scrobibus, nam bipedanei uix et̄ provincialibus agricolis approbari possunt, apud quos humili statu uitis plerūq; iuxta terram coerçetur. Cumq; in go destinatur, altiore fundamento stabiliēda

fit, & si modo scandit exælsius, plus alimenti, terræq; desyderat. Et ideo in maritandis arboribus nemo minorem bipedanea scrobem vitibus comparat. Cæterum illa parum profunt agricolarū studio præcipua cōmoda humilis positiōis, quod & celeriter adulescant semina, quæ non fatigant multo soli pressa pōdere, fiātq; uberiora, quæ leuiter suspensa sunt. Nam utraq; ista Iulij Attici ratio conuincit exemplo arbutinæ positionis, quæ scilicet multo ualidiorem, fertilioremq; stirpem reddit, quod non facerent, si nō laborarent altius demersa semina. Quid quod repastinata humus, dum est recens soluta, laxaq; uelut fermento quodam intus mesat? cū deinde non longissimā cepit uetustatē, condensata subsidit, ac uelut innatantes radices uitium summo solo destituit? Hoc aut minus accidit nostræ sacioni, in qua maiore mensura uitis demittit. Nā quod in profundo semina frigore laborare dicuntur, nos quoq; nō diffitemur. Sed nō est dupōdij, & dodrātis altitudo, q̄ istud efficiere possit, cū p̄sertim, qđ paulo ante retulimus, depressior arbutinæ uitis satio tñ effugiat p̄dictum incōmodū.

Non oportere unius uiniradicis duos palos uestire, sed singula semina singulis adminiculis esse contribuenda. Cap. II.

ALTERVM illud, quod minori impensa duos palos unius seminis flagellis censent maritari, falsum est. Sine. n. caput ipsum demortuum est, duo uiduant statumina, & mox uiniradices totidem substituendæ sunt, quæ numero suo rōnem cultoris onerāt. Sine uinit, & ut sepe uenit uel nigri est generis, uel parū fertilis non in uno, sed in pluribus pedamētis fructus claudicat, quāquā etiam generose stirpis uitē sic in duos palos diuisam rerū rusticarū prudentiores existimāt minus fertilem fore, q̄a cratem factura sit. Et ideo ueteres uineas mergis propagare potius, q̄ totas sternere idē ipse Atticus p̄cipit, quod mergi mox facile radicanter, ita ut quæq; uitis suis radicibus tanq̄ proprijs fundamentis innitatur. Hæc aut, quæ toto prostrata corpore cū inferius solum quasi cancellauit, atq; irretiuuit, cratem facit, & pluribus radicibus inter se cōnexis angit, nec aliter q̄ si multis palmitibus grauata desiat. Quare per omnia prætulerim duobus potius seminibus depositis, q̄ unico periclitari, nec id uelut cōpendium consecrari, quod in utranq; partē longē maius asferre possit dispendiū. Sed iā prioris libri disputatio repetit à nobis p̄missum sequentis exordium.

Novam consitionem vineæ, nisi magna, & assidua cultura adi-
uetur celeriter interire.

Cap. III.

IN OMNI genere impensarum (sicut ait Græcinus) pleriq;
nova opera fortius auspiciantur, q̄ tuetur perfecta. Nam quidam,
ut inquit ab incohato domos extruunt, nec perædificatis cultum
adhibent. Nonnulli strenue fabricant navigia, nec consumata p̄
inde instruunt armamentis, ministrisq; quosdam emacitas in ar-
mentis, quosdam exercet in comparadis mancipijs, sed ijsdem tu-
endis nulla cura tangit. Multi etiam beneficia, quæ in amicos cō-
tulerunt, leuitate destruunt. Ac ne ista Siluine miremur, liberos
suos nonnulli nuptijs, uotisq; quæsitos auare nutriunt, nec discipli-
nis, aut ceteris corporis excolunt instrumentis. Quid ijs colligi-
tur, scilicet plerunq; simili genere peccari etiam ab agricolis, qui
pulcherrime positas vineas ante q̄ pubescant, uarijs ex causis de-
stituunt. Alij sumptum annum refundentes, & hunc primū re-
ditum certissimum existimantes impedere nihil, quasi planè fue-
rit necesse vineas facere, quas mox auaritia defererent. Nonnulli
magna potius, q̄ culta uineta possidere pulchrum esse ducunt.
Cognoui iam plurimos, qui persuasum haberent, agrum bonis,
ac malis rationibus colendum. At ego, cum omne genus ruris, ni-
si diligenti cura, sateq; exercetur, fructuosum esse non posse iudi-
cem, tum uel maxime vineas. Res enim est tenera, infirma, iniu-
ria maxime impatiens, quæ plerunq; nimio labore, & ubertate
consumitur, peritq; si modum non adhibeas, fecunditate sua.
Cum tamen aliquatenus se confirmauit, & ueluti iuuenile robur
accepit, negligentiam sustinet. Nouella uero, dum adolescit, nisi
omnia iusta perceperit, ad ultimam redigitur maciem, & sic inta-
bescit, ut nullis deinceps impensis recreari possit. Igitur summa
cura ponenda sunt quasi fundamenta, & ut membra infantium
à primo statim die consitionis formanda, quod nisi fecerimus, oīs
impensa incassum recadat, nec prætermissa cuiusq; rei tempestiui-
tas reuocari queat. Experto mihi crede Siluine bene positam ui-
neam, boniq; generis, & bono cultore nunq̄ non cum magno fœ-
nore gratiam reddidisse, idq; non solum ratione, sed etiam exem-
plo nobis idem Græcinus declarat eo libro, quem de uineis scri-
psit, cum refert ex patre suo sepe se audire solitum Paridiū quen-
dam Veterensem uicinum suum duas filias, & uineis consitum
habuisse

habuisse fundum, cuius partem tertiam nubenti maiori filiae dedisse in dotem, ac nihilo minus aequae magnos fructus ex duabus partibus eiusdem fundi percipere solitum. Minorem deinde filiam nuptui collocasse in dimidia parte reliqui agri, nec sic ex pristino reddito detraxisse. Quo quid conueniat: nisi melius scilicet postea cultam esse tertiam illam fundi partem, quam antea uniuersam.

Prosterni uitem in scrobem, et recuruatam usque ab imo solo rectam etiam calamo applicari oportere.

Cap. IIII.

ET NOS igitur Publi Siluine magno animo uineas ponamus, ac maiore studio colamus, quarum consuetudinis sola illa commodissima ratio est, quam priore tradidimus exordio, ut facta in pastinato scrobe, tota uitis a media fere parte sulci prosternatur, et ad frontem eius ab imo usque recta materies erigatur, calamoque applicetur. Id enim praecipue observandum est, ne similis sit alueo scrobs, sed ut expressis angulis uelut ad perpendicularum frontes eius dirigantur, nam uitis supina, et uelut recumbens in alueo deposita, posteaquam ablaqueatur uulneribus obnoxia est. Nam dum exaltare fortius orbem ablaqueationis fossor studet, obliquam uitem plerumque sauciat, et nonnunquam praecidit. Meminerimus ergo usque ab imo scrobis solo rectum adminiculo sarmentum applicare, et ita in summum perducere. Tum cetera, ut priore libro praecipimus, ac deinde duabus gemmis super extantibus terram coequare. Deinde malleolo inter ordines posito crebris fossionibus pastinatum resolvere, atque in puluerem redigere. Sic namque malleoli, et uiniradices, et reliqua semina, quae deposuerimus, conualescant, si mollis, ac tenera humus nullis herbis irrepentibus humorem stirpibus praebuerit, nec duritia soli nouellas adhuc plantas uelut arcto uinculo compresserit.

A consuetudine omnibus mensibus fodiendum, et curandum, ne herbae nascantur.

Cap. V.

NUMERVS autem uertendi soli bidentibus (ut uerum fatear) definiendus non est, cum quanto crebrior sit, plus prodesse fossionem conueniat. Sed quoniam impensarum ratio modum postulat, satis plerisque uisum est, ex Calendis Martijs usque in Octobres, trigesimo quoque die nouella uineta confodere, omnesque herbas, et praecipue graminum extirpare, quod nisi manu eliguntur, et in summum reiciuntur,

Colu.

r

quantulacumq; parte adobruta sunt, reuiuiscunt, et uitium semina ita perurunt, ut scabra, atq; retorrída efficiant.

De pampinatione malleolis & uiniradiabus facienda. Ca. VI.

EA porro siue malleolo, seu uiniradiæ deposuimus, optimū est ab initio sic formare, ut frequenti pampinatione supernacua detrahant, nec patiamur plusquam in unam materiam uires, & omne alimentum conferre, primo tamen bini pampini summittuntur, ut sit alter subsidio, si alter forte deciderit. Cū deinde paulum induruerit uirga, tum deteriores singulae detrahuntur. Ac ne quæ relictae sunt, procellis uentorū decutiantur, molli, & laxo uinculo adsurgentes subsequi conueniet, dum clauiculis suis quasi quibusdam manibus adminicula cōprehendant. Hoc si operari per nūria facere prohibet in malleolo, quem & ipsum pampinare cēsemus, at certe in ordinarijs uitibus utiq; obtinendū est, ne pluribus flagellis emacientur, nisi si propaginibus futuris pspiciamus. Sed ut singulis materijs seruiant, quarū incrementa eligere debemus, applicato longiore adminiculo, p quod prorepāt in tm̄, ut sequentis anni ingum exuperent, & in fructū curuari possint. Ad quam mensurā cum increuerint cacumina infringenda sunt, ut potius crassitudine cōualescant, q̄ supernacua longitudine attenuentur. Idem tm̄ sarmentum, quod in materiam submittimus, ab imo usq; in tres pedes, & semissem pampinabimus, & omnes eius intra id spatium nepotes enatos sepius decerpemus. Quicquid deinde supra germinauerit, intactū relinqui oportebit, magis enim conueniet proximo autūno falce deputari superiorem partem, q̄ aestiuo tpe pampinari, qm̄ ex eo loco, unde nepotē ademeris, confestim alterum fundit, quo enato, nullus relinquitur oculus in ipsa materia, qui sequenti anno cum fructū germinet.

Tempestiuam esse pampinationem, qua digito palmites deiciuntur. Cap. VII.

OMNIS autem pampinatiōis ea est tempestiuitas, dñ adeo teneri palmites sunt, ut leui tactu digiti decutiantur. Nam si uehementius induruerint, aut maiore nisu conuellendi sunt, aut falce deputandi, quod utrunq; uitandum est, alterum quia lacerat matrem, si reuellere coneris, alterum quia fauiat, quod in uiridi, & adhuc stirpe immatura fieri noxiū est. Neq; n. eatenus plaga

consistit, qua uestigium fecit aëies, sed æstinis caloribus falæ uulnus penitus impressum, latius inarescit ita, ut non minimā partem de ipso matris corpore enecet. Atq; ideo si iam caulibus duris falcē adhibere necesse est, ij paululum ab ipsa matre recidēdi, et uelut resæces relinquēdi sunt, qui caloris exapiant iniuriam, eate nus qua nascuntur à latere palmitis. Ultra. n. nō serpit uaporis uolentia. In malleolo similis rō est pampinandi, & in longitudinem eliciendi materiā, si eo uelimus adminiculo uti, quod ego sæpe feci, sed si ppositū est utiq; recidere, ut bino potius utamur, cū ad unum pāpinū iā redegeris, et ipse exæsserit pedalem longitudinem decacuminare cōueniet, ut in cernicem potius cōfirmetur, & sit robustior. Atq; hæc positorū seminum prima cultura est.

Per autumnum ablaqueandā esse uineam. Cap. VIII.

SEQVENS deinde tempus (ut prodidit Celsus, & Atticus, quos in re rustica maxime nostra ætas probauit) ampliōrē curam deposcit, nam post Idus Octobris priusquam frigora inuadant, uitis ablaqueanda est, quod opus adopertas ostendit æstinas radículas, easq; prudens agricola ferro decidit. Nā si passus est conualescere inferiores deficiunt, atq; euenit, ut uinea summa parte terreni radices agat, q̄ & frigore infestent, & caloribus maiōrē in modum æstuent, ac uehementer sitire matrem in ortu caniculæ cogant. Quare qcqd intra sesquipedē natum est, cū ablaquaueris recidendū est. Sed huius non eadē rō est, amputandi, quæ traditur in superiori parte uitis. Nā minime adleuanda plaga est, minimeq; applicandū ferramentū ipsi matri, qm̄ si iuxta truncū radicē præideris, aut ex cicatrice plures enascentur, aut hyemalis, quæ ex pluuijs consistit in lacusculis ablaqueationis aqua brumæ cōgelationibus noua uulnera puret, & ad medullā penetrabit, quod ne fiat, recidere ab ipso codice instar unius digiti spatium conueniet, atq; ita radículas præidere, quæ sic ademptæ nō amplius pullulant, & à cætera noxa truncū defendūt. Hoc ope cōsumato, si est hyemis in ea regione placida, patens uitis relinquenda est, sin uiolētior, id facere nos prohibet, ante Idus Decēbris p̄dicti lacusculi æquandi sunt. Si uero ēt prægelida frigore regionis eius suspecta erūt, aliqd fimi, uel, si est cōmodius, colūbini stercore, aut in hunc usum p̄parate ueteris urinae senos sestarios, ante q̄ uitē adobruas, radicibus supfundes. Sed ablaqueare oibus au

tumnis oportebit primo quinquēnio, dum uitis conualescat, ubi uero truncus adoleuerit, ferè triennio intermittendus est eius operis labor. Nam & minus ferro crura uitium leduntur, nec tã celeriter radiculæ in ueterato iam codice enascuntur.

Quemadmodum ablaqueata uinea putetur. Cap. IX.

A B L A queationem deinde sequitur talis putatio, ut ex præcepto ueterum auctorum uitis ad unam uirgulam renocetur, eaq; recidatur duabus gemmis iuxta terram relictis. Quæ putatio nõ debet secundum articulum fieri, ne reformidet oculus, sed medio ferè internodio ea plaga obliqua salcæ fit, ne si trãuersa fuerit cicatrix, cœlestem superincidentem aquã contineat. Sed nec ad eã partem, qua est gemma, uerum ad posteriorem declinatur, ut in terram potius deuexa, q̃ in germen delachrymet. Nãq; defluens humor cecat oculum, nec patitur frondescere.

Quod sit optimum tempus putandi. Cap. X.

P U T A N D I autem duo sunt tempora, melius autem (ut ait Mago) uernũ, ante q̃ furculus progemmet, quoniã humoris plenus facilem plagam, & leuem, & æqualem accipit, nec falsi repugnat. Hunc aut̃ secuti sunt Celsus, & Atticus. Nobis neq; angusta putatione coercenda semina uidetur, nisi si admodum inuvalida sunt, neq; utique uerno recidenda. Sed primo quidem anno, quo sunt posita, frequentibus fossionibus, omnibus mensibus dum frondent, ac pampinationibus adiuuãda sunt, ut robur accipiant. Nec plus q̃ uni materiæ seruiant, quam ut educauerint autumno, uel uere, si magis competit, abradenda, & nepotibus, quos pampinator in superiore parte omiserat, liberãda censemus, atq; ita in ingum imponenda. Ea enim leuis, & recta sine cicatrice uinea est, quæ se primi anni flagello supra ingum extulit.

Quod tamen apud paucos agricolas, & raro contingit. Ideoq; prædicti auctores primitias uitis refecare censuerunt. Sed nec utiq; uerno omnibus regionibus melior putatio est, nam ubi cœlũ frigidum est, ea sine dubio eligenda est. Vbi uero aprica loca sunt, mollesq; hyemes, optima, & maxime naturalis est autũnalis, quo tempore diuina quadam lege, & æterna fructum cum frõde stirpes deponunt.

Quomodo malleolus refecandus sit.

Cap. XI.

HOC facere siue uiuiradicem, siue malleolum conserueris, cen-
 seo, nam illam ueterem opinionem damnauit usus, non esse ferro
 tangendos anniculos malleolos, qđ adiem reformident, quod fru-
 stra Virgilius, & Salserna, Stolonēsq; & Catones timuerunt, q
 non solum in eo errabant, quod primi anni capillamenta semi-
 num intacta patiebantur, sed & post biennium cum uiuiradix
 recidenda erat, omnem superficiem amputabant solo tenus iuxta
 ipsum articulum, ut è duro pullularet, nos autem magister artiũ
 docuit usus, primi anni malleolorum formare incrementa, nec pa-
 ti uitem supernacuis frōdibus luxuriantem syluescere, nec rursus
 in tantum coercere, quantum antiqui præcipiebant, ut totam su-
 perficiem amputemus, nam id quidem maxime contrariũ est. Pri-
 mum quod cum ad terram deaderis, semina (uelut intolerabili
 affecta uulnere) pleraq; intereunt, & nonnulla et, quæ pertinaci-
 ter uixerunt, minus fecundas materias afferunt, siquidem è duro
 quæ pullulant, omniũ confessione, pampinaria sepiissime fructu
 carent. Media igitur ratio sequenda est, ut neq; solo tenus malleo-
 lum recidamus, nec rursus in longiorem materiã prouocemus, sed
 annotato superioris anni pollice supra ipsam cōmissuram ueteris
 sarmenti unā, uel duas gemmas relinquemus, ex qbus germinet.

Quemadmodum pedanda sit uinea, & de canterio. Cap. XII.

PVTATIONEM sequitur iam pedandæ uineæ cura, uere
 hic annus nō dum uehementem palum, aut ridicam desyderat.
 Notatum est enim à me plerunq; teneram uineam melius admi-
 niculo modico, q̃ uehementi palo adquiescere. Itaq; aut ueteres
 (ne nouæ radicem agant) arundines binas singulis uitibus ap-
 plicabimus, aut si regionis conditio pmittit, uetera deponemus
 hastilia, quibus adnectantur singulæ transuersæ perticæ in imam
 partem ordinis, quod genus ingi canterium uocant rustici, plu-
 rimum id refert esse quod paulum infra curuationem uitis prore-
 pens pampinus statim apprehendat, & in transuersa potius se
 fundat, q̃ in edita, uentosq; facilius sustineat subnixus canterio,
 idq; iugum intra quartum pedem conueniet allenari, dum se ui-
 nea corroboret in pedationem.

DEINDE sequitur alligator, cuius officium est, ut rectam uitem producat in iugum, quæ siue iuxta palum est posita, ut quibusdam placuit auctoribus, obseruare debet, q̄ adnectit, ne in alliganda materia flexum pali (si forte curuus est) sequendū putet, nam ea res uncam uitæ facit, siue (ut Attico, & nonnullis alijs agricolis uisum est) inter uitem & palum spatium relinquet, qđ nec mihi displicet. Recta arundo adiungenda stirpi est, & ita p̄ crebra retinacula in iugum perducenda, uinculi genus quale sit, quo religantur semina, plurimum refert, nā dum nouella uinea est, q̄ mollissimo nectēda est, quia si uiminibus salicis, aut ulmi ligaueris, increſcens uitis seipsam præcidit, optima est ergo genista, uel paludibus defectus iuncus, aut ulua, nō pessime tñ in umbra siccata faciunt in hunc usum arundinum quoq; folia.

Malleolis iugum imponendum, & quā alte canterius alligandus sit.

Cap. XIII.

SED & malleolorū similis cura agenda est, ut ad unā, aut duas gemmas deputatis autumno, uel uere prius q̄ germinent, iungatur. Is, ut dixi, canterius propius à terra, q̄ uitibus ordinarijs submittendus est. Neq; n. editior esse debet pedali altitudine, ut sit quo teneri adhuc pampini se capreolis illigent suis, ne uentis explantentur. Insequit̄ deinde fossor, qui crebris bidentibus æqualiter, & minutim soli terga conuertat, hanc planam fossurā maxime nos probamus, nam illa, quam in Hispania hybernā appellant, cum terra uitibus detrahīt, & in media spatia interordiniorum confertur, superna uia nobis uidetur, quia iam præcessit autumnalis ablaqueatio, quæ & nudauit summas, et ad inferiores peruenit radículas, & hybernos transmisit imbres. Numerus autem fossionis, aut idem debet esse, qui primi anni, aut una minus, nam utiq; frequenter solum exercendum est, dum id incremento suo uites inumbrent, nec patiātur herbam subcrescere. Pampinationis eadem debet esse ratio huius anni, atque prioris, adhuc enim compeſcenda, quasi pueritia seminum ē, nec plus q̄ in unā flagellum est submittenda, tanto qđem magis, quod tenera eius ætas non sustinet, & fœtu, & materijs onerari.

Quemadmodum nouella uinea frequentanda est, & propagandæ faciendæ sint. Cap. XV.

SED cum annicula, mensumq; sex ad uindemiam perducta ē, sublato fructu protinus frequentanda est, & prædiali malleoli propagandi sunt, qui in hunc usum fuerant depositi, uel si ne hi quidem sunt, ex ordinaria uite in alterum palum mergus est attrahendus, nā plurimum interest, adhuc noua consitione, pedamentum omne uestiri, nec mox uineā, tum subseri, cum fructus capiendus est. Mergi genus est, ubi supra terram iuxta suum adminiculum uitis curuatur, atq; ex alto scrobe summersa perducit ad uacantem palum. Tum ex arcu uehementer citat materiā, quæ protinus applicata suo pedamento ad ingum euocat. Sequentem deinde anno insectat superior pars curuaturæ, usq; ad medullam, ne totas uires matris propagatum flagellū in se trahat, & ut paulatim condiscat suis radiabus ali. Bina deinde prædial proxime palmam, quæ ex arcu summissa est, & id, quod à matre absissum recens erit, confestim alte arcusoditur, et scrobiculo facto ad imū solum prædial, adobruiturq; ut & radices deorsum agat, nec ex propinquo negligenter in summa terra resectū progerminet. Tēpus aut non aliud magis idoneum est hunc mergū amputandi, q̄ ab idibus Octob. in idus Nouembr. ut hybernis mensibus suas radices confirmet, nam si uere id fecerimus, quo gemmare palmitēs incipiunt, matris alimentis subito destitutus languescit.

Quo tempore uiuiradix transferenda sit. Cap. XVI.

EADEM ratio est in transferēdo malleolo, nam in secundo autumno, si cœli, & loci qualitas patitur, commodissime post idus Octobris exēptus cōserit, sin autem aliqua terræ, uel aeris repugnat iniuria, tēpestiuitas eius in proximum uer differt, neq; diutius in uineis relinquendus est, ne soli uires absumat, et ordinaria semina infestet, quæ q̄to celerius liberata sunt consortio uiuiradicum, tanto facilius cōualescunt, at in seminario licet trimā, atq; et quadrimam uitam resectam, uel anguste putatam custodire, qm̄ non cōsulit uindemiæ, cum mensem trigessimū excesserit posita uinea. i. tertio autūno uehementioribus statuminibus statim impedāda est, idq; nō ut libet, aut fortuito faciendū, nā siue ppetruncū defigat palus, pedali tamen spatio recedendū est, ne aut

premat, aut radicem uulneret, & ut fossor ab omni parte semina circūfodiat, isq; palus sic ponendus est, ut frigore, & aquilonum exapiat uolentiam, uitemq; ptegat, siue medio interordinio pangetur, uel defodiendus est, uel prius paxillo perforato solo, altius adigendus, quo facilius & ingum, & fructū sustineat. Nā q̄to propius truncus cum radice statuitur, etiā leuiter defixa stabilior est, qm̄ contingēs uitem mutua uice sustinetur, & sustinet. Statim minibus deinde firmiter inga sunt alliganda, eaq; uel saligneis perticis, uel cōpluribus quasi fasciculis arundinum cōnectuntur, ut rigorem habeant, nec pandantur onere fructuū, nā binæ iam materiae singulis seminibus summittendæ erunt, nisi si tñ gracilitas uitis alicuius angustio rem putationē desiderabit, cuius unus palmes, atq; idem paucorum oculorum erit relinquendus.

Quomodo ingum faciendum sit.

Cap. XVII.

PERTICAE ingum firmiter faciunt, minusq; operosum, arundines pluribus operis ingantur, qm̄ & pluribus locis necit̄tur, eaq; inter se conuersis cacuminibus uinciendæ sunt, ut equalis crassitudo totius ingi sit, nam si cacumina in unum cōpetunt, imbecillitas eius partis grauata pondere iam maturum fructum prosternt, et canibus, ferisq; reddit obnoxium. At cum ingum in fascem pluribus arundinibus alterna cacuminum uice ordinatū est, ferē quinquennij præbet usum. Neq; n. est alia ratio putationis, aut ceteræ culturæ, q̄ quæ primi biennij, nam & autumnalis ablaqueatio sedulo faciēda, nec minus uacantibus palis propagines applicandæ. Hoc enim opus nunquam intermittendum est, quin omnibus instauretur annis, neq; enim ea, quæ serūt̄ur à nobis, immortalia esse possunt, attamen æternitati eorum sic consulimus, ut demortuis seminibus alia substituamus, nec ad occidionem uniuersum genus perduci patiamur cōplurium annorū negligentia, quinetiam crebræ fossiones dandæ, quamuis possit una detrahi culturæ prioris anni, pampinationes quoq; sepe adhibendæ, neq; enim satis est semel, aut iterum tota æstate uiti detrabere frondem supernuacua. Præcipue autem decutienda sunt omnia, quæ infra trunci caput egerminauerint, item si oculi singuli sub ingo binos pampinos emiserint, quis largos fructus ostendant, detrahendi sunt eis singuli palmites, quo letior, quæ super est materia consurgat, & reliquum melius educet fructum. Post

quadragesimum et alterum mensem perfecta vindemia, sic instituenda est putatio, ut submissis pluribus flagellis vitis in stellam diuidatur, sed putatoris officium est pedali fere spatio circa ingū vitem cōpescere, ut è capite quicquid tenerum est, per brachia emissum pronocetur, & per inguin inflexum præcipitetur ad eā mensuram, quæ terram nō possit cōtingere, sed modus p viribus trunci seruandus est, ne plures palmites submittantur, q̄ quibus vitis sufficere queat. Ferè autem prædicta etas læto solo, truncoq; tres materias, raro quatuor desiderat, quæ per totidem partes ab alligatore diuidi debent. Nihil. n. refert inguin in stellam decussari, atq; diduci, nisi & palmites adiungantur, quam tamen formam non omnes agricolæ probauerant, nam multi simplici ordine fuisse contenti, verum stabilior est vinea, & oneri sarmentorum, & fructui ferendo, quæ ex utraq; parte ingo deuincta pari libramēto velut anchoris quibusdam distinetur, tum etiam per plura brachia materias diffundit, & facilius eas explicat undiq; subnixa, quam quæ in simplici cæterio frequentibus palmitibus stypatur. Potest tamen, si uel parum late disposita vinea, uel parū fructuose, cœlumq; non turbidum, nec procellosum habeat, uno ingo contenta esse, nam ubi magna uis, & incursus est pluuiarum, pællarūq; ubi frequentibus aquis vitis labefactatur, ubi præcipitibus cliuis uelut pēdens plurima præsidia desiderat, ibi quasi quadrato circūfirmanda est agmine, calidis uero, & siccioribus locis in omnem partem inguin porrigendum est, ut prorepentes undiq; pampini iungantur & condensati cameræ more, terram sitiētē obumbrent. Contra pluuijs frigidis, & pruinosis regionibus simplices ordines instituēdi, nam & sic facilius insolatur humus, & fructus percoquitur, perflatumq; salubriorem habet, fossiores quoq; liberi, & aptius iactant bidentes, meliusq; perspicitur à custodibus fructus, & commodius legitur à vindemiatore.

Quomodo in hortulos vineæ diuidēdæ sint. Cap. XVIII.

SED Quando uineta placuerit ordinare, centenæ stirpes per singulos hortos semitis distinguantur, uel (ut quibusdā placet) in semiuigera omnis modus dirimatur, quæ distinctio præter illud cōmodum, quod plus solis, & uenti uitis præbet, tum ē oculos, & uestigia dñi (res agro saluberrima) facilius admittit, certamq;

COLVMELLAE.

estimationem in exigendis operibus præbet, neq; enim falli possumus per paria intervalla ingeribus diuisis. Quinetiã ipsa horum descriptorum descriptio quanto est minoribus modulis conasa fatigationem ueluti minuit, & stimulat eos, qui opa moliuntur & ad festinandum inuitat, nam ferè uastitas instantis laboris animos debilitat. Nonnihil etiam prodest uires, & prouentum cuiusque partis uinearum nosse, ut æstimemus, quæ magis, aut minus collenda sit. Vindemiatoribus quoq; hæc semitæ, & iugum, pedamentaq; sarrientibus opportunam laxitatem præbent, perquã uel fructus, uel statumina portentur.

De positione iugi, & quatenus à terra leuandum. Cap. XIX.

DE POSITIONE iugi quatenus à terra leuandum sit, hoc dixisse abunde est, humillimam esse quatuor pedum, celsissimam septem, quæ tamen in nouellis seminibus uitanda est, neq; enim hæc prima constitutio uinearum eẽ debet, sed per annorum longam seriẽ ad hanc altitudinem uitis perducenda est. Cæterum quãto humidius est solum, & cælum, placidioresq; uenti, tanto est altius attollendum iugum, nã lætitia uitium patitur se celsius euagari, fructusq; summotus à terra minus putrescit, & hoc uno modo pflatur uentis, qui nebulam, & rorem pestiferum celeriter adficant, multumq; ad deflorescendum, & ad bonitatem uini conferunt, rursus exilis terra, & acclinis, torrensq; æstu, uel quæ uehementibus procellis obnoxia est, humilius iugum posat, at si cuncta cõpetunt uoto, iusta est altitudo uineæ pedum quinque, nec tamẽ dubium, quin uites tanto melioris saporis præbeant mustum, quanto in editiora inga consurgunt.

De cura, & modo alligandarum uitium. Cap. XX.

PEDATAM uineam, iugatamq; sequitur alligatoris cura, cui antiquissimũ eẽ debet, ut supra dixi, rectam conseruare stirpem, nec flexum ridicæ psequi, ne prauitas statuminum ad similitudinem sui uitem configuret, id non solum ad speciem plurimũ refert, sed ad ubertatẽ, et ad firmitatẽ, perpetuitatemq; nã rectus truncus similẽ sui medullã gerit, p quã uelut quodã itinere sine flexu, atq; impedimento facilius terræ matris alimẽta meant, et ad summum pueniunt. At quæ curuæ sunt, & distortæ, nõ equaliter alligant, inhibentibus nodis, et ipso flexu incursum terreni humo-

ris ueluti salebris, retardante, quare cum ad summum palū recta uitis extenta est, capistro constringit, ne foetu grauata subsidat, curuetq;. Tū ex eo loco quod proximū ingo ligatum est, brachia disponuntur in diuersas partes, palmæq; superpositæ deorsum uersus curuant. A uinculo itaq; id quod ingo depēdet, fructu impletur, rursusq; curuatura iuxta uinculum materiam exprimit. Quādam eam partem, quā nos præcipitamus, supra ingū porrigūt, & crebris uiminibus innexis continent, quos ego minime probādos puto, nam dependētibus palmitibus, neq; pluuiæ, neq; pruinæ, grandines uel tū nocent, q̄tum religatis, & quasi tempestatibus oppositis, idem tū palmites prius q̄ fructus mitescant, uariantibus adhuc, & acerbis uinis religari debent, quo minus roribus queant putrescere, aut uentis, ferisq; deuastent, iuxta decumanū, atq; semitas palmites intrinsecus flectendi sunt, ne p̄tereū tium incursu ledant, et hac qdē rōne tēpestina uitis ad ingū p̄ducit, nā q̄ uel infirma, uel breuis est, ad duas gēmas reidēda ē, quo uehementiorē fundat materiā, q̄ protinus emicet in ingum.

Novella uinea quomodo putanda sit.

Cap. XXI.

QVINQVENNIS uineæ nō alia est putatio, q̄ ut figuratur, quemadmodum supra instituiimus ne ue supra getur. Sed ut caput trunci pedali ferē spatio sit inferius ingo, quaternis que brachijs, quæ duramenta qdā uocant, diuidat in totidem partes. Hæc brachia sat erit interim singulis palmitibus in fructum summitti, donec uineæ insti sint roboris. Cum aliquot deinde annis, quasi iuuenilem ætatem ceperint, quot palmites relinq; debeant, incertum est, nā loci lætitia plures, exilitas pauciores desyderat, siquidem luxuriosa uitis nisi fructu cōpesat, male deflorescit, & in materiā, frondemq; effundit, infirma rursus, cū onerata est, affligitur. Itaq; pingui terra singulis brachijs licebit bina iungere flagella, nec tū numerosius onerare, q̄ ut una uitis octo seruiat palmitibus, nisi si admodum nimia ubertas plures postulabit. Iam enim per gulæ magis, q̄ uineæ figuram obtinet, q̄ supra hunc modum materijs distēditur, nec debemus committere, ut brachia pleniora trunco sint, uerū assidue, cum è lateribus eorum flagella licuerit summittere, amputanda erunt superiora duramenta, ne ingum excedant, sed nouellis palmis semper uitis renouetur, quæ si satis excreuerint, ingo superponantur, sin aliqua earum

uel perfracta, uel parum procera fuerit, locumq; idoneum obtinebit, unde uitis anno sequenti reuocari debeat, in pollicem tōdeat, quem quidā custodem, alij reseam, nōnulli praesidiariū appellāt, idest sarmentum gemmarum duarum, uel trium, ex quo cū p̄cēsere fructiferae materiae, quicquid est supra uetusti brachij, amputatur, & ita ex nouello palmite uitis pullescit, atque haec rō bene institutarum uinearum in perpetuum custodienda erit.

Quemadmodum ueteranea uinea restituantur. Cap. XXII.

SI VERO aliter formatas acceperimus uineas, & multorū annorū negligentia superuenerit iugum, consyderandum erit, cuius longitudinis sint duramina, quae excedunt praedictam mensuram, nā si duorū pedum, aut paulo amplius fuerint, poterit adhuc uniuersa uinea sub iugum mitti, si autem plus trunco est applicatus, is à uite summonet, et in medio spatio duorū duraminū ad lineam pangit, transversa deinde uitis ad statumen perducitur, atq; ita iugo subiicitur. At si duramenta eius longius excesse rint, ut in quartū, aut ē in quintū statumen prorepserint, maiore sumptu restituent. Mergis nāq; (qui nobis maxime placent) p̄pagata celerime provenit. Hoc tñ si uetus, & exesa est sup̄ficies trunci, at si robusta, et integra, minore operā desyderat, quippe hyberno tpe ablaqueata fimo satiat, angusteq; deputat, & inter quartum, ac tertium pedē à terra uiridissima parte corticis acuto mucrone ferramenti uulnerat, frequentibus deinde fossuris terra permisceat, ut incitari uitis possit, et ab ea maxime parte, quae uulnerata est, pampinum fundere. Plerunq; aut germen de cicatrice procedit, quod siue longius prosiluerit, in flagellū summittit, siue breuius, in pollicem, siue admodum exiguum, in furunculū. Is ex quolibet uel minimo capillamento fieri pōt, nā ubi unius, aut alterius folij pampinus prorepserit è duro, dūmodo ad maturitatem pueniat, sequente uere si non abnodatus, neq; abrasus est, uehementem fundit materiā, quae cū conualuit, et quasi brachiū fecit, licet tñc supernagatam partem duramenti reidere, & ita reliquā iugo subiicere. Multi sequentes cōpendium temporis, tales uineas supra quartum pedem detrūcant, nihil reformidantes eiusmodi resectionem, qm̄ ferē plurimarum stirpium natura sic se commodat, ut iuxta cicatricem nouellis frondibus repullulescat. Sed haec qdem ratio minime nobis placet, siqdem uastior plaga

nisi habeat superpositam ualentem materiam, qua possit inole-
scere, solis halitu torretur, mox deinde roribus putrescat, & imbr-
bus. Attamen cum est utiq; uinea recidenda, prius ablaqueare,
deinde paulum infra terram conuenit amputare, ut supiecta hu-
mus uini solis arceat, & è radiabus nouellos prorumpentes cau-
les transmittat, qui possint uel sua maritare statumina, uel si qua
sunt uidua in propinquo propaginibus uestire. Hæc autē ita fie-
ri debebunt, si uinea altius posita, nec in summo labantes radices
habebunt, & si boni generis erunt, nãq; aliter incassum depēdit
opera, qm̄ de genere etiam renouata pristinum seruabunt inge-
nium, atq; summa parte terræ uix adhærebunt, & deficient ante
q̄ conualescant. Altera ergo uinea fructuosis potius surculis inse-
renda erit, altera funditus extirpanda & referenda, si modo soli
bonitas suadebit, cuius cum uitio consenuit, nullo modo restituen-
dam censemus. Loca porrò uitia sunt, quæ ferè ad internitionē ui-
neta perducunt macies, & sterilitas, terra salsa, uel amara, uligo,
præcept & prærupta positio, nimium opaca, & soli auersa, ual-
les arenosæ, arenosus etiã tofus, & plus iusto ieiunus sabulo, nec
minus terreno carens, ac nuda glarea, & si qua est proprietas si-
milis, quæ uitam non alit. Cæterum si uacat ijs, & horum simili-
bus incommodis, potest ea ratione fieri restibilis uinea, quã prio-
re libro præcepimus. Illa rursus mali generis uineta, quæ quãuis
robusta sint, propter sterilitatem fructu carent, ut diximus, emē-
dantur insitione facta, de qua suo loco differemus, cum ad eã di-
sputationem peruenerimus.

Quemadmodum eadem putentur.

Cap. XXIII.

N V N C, quoniam parum uidemur de putatione uinearū lo-
cuti, maxime necessariam partem propositi operis diligentius per-
sequemur. Placet ergo si mitis, ac temperata pñittit in ea regio-
ne, quam colimus, cœli clementia, facta uindemia secundū Idus
Octobris auspiciari putationem, cum tñ æquinoctiales pluuiæ præ-
cesserint, & sarmenta iustam maturitatē æperint, nã siccitas serio-
rem putationem facit, sin autē cœli status frigidus, & pruinofus
hyemis uiolentiam denūciat, in Idus Feb. hanc curā differemus.
Atq; id licebit facere, si erit exiguus possessionis modus. Nam ubi
ruris uastitas electionem nobis temporis negat, ualentissimam
quaque partem uineti frigoribus, macerrimam uere, uel autumn-

no, quin etiam per brumam meridiano axi oppositas uites, aquiloni per uer, & autumnum deputari conueniet. Nec dubium, quin sit horum uirgultorum natura talis, ut quāto maturius detonsa sint, plus materie, quanto serius, plus fructus afferant.

Quæ bonus uinitor in constituta iam uinea uitare, aut sequi debeat. Cap. XXIII.

QUANDO cumq; igitur uinitor hoc opus obibit, tria præcipue custodiat. Primum, ut quammaxime fructui consulat, deinde, ut in annum sequentem quamletissimas iam hinc eligat materias. Tum etiam, ut quamlongissimam perennitatem stirpi acquirat. Nam quicquid ex his omittitur, magnum affert domino dispendium. Vitis autem cum sit per quatuor diuisa partes, totidem cæli regiones aspiat. Quæ declinationes cum contrarias inter se qualitates habeant, uariam quoq; postulant ordinationem pro conditione suæ constitutionis à parte uitium. Igitur ea brachia, quæ septentrionibus obiecta sunt, paucissimas plagas accipere debent, & magis si putabuntur ingruentibus iam frigoribus, quibus cicatrices inuruntur. Itaq; una tantummodo materia iugo proxima, & unus infra eam custos erit summittendus, qui uitem mox in annum renouet. At è contrario per meridiem plures palmites submittantur, qui laborantem matrem feruoribus æstinis opacēt, nec patiantur ante maturitatem fructū inarescere. Orientis, atq; occidentis haud sanè magna est in putatione differentia, quoniā solem pari horarum numero sub utroq; axe uitis accipit. Modus itaq; materialium is erit, quem dictabit humi, atq; ipsius stirpis letitia. Hæc in uniuersum, illa per partes custodienda sunt. Nam ut ab una uite quasi à quibusdā fundamentis incipiam, semper circa crus dolabella dimouenda terra est. Et si soboles, quam rusticā suffraginem uocant, radiabus adheret, diligenter explātanda, ferroq; alleuanda est, ut hybernas aquas respuat. Nā præstat ex uulnere sobolem repullescentem uellere, quā nodosam, & scabram plagam relinquere. Hoc enim modo celeriter cicatricē ducat, illo cauatur, atque putrescat. Percuratis deinde quasi pedibus crura ipsa, trunciq; circūspiciendi sunt, ne aut pampinariis palmes internatus, aut ueruce similis furūculus relinquatur, nisi si iugo superiecta uitis, desyderabit ab inferiore parte renouari. Si uero trunci pars secta solis afflatu perarnit, aut aquis, noxijs uel anis

malibus, quæ per medullas irrepunt, cauata uitis est, Dolabella
 cōueniet expurgare, quicquid emortuum est. Deinde falce eradi-
 uino tenus, ut à uiridi, codice ducat cicatricem, neque est difficil-
 le, mox alleuatas plagas terra, quā prius amurca madefeceris, li-
 nire, nā & teredinem, formicamq; prohibet. Solem etiā, & plu-
 uias arcet eiusmodi litura, ppter quæ celerius coalescit, & fructum
 uiridem conseruat. Cortex quoq; aridus, fissusq; per summa
 trunci depēdens corpore tenus delibrandus est, qđ & melius ui-
 tis quasi sordibus liberata cōalescit, et minus uino fecis affert.
 Iam uero muscus, qui more compedis crura uitium deuincta cō-
 primit, situq; & ueterno macerat, ferro distringendus, & eradē-
 dus est. Atq; hæc in ima parte uitis. Nec minus ea, quæ in capi-
 te seruanda sint, deinceps præcipiantur. Plagæ, quas in duro ui-
 tis accipit, obliquæ, rotundæq; fieri debent, nā citius cōalescūt,
 & quādiu cicatricem nō obduxerint, cōmodius aquā fundunt.
 Transuersæ plus humoris & excipiunt, & cōtinent. Eam culpā
 maxime uinitor fugito. Sarmenta lata, uetera, male nata, cōtor-
 ta, deorsum spectantia recidito. Nouella, et fructuaria recta sum-
 mittito. Brachia tenera, & uiridia seruat. Arida, et uetera fal-
 ce amputato. Ungues custodū ānotinos refecato. In quatuor fer-
 mē pedes supra terrā uitē elatam totidem brachijs composito,
 quorum singula spectent decussati ingi partes, tum uel unum fla-
 gellū, si macrior uitis erit, uel duo, si plenior, brachio cuiq; sum-
 mittito, eaq; ingo superposita præcipitato. Sed meminisse oport-
 tebit, ne in eadem linea, unoq; latere brachij esse duas materias,
 plures ne patiamur. Nāq; id maxime uitē infestat, ubi nō om-
 nis pars brachij pari uicē laborat, atque æqua portione succum
 proli suæ dispensat, sed ab uno latere exigitur. Quo fit, ut ea ue-
 na, cuius omnis humor assumitur, uelut iēta fulgure areseat. Vo-
 catur etiam focaneus palmes, qui solet in bifurco medius prore-
 pere, & icarco eum prædicto uocabulo rustici appellant, quod
 inter duo brachia, et quæ se diuidit uitis, enatus uelut fauces obsi-
 det, atq; utriusq; duramenti alimenta præripit. Hūc ergo tanq̃
 emulū diligenter iđem amputant, & abnodāt, priusq; corrobo-
 retur. Si tñ ita præualuit, ut alterutrum brachium affligerit, id
 quod imbecillius est tollitur, & ipse focaneus summittit. Reciso
 .n. brachio, æqualiter utriq; pti uires mater sumministrat. Igit̃
 caput uitis pēdens infra ingum cōstituito, unde se pandant quæ

tuor (ut dixi) brachia, in quibus quotannis vitis renouetur, ampu-
 tatis ueteribus, & summissis nouis palmitibus, quarum delectus
 scire faciendus est. Nam ubi magna materiarum facultas est, puta-
 tor custodire debet, ne aut proximas duro, idest ab trunco, & ca-
 pite vitis relinquat, aut rursus extremas. Nam illae minime uin-
 demiae conferunt, cum exiguum fructum praebent, similes scilicet pa-
 pinarijs, haec uitem exhauriunt, quia nimio faetu onerant, & usque
 in alterum, ac tertium palmum, quod uitiosum esse diximus, se ex-
 tendunt. Quare medio in brachio commodissime palmae summit-
 tentur, quae nec spem uindemiae destituant, nec emacient stirpem
 suam, nonnulli fructus auidius eliciunt extrema, & media flagel-
 la summittendo, nec minus proximum duro sarmentum in custo-
 dem resecando, quod faciendum, nisi permittentibus soli, & trun-
 ci uiribus minime censeo. Nam ita se induunt uuis, ut nequeat ma-
 turitatem capere, si benignitas terrae, atque ipsius trunci letitia non
 adsit. Subsidiarius, idemque custos in pollice resecari non debet, cum
 palmae, ex quibus proximi fructus sperantur, idoneo loco sitae sunt.
 Nam ubi ligaueris eas, & in terram spectantes deflexeris, infra
 uinculum materias exprimes. At si longius, quam ritus agricolarum
 permittit, & a capite vitis emicuerit, & brachijs in aliena ingo-
 rum coplura perreperit, custodem ualidum, & quam maximum
 iuxta truncum duorum articuloꝝ, uel trium relinquemus, ex quo
 quasi pollice, proximo anno citata materia formetur in brachium,
 ut sic rearsa vitis, ac renouata intra inguē contineatur. Sed in sum-
 mittendo custode haec maxime sunt obseruanda. Primum, ne resu-
 pina coelum, sed prona potius plaga terram spectet. Sic. n. & ge-
 liadis ipsa se protegit, & ab sole obumbratur, deinde ne sagittae,
 sed ungulis quidem similis fiat resectio, nam illa celerius, & la-
 tius emoritur, haec tardius, & angustius reformidat. Quodque est
 usurpari uitiosissime animaduerto, maxime uitandum est. Nam dum
 seruiunt decori, quo sit breuior custos, & similis pollicis, iuxta ar-
 ticulum sarmentum recidunt. Id aut plurimum officit, quoniam
 secundum plagam posita gemma pruinis, & frigore tum deinde
 aestu laborat. Optimum est igitur medio ferè internodio subsidia-
 rium tondere palmitem, de uexaque resectionem facere post gem-
 mam, ne (ut iam ante diximus) superlachrymet, & gemmantem
 caecat oculum. Sed si resecis facultas non erit, circumspectendus est fu-
 runculus, qui quamuis angustissime praecisus in modum ueruae
 proximo

proximo uere materiam exigat, quam uel in brachium, uel in fructuarium remittamus, si neq; is reperiatur, sanctanda ferro est, atq; exulceranda uitis in ea parte, qua pampinum studemus elicere. Iam uero ipsos palmites, quos uindemia præparamus, clauiculis, ac nepotibus liberandos magnopere censeo. Sed in ijs recidentis alia conditio est, atq; alia in ijs, quæ proædunt è trunco, nã quicquid est, quod è duro prominet, uehementius applicata falx abnodatur, atq; eraditur, quo celerius obducatur cicatrice. Rursus quicquid è tenero præssit, sicut nepos paruius detondetur, quã ferè cõiunctam gerit ab latere gemmam, cui consulendum est, ne falx defringatur. Pressius enim si abnodes applicato ferro, aut tota tollitur, aut conuulnertur, propter quod palmes, quæ mox in germinatione citauerit, imbecillis, ac minus fructuosus erit, tum èt magis obnoxius uentis, scilicet quia infirmus de cicatrice prorepserit. Ipsius autem materiae, quam summittemus longitudini modum difficile est imponere. Pleriq; tñ in tantum prouocant, ut curuata, & præcipitata per iugum nequeat terram contingere. Nos subtilius dispienda illa censemus, primum uitis habitum, nam si robusta est, ampliores materias sustinet. Deinde soli quoq; pinguitudinem, quæ nisi adest, quãuis ualidissimam uitem celeriter necabimus procerioribus emaciatam flagellis. Sed longi palmitibus non mensura, uerum gemmarum numero æstimantur, nã ubi maiora sunt spatia inter articulos, licet eonq; materiam producere, dum penè terram contingat, nihilo minus enim paucis frondescat pampinis. At ubi spissa internodia, frequentesq; oculi sunt, quamuis breue sarmentum, multis palmitibus uirescat, & numero foetu exuberat. Quare modus talis generis necessario maxime est adhibendus, ne procerioribus fructuarijs oneret. Et ut cõsideret uinitor pximi anni magna, nec ne fuerit uindemia. Nã post largos fructus parcendum est uitibus, & ideo anguste putandum, post exiguos, imperadum. Super cætera illud èt censemus, ut duris, tenuissimisq; & acutissimis ferramentis totum istud opus exequamur, obtusa. n. & hebes, & mollis falx putatorem moratur, eoq; minus operis efficit, & plus laboris affert uinitori. Nam siue curuatur acies, quod accidit molli, siue tardius penetrat, quod evenit in retuso, & crasso ferramento, maiore nisi est opus. Tum etiam plagæ asperæ, atque inæquales, uites lacerant. Neq; enim uno, sed sæpius repetito ictu res transigitur. Quo plerunq; fit, ut

Colu.


f

quod praedidi debeat, perfringatur, et sic vitis laniata, scabrataq; putrescat humoribus, nec plagae consanentur. Quare magno opere monendus putator est, ut prolixet adiem ferramenti, & quantum possit, nouacula similem reddat. Nec ignoret in quaque re, qua parte falsis utendum sit. Nam plurimos per hanc insatiam uastare uineta comperi.

De figura falsis uineaticae.

Cap. XXV.

EST autem sic disposita uinitoriae falsis figura, ut capulo par proxima, quae rectam gerit adiem, culter ob similitudinem nominetur. Quae flectitur, sinus. Quae a flexu procurrit, scalprum. Quae deinde adunca est, rostrum appellatur. Cui superposita semiformis lunae species, securis dicitur. Eiusque uelut apex pronus imminens, mucro uocatur. Harum partium quaeque suis muneribus fungitur, si modo uinitor gnarus est. Nam cum in aduersum pressa manu desecare quid debet, cultro utitur, cum autem retrahere, sinu, cum adlenare, scalpro, cum incutere, rostro, cum ictu cadere, securi, cum in angusto aliquid expurgare, mucrone. Maior autem pars operis in uineam ductim potius, quam caesim facienda est. Nam ea plaga, quae sic efficitur, uno uestigio alleuat. Prius enim putator applicat ferrum, atque ita quae destinauit praedidit. Qui caesim uitem petit si frustratus est (quod saepe euenit) pluribus ictibus stirpem uulnerat. Tutior igitur, & utilior putatio est, quae (ut retuli) ductu falsis non ictu conficitur.



De cura adminiculandae, ingandaeque uineae. Cap. XXVI.

HIS peractis, sequitur (ut ante iam diximus) adminiculandae, ingandaeque uineae cura, cui stabilienda melior est ridica palo, neque ea quaelibet, nam est praecipua cuneis fissis olea, quercus, & suber, ac

si qua sunt similia robora. Tertiā obtinet locum pedamen teres, idq; maxime probat ex iunipero, & lauru, & cupressu. Recte et faciunt ad eam rem syluestres pinus, atq; et sambuca probabilis usus. Tamen in his hæc, eorumq; similia pedamenta post putationem retractanda sunt, partesq; eorū putres dedolanda. Atq; alia conuertenda, quæ synceritatem habent, alia summouenda, quæ uel cariōsa, uel iusto breuiora sunt, eorumq; in uicem idonea reponenda, iacentia statuenda, declinata corrigenda. Iugo si nō erit opus noua sartura, recentia uincula inferant. Si restituendū uidebitur ante q̄ uitis palo applicet, perticis, uel arundinibus cōnectatur, ac tum demum (sicut in nouella præcepimus) uitē iuxta caput, infraq; brachia colligemus cum ridica, idq; facere nō oportebit omnibus annis eodē loco, ne uinculū incidat, et truncū strāgulet. Brachia deinde sub stella quadripartito locabimus, tenerosq; palmites super iugum ligabimus nihil repugnantes naturæ, sed ut quisquis obsequet, leuiter curuabit, ne deflexu frāgat ne ue iam tumentes gemmæ detergeant. Atq; ubi duæ materiæ per unam partem iugi mittentur, media ptica interueniat, directæq; palmæ per iugorum compluuiā decurrant, & uelut merse cacuminibus in terram despiciant. Id ut scite fiat, meminerit alligator, ne retorqueat sarmentum, sed tantum inflexum deuinciat, et ut omnis materia, quæ nihil potest præcipitari, iugo superponatur, ut potius innixa perticæ, q̄ è uinculo pendeat. Sæpe enim notauimus per imprudentiam rusticos subijcere iugo palmam, et ita colligare, ut solo uimine suppendeat. Quæ uinea, cum accipit pampini, & uuarum pondus, infringitur.

Quæ bonus uinitor in constituta iam uinea uitare, aut seq̄ debeat. Cap. XXVII.

SIC deinde ordinata uineta festinabimus emū dare, sarmētisq; & calamētis liberare. Quæ sicco tñ solo legenda sunt, ne lutosa humus inculcata maiore fossori laborē præbeat, qui protinus ad huc silentibus uineis inducendus est. Nā si palmis incipientibus, progēmantibusq; fossorem immiseris, magnā partem uindemiæ decusseris. Igitur ante q̄ gemment per diuortium ueris, atq; huius quam altissime fodiendæ uineæ sunt, quo lætius, atq; hilarius pullulent. Eaq; ubi se frōdibus, et uuis uestierint, teneris caulibus nec dū adultis modus adhibendus est. Idemq; uinitor, q̄ ante fer

ro, nunc manu decutiet, umbrasq; cōpesct, ac supernacuos pāpi-
nos deturbabit. Nam id plurimum refert, non inscite facere, siquī
dem uel magis pampinatio, q̄ putatio uitibus consilii. Nam illa
q̄uis multū iuuat, sauiat tñ, & resecat. Hæc clementius sine uul-
nere medetur, & anni sequentis expeditionē putationē facit. Tū
etiam uitē minus cicatricosam reddit, quoniam id, ex quo uiri-
de, & tenerum decerptum est, celeriter cōsanescit. Super hæc ma-
teriæ, quæ fructum habent, melius cōualescunt, & uinæ cōmodi-
us insolata percoquuntur. Quare prudentis est, ac maxime callē-
tis uinitoris æstimare, ac dispicere, quibus locis in annum debeat
materias summittere, nec orbos tm̄ detrabere palmites, uerū etiā
frugiferos, si supra modum se numerus eorum profuderit, siquidē
euenit, ut quidam oculi trigeminis palmis egerminēt, q̄bus bi-
nos detrabere oportet, quo cōmodius singulos alumnos educēt.
Est. n. sapientis rustici reputare, num maiore fructu uitis se inducet
rit, q̄ ut perferre eum possit. Itaq; non solum frōdem supernaciā
debet decerpere, quod semper faciendum est, uerum interdū par-
tem aliquā fœtus decutere, ut ubere suo grauata uitem leuet.
Idq; faciet uarijs de causis pāpinator industrius, etiam si nō erit
maior fructus, q̄ ut maturescere queat. Si autem continuis superio-
ribus annis dapsili prouentu fatigata uitis fuerit, requiescere, ac
refici par erit, & sic future materiæ consulendum. Nam cacumini-
na flagellorum cōfringere luxuriæ comprimendæ causa uel è du-
ra parte, aut à trunco surgentes pampinos submouere oportebit,
nisi ad renouandam uitē unus, atq; alter seruandus est. Tum ē
capite quicquid inter brachia uiret explantare, atq; eos, qui per
ipsa duramenta steriles, nequicquam matrem occupāt, palmites
detergere, cuiuslibet uel pueri est officium.

Quomodo pampinari, & quot fossuris uinea excoli debeat.

Cap. XXVIII.

TEMPVS autem pampinationis ante, q̄ florem uitis osten-
dat, maxime est eligendum, sed & postea licet eandem repetere.
Medium igitur eorū dierum spatium, quo acini formantur uinea-
rum, nobis aditum negat, quippe florentem fructum mouere non
expedit, pubescentem uero, & quasi adolescentem conuenit reli-
gare, folijsq; omnibus nudare, tum & crebris fossiōibus implere,
nā sit uberior puluerationibus. Nec inficior plerosq; ante me rui-

sticarum rerū magistros tribus fossuris contentos fuisse, ex quibus Græcū, qui sic refert, pōt uideri satis esse constitutam uineā ter fodere. Celsus quoq; et Atticus consentiunt tres esse motus in uite, seu potius in omni surculo naturales, unum, quo germinet, alterum, quo floreat, tertium, quo maturescat. Hos ergo motus cēsent fossionibus conātari. Nō enim natura, quod uult satis efficit, nisi eam labore cum studio inueris. Atq; hęc colendarum uinearum cura finitur uindemia.

De inferendis uitibus, & insitione tuenda. Cap. XXIX.

REDEO nūc ad eam partem disputationis, qua sum professus uitium inferendarum, tuendarumq; insitionum p̄cepta. Tempus inferendi Iulius Atticus tradidit ex Calen. Nouembribus in Calendas Iunias quoad posse custodiri surculū, sine germine asfirmat. Eoq; debemus intelligere nullam partem anni excipi, si sit sarmenti silentis facultas. Id porro in alijs stirpiū generibus, quæ firmiter, & succosioris libri sunt, posse fieri sanè concesserim. In uitibus nimis temere tot mensium rusticis insitionem pmissam dissimulare nō est fidei meæ, non quod ignorem brumæ temporibus aliquando insitam uitem comprehendere. Sed non quid in uno uel altero experimento casu fiat, uerū quid certa ratione plerūq; proueniat, discantibus præcipere debemus. Etenim si exiguo numero periclitandum sit, in quo maior cura temeritati medet̄, possum aliquatenus conuincere. Cum uero uastitas operis etiam diligentissimi agricolæ curam distendat, omnem scrupulum summo uere debemus. Est enim contrarium quod Atticus præcipit. Nam idem per brumam negat recte putari uineam. Quæ res, quāuis minus lædat uitem, merito tñ fieri prohibetur, qđ frigoribus omnis surculus rigore torpet, nec propter geliadia corticem mouet, ut cicatricem consanet. Atq; idem Atticus non prohibet eodē ipso tempore inferere, quod tum, & totius obtruncatione uitis, et cum eiusdem resectionis fissura præcipit fieri. Verior itaq; ratio est inferendi tepentibus iam diebus post hyemem, cum & gemmas, & corticem naturaliter mouent, nec frigus ingruit, quod possit aut surculum insitum, aut fissuræ plagam inurere. Permisserim tamen festinantibus autumno uitem inferere, quia non dissimilis ē eius aeris qualitas uernæ, sed quocunq; quis tempore destinauerit inferere, non aliam sciat esse curam surculis explorandis, quā quæ

COLVMELLAE.

tradita est priore libro, cum de malleolis eligendis præcepimus, quos ubi generosos, & fœcundos, & quammaturissimos uiti detraxerit, diem quoq; tepidum, silentemq; à uentis eligat. Tum cōsyderet surculum teretem, solidiq; corporis, nec fungosæ medullæ crebris etiam gemmis, & breuibus internodijs, nam plurimum interest non esse longum sarmentum, quod inferat, & rursus plures oculos, quibus egerminet, inesse. Itaq; si sunt longa internodia, necesse est, ad unam, uel summum duas gemmas recidere surculum, ne proceriorem faciamus, quam ut tempestates, & uētos, et imbres immobilis pati possit. Inseritur autem uitis uel resassa, uel integra perforata terebra. Sed illa frequentior, & penè omnibus agricolis cognita insitio, hæc rarior, & paucis usurpata. De ea igitur prius differam, quæ magis in consuetudine est. Renditur uitis plerūq; supra terrā, nonnūq; tñ & infra, quo loco magis solida est, atq; enodis, cum iuxta terrā insita est, surculus adobruitur cacumine tenus, at cū editior est à terra, fissura diligenter subactō luto liniē, atq; superposito musco ligat, quod & callores, & pluuias arceat, temperat ita surculus, ut calamo nō ab similis, coagmentet fissurā, sub qua nodus in uite desyderat, quā quasi alliget eam fissurā, nec rimam patiat ultra procedere. Is nodus etiam si quatuor digitis à resectione abfuerit, illigari tñ eū prius, q̄ uitis findatur, cōueniet, ne cum scalpro factum fuerit iter surculo, plus in isto plaga hiet. Calamus autem non amplius tribus digitis debet alleuari, æqualiter ex ea parte, qua raditur, ut sit leuis, eaq; rasura ita deducitur, ut medullam cōtingat uno latere, atq; altero paulo ultra corticem distringatur, figureturq; in speciem cunei, sic ut ab ima parte acutus surculus, latere altero sit tenuior, atq; altero plenior, perq; tenuiorē ptē insertus eo latere arctetur quo est plenior, & utrinq; contingat fissuram, nam nisi cortex cortici sic applicetur, ut nullo loco transluceat, nequit coalescere, uinculi genus ad insitionem non unum est, alij uiminibus obstringunt, nonnulli circumdant libro fissurā, plurimi ligant iunco, quod est aptissimum, nam uimen, cum inaruit, penetrat, & insecat corticem, propter quod molliora uincula magis probamus, quæ cū circūuenere truncum, adactis arūdineis cuneolis arctantur, sed antiquissimū est, et ante hæc ablaqueari uitem, radicesq; summas, uel soboles amputari, & post hæc adobruī truncum, isq; cū comprehendit, aliā rursus exigit curam, nam sæpius pam,

pinandus est, cum germinat, frequentiusq; detrahenda sunt folioles, quæ à lateribus, radiabusq; prorepunt, tum quod ex insito profundit subligandum, ne uento furculus motus labefactes, aut explantetur tener pampinus, qui cum excreuit, nepotibus orbandus est, nisi si propter penuriã, & caluitium loci sumitur in ppagines. Autumnus deinde falcẽ maturis palmitibus admonet, sed putationis insitis custodit ea ratio, ut ubi nulla desideratur propago, unus furculus euocetur in iugum, alter ita recidat, ut adæquetur plaga trunco, sic tñ nequid radatur è duro. Pampinandum non aliter est, q̃ in nouella uiniradice, putandum uero sic, ut usq; in quartum annum parcius imperetur, dum plaga trunci ducat cicatricem. Atq; hæc per fissuram insitarum ẽ ordinatio, illa sic per terebrationem, primum ex uicino fructuosissimã oportet consyderare uitem, ex qua (uelut traducem inherentem matri) palmitem attrahas, & per foramen transmittas, hæc enim tutior, & certior est insitio, quoniam & si proximo uere non comprehendit, sequente certe, cum increuit, coniungi cogitur, et mox à matre reciditur, atq; ita superficies insitæ uitis usq; ad receptũ furculum obtruncatur. Huius traduci si non est facultas, tum detractum uiti quamrecentissimum eligitur sarmentum, & leuiter circumrasum, ut cortex tantum detrahatur, aptatur foramini, atq; ita luto circumlinitur resecta uitis, ut totus truncus alieni generis uiti seruiat, quod quidem non fit in traduce, qui à materno sustinetur ubere, dum inole scat, sed aliud est ferramentum, quo priores uitem perforabant, aliud, quod ipse usu nunc magis aptũ cõperi, nam antiqua terebra, quã solam ueteres agricolæ nouerãt, scobem faciebat, perurebatq; eam partem, quam perforauerat, densa porro raro reuirescebat, uel cũ priore coalescebat, in eaq; nec insitus furculus comprehendebat, tum etiam scobis nũquam sic eximebatur, ut non inhereret foramini, ea porro interuentu suo prohibebat corpus furculi corpori uitis applicari. Nos terebram, quam gallicam dicimus, ad hanc insitionem commentilõge habiliorẽ, utiliorẽq; comperimus, nam sic excauat truncum, ne foramen inurat, quippe non scobem, sed ramẽta facit, quibus exemptis, plaga leuis relinquit, quæ facilius omni pte sedentem furculum contingat, nulla interueniente lanugine, quã excitabat antiqua terebra. Igitur secundũ uernum æquinocitiũ perforatam uitiũ insitionem habeto, locisq; aridis, & siccis nigram ui-

tem inferito humidis albā, neq; est ulla eius ppagādi necessitas, si mō tā mediocris est crassitudo trunci, ut incrementū insiti plagā possit cōtegere, & nisi tñ uacuis locus demortui capitis uite reposat, qđ cū ita est, alter ex duobus surculis mergit, alter eductus ad iugū in fructum summittitur, neq; inutile ex ea uite, quā meriseris, enascentes in arci ppaginis pāpinos educare, quos possis mox, si ita cōpetet, uel propagare, uel ad fructum relinquere.

De ratione pedaminum, uiminū, & de salicto. Cap. XXX.

QVONIAM cōstituendis, colēdisq; uineis, quæ uidebantur utiliter praeipi posse, differuimus, pedaminū, ingorūq; & uiminum pspiciendox tradenda rō est. Hæc. n. quasi quædā dotes uineis ante praeprant, qbus si deficiat agricola, cām faciendi uineta non habet, cū oīa, quæ sunt necessaria extra fundū querenda sint, nec emptionis tm̄ (sicut ait Atticus) pretium onerat rustici rōnem, sed est etiā cōparatio molestissima. Cōuehenda sunt. n. tpe iniquissimo hybernū, quare salices uiminales, atq; arundinetæ, uulgaresq; syluæ, uel cōsulto cōsitæ è castaneis prius faciendæ sunt. Viminaliū (ut Atticus putat) singula iugera, sufficere pnt quis, & uigenis iugeribus ligandæ uineæ, arūdineti singula iugera, uigenis iugadis, castaneti iugeræ, totidē paladis quot arūdineti iugadis. Salicem uel riguus ager, uel uliginosus optime, nec incōmode tñ alit planus, et pinguis, atq; is debet cōverti bipalio (ita. n. p̄cipiunt ueteres) in duos pedes et semissem pastinare salicto destinātū solū, nec refert cuius generis uimen seras, dñ sit lentissimū. Putant tñ tria esse genera p̄cipuæ salicis, græcæ, gallicæ, sabinæ, quā plurimi uocant amerinam. Græca flauicollis est, gallica obsoleti purpurei, et tenuissimi uiminis. Amerina salix gracile uirgam, & rutilā gerit. Atq; hæ uel cacuminibus, uel taleis deponunt. Perticæ cacuminū modicæ plenitudinis, q tñ dipondiarj orbiculi crassitudinē nō excedant, optime panguntur, eousq; dñ ad solidum demittant. Taleæ sexq; pedales terreno imerse paululū obruunt, riguus locus spatia laxiora desiderat, eaq; senum pedū p qncuncē recte faciūt, siccanens spissiora sic, ut sit facilis accessus colentibus ea, qnū pedū interordinia esse abunde est, ut tñ in ipsa linea cōsitionis alterna uacuis intermissis bipedaneis spatijs consistant semina. Satio est eorū prius, q germinant, dum silent uirgæ, quas arboribus detrabi siccas conueniet,

nā rosidas si recideris, parē p̄spere proueniūt, ideo pluuij dies in exputanda salice uitantur. Fodienda sunt primo triennio salicē crebrius, ut nouella uineta, cū deinde cōualuerint, tribus fossuris contenta sunt, aliter culta celeriter deficiunt, nā quāuis adhibeatur cura, plurimæ salices intereunt, quæ in loco ex p̄pinq̄o mergis propagari debent, curuatis, & defossis cacuminibus, quibus restituatur q̄cquid intercidit. Anniculus deinde mergus decidatur à stirpe, ut suis radiabus tanq̄ uitis ali possit.

De genista.

Cap. XXXI.

PER ARIDA loca, q̄ genus id uirgultorū nō recipiunt, genistam postulant, eius cū sit satis firmū, tum ē lentissimū est uinculum. Seritur aut̄ semine, qđ cum est natum, uel defertur bima uiniradix, uel relicta cum id t̄ps exēssit, oībus annis more segetis iuxta terrā demeti pōt. Cætera uincula, qualia sunt ex rubo, maiore operā, sed in egeno tñ necessariam exigunt. Perticalis ferē salix eundē agrū, quē uiminalis, desiderat, melior tñ riguo puenit, atq; ea taleis conferitur, & cum germinauit ad unā perticā summittit̄, crebroq; foditur, atq; exherbatur, nec minus q̄ uinea pampinatur, ut in longitudinē ramorū potius, q̄ in latitudinem euocetur. Sic culta quarto demum anno ceditur, nam quæ uinculis preparatur, potest annicula præcidi ad semissem supra duos pedes, ut ē trunco fruticet, & in brachia uelut humilis uinea disponatur, si tñ sicior fuerit ager, bima potius refecabitur.

De arundinetis.

Cap. XXXII.

ARVND minus alte pastinat̄, melius tñ bipalio feritur, ea cum sit uinacissima, nec recuset ullum locum, p̄spere resoluta, q̄ denso, humido, q̄ sicco, uallibus, q̄ cliuis, fluminū ripis, & limitibus, ac uepretis cōmodius, q̄ medijs agris deponitur. Seritur bulbus radice, feritur & talea calami, nec minus toto p̄ster nitur corpe. Bulbus tripedaneis interuacantibus spatijs obrutus anno celerius maturā perticā præbet. Talea, & tota arundo ferius prædicto tpe euenit, sed sine recisa in dupondium & semissem talea, sine totæ arundines p̄stratæ deponantur, extent eæ cacumina oportet, qđ si obruta sunt, totæ putrescunt. Sed cultus arundinetis primo triennio non alius est, q̄ cæteris, cum deinde conseruit, repastinandū est. Ea est aut̄ senectus, cū uel exaruit situ, et

COLVMELLAE.

inertia plurimum annorum, uel ita densatum est, ut gracilis, & canea similis arundo prodeat. Sed illud de integro refodi debet, hoc potest interadi, & disrarari, quod opus rustici castrationem uocat, quae tamen resectio arundineti caeca est, quia non apparet in terra quid aut tollendum sit, aut relinquendum. Tolerabilius tamen arundo castratur ante quam cedit, quatenus calami uelut indices demonstrant, quid eruendum sit. Tempus repastinandi, & conferendi est prius quam oculi arundinum egerminent, ceditur deinde post brumam, nam usque in id tempus incrementum capit, ac tum compescitur, cum obrigit hyberno frigore. Fodiendum quoties & uineta, sed & macies eius, cinere, uel alio stercore iuuanda est, propter quod caesum plerique incendunt arundinetum.

De castaneis, & castanetis.

Cap. XXXIII.

CASTANEA roboribus proxima est, & ideo stabiliendis uineis habilis. Eius enim in repastinato nux posita celeriter emicat, & post quinquennium caesa more salicti recreatur, atque in palum formata ferè usque in alteram caesionem perennat. Ea pullam terram, et resolutam desiderat, sabulonem humidum, uel refractum tosum non respuit, opaco, & septentrionali clino letat, spissum solum, & rubricosum reformidat. Seritur ab Nouembri mense per totam hyemem sicca terra, & repastinata in altitudinem dupondij, & semissis. Noces in ordinem semipedalibus, ordines aut quinum pedum spatij dirimuntur. In altitudinem dodrantis castanea depressis sulcis committitur, quod ubi nuibus sunt confiti, prius quam complanentur, breues arundines ab latere castanearum panguntur, ut per hos sationis indices tutius fodi, & runcari possint. Simulatque semina stillauerint, & iam bima transferri queunt, interuellunt, ac bini pedes arbusculis uacui relinquunt, ne densitas platas emanet. Spissius aut semen propter uarios casus deponit, nam interdum prius quam enascatur, aut siccitatibus nux inarescit, aut aquarum abundantia putrescit, et interdum subterraneis animalibus sicuti muribus, & talpis infestat, propter quae saepe nouella castaneta caluescunt, atque ubi frequentanda sunt, melius ex uicino, si competit (mergi more) pertica declinata propagatur, quam exempta referitur. Haec enim uelut immota sua sede uehementer germinat, at quae radiatus exempta, & deposita est, biennio reformidat, propter quod compertum est commodius nuibus, quam uiuicadiabus eiusmodi syl-

uas institui. Spatia huiusce sationis, quæ supra scripta sunt, capi-
ta castanearum recipiunt. MM.DCCCLXXX. cuius summæ (si-
cut ait Atticus) ex facili iugera singula præbeant statuminum duo-
dena millia. Etenim taleæ propius stirpem recisæ quadrifidas ple-
runque, ac deinde secundæ taleæ eiusdem arboris bifidas ridicas sum-
ministrant, quæ genus fissilis adminiculi manet diutius, quæ teres pa-
lus. Cultus eiusdem est fossionis, positionisque, quæ vineæ. Supputari de-
bet bima, quinetiâ trima, nam bis ferro repetenda est ueris prin-
cipio, ut incitetur eius præritas. Potest et quercus simili ratione feri, ue-
rum biennio tardius, quæ castanea decidit, propter quod ratio postu-
lat tempus potius lucrari, nisi si dumosi, glareosi que montes, atque ea ge-
nera terræ, quæ supra diximus, glandem magis, quæ castaneam postula-
bunt. Hæc de vineis Italiis vinearumque instrumentis, quantum reor,
non inutiliter, et abunde differui, mox agricolarum provincialium ui-
neaticos, nec minus nostratis, et galliæ arbuti cultus traditurus.

L V C I I V N I I M O D E R A T I
C O L V M E L L A E D E R E
R V S T I C A L I B E R
Q V I N T V S.

Quemadmodum datas formas agroꝝ metiri debeas. Cap. I.

RIORIBVS Libris, quos ad te de con-
stituendis, colendisque vineis Siluine scripseram,
nonnulla defuisse dixisti, quæ agrestium ope-
rum studiosi desiderarent, neque inficior aliqua
me præterisse, quamuis inquirentem sedulo,
quæ nostri seculi cultores, quæque ueteres litterarum
monimentis prodiderunt. Sed cum sim-
professus rusticæ rei præcepta, nisi fallor, non asseueraueram, quæ
uastitas eius scientiæ contineret, cuncta me dicturum, sed plurima.
Nam illud in unius hominis prudentiam cadere non poterat.
Neque enim est ulla disciplina, aut ars, quæ singulari consumata sit
ingenio, quapropter ut in magna sylua boni uenatoris est inda-
ganter feras quam plurimas capere, nec cuiquam culpæ fuit non omnes ce-
pisse, ita nobis satis, abundeque est, tam diffusæ materiæ, quam susce-
pimus, maximam partem tradidisse, quippe cum in ea uelut omnia de-
siderentur, quæ non sunt propria nostræ professionis, ut proximè

COLVMELLAE.


cum de cōmetiendis agris rōnem. M. Trebellius noster à me requireret, uicinum adeo atq; coniunctum esse censebat demonstranti quemadmodum agrum pastinarem, præcipere et pastinatum quemadmodum metiri debeamus, quod ego nō agricolæ, sed mē soris officium esse dicebā, cū presertim ne architecti quidē, quibus necesse est mensuræ nosse rōnem, dignentur consumatorum ædificior, quæ ipsi disposuerint, modum cōprehendere, sed aliud existiment professioni suæ cōuenire, aliud eorū, qui iam extructa metiuntur, et imposito calculo perfecti operis rōnem computant, quo magis ueniam tribuendā esse nostræ disciplinæ censeo, si eatenus progredit, ut dicat, quæ quidq; rōne faciendum, non quantū id sit, quod effecerit. Verum qm̄ familiariter à nobis tu quoq; Siluine præcepta mensurarum desyderas, obsequar uoluntati tuæ, cū eo, ne dubites id opus geometrarum magis esse q̄ rusticorū, desq; ueniam, siquid in eo fuerit erratum, cuius scientiam mihi non uindico. Sed ut ad rem redeā, modus omnis areæ pedali mensura comprehendit, qui digitorū est. XVI. Pes multiplicatus in passus, et actus, et climata, et iugera, et stadia, centuriasq; mox etiā in maiora spatia prædit. Passus pedes habet quinq;. Actus minimus (ut ait. M. Varro) latitudinis pedes quatuor, longitudinis habet pedes CXX. Clima quoquouersus ped. est. LX. Actus quadratus undiq; finitur pedibus. CXX. hoc duplicatum facit iugerum, et ab eo, quod erat iunctum, nomen iugeri usurpauit. Sed hūc actū provincie Beticæ rustici agnam uocant, iudemq; triginta pedum latitudinem, et CLXXX. longitudinē, porcam dicunt. At Galli candetum appellant, in areis urbanis, spatium centum pedum, in agrestibus autem pedum CL. quod aratores candetum nominant, semiugerum quoq; arepennem uocant. Ergo (ut dixi) duo actus iugerum efficiunt longitudine pedum. CCXL. latitudine pedum CXX. q̄ utraq; summæ inter se multiplicatæ quadrato faciunt pedū uigintioctomillia et octingentos, stadiū deinde habet passus. CXXV. i. pedes. DCXXV. q̄ octies multiplicata efficiat mille passus, sic ueniunt quinquemillia pedum. Centuriam nunc diamus (ut idem Varro ait) ducentorum iugerum modum, olim autem ab centum iugeribus uocabatur centuria, sed mox duplicata nomen retinuit, sicuti tribus dictæ primū à partibus populi tripartito diuisi, quæ tñ nunc multiplicatæ pristinum nomē possident. Hæc non aliena, nec procul à ratioanio, quod tradituri su-

mus, breuiter præfari oportuit. Nunc ueniamus ad propositum. Ingeri partes nō omnes posuimus, sed eas, quæ cadunt in estimationem facti operis, nā minores persequi superuacuum fuit, p quibus nulla merces dependitur. Igitur (ut diximus) ingerum habet quadratoꝝ pedū uigintioctomillia & octingentos, qui pedes efficiunt scrupula. CCLXXXVIII. Ut aut à minima parte, idest ab dimidio scrupulo incipiā. Pars quingentesima septuagesima sexta pedes efficit quinquaginta. i. ingeri dimidium scrupulum. Pars ducentesima octuagesima octaua, pedes centum, hoc est scrupulū. Pars centesima quadragesima quarta, pedes. CC. hoc est scrupula duo. Pars septuagesima secunda, pedes. CCCC. hoc est sextula, in qua sunt scrupula quatuor. Pars qudragesima octaua, pedes. DC. hoc est sicilicus, in quo sunt scrupula sex. Pars uigesima quarta, pedes mille ducentos, hoc est semuncia, in qua sunt scrupula. XII. Pars duodecima duomillia & quadringentos, hoc est uncia, in qua sunt scrupula. XXIIII. Pars sexta, pedes quatuor millia & octingētos, hoc est sextans, in quo sunt scrupula. XLVIII. Pars quarta pedes septem millia & ducentos, hoc est quadrās, in quo sunt scrupula. LXXII. Pars tertia pedes nouē millia & sexcentos, hoc est triēs, in quo sunt scrupula. XCVI. Pars tertia et una duodecima, pedes duodecim millia, hoc est quāunx, in quo sunt scrupula. CXX. Pars dimidia pedes quatuordecim millia & quādringentos, hoc est semis, in quo sunt scrupula. CXLIIII. Pars dimidia et una duodecima, pedes sexdecim millia et octingētos, hoc est septunx, in quo sunt scrupula. CLXVIII. Partes duæ tertie, pedes decē nouē millia et ducētos, hoc est bes, in quo sunt scrupula. CXCII. Partes tres quartæ, pedes unū & uiginti millia et sexcentos, hoc est dodrans, in quo sunt scrupula. CCXVI. Pars dimidia & tertia, pedes uiginti quatuor millia, hoc est dextās, in quo sunt scrupula. CCXL. Partes duæ tertie & una quarta, pedes uigintisex millia et quadringentos, hoc est deunx, in quo sunt scrupula. CCLXIIII. Inger pedes uigintioctomillia & octingentos, hoc est as, in quo sunt scrupula. CCLXXXVIII. Ingeri autem modus si semper quadraret, & in agendis mensuris in longitudinem haberet pedes. CCXL. in latitudinē pedes. CXX. expeditissimum esset eius ratio cinium, sed quoniā diuersæ agrorum formæ ueniunt in disputationem, cuiusq; generis species subiiciemus, quibus quasi formulis utemur.


COLVMELLAE.

De varijs agrorum formis, & eorum dimensionibus. Cap. II.


OMNIS ager aut quadratus, aut longus, aut cuneatus, aut triquetrus, aut rotundus, aut etiam semiarculi, uel arcus, nonnunquam etiam plurium angulorum formam exhibet. Quadrati mensura facillima est, nam cum sit undiq; pedum totidē multiplicatur in se duo latera, & quæ summa ex multiplicatione effecta est, eam dicemus esse quadratorum pedum, tanq̃ est locus quoquoer sus. C. pedum, duimus centies centenos, fiunt decemmillia. Dicemus igitur eum locum habere decemmillia pedum quadratorū, quæ efficiunt ingeri trientem, & sextulam, pro qua portione operis effecti numerationem facere oportebit.




AT si longior fuerit, q̃ latior, ut exempli causa ingeri forma pedes habeat longitudinis. CCXL. latitudinis pedes. CXX. ita, ut paulo ante dixi, latitudinis pedes cū longitudinis pedibus sic multiplicabīs centies uicies duceni quadragenī fiūt uigintioctomillia & octingenti. Dicemus ingerū agri tot pedes quadratos h̃re. Si militerq; fiet de oībus agris, quorū lōgitudo maior sit latitudine.



Sin autem cuneatus ager fuerit, ut puta longus pedes centum, latus ex una parte pedes. XX. & ex altera pedes decem, tunc duas latitudines componemus, fiet utraq; summa pedes. XXX. Huius dimidia pars est, quindecim, quam cum longitudine multiplicando efficiemus pedes mille & quingentos. Hos igitur in eo cuneo quadratos pedes esse dicemus, quæ pars erit ingeri semuncia, & scrupula tria.




At si tribus paribus lateribus triquetrum metiri debueris, hanc formam sequeris. Esto ager triangulus pedum quoquoersus tricentorum. Hunc numerum in se multiplicato, fiunt pedes nonaginta millia. Huius summæ partem tertiam sumito, idest triginta millia. Item sumito partem decimā, idest novem millia. Vtrāq; summam composito, fiunt pedes triginta novem millia. Dicemus hanc summam pedum quadratorum esse in eo triquetro. Quæ mensura effiat ingerum, & trientem, & sicilicum.



COLVMELLAE.

Sed si triagulus disparibus fuerit lateribus ager, tanquā in subiecta forma, quæ habet rectum angulum, aliter ratioanum ordinabitur. Esto unius lateris linea, quæ facit angulum rectum pedum quinquaginta, & alterius pedum centum. Has duas summas in se multiplicato, quinquagies centeni fiunt quinquemillia. Horum pars dimidia duomillia quingeni, quæ pars ingeri unam, & scrupulum effiat.


Orthogoniij
50



100

Si rotundus ager erit, ut circuli speciem habeat, sic pedes sumito. Esto area rotunda, cuius diametros habeat pedes LXX. Hoc in se multiplicato septuagies septuageni fiunt quatuormillia & noningenti. Hanc summam undecies multiplicato, fiunt pedes quinquagintiamillia noningenti. Huius summæ quartādeamam subduco scilicet pedes triamillia octingenti & quinquaginta. Hos esse quadratos in eo circulo dico. Quæ summa effiat ingeri sexcentiam, scrupula duo & dimidium.

Rotundi




agri formæ

Si semicirculus fuerit ager, cuius basis habeat pedes CXL. cuius
nature autem latitudo pedes LXX. oportebit multiplicare lati-
tudinem cum basi, septuagies centeni quadrageni fiunt nouem
millia & octingenti. Hæc undecies multiplicata fiunt centumse-
ptem millia & octingenti. Huius summae quartadecima est septē
millia & septingenti, hos pedes esse dicemus in semicirculo, qui
efficiunt ingeri quadrantem scrupula quinque.

Semicircularis


agri forma



Si autem minus, q̄ semicirculus erit, arcū sic metiemur. Esto Ar-
cus, cuius basis habeat pedes XVI. latitudo autem pedes. II. II. II.
Latitudinem cū basi pono. Fit utriusq; pedes XX. Hoc duco qua-
ter fiunt LXXX. horū pars dimidia est. XL. Itē sexdecim pedū,
qui sunt basis pars dimidia. VIII. His octo in se multiplicati fi-
unt. LXIIII. Quartadecimā partem duco, ea efficit pedes
IIII. paulo amplius, hos adiacies ad quadraginta. Fit utraque
summa pedes. XLIIII. hos in arcu quadratos esse dico, qui faci-
unt ingeri dimidium scrupulū q̄nta & uigesima parte minus.

Minor semicirculo


agri forma



Si fuerit sex angulorum quadratos pedes, sic redigitur. Esto hexa-
gonum quoquoersus lineis pedum XXX. Latus unū in se multi-
Cola.

COLVMELLAE.


plico triens trieni sunt DCCCC. Huius summa tertiam partē statuo CCC. eiusdem partem decimam. XC. Fiunt. CCCXC. Hoc sexies ducendum est, quoniam sex latera sunt, quae consummata efficiunt duomilliatricenteni & quadraginta. Tot igitur pedes quadratos esse dicemus. Itaq; erit ingeri uncia dimidio scrupulo, & decima parte scrupuli minus.



Inter uites pangendas quot pedes relinquendi sint. Cap. III.


HIS igitur uelut primordijs talis rationij perceptis non difficiliter mensuras inibimus agroꝝ, quoꝝ nunc omnes persequi species & longum, & arduum est. Duas ēt nunc formulas praepositis adiuciam, quibus frequenter utuntur agricolae in disponendis seminibus. Esto ager longus pedes milleducētos, latus pe. CXX. In eo uites disponendae sunt ita, ut quini pedes inter ordines relinquantur. Quæro quot seminibus opus sit, cum quinum pedū spatia inter semina desyderantur. Duco quintam partem longitudinis, fiunt. CCXL. & quintam partem latitudinis, hoc est XXIIII. his utrisq; summis semper singulos asses adiucio, qui efficiunt extremos ordines, quos uocant angulares. Fit ergo altera summa ducentorumquadraginta annis, altera uiginti quinque. Has summas sic multiplicato quinquies et uicies ducentiquadragenī singuli, fiunt sex millia & uiginti quinque. Totidē dices opus esse seminibus.

Semina inter quinos pedes.



Similiter inter senos pedes si uoles ponere, duces sextam partem longitudinis milleducentorum, fiunt. CC. & sextam latitudinis CXX. idest XX. His summis singulos asses adijcies, quos dixi angulares esse. Fiunt CCI. & XXI. Has summas inter se multiplicabis uicies, & semel ducentos & unū, atq; ita efficiēs quatuor milliaducentos & uigintiunū. Totidē seminibus opus eē dices.


Semina inter senos pedes.



Similiter si inter septenos pedes ponere uoles septimam partem longitudinis, & latitudinis duces, et adijcies asses angulares, eodem modo, eodemq; ordine consumabis numerum seminum.


COLVMELLAE.

Semina inter septenos pedes.



Deniq; quotcunq; pedum spatia facienda censueris, totam partē lōgitudinis, & latitudinis duces, & prædictos asses adijcies. Hæc cum ita sint, sequitur iugerum agri, qui habet pedes. CCXL. lōgitudinis, & latitudinis pedes CXX. recipiat inter pedes ternos (hoc enim spatium minimum esse placet vitibus ponendis) per longitudinem semina LXXXI. per latitudinem inter quinos pedes semina. XXV. Qui numeri inter se multiplicati sunt seminum duomillia & uiginti quinque.

Semina inter ternos pedes.



Vel si quoquoersus inter quaternos pedes uinea erit disposita, longitudinis ordo habebit semina. LXI. latitudinis. XXXI. q numeri efficiunt in iugero uites mille octingētas & nonaginta una, uel si in longitudinem per quaternos pedes, in latitudinē per quinos pedes fuerit disposita, ordo longitudinis habebit semina. LXI. latitudinis. XXV. quod si inter quinos pedes consitio fuerit, per longitudinem ordinis habebit semina XLIX. & rursus per latitudinem semina XXV. qui numeri duo inter

se multiplicati efficiunt milleducentum et vigintiquinque. At si per senos pedes eundem vitibus locum placuerit ordinare, nihil dubium est, quin longitudini dandæ sint. XLI. vines, latitudini autem vigintiuna. Quæ inter se multiplicatæ efficiunt numerum DCCCLXI. Sin autem inter septenos pedes vinea fuerit constituenda, ordo per longitudinem recipiet capita trigintaquinque, per latitudinem. XVIII. qui numeri inter se multiplicati efficiunt. DCXXX. Totidem dicemus semina præparanda. At si inter octonos pedes vinea cōseret, ordo per longitudinem recipiet semina XXXI. per latitudinem autem. XVI. qui numeri inter se multiplicati efficiunt. CCCCXCVI. At si inter nouenos pedes ordo in longitudinem recipiet semina vigintiseptem, et in latitudinem quatuordecim, hi numeri inter se multiplicati faciunt. CCCLXXVIII. At si inter denos pedes, ordo longitudinis recipiet semina. XXV. latitudinis. XIII. hi numeri inter se multiplicati faciunt. CCCXXV. Et ne in infinitum præcedat disputatio nostra, eadē portione, ut cuique placuerint laxiora spatia, semina faciemus. Ac de mensuris agrorum, numerisque seminum dixisse abunde sit, nunc ad ordinem redeo.

De cultura provincialium vinearum.

Cap. II. III.

VINEARVM provincialium plura genera esse comperi. Sed ex ijs, quas ipse cognoui, maxime probantur, uelut arbusculæ, breui crure sine adminiculo per se stantes, deinde quæ pedamentis adnixæ singulis iugis imponuntur, eas rustici canteriatas appellant. Mox quæ defixis arundinibus circumuinctæ per statumina calamorum materijs ligatis in orbiculos, gyrosque flectuntur, eas nonnulli characatas uocant. Ultima est conditio stratarum uitiū, quæ ab enata stirpe confestim uelut proiectæ per humum porriguntur. Omnium autem sationis fere eadem est conditio, nam uel scrobe, uel sulco semina deponuntur, quoniam pastinationis expertes sunt exterarum gentium agricolæ, quæ tamen ipsa penè superuacua est ijs locis, quibus solum putre, et per se resolutum est, namque hoc imitamur arando (ut ait Virgilius) quod etiam pastinando. Itaque campania, quoniam uicinum ex nobis capere potest exemplum, non utitur hac molitione terræ, quia facilitas eius soli minorem operam desiderat, sicuti autem densior ager provincialis rustici maiorem posat impensam, quod nos pastinando efficiamus, ille sulco facto consequitur, ut laxius subacto solo deponat semina.

Repetitio eorū, quæ dicta sunt, per singula genera. Cap. V.

SED ut singula earum, quæ proposui, vinearum genera persequar, prædictum ordinem repetam. Vitis, quæ sine adminiculo suis viribus consistit, solutiore terræ scrobe, densiore sulco ponenda est. Sed & scrobes, & sulci plurimum prosunt, si in locis temperatis in quibus æstas non est perferuida, ante annum fiant, quæ vinea conferatur. Soli tamen ante bonitas exploranda est, nam si ieiuno, atque exili agro semina deponentur, sub ipsum tempus sationis scrobs, aut sulcus faciendus est. Si ante annum fiant, quæ vinea conferatur, scrobs in longitudinem, altitudinemque defossus tripedaneus abunde est, latitudine tamen bipedanea, uel si quaternum pedum spatia inter ordines relicturi sumus, commodius habemus eandem quoquoersus dare mensuram scrobibus, non amplius tamen quam in tres pedes altitudinis depressis. Cæterum quatuor angulis semina applicabuntur, subiecta minuta terra, & ita scrobes adobruentur. Sed de spatijs ordinum eatenus præcipiendum habemus, ut intelligant agricolæ sine aratro vineas culturi sint, laxiora interordinia relinquenda, siue bidentibus angustiora, sed neque spatiosiora, quam decem pedum, neque contractiora, quam quatuor. Multi tamen ordines ita disponunt, ut per rectam lineam binos pedes, aut, ut plurimum, ternos inter semina relinquunt. Transuersa rursus laxiora spatia faciant, per quæ uel fossor, uel arator incedat. Sationis autem cura non alia debet esse, quam quæ tradita est à me tertio uolumine. Vnum tamen huic consitioni Mago Carthaginensis adiicit, ut semina ita deponantur, ne prætinus totus scrobs terra compleatur, sed dimidia ferè pars eius sequente biennio paulatim adæquetur. Sic enim putat uitem cogi deorsum agere radices. Hoc ego siccis locis fieri utiliter non negauerim, sed ubi aut uliginosa regio est, aut cæli status imbrifer, minime faciundum censeo. Nam consistens in semiplenis scrobibus nimius humor ante quam conualescant, semina necat. Quare utilius existimo repleri quidem scrobes stirpe deposita, & cum semina comprehenderit, statim post æquinoctium autumnale debere diligenter, atque alte ablaqueari, & recisis radiculis, si quas in summo solo citauerint, post paucos dies adobruui, sic enim utrumque incommodum uitabitur, ut neque radices in superiorem partem euocentur, neque inmodicis pluuijs parum ualida uexentur semina. Vbi uero iam

corroborauerint, nihil dubium est, quin cœlestibus aquis plurimum inuentur. Itaque locis, quibus clementia hyemis permittit, adapertas uites relinquere, & tota hyeme ablaqueatas habere eas conueniet. De qualitate autem seminum inter auctores non conuenit. Alij malleolo p̄tinus conseri uineam melius existimāt, alij uiniradice, de qua re quid sentiam, iam superioribus uoluntatibus professus sum. Et nūc tamen hoc aduicio, esse quosdā agros, in quibus non æque bene translata semina, quā immota respōdeant, sed istud rarissime accidere. Notandum itaq; & diligenter explorandum esse & quid quæq; ferat regio, & quid quæq; recuset. Depositam ergo stirpem, id est malleolum, uel uiniradicē formare sic conuenit, ut uitis sine pedamine consistat. Hoc autem protinus effici nō potest. Nam nisi adminiculum tenere uiti, atq; infirmæ contribueris, prorepens pampinus terræ se applicabit. itaque posito semini arundo adnectitur, quæ uelut infantiā eius tueatur, atq; educet, producatq; in tantam staturam, quantam pmittit agricola. Ea porro non debet cē sublimis, nam usq; in sex quipedem coercenda est. Cum deinde robur accipit, etiā sine adiumento consistere ualens, aut capitis, aut brachiorum incrementis adclesat, nam duæ species huius quoq; culturæ sunt, alij capitatas uineas, alij brachiatas magis p̄bant. Quibus cordi est in brachia uitem componere, conuenit ut à summa parte, qua decisa nouella uitis est, quicquid iuxta cicatricem citauerit, conseruari, & in quatuor brachia pedalis mensuræ diuidere, ita ut oēm partem cœli singula aspiciant, sed hæc brachia non statim primo anno tam proceras summittuntur, ne oneretur exilitas uitis, sed compluribus putationibus in prædictam mensuram educuntur, deinde ex brachys, quasi quædam cornua prominentia relinqui oportet, atq; ita totam uitem omni parte in orbem diffundi. Putationis autem ratio eadem est, quæ in iugatis uitibus, uno tm̄ differt, quod pro materijs longioribus pollicēs quaternum, aut quinum gemmarum relinquunt, pro custodibus autem bigemmes reseces sunt. In ea deinde uinea, quā capitatam diximus, iuxta ipsam matrem usq; ad corpus sarmentū detrahatur, una aut altera tantūmodo gemma relicta, quæ ipsi trunco adhæret, hæc aut riguis, aut pinguiissimis locis fieri tutō pōt, cum uires terræ, & fructū, et materias ualent p̄bere. Maxime aut aratris excolunt, qui sic formatas uineas habent, & eam rōnem sequuntur detrahendi uiti

bus brachia, quod ipsa capita sine ulla extātia neq; aratro, neq; bubus obnoxia sunt, nam in brachiatis plerunq; fit, ut aut crure, aut cornibus bouum ramuli uitium defringantur, sepe etiā & stria, dum sedulus arator uomere perstringere ordinem, & q̄proximam partem uitium excolere studet, atq; hæc quidem cultura uel brachiatis, uel capitatis uitibus ante, q̄ gemment, adhibetur. Cū deinde germinauerint, fossor insequitur, ac bidētibus eas partes subigit, quas bubulus non potuit pertingere. Mox ubi materias uitis exigit, insequitur pampinator, et supernuacuos deterget fructuososq; palmites submittit, qui cum induruerūt, uelut in coronam religantur. Hoc duabus ex causis fit, una, ne libero excursu in luxuriam prorepant, omniaq; alimenta pampini absumāt, altera ut religata uitis rursus aditum bubulco, fossoriq; in excolenda se præbeat. Pampinādi aut̄ modus is erit, ut opacis locis, humidisq; et frigidis æstate uitis nudetur, foliaq; palmitibus detrahantur, ut maturitatem fructus capere possit, et ne situ putrescat. Locis aut̄ siccis, calidisq; & apricis, ut è contrario palmitibus uineæ contegantur, etsi parum pampinosa uitis est, aduectis frōdibus, & interdum stramentis fructus muniatur. M. quidē Colvmella patruus meus uir illustribus disciplinis eruditus, ac diligentissimus agricola Baticæ puinciæ sub ortu caniculæ palmeis tegetibus uineas adumbrabat, qm̄ plerūq; dicti syderis tempore quedam partes eius regionis sic infestatur euro, quem incolæ uulturum appellant, ut nisi tegminibus uites opacentur, uelut halitu flammeo fructus uratur, atq; hæc capitata, brachiataq; uitis cultura est. Nam illa, quæ uno ingo superponitur, aut quæ materijs summissis arundinū statuminibus per orbem cōnectitur, ferè eandē curam exigit, quā ingata. Nōnullos tñ in uineis charactis animaduerti, & maxime eluenaci generis prolixos palmites, quasi propagines summo solo adobruere. Deinde rursus ad arundines erigere, & in fructum summittere, quos nostri agricolæ mergos, galli candosoccos uocant, eosq; adobruunt simplia ex causa, quod existiment plus alimentum terram præbere fructuarijs flagellis, itaq; post uindemiam uelut inutilia sarmenta decidunt, & à stirpe summonent. Nos autem præcipimus easdem uirgas, cum à matre fuerint p̄asæ, sicubi demortuis uitibus ordines uacent, aut si nouellā quis uineam instituere uelit, p̄ uiniradice ponere, quoniam quidem partes sarmentorū, quæ fuerant obrutæ, satis multas

habent radices, quæ depositæ scrobibus, confestim cōprehendāt. Superest reliqua illa cultura prostratæ vineæ, quæ nisi uiolentissimo cœli statu suscipi non debet, nam et diffialem laborē colonis exhibet, nec unq̄ generosi saporis uinum præbet, atq; ubi regiōis conditio solam eam culturam recipit, bipedaneis scrobibus maleolus deponitur, qui cum egerminauit, ad unā materiā reuocatur, eaq; primo anno cōpesatur in duas gēmas, sequente deinde, cum palmites profudit, unus summittitur, cæteri decutiuntur, ac ille, qui summissus est, cum fructū edidit, in eā longitudinem deputatur, uti iacens nō excedat interordini spatium, nec magna est putationis differentia cubantis, & stantis rectæ vineæ, nisi quod iacenti uiti breuiores materiæ summitti debent, resces quoq; angustius in modum furunculoꝝ relinqui, sed post putatiōem, quā utiq; autumnō in eiusmodi uinea fieri oportet, ut uitis tota deflectatur in alterum interordinium, atq; ita pars ea, quæ fuerat occupata, uel foditur, uel aratur, & cum exulta est, eādem uitem recipit, ut altera quoq; pars excoli possit. De pampinatione talis vineæ parum inter auctores conuenit, alij negant esse nudandā uitem, quo melius cōtra iniuriam uentorū, ferarumq; fructū abscondat, alijs placet parcius pampinari, ut & uitis nō in totū superuacuis frondibus oneretur, & tñ fructum uestire, aut protegere possit, quæ ratio mihi quoq; cōmodior uidetur.

De ulmarijs faciendis.

Cap. VI.

SED IAM de uineis satis diximus, nunc de arboribus præcipiendum est. Qui uolet frequens, & dispositum arbustum paribus spatijs, fructuosumq; habere, operam dabit, ne emortuis arboribus rareseat, ac primam quamq; senio, aut tempestate afflictam summoueat, & inuicem nouellam sobolem substituatur. Id autem facile consequi poterit, si ulmorum seminarium paratum habuerit, quod, & quomodo, & qualis generis faciendū sit, non pigebit deinceps præcipere. Ulmorum duo esse genera conuenit, gallicum, & uernaculum, illud atinia, hoc nostras dicitur. Atiniam ulmum Tremellius Scrofa non ferre sameram (quod est semen eius arboris) falso est opinatus, nā rariore sine dubio creat, & icarco plerisq; & sterilis uidetur, seminibus inter frondem, quam prima germinatione edit, latentibus. Itaq; nemo iam ferit ex samera, sed ex sobolibus. Est autem ulmus longe latior, &

procerior, quam nostras, frondemq; incundiozem bubus præbet, qua cum assidue pecus alueris, & postea generis alterius frondẽ dare institueris, fastidium bubus affert. Itaq; si fieri poterit, totũ agrum genere uno atiniæ ulmi conferemus. Si minus, dabimus operam, ut in ordinibus disponendis pari numero uernaculas, et atinias alternemus, ita semper mista frõde utemur, et quasi hoc condimento illectæ pecudes fortius instæ abarioz conficient. Sed uitem maxime opulus uidetur alere, deinde ulmus, post etiã fraxinus. Opulus, quia raram, neq; idoneam frondem pecori p̃bet à plerisq; repudiata est. Fraxinus, quæ capris, & ouibus gratissima est, nec inutilis bubus, locis asperis, uel mōtosis, quibus minus letatur ulmus, recte seritur. Ulmus, quod & uitem commodissime patitur, & incundissimum pabulum bubus affert, uarijsq; generibus soli prouenit, à plerisq; reseritur. Itaq; cui arbutum nouum instituere cordi est, seminaria ulmorum, uel fraxinorum parentur ea rōne, quam deinceps subscripsimus, nam opuli melius cacuminibus in arbutis protinus deponuntur. Igitur pingui solo, & modice humido bipalio terram pastinabimus, ac diligenter occatam, & resolutam, uerno tempore in aream componemus. Sameram deinde, quæ iam rubicundi coloris erit, & cōpluribus insolata diebus iacuerit, ut aliquem tamen succum, & lentorem habeat, iniiciemus areis, & eas totas seminibus spisse contegemus, atq; in cribro putrem terram duos alte digitos incernemus, & modice rigabimus, stramentisq; areas cooperiemus, ne prodeuntia cacumina seminum ab auibus prærodantur. Vbi deinde proreperint plantæ, stramenta colligemus, & manibus herbas carpemus, idq; leniter, & curiose faciendum est, ne adhuc teneræ, breuesq; radiculæ ulmoz conuellantur, atq; ipsas qdẽ areas ita anguste compositas habebimus, ut qui rûcaturi sunt, medias partes earum facile manu contingant, nã si latiores fuerint ipsis seminibus, quæ proculcata erũt, noxam capient. Aestate deinde prius q̃ sol oriatur, aut ad uesperum, seminaria cōspergi potius, q̃ rigari debent, & cū ternum pedum plantæ fuerint, in aliud seminarium transferri, ac ne radices altius agant (quæ res postmodum in eximendo magnum laborem affert, cum plantas in aliud seminarium transferemus) oportebit nō maximos scrobiculos sequi pede inter se distantes fodere. Deinde radices in nodum si breues, uel in orbem toronæ similem, si longiores erunt, inflecti, &

oblitas fimo bubulo scrobiculis deponi, ac diligenter circunculca-
ri. Possunt etiam collectæ cum stirpibus plantæ eadem ratione di-
sponi, quod in atinia ulmo fieri necesse est, quæ non seritur è same-
ra. Sed hæc ulmus autumnī tēpore melius, q̄ uere disponit, pau-
latimq; ramuli eius manu detorquentur, quoniam primo biēnio,
ferri reformidat ictum, tertio demum anno acuta falce abradit,
atq; ubi trāslationi iam idonea est, ex eo tempore autumnī, quo
terra imbris permaduerit, usq; in uernum tempus ante, q̄ ra-
dix ulmi in eximendo delibretur, recte seritur, igitur in resoluta
terra ternum pedum quoquoersus faciendi scrobes, at in densa,
sulci eiusdem altitudinis, qui arbores recipiant preparandi, sed
deinde in solo rosido, & nebuloso conserendæ sunt ulmi, ut earū
rami ad orientem, & in occidentem dirigātur, quo plus solis me-
diæ arbores, quibus uitis applicata, & religata innititur, accipi-
ant. Quod si etiam frumentis consulemus, uberi solo intra qua-
draginta pedes, exili ubi nihil seritur intra uiginti arbores dispo-
nantur. Cum deinde adolescere incipient, falce formandæ, et tabu-
lata instituenda sunt. Hoc enim nomine usurpant agricolæ ra-
mos, truncosq; prominentes, eosq; uel propius ferro compescunt,
uel longius promittunt, ut uites laxius diffundantur. Hoc in so-
lo pingui, melius illud in gracili. Tabulata inter se ne minus ter-
nus pedibus absint, atque ita formentur, ne superior ramus in ea-
dem linea sit, qua inferior, nam demissum ex eo palmitem ger-
minantem inferior atteret, & fructum decutiet. Sed quacunque
arborem seueris, eam biennio proximo putare non oportet.
Post deinde si ulmus exiguum incrementum recipit, uerno tempo-
re ante quā librum demittat, decacuminanda est iuxta ramu-
lum, qui uidebitur esse nitidissimus, ita tamen uti supra cū trūco
stirpem dodrantalem relinquant, ad quam ductus, & applicatus
ramus alligetur, & correptus cacumen arbori præbeat. Deinde
stirpem post annum præcidi, & allenari oportet, quod si nullum
ramulum arbor idoneū habuerit, sat erit nouem pedes à terra re-
linqui, et superiorem partem detrūcari, ut nouæ uirgæ, quas eni-
serit, ab iniuria pecoris tutæ sint, sed si fieri poterit, uno ictu arbo-
rem præcidi, si minus, serra defecari, et plagā falce allenari opor-
tebit, eamq; plagā luto paleato cōtegi, ne sole, aut pluuijs infeste-
tur. Post annū, aut biennium, cū enati ramuli recte cōualuerint,
supernacuos deputari, et idoneos in ordinem summitti cōueniet.

Quæ ulmus à positione bene prouenerit, eius summæ uirgæ salcæ
 debent enodari, at si robusti ramuli erunt, ita ferro amputetur,
 ut exiguam stirpem prominentem trunco relinquant. Cū deinde
 arbor conualuerit, quicquid salcæ contingi poterit, exputandum
 est, allenandumq; eatenus, ne plaga corpori matris applicetur.
 Ulmum aut nouellam sic formare cōueniet, loco pingui octo pe-
 des à terra, sine ramo relinquēdi, uel in aruo gracili septē pedes,
 supra quod spatium deinde per arcuitū in tres partes arbor diui-
 denda est, ac tribus lateribus singuli ramuli submittendi, primo
 tabulato assignent, mox de ternis pedibus superpositis, alij rami
 submittendi sunt, ita ne usdem lineis, quibus in superiore positi
 sint, in eademq; rōne usq; in cacumen ordinanda erit arbor, atq;
 in frondatione cauendum, ne aut prolixiores pollices fiant, qui ex
 amputatis uirgis relinquunt, aut rursus ita allenentur, ne ipse
 truncus lædatur, aut delibret, nam parum gaudet ulmus, quæ in
 corpus nudat, uitandumq; ne de duabus plagis una fiat, cū ta-
 lem cicatricem nō facile cortex cōprehendat. Arboris aut perpe-
 tua cultura est, non solum ante diligenter eadē disponere, sed et
 truncum arcusodere, & quicquid frondis enatum fuerit, alternis
 annis aut ferro amputare, aut astringere, ne æmula umbra uiti
 noceat. Cū deinde arbor uetustatem fuerit adeptā, ppter ramū
 uulnerabit ita, ut excauet usq; in medullā, qua sit exitus humo-
 ri, quem ex superiore parte conceperit, uitam quoq; ante q̄ ex toto
 arbor praeualeat, conferere cōuenit, at si teneram ulmū marita-
 ueris, nouam sufferet, si uetustam uitam applicueris, coniungem ne-
 cabit, ita sibi pares esse ætate, & uiribus arbores, uitesq; cōuenit.
 Sed arboris maritandæ cā scrobis uiniradiā fieri debet, latus pe-
 des duos, altus leui terra, totidem pedū, graui, dupondio, & do-
 drante, lōgus pedes sex, aut minimū quinq;. Absit aut hic ab ar-
 bore ne minus sexquipedali spatio, nā si radicibus ulmi iunxeris,
 male uitis comprehendet, & cū tenuerit, incremento arboris oppri-
 metur. Hunc scrobem, si res pmittit, autūno facito, ut pluuijs, &
 geliadijs maceret. Circa uernum deinde æquinoctium binæ uites
 quo celerius ulmū uestiant, pedem inter se distantes scrobibus de-
 ponendæ cauēdumq; ne aut septentrionalibus uentis, aut rorulen-
 te, sed siccæ serant. Hanc obseruationē nō solum in uitiū positio-
 ne, sed in ulmox, ceterarumq; arborum præcipio, & uti cū de se-
 minario eximunt, rubrica notet una pars, quæ nos admoneat,

e aliter arbores constituamus, q̄ quemadmodum in seminario
 tenerint. Plurimum enim refert, ut eam partem cœli spectet, cui
 ibi tenero consueverunt. Melius autem locis apricis, ubi cœli sta-
 us, neq; prægélidus, neq; nimium pluuius est, autumnī tpe, &
 arbores, & vites post æquinoctium deponuntur. Sed eæ ita conse-
 rēdæ sunt, ut summam terram, quæ aratro subacta sit, semipedē
 alte substernamus, radicesq; omnes explicemus, & depositas ster-
 coremus (ut ego existimo) si minus, terra subacta operiamus, et
 circūcalcemus ipsum seminis codicem. Vites in ultimo scrobe de-
 poni oportet, materiasq; earum per scrobē porrigi, deinde ad ar-
 borem erigi, atq; ab iniuria pecoris caueis emuniri. Locis autē
 feruidis semina septentrionali parte arbori applicanda sunt, lo-
 cis frigidis à meridie, tēperato statu cœli, aut ab oriente, aut ab
 occidente, ne toto die solem, uel umbrā patiātur. Proxima dein-
 de putatione melius existimat Celsus ferro abstineri, ipsosq; coles
 in modū coronæ contortos arbori circundari, ut flexura materias
 profundat, quarū ualidissimam sequente anno caput uitis facia-
 mus. Me aut longius docuit usus, multo utilius esse primo quoq;
 tēpore falcem uitibus ad mouere, nec superuacuis sarmentis pati
 syluēscere, sed eam quoq; quæ primo summittetur, materiā ferro
 coercedam censeo usq; in alterā, uel tertiā gemmā, quo robustio-
 res palmites agat, qui cum primū tabulatum apprehenderint,
 proxima putatione disponetur, omnibus annis alioquin in supe-
 rius tabulatum excitabitur relicta semper una materia, quæ ap-
 plicata trunco cacumen arboris spectet. Iamq; uiti cōstitutæ cer-
 ta lex ab agricolis imponitur, pleriq; ima tabulata materijs fre-
 quentant uberiores fructum, et magis facilem cultum sequentes.
 At qui bonitati uini student, in summas arbores uitem pmouēt,
 ut quæq; materiæ se deuectæ in celsissimū quenq; ramū extēdunt,
 sic ut summa uitis summam arborē sequatur, idest, ut duo palmi-
 tes extremi trunco arboris applicent, qui cacumen eius spectent,
 & prout quisque ramus conualuit, uitem accipiat. Plenioribus
 ramis plures palmites alius ab alio separati imponantur, gra-
 lioribus pauciores, uitisq; nouella tribus toris ad arborē religer-
 tur, uno, qui est in crure arboris à terra quatuor pedibus distās,
 altero, qui summa parte uitem capit, tertio, qui mediā uitem cō-
 plectitur. Torum imū imponi tum oportet, cū uires uiti adiuuit,
 interdū. n. necessarius habetur, cum aut arbor sine ramis trūcata

est aut vitis pualens in luxuriam euagatur. Cetera putatiōis rō
 talis est, ut ueteres palmites, quibus pximi anni fructus pepēdit,
 omnes recidantur, noni arcuāsis undiq; capreolis, & nepotibus,
 qui ex his nati sunt, amputati cōmittantur, & si leta uitis est, ul
 timi potius palmites per cacumina ramoꝝ præcipitentur, si gra
 tilis, trunco proximis, si mediocris, medijs, quoniam ultimus pal
 mes plurimum fructum affert, proximus nimiū, uitemq; exhau
 rit, atq; attenuat. Maxime aut pdest uitibus, omnibus annis re
 solui, nam & cōmodius enodantur, & refrigerātur, cum alio lo
 co alligatae sunt, minusq; læduntur, ac melius conualescūt. Atq;
 ipsos palmites ita tabulatis superponi conuenit, ut à tertia gem
 ma, uel quarta religati dependeant, eosq; non constringi, ne sar
 mentum uimine præidatur. Quod si ita lōge tabulatum est, uti
 materia parum cōmode in id perducī possit, palmitem ipsum ui
 ti alligatum supra ternam gemmam religabimus. Hoc ideo fieri
 præcipimus, quia quæ pars palmitis præcipitata est, fructu indui
 tur, at quæ uinculo adnexa sursum tendit, ea materias sequente
 anno præbet. Sed ipsorum palmitum duo genera sunt, alterum,
 quod ex duro prouenit, quod quia primo anno plerunq; frōdem
 sine fructu affert, pampinarium uocant, alterum, quod ex anni
 culo palmite procreatur, quod, quia protinus creat, fructuariū
 appellant, cuius ut semper habeamus copiam in uinea, palmi
 tis partes ad tres gemmas religandæ sunt, ut quicquid intra uin
 culum est, materias exigat. Cum deinde annis, & robore uitis cō
 ualuit, traduces in proximam quāq; arborem mittendæ, easq; post
 bienniū amputare, simulatq; alias teneriores transmittere conue
 nit, nam uetustate uitem fatigant, nōnunquam etiam cum arbo
 rem totam uitis cōprehendere nequit, ex usu fuit partem aliquā
 eius deflexā terræ immergere, et rursus ad eandem arborē duas,
 uel tres propagines excitare, quo pluribus uitibus circumuenta cē
 lerius uestiatur. Viti nouellæ pampinarium dimitti nō oportet,
 nisi necessario loco natus est, ut uiduum ramum maritet, ueteri
 bus uitibus loco nati palmites pampinarij utiles sunt, & pleriq;
 ad tertiam gemmam resecti optime submittantur, nam in sequen
 ti anno materias fundūt. Quisquis aut pampinus loco natus in
 exputando, uel alligando fractus est, modo ut aliquā gemmam
 habuerit, extolli non oportet, qm̄ proximo anno uel ualidiorem
 materiā ex una creabit. Præcipes palmites dicuntur, qui de hor

notinis uirgis enati in duro alligantur, hi plurimum fructus afferunt, sed plurimum matri nocent. Itaque nisi extremis ramis, aut si uitis arboris cacumen superauerit, præcipitari palmitem non oportet. Quod si tamen id genus colis propter fructum summittere quis uelit, palmitem intorqueat. Deinde alliget, et præcipitet, nam et post eum locum, quem intorseris, lætam materiam citabit, et præcipitata minus uirium in se trahet, quamuis fructu exuberet. Præcipitem uero plus anno pati non oportet. Alterum est genus palmitis, quod de nouello nascitur, et in tenero alligatum dependet, (materiam uocamus) ea et fructum, et noua flagella bene procreat, et iam si ex uno capite duæ uirgæ summittantur, tamen utraq; materia dicitur. Nam pampinarius quam uini habeat, supra docui. Focaneus est, qui inter duo brachia uelut in furca de medio nascitur, eum colem deterrimum esse cõperi, quod neque fructum ferat, et utraq; brachia inter quæ natus est, attenuet, itaque tollendus est. Plerique uitem ualidam, et luxuriosam falso crediderunt feraciorem fieri, si multis palmitibus submissis oneretur, nam ex pluribus uirgis plures pampinos creat, et cum se multa fronde cooperit, peius defloret, nebulasque, et rores diutius continet, omnemque uiam perdit. Validam ergo uitem in ramos diducere censeo, et traducibus dispergere, atque diradiare, ceterosque uineariorum coles præcipitare, et si nimis luxuriabitur, solutas materias relinquare, ea ratione uitem feraciorem facere. Sed ut densum arbutum commendabile fructu, et decore est, sic ubi uetustate rarefuit, pariter inutile, et inuenuitum est. Quod ne fiat diligentis patrisfamilias est primam quamque arborem senio defectam tollere, ut in eius locum nouellam restituere uitem queat, nec tam uini radice frequentare (ea et si sit facultas) quam (quod est longe melius) ex proximo propagare, cuius utriusque ratio consimilis est ei, quam tradidimus. Atque hæc de Italico arbusto satis præcepimus.

De Arbusto gallico.

Cap. VII.

EST et alterum genus arbuti gallici, quod uocatur rumpotinum. Id desiderat arborem humilem, nec frondosam. Cui rei maxime uidetur idonea opulus. Ea est arbor corno similis, quæ etiam cornus, et carpinus, et ornus, nonnunquam et salix à plerisque in hoc ipsum disponitur. Sed salix nisi in aquosis locis, ubi aliæ arbores difficaliter cõprehendunt, ponenda non est, quia uini saporem infestat.

Potest etiam ulmus sic disponi, ut adhuc tenera decumines, ne altitudinem quindecim pedum excedat. Nam ferè ita cōstitutum rompotinetum animaduerti, ut ad octo pedes locis siccis, et clinosis, ad duodecim locis planis, et uliginosis tabulata disponantur. Plerumq; aut ea arbor in tres ramos diuiditur, quibus singulis ab utraq; parte cōplura brachia summittuntur, tum oēs penè uirgæ ne umbrent eo tempore, quo uitis putatur, abraduntur, arboribus rompotinis si frumentum non inseritur, in utrāq; partem uiginti pedum spatia interueniunt. At si segetibus indulgetur, in alteram partem quadraginta pedes, in alterā uiginti relinquuntur. Cetera simili ratione atq; in arbusco ita lico administrantur, ut uites longis scrobibus deponantur, ut eadem diligentia curetur, atq; in ramis deducatur, ut noui traduces oībus annis inter se ex arboribus proximis connectantur, et ueteres decidantur. Si tradux traducem nō cōtingit, media uirga inter eas deligetur. Cum deinde fructus pōdere urgebit, subiectis administrandis sustineatur. Hoc aut genus arbusci, ceteraq; omnes arbores quanto altius arantur, et circumfodiuntur maiore fructu exuberant, quod an expediat patrifamilias facere cultus docet.

De generibus olearum.

Cap. VIII.

OMNIS tamen arboris cultus simplicior, q̄ uinearum est, longeq; ex omnibus stirpibus minorem impensam desiderat olea, quæ prima omnium arborum est, nam quamuis nō continuis annis, sed ferè altero quoq; fructu afferat, eximia tamen eius ratio est, quod leui cultu sustinetur, et cum se non induit, uix ullam impensam possit, sed et si quam recipit, subinde fructus multiplicat, neglecta cōpluribus annis non ut uinea desiat, eoq; ipso tempore aliquid etiam interim patrifamilias præstat, et cum adhibita cultura est, uno anno emendatur. Quare etiā nos in hoc genere arboris diligenter præcipere censuimus. Olearū, sicut uitium, plura genera esse arbitror, sed in meam notitiam decem modo peruenierūt. Pausia, algiana, lianiana, sergia, neuia, culminia, orchis, regia, cirātes, murtea. Ex quibus bacca iucundissima est pausia, speciosissima est regia, quæ potius escæ q̄ oleo est idonea. Pausia tamen oleum saporis egregij, dum uiride est, uetustate corrumpitur. Orchis quoq; et radius melius ad escā, q̄ in liquore stringitur. Oleum optimū liania dat, plurimū sergia, omnisq; olea, et maior

et maior ferè ad escā, minor oleo est aptior. Nulla ex his generibus, aut perferuidum, aut gelidum statum cœli patitur. Itaque æstuosus locis septentrionali colle, frigidis meridiano gaudet. Sed neq; dep̄ssa loca, neq; ardua, magisq; modicos cliuos amat, quales in Italia Sabinorum, uel tota puincia Bætica uidemus. Hæc arborem pleriq; existimant ultra miliarium sexagesimum à mari, aut non uiuere, aut non esse feracem. Sed in quibusdam locis recte ualet. Optime uapores sustinet pausia, frigus sergia. Aptissimum genus terræ est oleis, cui glarea subest, si superposita creta sabulo admista est. Non minus pbabile est solum, ubi pinguis sabulo est. Sed et densior terra, si uuida, et læta est, cōmode recipit hanc arborem. Creta ex toto repudianda est, magis etiam scaturiginosa, et in qua semper uligo consistit. Inimicus est et ager sabulo mæcer, et nuda glarea. Nam et si non emorit in eiusmodi solo, nunquā tamen conualescit. Potest tamen in agro frumentario feri, uel ubi arbutus, aut ilex steterant. Nam quercus etiam excisa radices noxias oliueto relinquit, quarum uirus enecat oleā. Hæc in uniuersum de toto genere huius arboris habui nobis dicere. Nunc per partes culturam eius exequar.

De seminarijs oliuarum faciendis.

Cap. IX.

SEMINARIUM oliueto præparetur cœlo libero, terreno modicè ualido, sed succoso, neq; denso, neq; soluto solo, potius tñ resoluto. Id genus terræ ferè nigra est, quam cum in tres pedes pastaaueris, et alta fossa circundederis, ne aditus pecori detur fermentari finito. Tum ramos nouellos proceros, et nitidos, quos cōprehensos manus possit arcūuenire, hoc est manubrij crassitudine feracissimos arboribus adimito, et ex his quamrecentissimas tales as recidito, ita ut ne corticem, aut ullam aliam partem, q̄ q̄ serra præciderit, lædas. Hoc autem facile contingit, si prius uaram feceris, et eam partem, supra quam ramum secaturus es, fœno, aut stramentis texeris, ut molliter, et sine noxa corticis taleæ superpositæ secantur. Taleæ deinde sesquipedales serra præcidantur, atq; earum plagæ utraq; parte falce leuentur, et rubrica notentur, ut sic quemadmodum in arbore steterat ramus, ita parte ima terrā et cacumine cœlum spectans deponatur. Nam si inuersa mergatur, difficulter comprehendet, et cum ualidius conualuerit, sterilis in perpetuum erit. Sed oportebit talearum capita, et imas

Colu.

COLVMELLAE.

partes misto fimo cū cinere oblinire, & ita totas eas immergeri, ut putris terra quatuor digitis alte superueniat. Sed binis indiabus ex utraq; parte humantur. Hi sunt de qualibet arbore breui spatio iuxta eas positi, & in summa parte inter se uinculo cōnexi, ne facile singuli deiciantur. Hoc facere utile est propter fossorū ignorantia, ut cum bidentibus, aut sarculis seminariū colere institueris, depositæ talæ non ledant. Quidam melius existimāt ex radicū oculis siluestriū olearū hortulos excolere, & chorda simili rōne disponere, sed utrūq; debet post uernū æquinoctiū seri, & quā frequentissime seminarium primo anno sarriri, postero, & sequētib; cum iam radiculæ seminum conualuerint, rastris excoli. Sed biennio à putatione abstineri, tertio anno singulis seminibus binos ramulos relinqui, & frequenter sarriri seminariū conueniet. Quarto anno ex duobus ramis infirmior amputandus est, sic ex cultæ quinquennio arbusculæ habiles translationi sunt. Plantæ aut in oliueto disponuntur optime siccis, minimeq; uliginosis agris per autūnum, letis, & humidis uerno tpe paulo ante q̄ germinant. Atq; ipsis scrobes quaternum pedum præparantur anno ante, uel si tempus non largitur, prius q̄ deponantur arbores, stramentis incendantur scrobes, ut eos ignis putres faciat, quos sole, & pruina facere debuerat. Spatium inter ordines minimum esse debet pingui, & frumentario solo sexagenum pedum in alteram partem, atq; in alterā quadragenū, macro, nec idoneo segetibus quidem, & uicenum pedum. Sed in fauonium dirigi ordines cōuenit, ut æstiuo proflatu refrigerētur. Ipsæ aut arbusculæ hoc modo possunt transferri, ante q̄ explantes arbusculam, rubrica notato partem eius, quæ meridiem spectat, ut eodem modo, quo in seminario erat, deponatur. Deinde ut arbusculæ spatium pedale in circuitu relinquatur, atq; ita cum suo cespite planta eruat. Qui cespes in eximendo ne resoluiatur, modicos furculos uirgarum inter se connexos facere oportet, eosq; pilæ quæ eximitur, applicare, & uiminibus ita innectere, ut cōstricta terra uelut inclusa teneatur. Tum subruta parte ima leniter pilam cōmouere, & suppositis uirgis alligare, atque plantā transferre. Quæ ante q̄ deponatur, oportebit solum scrobis iniū fodere bidentibus, deinde terrā aratro subactam (si tamē pinguior erit summa humus) immittere, & ita ordeī semina substernere, et si constet in scrobibus aqua, ea omnis haurienda est ante, q̄

demittantur arbores. Deinde ingerendi minuti lapides, uel glarea mista pingui solo, depositisq; seminibus latera scrobis circumcidenda, & aliquid stercoris interponendum. Quod si cū ea terra planta non cōuenit, tum optimū est omni fronde priuare truncum, atq; leuatis plagis, fimoq; & cinere oblitis in scrobem, uel sulcum deponere. Truncus aut aptior translatiōi est, qui brachij crassitudinem habet. Poterit. n. longe maioris incrementi, & robustioris transferri, quem ita cōuenit poni, ut si non periculum à pecore habeat, exiguus admodū supra scrobem enineat, latius enim frondet. Si tñ incursus pecoris aliter uitari non poterit, celsior truncus cōstituetur, ut sit innoxius ab iniuria pecorē. Atq; et rigandæ sunt plantæ, cū siccitates incesserunt, nec nisi post biennium ferro tangendæ, ac primo furculari debent, ita ut simplex stylus altitudinem maximi scrobis excedat. Deinde arādo ne coram bos, aliam ue partē corporis offendat. Optimū est et cōstitutis plantas circummunire caueis, deinde constitutum iā, & maturum oliuetum in duas partes diuidere, quæ alternis annis fructu induantur, neq; enim olea continuo biennio uberat. Cū subiectus ager consitus nō est, arbor coliculum agit, cum seminibus repletur, fructum affert, ita sic diuisum oliuetum omnibus annis æqualem redditum adfert. Sed id minime bis anno arari debet, et bidentibus alte circūfodiri. Nā post solstitiū cum terra æstibus hiat, curandum est, ne per rimas sol ad radices arborē penetret. Post æquinoctiū autumnale ita sunt arbores ablaqueandæ, ut à superiore parte, si olea in clino sit, in alia exantē, quæ limosam aquā ad codicē deducāt. Omnis deinde soboles, quæ ex imo stirpe nata est, quotānis extirpāda est, ac tertio quoq; fimo uel pabulandæ sunt oleæ. Atq; eadem rōne stercorabit oliuetum, quā in secundo libro pposui, tñ segetibus prospicietur. Ac si ipsis tantūmodo arboribus satis seruaueris, singulis stercoris caprini sex librae, stercoris siccū modij singuli, uel amurcæ in singulis congius. Stercus autūno debet inuci, ut pmissum hyemi radices oleæ calefaciat. Amurca ualētibus infundēda est, nā p hyemē si uermes, atq; alia suberūt aīalia, hoc medicamento necant. Plerunq; et locis siccis, & humidis arbores musco infestant, quem nisi ferramento reseueris, nec fructum, nec latam frondem olea inducet. Quinetiā cōpluribus interpositis annis oliuetum putandū ē, nā ueteris puerbū meminisse cōuenit. Eum, q aret oliuetū, rogare.

fructum, qui stercoret, exorare, qui cadat cogere. Quod tamē satis erit octavo anno fecisse, ne fructuarij rami subinde amputentur. Solent etiam quis lætæ arbores fructum non afferre. Eas terebrari gallica terebra conuenit, atq; ita in foramen uiridem taleæ oleastri demitti, sic uelut inita arbor fecundo semine fertilior ex-
tet. Sed & sine ablaqueatione adiuuanda est amurca insulsa cū
suilla, uel nostra urina uetere, cuius utriusq; modus seruat. Nā
maximæ arbori, ni tantūdem aquæ miscetur, urna abūde erit.
Solent ēt uitia soli fructū oleæ necare, cui rei sic medebimur. Al-
tis gyris ablaqueabimus eas, deinde calis pro magnitudine arbo-
ris plus, minus uel circūdabimus, sed minima arbor modicū po-
stulat. Hoc remedio si nihil fuerit effectum, ad præsidium infitio-
nis confugiendum erit. Quemadmodum autem olea inserenda
sit, postmodum dicemus. Nonnunquam etiam in olea unus ra-
mus ceteris aliq̃to est lætior, quem nisi recideris, tota arbor cōtri-
stabitur. Ac de oliuetis hætenus dixisse satis est. Superest ratio po-
miferarum arborum, cui rei deinceps præcepta dabimus.

De arboribus pomiferis.

Cap. X.

LOCVM pomarij, prius q̃ semina seras, circūmunire maceris
oportet uel sepe, uel fossa præcipiti, ut non solum pecori, sed et ho-
mini transitum negare ualeat, quoniam si sæpius cacumina ho-
minis manu tractata, aut à pecoribus prærosa sunt, in perpetuū
semina incrementum capere nequeunt. Generatim autem dispo-
nere arbores utile est, maxime etiam ne imbecilla à ualentiore præ-
matur, quia nec uiribus, nec magnitudine par est, impariq; spatio
temporis adolescit. Terra, quæ uitibus apta est, etiam arboribus
est utilis. Ante annum, q̃ seminare uoles, scrobem fodito, ita sole,
pluujs uel macerabitur, & quod positum est, cito comprehendet.
At si eodem anno & scrobem facere, & arbores serere uoles, mi-
nimum ante duos menses scrobes fodito, postea stramentis incen-
sis calefacto, quos si latiores, patentioresq; feceris, lætiores, uberio-
resq; fructus perapiēs. Sed scrobis clibano similis fiat, cuius imū
summo patentius est, ut laxius radices uagentur, ac minus frigo-
ris hyeme, minusq; æstate uaporis per angustum os penetret etiā
ut cliuosis locis terra, quæ in eū congesta est, à pluuijs non abluat-
ur. Arbores raris interuallis serito, ut cū creuerint, spatium habe-
ant, quo ramos extendant, nam si spisse posueris, nec infra serere

quid poteris, nec ipsæ fructuosæ erunt, nisi interuulseris. Itaque inter ordines quadragenos pedes, minimumq; tricenos relinquere conuenit. Semina lege crassa, non minus, q̄ manubrium bidētis, recta, lenia, proœra, sine ulceribus, integro libro, ea bene, & celeriter cōprehendent. Si ex ueteribus ramis sumes, de ijs quoq; qui quotānis bonos, & uberes fructus afferūt, eligito, ac illos magis, qui sunt contra solem, q̄ qui umbris, rariis, aut plantis continentur. Sed ante q̄ arbusculas transferas, nota quibus uentis antea fuerant constitutæ, postea manus admoneto, ut de cliuo, & sicco in humidum agrum transferas. Trifurcam maxime ponito. Ea extet minime tribus pedibus. Si eodem scrobe duas, aut tres arbusculas uoles constituere, curato, ne inter sese contingant, qm̄ mutuo contactu aut computrescent, aut uermibus interibunt. Cum semina depones, dextra, sinistraq; usq; in inum scrobem fasciculos sarmetorum brachij crassitudinis demittito, ita ut supra terram paululum extent, per quos æstate paruo labore aqua radiabus sumministrare possis. Arbores, ac semina cum radiabus autumno serito, hoc est circa Calendas, et Idus Octobris. Primo uere ante q̄ germinent, arbores, deponito, ac ne tinea molesta sit seminibus ficulneis, in inuū scrobem lentisæ taleam inuerso cacumine demittito. Ficum frigoribus ne serito. Loca aprica, calculosa, glareosa, interdum & saxosa amat. Eiusmodi arbor cito cōualescit, si scrobes amplos, patenteq; feceris. Ficorū genera, & si sapore, atq; habitu distant, uno modo, sed pro differentia agri, serunt. Locis frigidis autumnī temporibus, & aquosis præcoques ponito, ut ante pluuiā fructum deligas. Locis calidis hybernæ serito. At si uoles ficum, quāuis non natura, seram facere, tum grossulos, priorem ue fructum decutito, iterum alterum edet, quē in hyemem differet. Nonnunquam etiam, cum frondere cœperunt cacumina sic, ferro summa prodest amputare, sic firmiores arbores, & feraciores fiunt. Ac semper conueniet, simul atq; folia agere cœperint ficus, rubricam amurca diluere, & cum stercore humano ad radicem infundere. Ea res efficit uberiorem fructum, et sacrum sic pleniorē, ac meliorem. Serendæ sunt autem præcipue liuianæ, africanæ, caladicæ, sulcæ, lydiæ, callistrutiæ, topiæ, rhodiæ, libycæ, hybernæ, omnes etiam biferae, & triferae flosculi. Nucem græcam serito circa Calen. Febr. quæ prima gemmasit. Agrum durum, calidum, sicum desyderat, nam in locis diuersis

COLVMELLAE.

nucem si deposueris, plerumque putrescat. Ante quam nucem deponas,
 in aqua mulsa, nec nimis dulci macerato, ita iucundioris saporis
 fructum, cum adoleuerit, præbebit, et interim melius, atque celerius
 frondebit. Ternas nucas in trigonum statuito, ut nux a nucæ mini-
 me palmo absit, et anceps ad faonium spectet. Omnis autem nux
 unam radicem mittit, et simplicia stylo prorepat. Cum ad scrobis
 solum radix peruenit, duritia humi coarctata recuratur, et ex sum-
 mo duum ramorum ambas radices emittit. Nucem græcā, et auel-
 lanam, tarentinam facere hoc modo poteris. In quo scrobe desti-
 naueris nucas serere, in eo terrā minutam per modo semipedis po-
 nito, ibique semen ferulæ repangito, cum ferula fuerit enata, eam fin-
 dito, et in medulla eius sine putamine nucem græcā, aut auella-
 nam abscondito, et ita adobruito, hoc ante Calen. Mar. facto,
 uel et inter Nonas, et Idus Mar. Eodē tempore in glandem, et pi-
 neā, et castaneam serere oportet. Malū puniceū ab eodē tempore usque
 in Calen. Aprilis recte seritur, quod si acidum, aut minus dulce
 fructum feret, hoc modo emendabitur. Stercore suillo, et huma-
 no, urinaque uetere radices rigato, ea res et fertilem arborem red-
 det, et primis annis fructum uinosum, et post quinquennium dul-
 cem, et apirennum facit. Nos exiguum admodum laseris uino dilui-
 mus, et ita cacumina arboris summa oblenimus, ea res emenda-
 bit acorem malorum. Mala punica ne in arbore rumpantur, reme-
 dio sunt lapides tres, si, cum seres arborem, ad radicem ipsam col-
 locaueris. At si iam arborem, satam habueris, scillā secundū radi-
 cem arboris serito. Alio modo cum iam matura mala fuerint, an-
 te quam rumpantur, ramulos, quibus dependent, intorqueto, eodē mo-
 do seruabuntur incorrupta etiā toto anno. Pyrū autumno ante
 brumam serito, ita ut minime dies. XXV. ad brumam supersint,
 quæ ut sit ferax, cum adoleuerit, alte eam ablaqueato, et iuxta ip-
 sam radicem truncum findito, et fissurā cuneo tedæ pineæ adigi-
 to, et ibi relinquito, deinde absumpta ablaqueatione, cinerē su-
 pra terram iniato. Curandum est autem, ut quā generosissimis py-
 ris pomaria cōseramus. Ea sunt crustumina, regia, segnina, tarē-
 tina, quæ syria dicuntur, purpurea, superba, ordeacea, aniciāna,
 neniana, faoniana, lateritana, dolabelliana, turriniana, uole-
 ma, mulsa, præcoia, uenerea, et quedā alia, quorum enumeratio
 nunc longa est. Præterea malorum genera exquirenda maxime scā-
 dianā, matianā, orbiculatā, sextianā, pelusianā, amerinā, syri-

ca, melimela, cydonia, quorū genera tria sunt struthia, chrysomeliana, mustea. Quæ omnia nō solum uoluptatem, sed etiam salubritatem afferunt. Sorbi quoq; & armeniaci, atq; persici non minima est gratia. Et mala, sorba, pruna post mediā messē usq; in Idus Feb. serito. Mororū ab Idibus Feb. usq; ad æquinoctiū uernum satio est. Siliquam græcam, quā quidam *νεπέτιον* uocāt, et persicum ante brumā per autumnum serito. Amygdala si paucē feraxerit, forata arbore lapidem adiūcto, & ita librum arboris inolescere finito. Omnium autē generum ramos, circa Cal. Mar. in hortis subacta, & stercoreata terra supra puluinos arearū disponere conuenit. Danda est opera, ut dum teneros ramulos habēt, ueluti pampinentur, & ad unum stylum primo anno semina redigantur, & cum autumnus inceserit, ante q̄ frigus cacumina adurat, omnia folia decerpere expedit, & ita crassis arundinibus, quæ ab una parte nodos integros habeāt, uelut pileis induere, atq; sic à frigore, & geliadys teneras adhuc uirgas tueri. Post uigintiquatuor deinde menses siue transferre, & disponere in ordinem uoles, siue inferere, satis tute utrunq; facere poteris.

De insitione arborum.

Cap. XI.

OMNIS surculus omni arbori inferi potest, si nō est ei, cui inferitur, cortice dissimilis. Si uero etiam similem fructum, et eodē tempore affert, sine scrupulo egregie inferitur. Tria genera porro insitionum antiqui tradiderunt. Vnum, quo resecta, et fissā arbor resectos surculos accipit, alterum, quo resecta inter librum, & materiam semina admittit, quæ utraq; genera uerni temporis sunt, tertium, quo ipsas gemmas cum exiguo cortice in partem sui delibratam recipit, quam uocant agricolæ emplastrationem, uel, ut quidam, inoculationem. Hoc genus insitionis æstiuo tēpore optime usurpatur, quarum insitionum rationem cum tradiderimus, à nobis quoq; repertam docebimus. Omnes arbores simul atq; gemmas agere cœperint, luna crescente inferito, olinam autem circa æquinoctium uernum usq; in Idus Aprilis. Ex qua arbore inferere uoles, & surculos ad insitionem sumpturus es, uideto, ut sit tenera, & ferax, nodisq; crebris, & cū primū germina tumebūt de ramulis anniculis, qui solis ortum spectabūt, & integri erūt, eos legito crassitudine digiti minimi, surculi sint bifurci, uel trifurci. Arbore, quā inferere uoles, serra diligenter exsecato ea pre,

qua maxime nitida, et sine cicatrice est, dabisq; operā, ne librum lēdas. Cum deinde truncum recideris, acuto ferramento plagam leuato. Deinde cuneum tenue ferreum, uel osseum inter corticē et materiam ne minus digitos tres, sed considerate demittito, ne lēdas, aut rumpas corticē. Postea surculos, quos inserere uoles, falce acuta ex una parte deradito tantum, quantum cuneus demissus spatij dabit, atq; ita, ne medullas, ne ue alterius ptis corticē lēdas. Vbi surculos paratos habueris, cuneū uellito, statimq; surculos in ea foramina, quæ cuneo adactō inter corticē, et materiā feceris, demittito. Ea autem sine, qua adraferis, surculos sic inserito, ut semipede, nec amplius de arbore extent. Supra deinde muscum imponito, & ita ligato, ne pluuia dilabatur. Quosdam tñ magis delectat in trunco arboris locum seminibus serrare, insectasq; ptes tenui scalpello leuare, atq; ita surculos aptare. Si pusillā arborē inserere uoles, inuam absindito, ita ut sequipede è terra extet, & cū deinde præideris, plagam diligenter leuato, & medium truncum acuto scalpello permodicē findito, ita ut fissura digitorū trium sit in ea. Deinde cuneum, quo diducatur, inserito, & surculos ex utraq; parte derafos demittito, sic ut librum seminis libro arboris equalem facias. Cum surculos diligenter aptaueris, cuneum eximito, et arborem, ut supradixi, alligato. Deinde terrā circa arborem adaggerato usq; ad ipsum insitum. Ea res à uento, & calore maxime tuebit. Hoc tertiū genus insitionis, cum sit subtilissimum, non omni generi arborū idoneum est, sed ferè recipiunt talem insitionem, quæ humidū, succosumq; & ualidum librum habent, sicut ficus, nam & lactis plurimum mittit, & corticē robustū habet, optime itaq; inseritur caprifici ramus. Ex arbore, de qua inserere uoles, nouellos, & nitidos ramos eligito. In ysdemq; obseruato gemmam, quæ bene apparebit, certamq; spem germinis habebit. Eam duobus digitis quadratis circūsignato, ut gemma media sit, & ita acuto scalpello circūcidito, delibratoq; diligenter, ne gemmam lēdas. Postea item alterius arboris, quam emplastraturus es, nitidissimum ramentum eligito, & eiusdē spatij corticē circūcidito, & materiā delibrato. Deinde in eā partem, quā nudaueris, preparatū emplastrū aptato, ita ut alteræ delibratæ parti conueniat. Vbi ita hæc feceris, circa gemmam bene alligato, cauetoq; ne lēdas ipsum germen. Deinde cōmissuras, & uincula luto oblinito spatio relicto,

ut gemma libera uinculo non urgeatur. Arboris aut̃ insit̃e sobo-
lem, & ramos superiores prædito, nequid sit, quo possit succus
euocari, aut necui magis, q̃ insito seruiat. Post. XXI. diē soluto
emplastrum, & hoc genere optime etiam inseritur olea. Quar-
tum illud genus insitionis iam docuimus, cum de uitibus dispu-
tauimus, itaq; supernacuum est hoc loco repetere traditam ratio-
nem terebratiōis, sed cum antiqui negauerint posse omne genus
sirculorum in omnem arborem inseri, & illam quasi finitionem,
qua nos paulo ante usi sumus, ueluti quandam legem sanxerint,
eos tantum sirculos posse coalescere, qui sint cortice, ac libro, &
fructu consimiles ijs arboribus, quibus inseruntur, existimauimus
errorem huius opinionis discutiendum, tradendamq; posteris ra-
tionem, qua possit omne genus sirculi omni generi arboris inse-
ri. Quod ne longiore exordio legentem fatigemus, unum quasi
exemplum subiiciemus, quo possit omne genus sirculi omnibus
arboribus inseri. Scrobem quoque uersus pedum quatuor ab ar-
bore oliuæ tam longe fodito, ut extremi rami oleæ possint eā con-
tingere. In scrobem deinde sic arbusculam deponito, diligentiq;
adhibeto, ut robusta, & nitida fiat. Post triennium, cum iam sa-
tis amplum incrementum ceperit, ramum oliuæ, qui uidetur niti-
dissimus, deflece, & ad crus arboris ficulneæ religa, atq; ita am-
putatis cæteris ramulis, ea tantum cacumina, quæ inferere uoles,
relinque. Tum arborem sic detruncatā, plagamq; leuā, & mediā
cuneo finde. Cacumina deinde oliuæ, sicuti matri coherent, ex
utraq; parte abraide, & ita fissuræ sic infere, cuneumq; exime, di-
ligenterq; ramulos colliga, nequa uī renellantur. Sic interposito
triennio conualescet ficus cum olea, & tum demum quarto an-
no, cum bene coierint, uelut propagines, ramulos oliuæ à matre
rescabis. Hoc modo omne genus in oēm arborem inferes. At pri-
us q̃ finē libri faciamus, quā ferē species sirculorū omnium p̃secuti
sumus, prioribus libris, de cythiso dicere nunc tempestiuum est.

De Cythiso.

Cap. XII.

CYTHISVM in agro esse q̃ plurimum maxime refert, quod
gallinis, apibus, capris, bubus quoq; & omni generi pecudum
utilissimus est, quod ex eo cito pinguescit, & lactis plurimū præ-
bet onis, tum etiam quod octo mensibus uiridi eo pabulo uti, &

& postea arido possis. Præterea in quolibet agro, quis macerari-
 mo, celeriter comprehendit, omnem iniuriam sine noxa patitur.
 Mulieres quidem, si lactis inopia premuntur, cythysum aridum
 in aquam macerari oportet, & cum tota nocte permaduerit, pos-
 tero die expressi succi ternas heminas permisceri modico uino,
 atq; ita potandum dari, sic & ipsæ ualebunt, & pueri abūdan-
 tia lactis confirmabuntur. Satio autem cythysi uel autumnō cir-
 ca idus Octobr. uel uere fieri potest. Cum terram bene subegeris,
 areolas facito, ibiq; uelut ocymi semen cythysi autūno serito, plan-
 tas deinde uere disponito, ita ut inter se quoquoersus quatuor
 pedum spatia distent. Si semen non habueris, cacumina cythiso-
 rum uere deponito, & stercoratam terram circumaggerato. Si
 pluuia non inceserit, rigato quindecim proximis diebus, simul
 atq; nouam frondem agere cœperit, sarrito, & post triennium
 deinde cedito, & pecori præbeto. Equo abunde est uiridis pōdo.
 XV. bubus pondo uicena, cæterisq; pecoribus pro portione uiri-
 um. Potest etiam ante Septembrem satis commodè ramis cythi-
 sus feri, quoniam facile comprehendit, & iniuriam sustinet. Ari-
 dum si dabis, parius præbeto, quoniam uires maiores habet, pri-
 usq; aqua macerato, & exemptum paleis permisceto. Cythysum
 cum aridum facere uoles, circa mensem Septembrem, ubi semen
 eius grandescere incipiet, cedito, paucisq; horis, dum flaccescat,
 in sole habeto, deinde in umbra exiccato, & ita condito. Hacten-
 us de arboribus præcepisse abūde est, reddituro pecoris curam,
 & remedia sequenti uolumine.

LVCII IVNII MODERATI
COLVPELLAE DE RE
RVSTICA LIBER
SEXTVS.

CIO QVOSDAM PVBLI Sil-
uine prudentes agricolas pecoris, abnuisse cu-
ram, gregariorumq; pastorum uelut inimicā
professionis suae disciplinam constātissime res-
pudiassē. Neq; inficior id eos aliqua ratione
fecisse, quasi sit agricolae contrarium pastoris
propositum, cum ille quammaxime subactō,
& puro solo gaudeat, hic nouali, graminosoq; ille fructū ē ter-
ra speret, hic ē pecore. Ideoq; arator abominetur, at contra pa-
stor optet herbarum prouentum. Sed in his tam discordantibus
notis est tamen quaedam societas, atque coniunctio, quoniam &
pabulum ē fundo plerunq; domesticis pecudibus magis, q̄ alienis
depascere ex usu sit, & copiosa stercoratione, q̄ contingit ē gregi-
bus, terrestres fructus exuberare. Nec tamen ulla regio est, in
qua modo frumenta gignantur, quae non, ut hominum, ita ar-
mentorum adiumento iuuetur, unde etiam iumenta nomen à re
traxere, quod nostrum laborem uel onera subuectando, uel aran-
do iuuarent. Itaq; sicut ueteres Romani praeceperūt, ipse quoq;
censeo tam pecorum, q̄ agrorum cultum pernoscere. Nam in rui-
sticatione uel antiquissima est ratio pascendi, eademq; questuo-
sissima, propter quod nomina quoq; & pecuniae, & peculij tra-
cta uidentur à pecore, quoniam id solum ueteres possederunt, &
adhuc apud quasdam gentes unum hoc usurpatur diuitiarum
genus, & nunc apud nostros quidē colonos alia res uberior nul-
la est, ut etiam. M. Cato credidit, qui consulenti quā partē rei
rusticae exercendo celeriter locupletari posset, respondit, si bene
pasceret. Rursusq; interroganti quid deinde faciendo satis ube-
res fructus percepturus esset, affirmavit si mediocriter pasceret.
Ceterum de tam sapiente uiro piget dicere, quod eum quidā au-
ctores memorant, quid nam querenti cuidam tertium in agricul-
tatione questuosum esset, asseuerasse, si quis uel male pasceret, cū
presertim maius dispendium sequatur inertem, & insaum pa-
storem, quā prudentem, diligentemq; compendiū. De secundo.

tamen responso, dubium non est, quin mediocrem negligentiam domini fructus pecoris exuperet. Quam ob rem nos quoque hanc partem rei rusticae Siluinae quanta ualimus industria, maiorum secuti precepta, posteritati mandamus. Igitur cum sint duo genera quadrupedum, quorum alterum paramus in consortium operum, sicut bovem, mulam, equum, asinum, alterum uoluptatis, ac reditus, et custodiae causa, ut ouem, capellam, suem, canem, de eo genere primum dicemus, cuius usus nostri laboris est particeps, nec dubium, quin (ut ait Varro) ceteras pecudes bos honore superare debeat, praesertim autem in Italia, quae ab hoc nuncupationem traxisse creditur, quod olim graeci tauros τράλους uocarent, et in ea urbe, cuius moenibus codendis mas, et foemina aratro terminum signauerunt, uel ut pecus, quod item Athenis Cereris, et Triptolemi fertur minister, quod inter fulgentissima sidera particeps caeli, quod deinde laboriosissimus adhuc hominis socius in agricultura, cuius tanta fuit apud antiquos ueneratio, ut tam capitale esset bovem necasse, quam canem. Ab hoc igitur promissi operis capiamus exordium.

De bubus parandis, atque emendis, earumque forma. Cap. I.

QVAE in emendis bubus sequenda, quaeque uitanda sint, non ex facili dixerim, cum pecudes pro regionis, caeli, statu et habitu corporis, et ingenii animi, et pili colorem gerant. Aliae formae sunt asiaticae, aliae gallicae, epiroticae aliae, nec tamen diuersitas prouinciarum, sed ipsa quoque Italiae partibus suis discrepat. Capania plerumque boues progenerat albos, et exiles, labori tamen, et culturae patrij soli non inhabiles. Umbria uastos, et albos, eademque rubros, nec minus probabiles animis, quam corporibus. Hetruria, et Latium compactos, sed ad opera fortes. Apenninus durissimos, omnemque difficultatem tolerantibus, nec ab aspectu decoros. Quae cum tam uaria, et diuersa sint, tamen quaedam quasi communia, et certa precepta in emendis iuuenis arator sequi debet, eaque Mago Carthaginiensis ita perdidit, ut nos deinceps memorabimus. Paradi sunt boues nouelli, quadrati, gradibus membris, cornibus proceris, ac nigrantibus, et robustis, fronte lata, et crassa, hirtis auribus, oculis, et labiis nigris, naribus resimis, patulisque, ceruice longa, et torosa, palea ribus aequalis, et penae ad genua permissis, pectore magno, armis uastis, capiti, et tamquam implete utero, lateribus porrectis, lumbis latis, dorso

recto, planoq; uel etiam subsidente, clunibus rotundis, cruribus compactis, ac rectis, sed breuioribus potius, q̄ lōgis, nec genibus improbis, ungulis magnis, caudis lōgissimis, et setosis, pilosisq; corpore denso, breuiq; colore rubeo, uel fusco, tactu corporis molissimo.

De bubus domandis.

Cap. II.

TALIS notæ uitulos oportet, cum adhuc teneri sunt, consue scere, manu tractari, ad præsepia religari, ut exiguus in domitura labor eorum, & minus sit periculi. Verum neq; ante tertium, neq; post quintum annum iuencos domari placet, qm̄ illa ætas adhuc tenera est, hæc iam prædura. Eos aut, qui de grege feri cōprehenduntur, sic subigi conuenit. Primum omnium spatiosum stabulum præpare, ubi domitor facile uersari, & unde egredi sine periculo possit. Ante stabulum nullæ angustiae sint, sed aut campus, aut uia late patens, ut cū producentur iuueni, liberū habeant excursus, ne pauri aut arboribus, aut obiacenti cuilibet rei se implicent, noxamq; capiant. In stabulo sint ampla præsepia, supraq; transuersi asseres in modum iugorū à terra septē pedibus elati configant, ad quos religari possint iuueni. Diem deinde, quo domituram auspicias, liberū à tempestatibus, & à religionibus, matutinū eligito, canabinisq; funibus cornua iuencorū ligato, sed iaculi, quibus copulant, lanatis pellibus inuoluti sint, ne tenera fronte sub cornua lædant. Cum deinde buculos comprehēderis, extra stabulum producto, & ad stipites religato ita, ut exiguū laxamenti habeant, distentq; inter se aliquāto spatio, ne in colluctatione alter alteri nocēat. Si nimis asperi erunt, paterē unū diem, noctemq; desēniant, simulatq; iras contuderint, manu producant, ita ut & aliquis ante, & à tergo complures, qui sequant, retinaculis eos contineant, & unus cum claua saligneæ procedens modicis ictibus subinde impetus eorū coerceat. Sin aut placidi, & quieti boues erunt, uel eodem die, quo alligaueris, ante uesperum licebit producere, & docere per mille passus composite, ac sine pauore ambulare. Cum domū perduxeris, arcte ad stipites religato, ita ne capite moueri possint. Tum demū ad alligatos boues, neq; à posteriore parte, neq; à latere, sed aduersus placide, & cū quadā uocis adulatione uenito, ut accedentem consuescant aspiciere. Deinde nares perfricato, ut hominē di

stant odorari. Mox etiam conuenit tota tergora & tractare, & respergere mero, quo familiariores bubulco fiant, uentri quoq; et sub fœmina manuum subiicere, ne ad eiusmodi tactum postmodum pauescant, & ut ricini, qui plerumq; fœminibus inhaerent, eximantur. Itaq; cum sit, à latere domitor, stare debet, ne calce contingi possit. Post hæc diductis malis, educto linguam, totumq; eorum palatum sale defricato, libralesq; offas in præfulse adipis liquamine tinctas, lingula demittito, ac uini singulos sextarios per cornu fauibus infundito, nam per hæc blandimenta triduo ferè māsuescunt, iugumq; quarto die accipiunt, cui ramus illigatur, et temonis uicē trahitur. Interdum & pondus aliquod iniungitur, ut maiore nisu laboris exploretur patientia. Post eiusmodi experimenta uacuo plostro subiungendi, & paulatim longius cum oneribus producendi sunt. Sic perdomiti mox ad aratrum instituantur, sed in subactō agro ne statim difficultatē operis reformident, ne ue adhuc tenera colla, dura prossissione terræ contendant. Quemadmodum aut bubulcus in arando bouem instituat, primo præcepi uolumine. Curandum ne in domitura bos calce, aut cornu quenq; contingat, nam nisi hæc caueantur, nunq̄ eiusmodi uitia, quāuis subacta, eximi poterunt. Verum ista sic agenda præcipimus, si ueteranum pecus non aderit, nā si aderit, expeditior, tutiorq; ratio domandi est, quā nos in nostris agris sequimur. Nā ubi plastro, aut aratro iuuentum consuesimus, ex domitis bubus ualentissimum, eundemq; placidissimum cum indomito iungimus, qui & procurrentem retrahat, & cunctantem pducit. Si uero non pigeat iugum fabricare, quo tres iungantur, hac machinatione consequemur, ut etiam contumaces boues grauissima opera non recusent. Nā ubi piger iuuentus medius inter duos ueteranos iungitur, aratroq; iniuncto terram moliri cogitur, nulla est imperium respuendi facultas. Sine enim efferatur profilit, duorum arbitrio inhibetur, seu consistit, duobus gradientibus etiam obsequitur, seu conatur decumbere, à ualētioribus subleuatur trahitur, propter quæ undiq; necessitate contumaciam deponit, & ad patientiam laboris paucissimis uerberibus perducitur. Est etiā post domituram mollioris generis bos, qui decumbit in sulco, eū non seuitia, sed ratione censeo emendandum, nam qui stimulis, aut ignibus, alijsq; tormentis id uitium eximi melius indicat, uere rationis ignari sunt, quoniam pernicioxa contumacia plerumq;

senientem fatigat. Propter quod utilius est citra corporis uexationem fame potius, & siti cubitorem bouem emendare. Nam cū uehementius afficiunt naturalia desyderia, q̄ plagæ. Itaq; si bos decubuit, utilissimum est sic pedeseius uinculis obligari, ne aut insistere, aut progredi, aut pasci possit. Quo facto inedia, & siti cōpulsus deponit ignauiam, quæ tamen rarissima est in pecore uernaculo, lōgeq; omnis bos indigena melior est, q̄ peregrinus, nam neq; aquæ, nec pabuli, nec cœli mutatione tentatur, neq; infestatur conditione regionis, sicut ille, qui ex planis, & campestribus locis, in montana, & aspera pductus est, uel ex montanis in campestria. Itaq; etiam, cum cogimur ex longinquo boues arcessere, curandum est, ut ex similibus, patrijs locis traducantur. Item custodiendum est, ne in corporacione, uel statura, uel uiribus impar cum ualentiore iungatur, nam utraq; res inferiori celeriter affert exitium, mores huius pecudis probabiles habentur, qui sunt ppiores placidis, q̄ conatatis, sed non inertes, qui sunt uerentes plagarum, & acclamationum, sed fiducia uirium, nec auditu, nec uisu pauidi, nec ad ingredienda flumina, aut pontes formidolosi, multi abi edaces, uerum in eo conficiendo lenti, nā hi melius concoquunt, ideoq; robora corporum citra maciem cōseruant, qui ex commodo, q̄ qui festinanter mandunt. Sed tam uitium est bubuli pinguem, q̄ exilem bouem reddere. Habilis enim, & modica corporatura pecoris operarij debet esse, neruisq; & musculis robusta, nō adipibus obesa, ut nec sui tergoris mole, nec labore operis degrauctur. Sed quoniam quæ sequenda sunt in emendis, domandisq; bobus tradidimus, tutelam eorum præcipiamus.

De bouum cura, & cibarijs.

Cap. III.

BOVES calore sub diuo, frigoribus intra tectū manere oportet, itaq; hybernæ stabulationi eorum præparanda sunt stramenta, quæ mēse Augusto intra dies triginta sublata messis præcisa, in aceruum extrui debent. Horum defectio cū pecori, tum agro est utilis. Liberantur arua sentibus, qui æstiuo tpe per caniculæ ortum reasi, plerunq; radiatus intereunt, & stramentis pecoris subiecti plurimum stercoris efficiunt. Hæc cum ita curauerimus, tū & omne genus pabuli pparabimus, dabimusq; operā, ne penuria cibi macrescat pecus. Boues aut recte pasceendi nō una rō est, nā si ubertas regiōis uiride pabulū sumministrat, nemo dubitat,

COLVMELLAE.

quin id genus aibi ceteris præponendum sit, quod tamen nisi riguis, aut rosidis locis nõ contingit. Itaq; in ijs ipsis uel maximũ commodum est, quod suffiat una opera duobus iugis, quæ eodẽ die alterna temporum uicẽ uel arant, uel pascuntur. Sicioribus agris ad præsepia boues alendi sunt, quibus pro condiitiõe regionum aibi præbentur. Eosq; nemo dubitat, quin optimi sint, uicia in fascem ligata, & acercula, itemq; pratense fœnum. Minus cõmode tuemur armentum paleis, quæ ubiq; & quibusdam regionibus solæ præsidio sunt. Ea probantur maxime ex milio, tum ex ordeo, mox etiam ex tritico. Sed iumentis instam operam reddentibus, ordeum præter has præbetur. Bubus autem pro tẽporibus anni pabula dispensantur. Ianuario mense singulis fressi, et aqua macerati erui quaternos sextarios mistos paleis dare cõuenit, uel lupini macerati modios, uel acerculae macerate semodios, & sup hæc affatim paleas, licet etiam si sit leguminum inopia & eluta, & siccata uinacia, quæ de lora eximuntur, cum paleis miscere. Nec dubium est, quin ea longe melius cum suis folliculis ante, q̃ eluantur, præberi possint. Nam & aibi, & uini uires habent, nitidumq;, & hilare, & corpulentum pecus faciunt. Si grano abstinentus, frondis aridæ corbis pabulatoria modiorum uiginti sufficit, uel fœni pondo triginta, uel si non, modius uiridis laureæ, et iligneæ frondis, sed his si regionis copia permittat, glans adiicitur, quæ nisi ad satietatem detur, scabiem parit. Potest etiam si puentus uilitatem facit, semodius fabæ fresæ præberi. Mese Februario plerunq; eadem cibaria sufficiunt. Martio, et Aprili debet ad fœni pondus adijci, quia terra profanditur. Sat autem erit pondo quadragena singulis dari. Ab idibus tamẽ mēsis Aprilis usq; in Idus Iunias uiride pabulum recte secatur. Potest etiam in Calen. Iulias frigidioribus locis idẽ præstari. A quo tempore in Calendas Nouembres tota æstate, & deinde autumno satient fronde, quæ tñ non ante est utilis, q̃ cum maturuerit uel imbribus, uel assidujs roribus, probaturq; maxime ulmea, post fraxinea, & ab hac populnea, ultimæ sunt iligneæ, & querneæ, & laureæ, sed post æstatem necessarie deficientibus ceteris, Possunt etiam & folia ficulnea probe dari, si sit eorum copia, aut stringere arbores expediat. Iligneæ tamen uel melior est querneæ, sed eius generis, quod spinas non habet, nam id quoq; uti iuniperus respuif à percore pp aculeos. Nouembri mēse, ac Decembri per sementẽ q̃tum appetit bos,

appetit bos, tantum præbendum est. Plerumq; tamen sufficiunt singulis modij glâdis, & paleæ ad satietatem datæ, uel lupini macerati modij, uel erui aqua conspersi sextarij. VII. permisti paleis, uel cicerulæ similiter conspersæ sextarij. XII. misti paleis, uel singuli modij vinaceorum, si us, ut supra dixi, large paleæ adiuantur. Vel si nihil horum est, per se fœni pondo quadraginta.

De uitis boum, & medicinis.

Cap. IIII.

SED non proderit abis satiari pecora, nisi omni adiuuent diligencia, ut salubri sint corpore, uiresq; conseruent. Quæ utraq; custodiuntur large dato per triduum medicamento, quod cõponitur pari pōdere triti lupini, cupressiq; & cum aqua, nocte una sub diuo habito, idq; quater anno fieri debet ultimis temporibus ueris, æstatis, autumnii, hyemis. Sæpe etiam lāgor, & nausea discutitur, si integrum gallinacium crudū ouum ieiunis faucibus inferas, ac postero die spicas ulpiæ, uel ally cum uino cōteras, & in naribus infundas, neq; hæc tantum remedia salubritatem faciunt. Multi & largo sale miscent pabula, quidam marrubiū derunt cum oleo, & uino, quidam porri fibras, alij grana thuris, alij sabinam herbam, rutamq; cum mero diluunt. Ea q; medicamenta potāda præbent. Multi caulibus uitis albæ, et ualuulis erui bubus medentur, nonnulli pellem serpentis obtritam cum uino miscent. Est etiam remedio, cum dulci uino tritum serpyllum, & conisa, & in aqua macerata scylla. Quæ omnes prædictæ portiones trium heminarum singulis diebus per triduum datæ, aluum purgant, depulsisq; uitis, recreant uires, maxime tamen habetur salutaris amurca, si tantundem aquæ misceas, & ea pecus insuescas, quæ protinus dari non potest, sed primo tibi asperguntur, deinde exigua portione medicatur aqua, mox pari mensura mista datur ad satietatem.

Quæ sint, quibus pestilentia ingruit gregi, & quæ remedia adhibenda.

Cap. V.

NVLLO autem tempore, & minime æstate utile est boues incursum conitari, nam ea res aut cit aluum, aut mouet febrē. Caue dum quoq; est, ne ad præsepia sus, aut gallina perrepat, nam hoc, quod decidit, immistum pabulo, bubus affert necem, & id præcipue, quod egerit sus ægra, pestilentia facere ualet, quæ cum

Colu.

x

COLVMELLAE.

in gregem incidit, confestim mutandus est cœli status, & in plures partes distributo pecore lōginquæ regiones petendæ sunt, atq; ita se gregādi à sanis morbidī, nequis interueniat, qui contagione ceteros labeficiat. Itaq; cū ablegabuntur, in ea loca perducēdi sunt, quibus nullum impasitur pecus, ne aduentu suo ēt illis tabem afferant. Euincendi sunt autē quī pestiferi morbi, & exquīsitis remedijs propulsandi. Tunc panacis, & eryngij radices fœniculi seminibus miscendæ, & cū defruti, ac moliti tritici farina, candentiq; aqua conspergēdæ, eoq; medicamine saluandū egrotum pecus. Tum paribus casia myrrhæq; & thuris ponderibus, ac tantūdem sanguinis marinæ testudinis miscetur potio, cū uini ueteris sextarijs tribus, & ita p̄ nares infundit̃. Sed ipsum medicamentum pōderis sex uncia diuisum, portiōe aqua per tridū cum uino dedisse sat erit. Præsens ēt remedium cognouimus radicula, quam pastores consiliginem uocant. Ea in marsis montibus plurima nascitur, omniq; pecori maxime est salutaris. Leua manu effodit̃ ante solis ortum, sic enim lecta maiorem uim creditur habere. Vsus eius traditur talis, ænea subula pars auriculæ latissima circūscribit̃, ita ut manante sanguine tanq̃ o litteræ ductus appareat orbiculus. Hoc & intrinsecus, & ex superiore pte auriculæ cum factum est, media pars descripti orbiculi eadē subula transiit, & facto foramini prædicta radícula inserit̃, quā cum recens plaga comprehendit, ita continet, ut elabi nō possit. In eam deinde auriculam oīs uis morbi, pestilēsq; virus elicitur, donec pars, quæ subula circūscripta est, demortua exadat, et minime partis iactura caput conseruatur. Cornelius Celsus etiā uisā folia cum uino trita per nares infundere iubet. Hæc faciendā, si gregatim pecora laborant, illa deinceps, si singula.

Quod remedium adhibetur boni cruditate laboranti. Cap. VI.

CRUDITATIS signa sunt crebri ructus, ac uentris sonitus, fastidia cibi, neruorū intētio, hebetes oculi. Propter q̃ bos neq; ruminat, neq; lingua se deterget. Remedio erunt aquæ calidæ duo cōgij, & mox triginta brassicæ caules modice cocti, et ex acetō dati, sed uno die abstinendum est alio cibo. Quidā clausum intra tectā, cōtinent, ne pasci possit, tum lentisā, oleastriq; cacuminum pondo. II. & libra mellis una trita pmiscet aquæ congio, quā nocte una sub dio habent, atq; ita faucibus infundunt.

deinde interposita hora macerati erui quatuor libras obijciunt,
 aliaq; potione prohibent. Hoc per tridui fieri, dum omnis causa
 langoris discutias. Nam si neglecta cruditas est, & inflatio ven-
 tris, & intestinorū maior dolor insequitur, qui nec capere cibos su-
 nit, genitus exprimit, locoq; stare non patitur, sepe decumbere, et
 agitare caput, caudamq; crebrius agere. Manifestum remedium
 est proximā clunibus partem caudæ vinculo uehementer obstrin-
 gere, uiniq; sextariū cum olei hemina faucibus infundere, atque
 ita citatū per mille & quingentos passus agere. Si dolor perma-
 net, ungulas circūsecare, & unctā manu per anum inserta finem
 extrahere, rursusq; agere currentem. Si nec hæc profuit res, capri-
 fia aridæ conterunt, & cū dodrante aquæ calidæ dant. Vbi nec
 medicina processit, myrti, syluestris foliorum duæ libræ deligan-
 tur, totidemq; sextarij calidæ aquæ misti per uas ligneū faucibus
 infunduntur. Atq; ita sub cauda sanguis emittitur, qui cum satis
 profluxit, inhibetur papyri ligamine. Tum concitate agit pecus
 eousq; dum anhelet. Sunt & ante detractionem sanguinis illa
 remedia, tribus heminis uini, tres uncia pinisti alij permiscen-
 tur, & post eam potionem currere cogitur. Vel salis sextans, cum
 æpis decem conteritur, & admisto melle decocto collyria immit-
 tuntur aluo, atq; ita citatus bos agitur.

Quo remedio sedatur dolor uentris, et intestinorū pecoris. C. VII.

VENTRIS quoq; & intestinorū dolor sedatur uisu nantium,
 & maxime anatis, quā si cōspexerit, cui intestinū dolet, celeriter
 tormēto liberatur. Eadem anas maiore profectu mulos, & equum
 genus cōspectu suo sanat. Sed interdum nulla prodest medicina.
 Sequitur torminum uitium, quorū signum est cruenta, & mucosa
 uentris pluuiæ. Remedia sunt cupressini quādecim coni, totidēq;
 gallæ, et utrorūq; ponderū uetustissimus caseus, quibus in unū tun-
 sis admiscuntur austeri uini quatuor sextarij, q̄ pari mēsurā p̄ qua
 tridui dispensat dant, nec desint lentisæ, myrtiq; & oleastri ca-
 cumina uiridis. Alius corpus, ac uires carpit, operiq; inutilē red-
 dit, q̄ cum accident, prohibendus erit bos potione p̄ triduum, pri-
 moq; die cibo abstinentus. Sed mox cacumina oleastri, et arūdinis
 itē bacæ lētisæ, et myrti dādæ, nec ptās aquæ, nisi quā parāssime
 faciēda est. Sunt qui teneræ laurus caulium librā, cum abrotani
 macerati pari portione dent, cum aquæ calidæ duobus sextarijs,

atq; ita faucibus infundant, eademq; pabula, ut supra diximus obijciant. Quidam uinaceorum duas libras torrefaciunt, & ita coterunt, et cum totidem sextarijs uini austeri, potandū medicamentum præbent, omniq; alio humore prohibent, nec minus acumina prædictarum arborum obijciant. Quod si neq; uentris restiterit citata proluuies, neq; intestinorum, ac uentris dolor, aibosq; respuet, et prægrauato capite, si sæpius, q̄ consuevit, lachrymæ ab oculis, & pituita à naribus profluent, usq; ad ossa frons media uratur, auresq; ferro scindantur. Sed uulnera facta igne, dum sanescunt, defricare bubula urina conuenit. At ferro resassa melius picæ, & oleo curantur.

De uitiosis incrementis lingue.

Cap. VIII.

SOLENT etiam fastidia cibo afferre uitiosa incrementa lingue, quas ranas ueterinarij uocant. Hæc ferro reciduntur, & sale cum allio pariter trito uulnera defricantur, donec læssita pituita decidat. Tum uino perluitur os, & interposito unius horæ spatio uirides herbæ, uel frondes dantur, dum facta ulcera cicatrices ducant. Si neq; ranæ fuerint, neq; alius citata, & nihilo minus cibos non appetet, proderit alliū pinsitum cum oleo p̄ nares infundere, uel sale, uel cunela defricare fauces, uel eandem partem allio tunso, & hallecula linire. Sed hæc his solū fastidiū tollunt.

De febre boum.

Cap. IX.

FEBRICITANTI boui cōuenit abstineri cibo uno die. Postero deinde exiguum sanguinē ieiuno sub cauda emitti, atq; interposita hora modicæ magnitudinis coctos brassicæ coliculos triginta ex oleo, & garo saluiati more demitti, eamq; escam per quinque dies ieiuno dari. Præterea acumina lentisæ, aut oleæ, uel tenerrimam quāq; frōdem, aut pampinos uitis obijci, tum etiam spongia labra detergeri, & aquam frigidam ter die præberi potandam, quæ medicina sub tecto fieri debet, nec ante sanitatem bos emitti. Signa febricitantis, manantes lachrymæ, grauātū caput, oculi compressi, fluidum salinis os, longior, & cum quodā impedimento tractus spiritus, interdum & cum gemitu.

De tussi boum.

Cap. X.

RECENS tussis optime saluiato farina ordeaceæ discutitur. Interdum magis prosunt gramina conisa, & his admista fresa faba. Lentes quoq; ualuulis exemptæ, et minutæ molitæ, miscentur aquæ calidæ Sextarij duo, factaq; sorbitio per cornu infunditur. Veterem tussim sanant duæ libræ hyssopi macerati sextarijs aquæ tribus, nā id medicamentū teritur, & cū lentis minutæ, ut dixi, molitæ sextarijs quatuor more saluiati dat, ac postea aqua hyssopi p cornu infundit. Porri et succum oleo, uel ipsa fibra cū ordeacea farina contrita remedio est. Eiusdem radices diligēter lotæ, & cum farre triticeo pinsitæ, ieiunoq; datæ uetustissimā tussim discutunt. Facit idem pari mensura eruum sine ualuulis cū torrefacto ordeo molitum, & saluiati more in fances demissum.

Suppurationis remedia.

Cap. XI.

SVPPVRATIO melius ferro resanditur, q̄ medicamentis. Expressus deinde sinus ipse, qui eam continebat, calida bubula urina eluitur, atq; linamentis picæ liquida, & oleo imbutis colligatur. Vel si collui ea pars non potest, lamina candenti seuum caprinum, aut bubulum instillatur. Quidam, cum uitiosam partem inuiderunt, urina uetere eluunt, atq; ita æquis pōderibus in cocta picæ liquida cum uetere axungia linunt.

Claudicanti boui quod remedium adhibeatur. Cap. XII.

SANGVIS dimissus in pedes claudicationem affert, quod cum accidit, statim ungula inspicitur. Tactus aut feruorē demonstrat, nec bos uitiatam partem uehementius premi patitur. Sed si sanguis adhuc supra ungulas in cruribus est, fricatione assidua discutitur, uel cum ea nihil profuit, scarificatione demitur. At si iam in ungulis est, inter duos ungues cultello leniter aperies. Postea linamenta sale, atq; aceto imbuta applicantur, ac solea sparte pes induitur, maximeq; datur opera, ne in aquam pedē mittat, & ut sic stabuletur. Hic idem sanguis nisi emissus fuerit, saniem creabit, qui si suppurauerit, tarde procurabit, ac primo ferro arcūsisus, & expurgatus, deinde pannis, aceto, & sale, et oleo madentibus inculcatis, mox axungia uetere, & seuo hirano pari pondere decoctis, ad sanitatem perducitur. Si sanguis in inferiore parte ungulæ est, extrema pars ipsius unguis ad uinum resecatur, et ita emittitur, ac linamentis pes inuolutus sparte munif.

x iiij

Mediam ungulam ab inferiore parte nō expedit aperire, nisi eo loco iam suppuratio facta est. Si dolore nervorū claudicat, oleo, & sale genua, poplitesq; & crura confricanda sunt, donec sanentur. Si genua intumuerunt, calido aceto fouenda sunt, & lini semen, aut milium detritū, conspersumq; aqua mulsa imponēdū, spongiæ quoq; feruenti aqua imbutæ, & expressæ, atq; melle litæ recte genibus applicant, ac fasciis circumdant. Quod si tumori subest aliquis humor, fermentū, uel farina ordeacea ex passo, aut aqua mulsa decocta imponit, & cū maturuerit suppuratio, resandit ferro, eaq; emissa, ut supra docuimus, linamentis curat. Possunt et (ut Cornelius Celsus præcipit) lilij radix, aut scylla cū sale, uel sanguinalis herba, quā πολύγονον græci appellāt, uel marrubium ferro reclusa sanare. Ferē aut omnis dolor corporis, si sine uulnere est, recens melius fomentis discutitur, uetus uritur, & supra uestum butyrum, uel caprinus instillatur adeps.

Ad scabiem remedia, & ad morsum rabiosi canis, uel lupi, nec non & ad coriaginem. Cap. XIII.

SCABIES extenuat trito allio defricto, eodemq; remedio curatur rabiose canis, uel lupi morsus, & tñ & ipse imposito uulneri uetere salsamēto, æque bene sanat. Et ad scabiem præsentior alia medicina est, cinila bubula, et sulfur conterunt, admistaq; amurca cū oleo, aqua, aceto incoquunt, deinde tepesactis fassum alumē tritum spargit. Id medicamentum candente sole illitum maxime prodest. Vlceribus gallæ tritæ remedio sunt, nec minus succus marrubij cum fuligine. Est & infesta pestis bubulo pecori, coriaginem rustici appellant, cū pellis ita tergori adheret, ut apprehensa manibus deduci à costis non possit. Ea res non aliter accidit, q̄ si bos aut ex langore aliquo ad maciem perductus est, aut sudans in opere faciendo refrixit, aut si sub onere pluuiæ madefactus est. Quæ qm̄ perniciofa sunt, custodiendum est, ut cū ab ope boues redierint, adhuc æstuant, anhelantesq; uino aspergant, & offæ adipis faucibus eorū inferantur. Quod si prædictum uittum inhaferit, proderit decoquere laurū, & ea calda fouere terga, multoq; oleo, & uino confestim subigere, ac per omnes partes apprehendere, & attrahere pellem, idq; optime fit sub dio sole feruente. Quidam fraces uino, & adipe commiscant, eoq; medicamento post fomenta prædicta utuntur.

Ad exulcerationem pulmonis, & palati, atq; cœuicis tumorem

Cap. XIII.

EST etiam illa grauis pernicies, cum pulmones exulcerantur, inde tussis, & macies, & ad ultimum phthisis inuadit. Quæ ne mortem afferant, radix coryli iusta ita, ut supra docuimus, pfo rata auriculæ inseritur, tum porri succus instar heminæ pari olei mensuræ miscetur, & cū uini sextario potādus datur diebus cō pluribus. Interdū & tumore palati cibos respuit, crebrumq; suspirium facit, & hanc speciem præbet, ut bos in latus pendere uideatur. Ferro palatum opus est sanare, ut sanguis profluat, & exemptum ualuulis eruum maceratum, uiridemq; frondem, uel aliud molle pabulum, dum sanetur, præbere. Si in opere collum contusum erit, præsentissimū est remedium sanguis de aure emissus, aut si id factum non erit, herba, quæ uocatur auia, cum sale trita, & imposita. Si cœuix mota, & deiecta est, consyderabimus quam in partem declinet, & ex diuersa auricula sanguinē detrahemus. Ea porro uena, quæ in aure uidetur eē amplissima sarmento prius uerberatur. deinde cum ad ictum intumuit, cultello soluitur, & postero die iterum ex eodem loco sanguis emittitur, ac biduo ab opere datur uacatio. Tertio deinde die leuius iniungitur labor, & paulatim ad iusta perduatur. Quod si cœuix in neutram partem deiecta est, mediāq; intumuit, ex utraq; auricula sanguis emittitur, qui cum intra biduum, quam bos uitium cepit, emissus non est, intumesat collum, neruiq; tenduntur, & inde nata durities iugum non patitur. Tali uitio compimus aureum esse medicamentum ex picæ liquida, & bubula medulla, & hirano seuo, & uetere oleo æquis ponderibus compositū, atque incoctum. Hac compositione sic utendum est, cum disiungitur ab opere in ea piscina, ex qua bibit tumor cœuicis aqua madefactus subsiccatur, prædictoq; medicamento defricatur, & illinitur. Si ex toto propter cœuicis tumorem iugum recuset, paucis diebus requies ab opere danda est. Tum cœuix aqua frigida defricanda, & spuma argenti illinenda est. Celsus quidē tumenti cœuici herbam, quæ uocat auia, ut supra dixi, contundi, & imponi iubet. Clauor, qui ferè cœuicem infestant, minor molestia est, nā facile operanti lucerna instillatur. Potior tamen rō est custodiendi, ne nascant, ne ue colla caluescant, q̄ non aliter glabra fiunt, nisi cum sudore, aut pluuia cœuix in opere madefacta

est, itaq; cum id accidit, ueteri lateri later conteritur, eoq; intrito prius q̄ disiungantur, colla conspergi oportet, deinde cum id sic cum erit, subinde oleo imbui.

Ad talum, seu ungulam lesam remedia.

Cap. XV.

SI TALUM, aut ungulam uomer læserit, picem duram, et axungiam cum sulfure, et lana succida inuolutam candente ferro supra uulnus inurito. Quod idem remedium optime facit exēpta stirpe, si forte surculum calcauerit, aut acuta testa, uel lapide ungulam pertuderit, quæ tamen si altius uulnerata est, latius ferro circundis, et ita inuritur ut supra præcipi. deinde sparte calceata per triduum suffuso aceto curat. Item si uomer cruris laederit, marina lactuca, quam græci τιβύμαλλον uocant, admisto sale imponitur. Subtriti pedes eluuntur calefacta bubula urina. Deinde fasces sarmentorum incenso, cum iam ignis in fauillam recidit, feruentibus cineribus cogitur insistere, ac picæ liquida cum oleo, uel axungia cornua eius linuntur. Minus tñ claudicabunt armenta, si opere disiectis multa frigida lauentur pedes, et deinde suffragines, coronæ, ac discrimen ipsum, quo diuisa est bonis ungula, uetere axungia defricetur.

Ad conuulsos armos, et cornua præfracta.

Cap. XVI.

SAEPE etiam bos uel grauitate longi laboris, uel in profundendo duriori solo, aut obuiæ radici oblectando conuellit armos. Quod cum accidit, è prioribus cruribus sanguis mittendus est, si dextrum armum læsit, in sinistro, si leuū, in dextro, si uehementius utrunq; uitiavit, item in posterioribus cruribus uenæ soluentur. Præfractis cornibus linteola sale, atq; aceto, et oleo imbuta superponunt, ligatisq; per triduum eadem infunduntur. Quarto demum, axungia pari pondere cum picæ liquida, cortici pineo lenigato lita imponitur, et ad ultimum cum iam cicatricem ducunt, fuligo infricat. Solent et neglecta ulcera scætere uermibus q̄ si mane profundunt aqua frigida, rigore contracti decidunt, uel si hac rōne nō pnt eximi, marrubiū, aut porrū conterit, et admisto sale imponit, id celerime necat p̄dicta aīalia. Sed expurgatis ulceribus, confestim adhibenda sunt linamēta cū picæ, et oleo, uetereq; axungia, et extra uulnera eodē medicamēto circūliniēda ne infestent à muscis, quæ ubi ulceribus infederūt, uermes creāt.

Ad ictus serpentis, et noxiorum animalium.

Cap. XVII.

EST etiam mortifer ipsis serpentis ictus, est & magnorum animalium noxium virus, nam & uipera, & cælia sæpe cum in pasua bos improvide supercubuit, læssita onere morsum imprimit. Musq; araneus, quem græci σκυτάλην appellant, quamuis exiguis dentibus non exiguam pestem molitur. Venena uiperæ depellit super scarificationem ferro factam herba, quam uocant personatam, trita, & cum sale imposita. Plus est eiusdem radix contusa prodest, uel symonianum trifolium, quod inuenitur confragosis locis, efficacissimum tradit, odoris grauis, neq; absimilis bitumini, & ideo græci eam ἀσφάλτιον appellant, nostri autem propter figuram uocant acutum trifolium, nam longis, & hirsutis folijs uiret, caulemq; robustiorem facit, q̄ pratense. Huius herbe succus uino mistus infunditur faucibus, atq; ipsa folia, cum sale trita malagmatis more, scarificationi intenditur, uel si hanc herbam uiridem tempus anni negat, semina eius collecta, & leuigata cum uino dantur potanda, radicesq; cum suo caule trita, & farina, & sale comistæ ex aqua mulsa scarificationi superponuntur. Est et præsens remedium, si conteras fraxini tenera cacumina quinq; librarum cum totidē uini, & duobus sextarijs olei, expressumq; succum faucibus infundas. Itemq; cacumina eiusdem arboris cum sale trita læsæ parti superponas. Cæliæ morsus tumorem, suppurationemq; molitur. Idem facit etiam muris aranei. Sed illius sanatur noxa subula ænea, si locum læsum cōpungas, cretaq; amolia ex aceto linas. Mus perniciem, quā intulit, suo corpore luit, nam animal ipsum oleo mersum necatur, et cum iputruit, conteritur eoq; medicamine morsus muris aranei linitur. Vel si id non adest, humorq; ostendit iniuriam dentium, cum minum conteritur, eiq; adiungitur exiguum picis liquidæ, & axungie, ut lentorem malagmatis habeat. Id impositum perniciē cōmouet. Vel si ante q̄ tumor discutiatur, in suppurationem cōuertitur, optimum est ignea lamina conuersionem refecare, & quicquid uitiosi est inurere, atq; ita liquida picæ cum oleo linire. Sollet etiam ipsum animal uiuum creta figulari circumdari, quæ cū siccata est, collo bouum suspenditur, ea res innoxium pecus a morsu muris aranei præbet. Oculorum uitia plerunq; melle sanant, nam siue intumuerunt, aqua mulsa triticæ farine conspergitur,

COLVMELLAE.

Et imponitur, siue albu in oculo est, montanus sal, hispanus, uel ammoniacus, uel etiam cappadocus minute tritus, et immistus melli uitiu extenuat, facit idem trita sepie testa, et per fistulam ter die oculo inspirata. Facit et radix, qua graeci σ' λ φ ι ο ν uocāt, uulgus aut nostra cōsuetudine la serpitiū appellat, huius quāto cūq; ponderi decē partes salis ammoniaci adiūntur, eaq; pariter trita oculo similiter infunduntur, uel eadem radix confusa, et cū oleo lentisā inuncta uitiū expurgat. Epiphora supprimit polenta cōspersa mulsa aqua, et in supalia, genasq; imposita, pastinacaeq; agrestis semina, et succus armoracae, cū melle cōlinita oculorum sedant dolorem, sed quotiescūq; mel, aliū ue succus remedijs adhibetur, arcunliniendus erit oculus pice liquida cum oleo, ne à muscis infestetur, nam et ad dulcedinem mellis, aliorumq; medicamentorum non hae solae, sed et apes aduolant.

Remedia ad haustam hirudinem.

Cap. XVIII.

MAGNAM etiam perniciem saepe affert hirudo hausta cum aqua, ea adherens faucibus sanguinem duat, et incremēto suo trāsitu abis praecludit, si tam difficili loco est, ut manu detrahi nō possit, fistulam, uel arundinem inserito, et ita calidū oleum infundito, nam eo cōtactu animal confestim decedit. Pōt etiā per fistulam densi cinicis nidor immitti, qui ubi superponitur igni, fumū emittit, et cōceptum nidorem fistula usq; ad hiruīdine perfert, isq; nidor depellit haerentem, si tñ uel stomachum, uel intestinum tenet, calido aceto per cornu infuso necatur. Has medicinas quauis bubus adhiberi praeceperimus, posse tamen ex his plurima etiam omni maiori pecori conuenire nihil dubium est.

De machina faciēda, qua clausa, iumenta curent. Cap. XIX.

SED et machina fabricanda est, qua clausa, iumenta, bouesq; curentur, ut et propior accessus ad pecudem medentibus sit, nec in ipsa curatione quadrupes reluctando remedia respuat. Est aut talis machinae forma, roboreis axibus cōpingitur solum, quod habet in lōgitudinem pedes nouē, et in latitudinem pars prior dupondium semissem, pars posterior quatuor pedes. Huic solo septem pedum stipites recti ab utroq; latere quaterni applicantur. Ex ijs aut ipsis quatuor, cū in angulis sunt affixi omnes trāsuersis sex temonibus inter se ligantur, ita ut à posteriore parte, quae la

tior est, uelut in caueam quadrupes possit induci, nec exire alia parte prohibentibus aduersis axiculis. Primis aut duobus statuminihus imponitur firmum iugum, ad quod iumenta capistrantur, uel bouum cornua religantur, ubi possunt et numelli fabricari, ut inserto capite descendētibz per foramina regulis cernix teneat, ceterum corpus laqueatum, et distentum temonibus obligatur. Sicq; immotum animal medentis arbitrio est expositum. Hæc ipsa machina communis erit omnium maiorum quadrupedum.

De tauri forma.

Cap. XX.

QUONIAM de bubus satis præcepimus, opportune de tauris, uacisq; dicemus. Tauros maxime membris amplissimis, moribus placidis, media ætate probandos censeo, cetera ferè eadem omnia in his obseruabimus, quæ in bubus eligendis, neq; n. alio distat bonus taurus à castrato, nisi q; huic torua facies est, uegetior aspectus, breuiora cornua, torosior cernix, et ita uasta, ut sit maxima portio corporis, uentre paulo substrictiore, qui magis relictus, et ad ineundas fœminas habilis sit.

De forma uacæ.

Cap. XXI.

VACCÆ quoq; probantur altissimæ formæ, longæq; maximis uteris, frontibus latissimis, oculis nigris, et patentibus cornibus, uenustis, et leuibus, et nigrantibus, pilosis auribus, compressis malis, palearibus, et caudis amplissimis, ungulis modicis, et cruribus. Cetera quoq; ferè eadem in fœminis, quæ et in maribus desyderantur, et præcipue ut sint nouellæ, quoniam, cum exæsserint annos decem, fœtibus inutiles sunt. Rursus minores bimis iniri non oportet. Si ante tamen conciperint, partum earum remoueri placet, ac per triduum, ne laborent, ubera exprimi, postea mulctra prohiberi.

Quot annis delectus faciendus.

Cap. XXII.

SED et curandum est omnibus annis in hoc æque atq; in reliquis gregibus pecoris, ut delectus habeatur, nam et enixæ, et uetustæ, quæ gignere desierunt, summonendæ sunt, et utiq; tauræ, quæ locum fœcundarum occupant, ablegandæ, uel aratro domandæ, qm̄ laboris, et operis non minus q̄ iuueni propter uteri sterilitatem patientes sunt. Eiusmodi armentum maritima,

et aprica hyberna desyderat, æstate, opacissima nemorū, ac montium alta magis q̄ plana pascua, nam melius nemoribus herbis, et frutetis, et carectis, q̄ lapidosis locis duratur ungulæ, nec tam fluuios, riuosq̄ desyderant, q̄ lacus manufactos, quoniā fluminalis aqua, quæ ferè frigidior est, partum abigit, et cœlestis inundior est. Omnis tamen extremi frigoris tolerantior equino armento uacca est, ideoq̄ facile sub dio hybernat.

De conseptis, et stabulis faciendis.

Cap. XXIII.

SED laxo spatio consepta facienda sunt, ne in angustis conceptum altera alterius elidat, et ut inualida fortioris ictus effugiat. Stabula sunt optima saxo, aut glarea strata, non incōmoda tamen etiam sabulosa, illa, quod imbres respuant, hæc, quod celeriter sorbeant, transmittantq̄, sed utraq̄ deuexa sint, ut humorē effundant, spectentq̄ ad meridiem, ut facile siccentur, et frigidis uentis non sint obnoxia. Lenis aut cura pascui est, nam ut letior herba consurgat, ferè ultimo tempore æstatis incēditur, ea res et teneriora pabula recreat, et sentibus ustis fruticem surrecturum in altitudinem compesat, ipsis uero corporibus affert salubritatē iuxta conseptum saxi, et canalibus sal superiectus, ad quem saturæ pabulo libenter recurrunt, cū pastorali signo quasi receptū canitur, nā id quoq̄ semp̄ crepusculo fieri debet, ut ad sonum bucina pecus, siquod in syluis substituerit, septa repetere consuescat. Sic enim recognosci grex poterit, numerusq̄, cēseri, si ueluti ex militari disciplina intra stabularij castra manserint, sed non eadem in tauros exercentur imperia, qui freti uiribus p̄ nemora uagantur, liberosq̄, egressus, reditusq̄, habent, nec renocantur, nisi ad coitus fœminarum.

Quæ ætas idonea ad admissuram.

Cap. XXIIII.

EX HIS, Qui quadrimis minores sunt, maioresq̄, q̄ duodecim annorū, prohibentur admissura, illi, quoniam quasi puerili ætate seminadis armentis parū habentur idonei, hi, q̄ senio sunt effecti. Mense Iulio fœminæ maribus plerūq̄ permittendæ, ut eo tpe conceptos proximo uere adultis iam pabulis edant, nā decē mensibus uentrem perferūt, neq̄ ex impio magistri, sed sua sponte marem patiuntur, atq̄ in id ferè, quod dixi tempus, naturalia congruunt desyderia, qm̄ nimietate uerni pabuli p̄cudes exhilarant.

rata lasciuunt, quod si aut foemina recusat, aut nō appetit taurus, eadem ratione, qua fastidientibus equis mox praecipiemus. Eliatur cupiditas odore genitalium admoto naribus, sed & pabulum circa tempus admissurae subtrahitur foeminis, ne eas steriles reddat nimia corporis obesitas, & tauris adiutur, quo fortius ineant, unumq; marem quindecim uaccis sufficere abunde est, qui ubi iuuentam superuenit, certis signis comprehendere licet, quem sexum generauerit, qm si parte dextra desiliuit, marem seminasse manifestum est, si leua foeminam, id tamen uerum esse non aliter apparet, q̄ ubi post unum coitum forda non admittit taurum, quod & ipsum raro accidit, nam quis plena foetu non expletur libidine, adeo ultra naturae terminos etiā in pecudibus plurimum pollent blandae uoluptatis illecebrae, sed non dubium est, ubi pabuli sit laetitia, posse omnibus annis partum educari. at ubi penuria est, alternis summitti, quod maxime in operarijs fieri placet, ut & uituli anni temporis spatio lacte satientur, nec forda simul operis, & uteri grauetur onere, quae cum partū edidit, nisi cibis fulta est, quis bona nutrix labore fatigata nato subtrahit alimentum. Itaq; & foetae cythis uiridis, & torrefactū ordeum, maceratumq; eruum praebetur, uel tenero olere commisto, torrido, mollitoq; milio, & per unam noctem lacte macerato saluiatur, melius etiam in hos usus altinae uaccae probatur, quas eius regionis incolae cernas appellant, ea sunt humilis stature lactis abundantes, propter quod remotis earum foetibus, generosum pecus alienis educatur uberibus, uel si hoc praesidiū nō adest faba fresa, & uinum recte tolerat, idq; praecipue in magnis gregibus fieri oportet.

Remedia ad lumbricos uitulorum.

Cap. XXV.

SOLENT autem uitulis nocere lumbrici, qui serè nascuntur cruditatibus, itaq; moderandū est, ut bene concoquant, aut si iā tali uitio laborant, lupini semicrudi conteruntur, & offae saluiati more faucibus ingeruntur, pōt etiam cum arida fico, & eruo cōteri herba santonica, & formata in offam, sicut saluiatū demitti, facit idē axungiae pars una tribus ptibus hyssopi pmista. Marubij quoq; succus & porri, ualet eiusmodi necare animalia.

De castrandis uitulis.

Cap. XXVI.

COLVMELLAE.

CASTRARE vitulos Mago censeat, dū adhuc teneri sunt, neq; id ferro facere, sed fissa ferula cōprimere testiculos, & paulatim cōfringere, idq; optimū genus castrationum putat, quod adhibetur etati teneræ sine vulnere, nā ubi iam induruit, melius bi mus, q̄ anniculus castratur, idq; facere vel autumnō Luna decreſcente præcipit, vitulumq; ad machinā deligare. Deinde prius q̄ ferrum admoueat, duabus angustis ligneis regulis (ueluti forapibus) apprehendere testium nervos, quos græci κρεμαστικὰς ab eo appellant, quod ex illis genitales partes dependent, quibus cōprehensis, statim testes ferro reſecare, & expressos ita reſcindere, ut extrema pars eorum adherens prædictis nervis relinquatur, nam hoc modo nec eruptione sanguinis periclitatur iuuenis, nec in totum effœminatur adempta omni virilitate formaq; ſervata maris, generandi vim deposuit, quam tamē ipsam non protinus amittit. Nam si patiaris eum a recenti curatione fœminam ini re, constat ex eo poſſe generari, ſed minime id permittendum, ne profluuiō sanguinis intereat, uerū vulnera eius ſarmentitio cinere cum argenti ſpumâ linenda ſunt, abſtinendusq; eo die ab humore, & exiguo cibo alendus. Sequenti triduo uelut æger cacuminibus arborum, & deſecto uiridi pabulo oblectandus, phibendusq; multa potione. Placet etiā piæ liquida, & cinere, cū exiguo oleo ulcera ipſa poſt triduum linire, quo et celerius cicatricē ducant, nec à muſcis infeſtentur. Hactenus de bubus dixiſſe abunde eſt.

De Equis.

Cap. XXVII.

QVIBVS cordi eſt educatio generis equini, maxime cōuenit prouidere authorem indiſtriū, & pabuli copiam, quæ utraq; uel mediocria pnt alijs pecoribus adhiberi. Sūmā ſedulitatē, et largam ſatietatē deſyderat equinum pecus, qđ ipſum tripartito diuidit. Eſt. n. generoſa materies, q̄ arco, ſacrisq; certaminibus equos p̄bet, eſt mularis, q̄ pretio fœtus ſui cōparatur generoſo, eſt et uulgaris, q̄ mediocres fœminas, maresq; p̄generat. Ut quæq; eſt p̄ſtā tior, ita ubere campo paſcit. Gregibus aut ſpatioſa, et paluſtria, necnō montana paſcua eligenda ſunt, rigua, nec unq; ſiccanea, uacua ue magis, q̄ ſtirpibus impedita, frequēter mollibus potius q̄ p̄ceris herbis abundantia. Vulgaribus eqs paſſim maribus, ac fœminis paſci permittitur, nec admiſſuræ certa tpa ſeruatur. Generoſis circa uernū æquinoctiū mares iunguntur, ut eodē tpe, quo

conceperint, iam lætis, & herbidis campis post anni messem par-
uo cū labore fœtum educant, nā mense duodecimo partum edūt.
Maxime itaq; curandū est, prædicto tpe anni, ut tam fœminis,
q̄ admissarijs desyderantibus, coeundi fiat ptās, qm̄ id præcipue
armentum si phibeas, libidinis extimulatur furys, unde ēt uene-
no inditum est nomē ἰσχυρὸς αἷς, quod equinæ cupidini similem
mortalibus amorē accendat. Nec dubium, qn̄ aliquot regiōibus
tanto flagrent ardore coeundi fœminæ, ut ēt si marē nō habeant
assidua, & nimia cupiditate figurantes sibi ipsæ uenerē (cōhor-
talium more auīū) uento cōcipiant. Quæ. n. poeta licētius dicit.
Salicet ante omnes furor est insignis equarum.
Et mentem Venus ipsa dedit, quo tempore glauci
Potniades malis membra absumpsere quadrigæ,
Illas ducit amor trans gargara, transq; sonantem
Ascanium, superant montes, & flumina tranant,
Continuoq; auidis ubi subdita flamma medullis,
Vere magis, quia uere calor redit ossibus, illæ
Ore omnes uerse in Zephyrum stant rupibus altis,
Exceperantq; leues auras, & sæpe sine ullis
Coniugijs, uento grauidæ (mirabile dictū)
Saxa per & scopulos, & depressas conualles
Diffugiunt, non Eure tuos, neq; solis ad ortus
In Boream, Caurumq; aut unde nigerrimus auster
Nasatur, & pluuio contristat frigore cælum.
Cum sit notissimum etiā in sacro monte Hispaniæ, qui procurrit
in occidentem iuxta oceanum, frequenter equas sine coitu uentrē
pertulisse, fœtūq; educasse, qui tamen inutilis est, quod triennio
prius q̄ adolescat, morte absumitur, quare, ut dixi, dabimus ope-
ram, ne circa æquinoctium uernū equæ desyderijs naturalibus an-
gantur. Equos aut̄ pretiosos reliquo tpe anni remouere oportet à
fœminis, ne aut cum uolent, ineant, aut si id facere prohibeant,
cupidine solitati noxā cōtrahāt. Itaq; uel in lōgīnqua pascua
marē placet ablegari, uel ad præsepia contineri, eoq; tpe, quo uo-
catur à fœminis, roborandus est largo cibo, & appropinquante
uere ordeo, ernoq; saginādus, ut ueneri supersit, q̄toq; fortior inie-
rit, firmiora semina pbeat futuræ stirpi. Quidam ēt p̄cipiunt eo-
dem ritu, quo mulos, admissariū saginare, ut hac sagina hilaris
plurimis fœminis sufficiat. Verūtamen nec minus, q̄ quīdecim

nec rursus plures, quā viginti, unus debet implere. Isque admissura potest trimus adhiberi, et usque ad annos viginti plerumque idoneus esse. Quod si admissarius iners in uenerem est, odore perfricatur deterfis spongia feminae locis, et admotā naribus equi. Rursus si equa marem non patitur, detrita scylla naturalia eius linuntur, quae res accendit libidinem. Nonnunquam ignobilis quoque vulgaris elicit cupidinem coeundi. Nam ubi admotus ferē tentauit obsequium, foemina abducitur, et iam patientiori generosior equus imponitur. Inde maior praegnantibus adhibenda cura est, largoque pascuo firmandae. Quod si frigore hyemis herbae defecerint, tecto contineantur, ac neque opere, neque cursu exerceantur, neque frigori committantur, nec in angusto, clauso uel, ne aliae aliarum conceptus elidant, nam haec omnia incommoda foetum abigunt. Quod tamen si aut partu, aut abortu equa laborauit, re medio erit filicula trita, et aqua tepida permista, dataque per cornu. Sin autem prospere cessit, minime manu contingendus pululus erit, nam leditur etiam leuissimo contactu, tantum cura adhibebitur, ut et amplo, et calido loco cum matre uersetur, ne aut frigus adhuc infirmo noceat, aut mater in angustiis eum obterat. Paulatim deinde producendus erit, prouidendumque ne stercore ungulas adurat. Mox cum firmior fuerit, in eadem pascua, in quibus mater est, dimittendus, ne desyderio partus sui laboret equa. Nam id praecipue genus pecudis amore natorum, nisi fiat potestas, noxam trahit. Vulgari foeminae solene est omnibus anis parere, generosam conuenit alternis continere, quo firmior pullus lacte materno laboribus certaminum praeparetur.

De etate admissarii, et quis pullus generetur. Cap. XXVIII.

MAREM putant minorem trimo non esse idoneum admissurae, posse uero usque ad uigesimum annum progenerare, foeminae nam biniam recte concipere, ut post tertium annum enixa foetus educet, eamque post decimum non esse utilem, quod ex annosa matre tarda sit, atque iners proles. Quae siue ut foemina, siue ut masculus concipiat, nostri arbitri fore Democritus affirmat, qui praecipit, ut cum progenerari marem uelimus, sinistrum testiculum admissarii lineo finiculo, alio uel quolibet obligemus, cum foeminam, dextrum, idemque in omnibus penē pecudibus faciendum censet.

De indole,

De indole, & forma equi.

Cap. XXIX.

CUM uero natus est pullus, confestim licet indolem aestimare, si hilaris, si intrepidus, si neque conspectu, nonaeque rei auditu terretur, si ante gregem procurrat, si lascivia, & alacritate, interdum & cursu certans aequales exuperat, si fossam sine cunctatione transilit, pontem, flumenque transcendit. Haec erunt honesti animi documenta. Corporis uero forma constabit exiguo capite, nigris oculis, naribus apertis, breuibus auriculis, & arrectis, cervice molli, lataque, nec longa, densa iuba, et per dextram partem profusa, lato, & musculorum toris numeroso pectore, grandibus armis, & rectis, lateribus inflexis, spina duplici, uentre substricto, testibus paribus, & exiguis, latis lumbis, & subfidentibus, cauda longa, & setosa, crispaque, mollibus, atque altis, rectisque cruribus, tereti genu, paruoque, neque introrsus spectanti, rotundis clunibus, foemineibus torosis, ac numerosis, duris ungulis & altis, & concavis, rotundisque, quibus coronae mediocres suppositae sunt, sic uniuersum corpus compositum, ut sit grande, sublime erectum, ab aspectu quoque agile, & ex longo, quantum figura permittit, rotundum. Mores autem laudantur, qui sunt ex placido, & ex conatato mitissimi, nam hi & ad obsequia reperiuntur habiles, et ad certamina laborum patientissimi, equus bimus ad usum domesticum recte domatur, certaminibus autem expleto triennio, sic tamen ut post quartum demum annum labori committatur. Annorum notae cum corpore mutantur, nam dum bimus et sex mensium est, medii dentes superiores, & inferiores cadunt, cum quartum agit annum, hi, qui canini appellantur, deiectis, alios affert, intra sextum deinde annum, molares superiores cadunt. Sexto anno, quos primos mutauit, exaequat. Septimo omnes explentur aequaliter, & ex eo cauatos gerit, nec postea quot annorum sit, manifesto comprehendi potest. Decimo tamen anno tempora canuari incipiunt, & supercilia nonnunquam canescere, & dentes prominere. Haec, quae ad animum, & mores, corpusque, & etatem pertinent, dixisse satis habeo, nunc sequitur curam recte, & minus ualentium demonstrare.

De cura, & medicina equorum.

Cap. XXX.

Colu.

y

SI SANIS est *maies*, celerius torrefacto tritico, q̄ ordeo reficitur, sed & uini potio danda est, ac deinde paulatim eiusmodi cibi subtrahendi immistis ordeo fursuribus, dum cōsuescat faba, & puro ordeo ali. Nec minus quotidie corpora pecudum q̄ hominum defricanda sunt, ac sepe plus pdest pressa manu subegisse terga, q̄ si largissime abos praebeas. Multum autē refert robur corporis, ac pedum seruare, quod utrunq; custodiemus, si idoneis temporibus ad praesepia, ad aquam, ad exercitationem pecus duxerimus, curaq; fuerit, ut stabulētur sicco loco, ne humore madescant ungulae, quod facile euitabimus, si aut stabula roboreis axibus cōstrata aut diligenter subinde emundata fuerit humus & paleae superiectae. Plerunq; iumenta morbos capiunt lassitudine, & aestu, nonnunquam & frigore, & cum suo tēpore urinae non fecerint, uel si sudant, & à conatatione confestim biberint, uel si cum diu steterint, subito ad cursum extimulata sunt. Lassitudini quies remedio ē, ita ut in fauces oleū, uel adeps uino mista infundatur. Frigori fomenta adhibent, caputq; spina, & tepenti adipe uel uino liniunt. Si urinam non facit, eadem ferē remedia sunt, nam oleum immistum uino super ilia, & renes infunditur, & si hoc parum profuit, melle decocto, & sale collyriū tenue indit forameni, quod me at urina, uel musci uina, uel thuris mica, uel de bitumine collyrium inferitur naturalibus. Haec eadem remedia adhibent, si urina genitalia deusserit. Capitis dolorem indicant lachrymae, quae profluunt, auresq; flaccidae, & cernix cū capite aggrauata, et in terrā submissa. Tum res indit uena, quae sub oculo est, & os calda fouetur, ciboq; abstinet primo die. In postero aut potio ieiuno tepidae aquae praebetur, ac uiride gramen, tum uetus foenum, uel molle stramentum substernitur, crepusculoq; aqua iterum datur, parumq; ordei cum uiciae libris ijs, ut perexigua portione cibi ad iusta perducatur. Si equo maxillae dolent, calido aceto fouendae, & axungia uetere confricandae sunt, eademq; mediana tumentibus adhibenda est. Si artus laeserit, aut sanguinem demiserit, medio ferē in utroq; crure uenae soluant, & thuris polline cū eo, qui profluit, sanguine immisto, artus linantur, & ne plus iusto exinaniatur, stercus ipsius iumenti fluentibus uenis ad motū fasciis obliget. Postero quoq; die ex ysdem sanguis detrahatur, eodemq; modo curetur, ordeoq; abstineatur exiguo foeno dato. Post triduum deinde usq; in diem

sextum porri succus instar trium cyathorum mistus cum olei hemina fauibus per cornu infundatur. Post sextum diem lente ingredi cogatur, et cum ambulauerit, in piscinam demitti cum conueniet, ita ut natet, sic paulatim firmioribus cibis adiutus ad ista perducatur. At si bilis molesta iumento est, uenter intumescat, nec emittit uentos. Manus uncta inseritur aluo, et obsessi naturales exitus adaperiunt, exemptoque stercore posita cumila bubula, et herba pedicularis cum sale trita, et decocta melli miscentur, atque ita facta collyria subiunguntur, quae uentrem mouent, bilemque omnem deducunt. Quidam myrrhae tritae quadrantem cum hemina uini fauibus infundunt, et anum liquida pice oblinunt. Alij marina aqua lauant aluum, alij recenti muria. Solent et uermes quasi lumbrici nocere intestinis, quorum signa sunt, si iumenta cum dolore crebro uoluant, si admonent caput utero, si caudam saepius iactant. Pns medicina est ita, ut supra scriptum est, inserere manum, et finem eximere, deinde aluum marina aqua, uel muria dura lauare, postea radicem capparum tritam cum sestario aceti fauibus infundere, nam hoc modo praedicta intereunt animalia.

Ad tussim.

Cap. XXXI.

OMNI autem imbecillo pecori alte substernendum est, quo mollius cubet. Recens tussis celeriter sanatur, pinsita lente, et a ualuulis separata, minuteque mollita. Quae cum ita facta sunt, sestarius aquae calidae in eandem mensuram lentis miscetur, et fauibus infunditur, similisque medicina triduo adhibetur, ac uiridibus herbis, cacuminibusque arborum recreatur egrotum pecus. Vetus autem tussis discutitur porri succo trium cyathorum cum olei hemina fauibus infuso, usdemque, ut supra monuimus, cibis praebitis. Impetigines, et quicquid scabies occupat aceto, et alumine defricantur. Nonnunquam, si haec permanent, paribus ponderibus permistis nitro, et sasso alumine, cum aceto linuntur. Papulae feruentissimo sole usque eo strigile raduntur, quoad eliciatur sanguis, tum ex aequo miscentur radices agrestis herbae, sulfurque, et pix liquida cum alumine. Et eo medicamine praedicta uitia curantur.

Ad intertriginem, et scabiem.

Cap. XXXII.

INTERTRIGO bis in die subluatur aqua calida. Mox decocto, ac trito sale cum adipe defricatur, dum saniei uis emanat. Scabies

mortifera huic quadrupedi est, nisi celeriter succurritur. Quæ, si levis est, inter initia candenti sub sole, uel cædria, uel oleo lentissimè linitur, uel urticæ semine, & oleo detritis, uel unguine æti, uel quod in lanabus salitus thynnus remittit. Præcipue tamen huic noxæ salutaris est adeps marini uituli. Sed si iam inueterauerit, uehementioribus opus est remedijs. Propter quod bitumen, & sulfur, & ueratrum picæ liquidæ, axungiaq; ueteri commista pari pondere incoquantur, atq; ea compositione curantur, ita ut prius scabies ferro erasa, perluatur urina. Sæpe etiam scalpello usq; ad uinum refecare, & amputare scabiem profuit, atq; ita factis ulceribus mederi liquida picæ, atq; oleo, quod expurgant, & replent uulnera æque. Quæ cum expleta sunt, ut celerius cicatricem, & pilum ducant, maxime proderit fuligo ex abeno ulcere infricata.

Ad muscas, & oculorum dolores.

Cap. XXXIII.

MUSCÆ quoq; uulnera infestantes summovebimus picæ, et oleo, uel unguine mistis, & in fufis, cætera erui farina recte curantur. Cicatrices oculorum ieiuna salina, & sale defricatæ extenuantur, uel cum fusili sale trita sepiæ testa, uel semine agrestis pastinacæ pinsito, & per linteam super oculos expresso. Omnisq; dolor oculorum inunctione succi plantaginis, cum melle attico, uel si id non est, utiq; thymino celeriter lenatur. Nonnunquam etiam per nares profluvium sanguinis periculum attulit. Idq; repressum est infuso naribus uiridis coriandri succo.

Ad fastidia ciborum, & labem pestiferam remedia. Ca. XXXIIII.

INTERDUM & fastidio ciborum languescit pecus. Eius remedium est genus seminis, quod git appellatur. Cuius duo cyathi triti adiunguntur olei cyathis tribus, & uini sextario, atq; ita faucibus infunduntur. Et nausea discutitur, etiam si caput alij tritum cum uini hemina sæpius potandum præbeas. Suppuratio melius ignea lamina, quam frigido ferramento referatur, et expressa, postea linamentis curatur. Est etiam illa pestifera labes, ut intra paucos dies equæ subita macie, & deinde morte corripiantur. Quod cum accidit, quaternos sextarios gari singulis per nares infundere utile est, si minoris formæ sunt, nam si maioris etiam congios. Ea res omnem pituitam per nares eliat, & pecudem expurgat.

De equarum rabie.

Cap. XXXV.

R A R A quidem, sed & hæc est equarum nota rabies, ut cum in aqua imaginem suam uiderint, amore inani capiant. Et per hunc oblitæ pabuli, tabe cupidinis intereant. Eius uesaniæ signa sunt, cum per pascua ueluti extimulatæ concursant, subinde ut circumspectantes requirere, ac desiderare aliquid uideantur. Mentis error discutitur, si deductas ad aquam. Tum demum speculatæ deformitatem suam pristinae imaginis abolent memoriam. Hæc de uniuerso equarum genere satis dicta sunt. Illa proprie præcipienda sunt iis, quibus mularum greges curæ est submittere.

De Mulis.

Cap. XXXVI.

I N E D V C A N D O genere mularum antiquissimum est diligenter exquirere, atque explorare parentem future proles foeminam, & marem, quorū si alter non est idoneus, labat et quod ex duobus fingitur. Equam conuenit in annos decem, quousque amplissimam, atque pulcherrimam formam sit, membris fortibus patientissimam laboris eligere, ut discordantem utero suo generis alieni stirpem insitam facile recipiat, ac perferat, & ad foetum non solum corporis bona, sed & ingenij conferat. Nam cum difficulter iniecta genitalibus locis animentur semina, tum et concepta diutius in partum adolescunt, ut quæ peracto anno mense tertio decimo uix eduntur, natisque inheret plus socordiae paternae, quam uigoris materni. Verumtamen ut equæ dictos in usus minore cura reperiunt, ita maior est labor eligendi maris, quoniam sæpe iudicium probantis frastretur experimentum. Multi admissarij specie tenus mirabilissimam sobolem formam, uel sexu progenerant. Nam siue paru corporis foeminas fingant, siue etiam speciosi, plures mares, quam foeminas, reditum patrisfamiliae minuunt. At quidam contempti ab aspectu, pretiosissimorum seminum feraces sunt. Nonnunquam aliqui generositatem suam natis exhibent, sed hebetes uoluptate, rarissime sollicitantur ad uenerem. Huiusmodi mari sensim magistri subadmonere debent generis eiusdem foeminam, quoniam am similia similibus familiariora fecit natura. Ita enim efficitur, ut eius obiectu, cum uias etiam superiectu eblanditus est, uelut incensus, & obcecatus cupidine, subtracta, quam petierat, fastiditæ imponatur equæ.

Ad temperandam *seuitiam* admissarij in libidinem *furētis*.

Cap. XXXVII.

EST & alterum genus admissarij *furētis* in libidinem, quod nisi astu inhibeat, affert gregi perniciem. Nam & sepe uinculis abruptis grauidas inquietat, & cum admittitur, cerniabus, dorsisq; *foeminarū* imprimit morsus. Quod ne faciat, paulisper ad molam uinctus amoris *seuitiam* labore temperat, & sic ueneri modestior admittitur. Nec tñ aliter admittendus est etiam clementioris libidinis, quoniam multum refert naturaliter sopitum pecudis ingenium modica exercitatione concuti, atq; excitari, uegetioremq; factum marem *foemina* iniungi, ut tanta quadam ui *semina* ipsa principijs agilioribus figurent. Mula autē non solum ex equa, & asino, sed ex asina, & equo, item q; onagro, & equa generat. Quidam uero non dissimulandi auctores, ut Marcus Varro, & ante eū Dionysius, ac Mago prodiderunt, mularum *foetus* regionibus Africæ adeo non prodigiosos haberi, ut tam familiares sint incolis partus earum, q̄ sint nobis equarum. Neq; tamen ullum est in hoc pecore, aut animo, aut forma prestantius, q̄ quod seminabit asinus, quāquā possit huic aliquatenus comparari, qd̄ progenerat onager, nisi & indomitum, & seruitio contumax syluestri more, strigosum, patris pferret habitum. Itaq; eiusmodi admissarius nepotibus magis, q̄ filiis utilior est. Nam ubi asina, & onagro natus admittit equæ, per gradus infracta feritate quicquid ex eo prouenit, paternam formam, & modestiam, fortitudinem, celeritatemq; auitā refert. Qui ex equo, & asina concepti generantur, quāuis à patre nomen traxerint, quod *hinni* uocantur, matri per omnia magis similes sunt. Itaq; cōmodissimum est asinum destinare mularum generi seminando, cuius (ut dixi) species experimento est speciosior. Verūtamen ab aspectu non aliter probari debet, q̄ ut sit amplissimi corporis, cernice ualida, robustis, ac latis costis, pectore musculofo, & uasto, *foeminibus* lacertosis, cruribus compactis, coloris nigri, uel maculosi, nam *murinus* cum sit in asino uulgaris, tum etiam non optime respondet in mula. Neq; nos uniuersa quadrupedis species decipiat, si qualem probamus, cōspiciamus, nam quemadmodū arietum, quæ sunt in linguis, & palatis maculae, plerūq; in uelleribus agnosce deprehenduntur, ita si discolor

res pilos asinus in palpebris, aut auribus gerit, sobolem quoque frequenter facit diuersi coloris, qui & ipse etiam si diligentissime in admissario exploratus est, sepe tamen dominum decipit. Nam interdum etiam citra prædicta signa dissimiles sui mulas fingit, quod accidere non aliter reor, quàm ut auitus color primordij seminis mistu reddatur nepotibus. Igitur qualem descripsi asellum, cum est à partu statim genitus, oportet matri statim subtrahi, & ignorantæ equæ subijci. Ea optime tenebris fallitur. Nam obscuro loco partu eius amoto, prædictus quasi ex ea natus alitur. Cui deinde cum decem diebus insuevit equa, semper postea destinanti præbet ubera. Sic nutritus admissarius equas diligere cõdisit. Interdum etiam, quãuis materno lacte sit educatus, potest à tenero conuersatus equis, familiariter earum consuetudinem appetere. Sed non oportet minorem, quàm trinum admitti. Atque id ipsum si concedatur, uere fieri conueniet, cum & defecto uiridi pabulo, & largo ordeo firmandus, nonnunquam et salinadus erit. Nec tamen teneræ fœminæ committetur, nam nisi prius ea marem cognouit, adsilientem admissarium calibus proturbat, et iniuria depulsum etiam cæteris equis reddit inimicum. Id ne fiat, de gener, & uulgaris asellus admonetur, qui soliatet obsequia fœminæ, neque is tamen inire sinitur. Sed, si iam est equa ueneris patiens, confestim ab actō uiliore, pretioso mari iungitur. Locus est ad hos usus extructus (machinam uocant rustici) qui duos parietes aduerso cliuulo inædificatos habet, & angusto intervallo sic inter se distantes, ne fœmina conluctari, aut admissario ascendenti auertere se possit. Aditus est ex utraq; parte, sed ab inferiore clatris munitus, ad quæ capistrata imo cliuo constituit equa, ut & prona melius ineuntis semina recipiat, & facilem sui tergoris ascensum ab editiori parte minori quadrupedi præbeat, quæ cum ex asino conceptum edidit, partum sequenti anno uacua nutrit. Id enim utilius est, quàm quod quidam faciunt, ut & fœtam nihilo minus admissio equo impleant. Annicula mula recte à matre repellitur, & amota montibus, aut feris locis pasçitur, ut ungulas duret, sitque postmodum longis itineribus habilis, nam cli tellis aptior mulus, illa quidem agilior. Sed uterque sexus & uia recte graditur, & terram commode profandit, nisi pretium quadrupedis rationem rustici oneret, aut campus graui gleba robora bouum deposcat.

De medicinis eorum.

Cap. XXXVIII.

MEDICINAS huius pecoris plerunq; iam in alijs generibus edocui, propria tamen quedam vitia mularum non omit tam, quorum remedia subscripsi. Febrienti mulæ cruda brassica datur. Suspiriosæ sanguis detrahatur, & cum sextario vini, atq; olei thuris semina, marrubij succus instar hemina mistus infunditur. Suffraginosæ, ordeacea farina imponitur, mox suppuratio ferro reclusa linamentis curatur, uel gari optimi sextarius cum libra olei per narem sinistram demittitur. Admischeturq; huic medicamini trium, uel quatuor ouorum albus liquor separatis uittellis. Fœmina secari, & interdum inuri solent. Sanguis demissus in pedes, ita ut in equis emittitur. Vel si est herba, quam uerratum uocant rustici, pro pabulo ædit. Est ὄσχυρος, cuius semen detritum, & cum uino datum prædicto uitio medet. Maliciae & lãgor submonetur sæpius data potione, quæ recipit semina triti sulfuris, ouumq; crudum, & tritæ myrrhæ pondus denarij. Hæc tria uino admischentur, atque ita faucibus infunduntur. Sed & tussi, doloriq; uentris eadem ista æque medentur. Ad maciem nulla res tantum quantum medica potest. Ea herba uiridis, nec tarde tamen arida fœni uice saginat iumenta. Verum modice danda, ne nimio sanguine strãgulef pecus. Lassæ et estuanti mulæ, adeps in fauces demittitur, merumq; in os suffundit. Cetera exequemur i mulis, sicut prioribus huius uoluminis partibus tradidimus, quæ curam bouum, equarumq; continent.

173

LVCII IVNII MODERATI
COLVMELLAE DE RE
RVSTICA LIBER
SEPTIMVS.

De Asello.

Cap. I.

E MINORE pecore dicturus P. Silui-
ne, principium tenebit minor Arcadiae, uilis
hic, uulgarisq; asellus, cuius pleriq; rusticarū
rerum authores in emendis, tuendisq; iumen-
tis praecipuam rōnem uolunt eē, nec iniuria.
Nam ēt eo rure, quod pascuo caret, continer-
i potest, exiguo & qualicunq; pabulo cōten-
tus. Quippe uel folijs, spinisq; uel pertiis salignis alitur, uel obie-
cto faece sarmentorū. Paleis uero, quibus penē oēs regiones abun-
dant, ēt glisat. Tum imprudentis custodis negligentiam fortissi-
me sustinet, plagarū, & penuriae tolerantissimus, propter q̄ tar-
dius deficit, q̄ ullum aliud armentū. Nā laboris, & famis maxi-
me patiens, raro morbis afficit. Huius animalis tam exiguae tu-
telae plurima, & necessaria opa supra portionem respondent, tū
et facilem terrā qualis in Betica, totaq; Libye sit, lenibus aratris
profandat, & non nimio pondere uehicula trahat. Saepe ēt, ut
celeberrimus poeta memorat, Tardi costas agitator aselli.
Vilibus aut onerat pomis, lapidemq; reuertens
Incissum, aut atrae massam picis urbe reportat.
Iam uero molarum, & conficiendi frumenti penē solennis est hu-
ius pecoris labor. Quare omne rus tanquam maxime necessariū
desyderat asellum, qui, ut dixi, pleraq; utensilia & uehere in ur-
bem, & reportare collo, uel dorso commode potest. Qualis autē
species eius uel cura probatissima sit, superiore libro, cum de pre-
tioso praeciperetur, satis dictum est.

De Ouibus emendis, tuendisq;.

Cap. II.

POST maiores quadrupedes ouilli pecoris secunda ratio est,
quae prima sit, si ad utilitatis magnitudinem referas. Nā id praeci-
pue nos cōtra frigoris uiolentiam protegit, corporibusq; nostris
liberaliora praebet uelamina. Tum ēt casei, lactisq; abundantia
non solum agrestes saturat, sed ēt elegantium mensas, incūdis et

COLVMELLAE.

numerofis dapibus exornat. Quibusdam uero nationibus frumenti expertibus uictum commodat, ex quo Nomadum, Geta- rumq; plurimi γαλακτοπόται dicuntur, igitur id pecus, quod molliffimū fit, ut ait prudentiffime Celfus, ualitudinis tutiffimæ est, minimeq; pestilentia laborat. Verūtamen eligendum est ad naturam loci, quod semper obseruari non solum in hoc, sed etiā in tota ruris disciplina Virgilius præcipit, cum ait.
Nec uero terræ ferre omnes omnia possunt.

Pinguis & campestris situs proceras oues tolerat, gracilis & col- linus quadratas, syluestris & montosus exiguas, pratis planisq; noualibus tectum pecus comodiffime pasitur. Idq; non solū ge- neribus, sed etiam coloribus plurimum refert. Generis eximij mi- lesias, calabras, appulasq; nostri existimabant, earumq; optimas tarentinas. Nunc gallicæ pretiosiores habentur, earumq; præci- pue altinates. Item quæ circa Parmam, & Mutinam macris sta- bulantur campis. Color albus cum sit optimus, tum etiā est uti- liffimus, quod ex eo plurimi fiunt, neque hic ex alio. Sunt etiam suapte natura pretio commendabiles pullus, atque fuscus, quos præbent in Italia Pollentia, in Batia Corduba. Nec minus Asia rutilos, quos uocant ἐρυθρούς. Sed & alias uarietates in hoc pecoris genere docuit usus exprimere, nam cum in municipi- um gaditanū ex uicino Africæ miri coloris syluestres ac feri arie- tes, sicut aliæ bestię munerarijs deportarentur, M. Columella pa- truius meus acris uir ingenij, atq; illustris agricola quosdā mer- catus in agros transtulit, & mansuetos tectis ouibus admisit. Eæ primum hirtos, sed paterni coloris agnos ediderunt, q; deini- de & ipsi tarentinis ouibus impositi, tenuioris uelleris arietes p- generauerunt. Ex his rursus quicquid conceptum est, maternam molliem, paternum & anitum retulit colorem. Hoc modo Co- lumella dicebat, qualemcunq; speciem, quæ fuerit in bestijs, p- ne- potum gradus mitigata feritate, reduisse. Ad propositum reuer- tar. Ergo duo genera sunt ouilli pecoris, molle, & hirsutum, sed in utroq; uel emendo plura communia, quædam tamen sunt pro- pria generosi, quæ obseruari conueniat. Communia in emendis gregibus ferè illa, si candor lanæ maxime placet, nunquam can- didiffimos mares legeris, quoniam ex albo sepe fuscus editur par- tus, ex erythreo, uel pullonunquam generatur albus.

De arietibus eligendis.

Cap. III.

IT A Q V E non solum ea ratio est probandi arietis, si uellere candido uestitur, sed etiam si palatum, atq; lingua concolor lanæ est. Nā cum hæ corporis partes nigre, aut maculosæ sunt, pulla uel etiam uaria nascitur proles, idq; inter cætera eximie talibus numeris significauit. idem qui supra, Illum autem, quamuis aries sit candidus ipse, Nigra subest udo tantum cui lingua palato, Reijce, ne maculis infuset uellera pullis Nascentum. Vna, eademq; ratio est in erythreis, & nigris arietibus, quorum similiter (ut iam dixi) neutra pars eē debet discolor lanæ, multoq; minus ipsa uniuersitas tergoris maculis uariet. Ideo nisi lanatas oves enī non oportet, quo melius unitas coloris appareat, quæ nisi præcipua est in arietibus, paternæ notæ plerunq; natis inhaerent. Habitus aut maxime probatur, cum est altus, atq; procerus, uentre promisso, atq; lanato, cauda longissima, densiq; uelleris, fronte lata, testibus amplis, intortis cornibus, nō quia magis hic sit utilis (nam est melior mutilus aries) sed quia minime nocent. Intorta potius q̄ surrecta, et patula cornua. Quibusdam tñ regionibus, ubi cæli status uuidus, uento, susq; est, capros, et arietes optauerimus uel amplissimis cornibus qđ ea porrecta, altaq; maximā partē capitis à tempestate defendant. Itaq; si plerunq; est atrocior hyems, hoc genus eligemus, si clementior, mutilum probabimus marem, qm̄ est illud incōmodum in cornuto, quod cum sentiat se uelut quodam naturæ loco capitis armatum, frequenter in pugnam procurrat, et fit in fœminas quoq; procacior. Nam riualem (quis solus admissuræ nō sufficit) uiolentissime psequitur, nec ab alio tempestiuum patit iniri gregem, nisi cū est fatigatus libidine. Mutilus autē, cum se tanq̄ exarmatū intelligat, nec ad rixam prōptus est, & in uenere mitior. Itaq; capri uel arietis petulā sœuitiam, pastores hac astutia repellunt, mensuræ pedalis robustā tabulam cōfigunt aculeis, & aduersum fronti cornibus religant. Ea res ferū prohibet à rixa, cū stimulatū suo ic̄tu ipsum se sandat. Epicharmus aut syracusanus, qui pecudū mediānas diligentissime cōscripsit, affirmat pugnacem arietē mitigari terebra secundū auriculas foratis cornibus, qua curuant in flexu. Eius quadrupedis ætas ad p̄generan-

COLVMELLAE.

dum optima est trima, nec tñ inhabilis usq; in annos octo. Fœmina post bimatum maritari debet, iuuenisq; habetur quinquennis. Fatiscit post annum septimum. Igitur ut dixi, mercaberis oves intonsas, uariam, & canam comam improbabis, quod sit incerti coloris. Maiorem trima dente minacem sterilē repudiabis. Eliges bimam uasti corporis, cernice prolixa, prolixi uilli, nec asperi, lanosi, & ampli uteri, nam uitandus est glaber, & exiguus, atq; hæc ferè cōmunia sunt, in comparandis ouibus. Illa ē turendis humilia facere stabula, sed in longitudinem potius, q̄ in latitudinem porrecta, ut simul hyeme calida sint, nec angustiae fœtus oblidant. Ea poni debent contra medium diem, nanq; id pecus, quāuis ex omnibus animalibus uestitissimum, frigoris tamen impatientissimum est, nec minus aestiui uaporis. Itaque cohors clausa sublimi macerie præponi, uestibulo debet, ut sit in eā tutus exitus aestiuādi. Deturq; opera, nequis humor subsistat, ut semper quam aridissimis filiabus, uel culmis stabula constrata sint, quo purius, & mollius incubent fœtæ. Sint quala mundissima, nequa earū ualetudo, quæ præcipue custodienda est, infestet uiligine. Omni autem pecudi larga p̄benda sunt alimenta, nam uel exiguus numerus, cum pabulo satiat, plus domino reddit, q̄ maximus grex, si senserit penuriam. Sequeris autem noualia non solū herbida, sed quæ plerunq; uidua sunt spinis ut amurq; sepius auctoritate diuini carminis.

Si tibi lanitium curæ est, primum aspera sylua,
Lappæq; tribuliq; absint.

Quoniā ea res, ut ait idē, scabras oves reddit, cum tonsis illotus adhæsit sudor, et hirsuti seuerunt corpora uepres. Tim ē quoti die minuitur lana, quæ quanto prolixior in pecore concreuit, tātō magis obnoxia est rubis, qbus uelut hamis inuncta à pascen tñ tergoribus auellit. Molle uero pecus ē uelamen, quo protegit, amittit, atq; id non paruo sumptu reparat. Inter auctores ferè cōstat primū esse admissuræ tps uernum parilibus si sit ouis matura, sin uero fœta circa Iuliū mensem. Prius tñ haud dubie p̄babilius, ut messem uindemia, fructum deinde uineaticū fœtura pecoris exapiat, et totius autūni pabulo satiat agnus ante mœstiā frigore atq; hyemis ieiuniū, confirmet. Nā melior est autumnalis uerno, sicut ait uerissime Celsus, quia magis ad rem p̄tinet, ut ante aestiuum q̄ hybernum solstitium cōualescat, solusq;

ex omnibus animalibus bruma commodè nascitur. At si res exi-
git, ut plurimi mares progenerandi sint, Aristoteles uir callidissi-
mus rerum naturæ præcipit admissuræ tempore obseruare sicis
diebus halitus septentrionales, ut contra uentum gregem pasca-
mus, & eum spectans admittatur pecus. At si fœminæ genera-
de sunt, austrinos flatus captare, ut eadem ratione matrices in-
eantur. Nam illud, quod priore libro docuimus, ut admissarij
dexter, uel etiam sinister uinculo testiculus obligetur, in magnis
gregibus operosum est. Post fœturam deinde longinquæ regiõis
pascua petiturus opilio, ferè omnē sobolem pastioni reseruet sub
urbanæ. Villicus enim teneros agnos, dum adhuc herbæ sunt ex-
pertes, lanio tradit, quoniam & paruo sumptu deuehuntur, &
ijs summotis, fructus lactis ex matribus non minor percipitur.
Summitti tamen etiam in uicinia urbis quandoq; oportebit, nā
uernaculum pecus peregrino longe est utilius, nec committi de-
bet, ut totus grex effœtus senectute dominum destituat, cū præ-
sertim boni pastoris uel prima cura sit annis omnibus in demor-
tuarum uitiosarumq; ouium locum totidem uel etiam plura ca-
pita substituere, qm̄ sæpe frigorū atq; hyemis sæuitia, pastore
decipit, & eas oues interimit, quas ille tempore autumnī ratus
adhuc esse tolerabiles, non summonerat. Quo magis etiam pro-
pter hos casus, nisi ualidissima, q̄ non cōprehendatur hyeme, no-
uaq; pro genie repleatur numerus. Quod qui faciet seruare de-
bebit, ne minori quadrimæ, ne' ue ei, quæ exæssit annos octo, p-
lem submittat. Neutra enim ætas ad educandum est idonea, tū
etiam quod ex uetere materia nascitur, plerunq; congeneratum
parentis senium refert, nam uel sterile, uel imbecillum est. Partus
uero incipientis pecoris non secus, q̄ obstetricum more custodiri
debet. Neq; enim aliter hoc animal, q̄ muliebris sexus enititur,
sæpiusq; etiam quanto est omnis rationis ignarum, laborat in
partu. Quare ueterinariæ mediinæ prudens esse debet pecoris
magister, ut si res exigat, uel integrum conceptum, cum trāsuer-
sus hæret locis genitalibus, extrahat, uel ferro diuisum citra ma-
tris perniciem partum educat, quod græci uocant ἐμβρύου
ἄκρος. Agnus autem, cum est editus, erigi debet, atq; uberibus
admoneri, tum etiam eius diductum os pressis humectare pa-
pillis, ut condiscat maternum trahere alimentum. Sed prius q̄
hoc fiat, exiguum emulgendum est, quod pastores colostram uo-

cant. Ea nisi aliquatenus emittitur, nocet agno, & biduo quo na-
 tus est, cum matre clauditur, ut & ea partum suum foueat, & il-
 le matrem agnoscere condiscat. Mox deinde quandiu non lasci-
 uit, obscuro, & calido septo custodiatur. Postea luxuriantem uir-
 gea cū cōparibus area claudi oportebit, ne uelut puerili nimia
 exultatione macescat. Cauendumq; est, ut tenerior separet à ua-
 lidioribus, quia robustus angit imbecillum, satisq; est mane prius
 q̄ grex procedat in pascua, Deinde etiam crepusculo redeūtibz
 saturis ouibus admiscere agnos, qui cum firmi esse cōperint, pas-
 cendi sunt intra stabulum cythiso, uel medica, tum etiam fursuri-
 bus, aut si permittit annona, farina ordei, uel erui. Deinde, ubi
 cōualuerint, circa meridiem pratis, aut noualibus uillæ cōtiguīs
 matres admoendæ sunt, & à septo emittendi agni, ut cōdiscat
 foris pasci. De genere pabuli, ut & ante diximus, & nunc eorū,
 quæ omīssa sunt, meminerimus, iucundissimas herbas esse, q̄ ara-
 tro proscissis aruis nascantur, deinde quæ pratis uligine carenti-
 bus, palustres syluestresq; minime idoneas haberi. Nec tamē ulla
 sunt tam blanda pabula, aut etiam pascua, quorum gratia non
 exoleſcat usu continuo, nisi pecudū fastidio pastor occurrerit præ-
 bito sale, quod uelut ad pabuli condimentum per æstatem cana-
 libz ligneis impositum cum è pastu redierint oues, lambūt, atq;
 eo sapore cupidinem bibendi, pascendiq; concipiunt. At cōtra pe-
 nuria hyemis succurritur obiectis intra tectū per præsepia cibis.
 Aluntur autem commodissime repositis ulmeis, uel ex fraxino frō-
 dibz, uel autumnali fœno, quod cordin uocatur. Nam id mol-
 lius, & ob hoc iucundius est, q̄ maturum. Cythiso quoq; & sati-
 ua uida pulcherrime pascuntur, necessaria tamen, ubi cetera de-
 fecerunt, etiam ex leguminibus palea, nam per se ordeū, uel fresa
 cum suis ualuulis faba, uel cicercula sumptuosior est, q̄ ut subur-
 banis regionibus exiguo pretio possit præberi, sed si uilitas pmit-
 tit, haud dubie sunt optima. De tpibus aut pascēdi, & ad aquā
 ducēdi per æstatem non aliter sentio, q̄ ut prodidit Maro.
 Luciferi primo cum sydere frigida rura
 Carpat, dum mane nouum, dum gramina canent,
 Et ros in tenera pecori gratissimus herba.
 Inde ubi quarta sitim cœli collegerit hora,
 Ad puteos, aut alta greges ad stagna pducamus, medioq; die,
 ut idem, ad uallem,

Sicubi magna Iouis antiquo robore quercus
 Ingentes tendit ramos, aut sicubi nigrum
 Illiabus crebris sacra nemus accubat umbra.

Rursus deinde iam mitigato uapore cōpellantur ad aquam, et
 per æstatem id faciendum, & iterum ad pascua producendum.
 Solis ad occasum, cum frigidus aëra uesper
 Temperat, & saltus refiat iam rosida luna.

Sed obseruandum est sydus æstatis per emersum caniculæ, ut ante
 meridiem grex in occidentem spectans agatur, et in eā partem
 progrediatur, post meridiem in orientem. Siquidē plurimum re/
 fert, ut pascentium capita sint obuersa soli, qui plerūq; nocet ani/
 malibus oriente prædicto sydere. Hyeme, & uere matutinis tēpo/
 ribus intra septa contineantur, dū dies aruis geliadia detrahat.
 Nam pruinosa ijs diebus herba pecudi grauedinem creat, uen/
 tremq; pluit, quare et frigidis, humidisq; tēpibus ani semel tū ei
 potestas aquæ facienda est. Tum qui sequitur gregē circūspectus,
 ac uigilans (id quod omnibus, & omnium quadrupedum custo/
 dibus præcipitur) magna clementia moderatur, idemq; duci pro/
 prior q̄ domino, & in cogendis, recipiendisq; ouibus adclamatio/
 ne, ac baculo minetur, nec unquam telum emittat in eas, neq; ab/
 his longius recedat, nec aut recubet, aut cōsidat, nam nisi proce/
 dit, stare debet, quoniam grex q̄dem custodis officium, sublimē,
 ælissimamq; oculorum ueluti speculam, desyderat, ut neq; tar/
 diiores, & grauidas, dum cunctantur, neq; agiles, & foetas, dum
 procurrunt, separari à cæteris sinat, ne fur, aut bestia hallucinan/
 tem pastorem decipiat, sed hæc communia ferè sunt in omni pe/
 core ouillo. Nunc, quæ sunt generosi propria dicemus.

De ouibus tectis.

Cap. IIII.

GRÆCVM pecus, quod pleriq; tarentinum uocant, nisi
 cum domini præsentia est, uix expedit haberi, siquidē & curam,
 & cibum maiorem desyderat, nam cum sit uniuersum genus lani/
 gerum cæteris pecudibus mollius, tum ex omnibus tarentinū est
 mollissimum, quod nullam domini, aut magistrorum inertiam su/
 stinet, multoq; minus auaritiam nec æstus, nec frigoris patiens.
 Raro foris, plerūq; domi alit, & est auidissimū cibi, cui si detra/
 hitur fraude uillia, clades, sequitur gregē. Singula capita per hye/
 mem recte pascuntur ad præsepia tribus ordeï, uel fræsæ cum suis

ualuulis fabæ, aut cicercule quatuor sextarijs, ita ut & aridam frondem præbeat, aut siccam, uel uiridē medicam, cythifum ue, tum etiam cordi fœni septena pondo, aut leguminū paleas adfatim. Minimus agnis uendundis in hac pecude, nec ullus lactis reditus haberi potest, nam & qui summoneri debent, paucissimos post dies q̄ editi sunt, immaturi ferè macantur, orbæq; natis suis matres alienæ soboli præbent ubera. Quippe singuli agni binis nutriabus summittuntur, nec quicquā subtrahi summissis expedit, quo saturior lactis agnus celeriter confirmet, & parta nutriaci consociata minus labore in educatione fœtus sui. Quam ob causam diligenti cura seruandum est, ut & suis quotidie matribus, & alienis non amantibus, agni subruentur. Plures autem in eiusmodi gregibus, q̄ in hirtis masculos enutrire oportet. Nam prius q̄ fœminas inire possint mares castrati, cū bimatum expleuerint, enecantur, & pelles eorum propter pulchritudinem lanæ maiore pretio, q̄ alia ueller a mercatibus traduntur. Liberis autem campis, & omni surculo, ruboq; uacantibus ouem græcam pascere meminerimus, ne, ut supra dixi, & lana carpatur, & tegumen. Nec tamen ea minus sedulam curam foris, quia non quotidie proædit in pascua, sed maiore domestica postulat, nam sæpius detergenda, & refrigeranda ē, sæpius eius lana diducenda, uinoq; & oleo insuccanda, nonnūquam etiam tota est eluenda, si diei permittit aprietas, idq; ter anno fieri sat est. Stabula uero frequenter euerrenda, & purganda, humorq; omnis urinae deuerrendus est, qui commodissime siccatur perforatis tabulis, quibus ouilia consternuntur, ut grex supercubet, nec tantū cœno, aut stercore, sed exitiosis quoq; serpentibus tecta liberentur, quod ut fiat, Discæ & odoratam stabulis incendere cædrum, Galbaneoq; agitare graues nidore chelydros. Sæpe sub inuotis præsepibus aut mala tactu. Vipera delituit, cælumq; exterrita fugit, Aut tecto assuetus coluber. Quare, ut idem inbet. Cape saxa manu, cape robor a pastor, Tollentemq; minas, & sibila, colla tumentem Deijce. Vel ne istud cum periculo facere necesse sit, muliebres capillos, aut ceruina sæpius ure cornua, quorum odor maxime non patitur stabulis prædictam pestem consistere. Tonsuræ certum

certain tempus anni per omnes regiones seruari non potest, quoniam nec ubiq; tarde, nec celeriter æstas ingruit, & est modus optimus cōsyderare tempestates, quibus ouis, neq; frigus, si lanam detraxeris, neq; æstus, si non dum detonderis, sentiat. Verum ea quandoq; detonsa fuerit, ungi debet tali medicamine. Succus excocti lupini, ueterisq; uini sex, & amurca pari mensura miscetur, eoq; liquamine tonsa ouis imbuitur, atq; ubi per triduum delibuto tergoe medicamina perbiberit, quarto die si est uicinia maris, ad litus deducta mersatur, si minus est, cœlestis aqua sub dio salibus in hunc usum durata, paulum decoquitur, eaq; grex perluitur. Hoc modo curatum pecus toto anno scabrum fieri nō posse Celsus affirmat. Nec dubium est, quin etiam ob eam rem lana quoq; mollior, atq; prolixior renascatur.

Medicinæ pecoris ouilli.

Cap. V.

ET QVONIAM recensuimus cultum, curamq; recte ualentium, nunc quemadmodum uitis, aut morbo laborantibus subueniendum sit, præcipiemus, quāquam pars hæc exordij penè tota iam exhausta sit, cum de medicina maioris pecoris priore libro disputaremus, quia cum sit ferè eadem corporum natura minorum, maiorumq; quadrupedum, pauca, paruaq; morborum, & remedium differentie possunt inueniri, quæ tamen quantulacūq; sint, non obmittentur à nobis. Si ægrotat uniuersum pecus, ut et ante præcepimus, & nunc (quod remur eē maxime salutare) iterum adseueramus in hoc casu, quod est remedium præsentissimū pabula mutemus, & aquationes totius regionis, & alium quæramus statum cœli, curemusq; si ex calore, & æstu concepta pestis inuasit, ut opaca rura, si inuasit frigore, ut eligatur aprica. Sed modice, ac sine festinatione persequi pecus oportebit, ne imbecillitas eius longis itineribus aggrauetur, nec tamen in totum pigre, ac segniter agere. Nam quemadmodum fessas morbo pedes uehementer agitare, & extendere non conuenit, ita conducat mediocriter exercere, & quasi torpentes excitare, nec pati ueterno cōsenescere, atq; extinguī. Cum deinde grex ad locū fuerit perductus in lacinas colonis distribuatur, nā particulatim facilius q̄ uniuersus conualescat, siue quia ipsius morbi halitus minor est in exiguo numero, seu quia expeditius cura maior adhibetur paucioribus. Hæc ergo, & reliqua (ne nunc eadem repetamus) quæ

Colu.

Z

superiore exordio percensuimus, observare debemus, si uniuersae laborabūt, illa, si singulae. Oues frequentius, q̄ ullum aliud aīal infestantur scabie, quae ferē nascitur, sicut noster memorat poeta.

Cum frigidus imber

Altius ad uinum perſedit, & horrida cano

Bruma gelu.

Vel post tonsuram, si remedium praedicti medicaminis nō adhibeas, si aestiuum sudorem mari, uel flumine nō abluas, si tonsum gregē patiaris syluestribus rubis, ac spinis sauciari, si stabulo utaris, in quo mulae, aut equi, aut asini steterūt. Praecipue tñ exiguitas aibi maciē, macies autē scabiem facit. Hec ubi coepit irrepere, sic intelligitur, uitiosum locum pecudes, aut morsu scalpunt, aut cornu, uel ungula tundunt, aut arbori adfricant, parietibus ue detergent, quod ubi aliquam facientem uideris, comprehendere oportebit, & lanam diducere, nam subest aspera cutis, & uelut quaedam prurigo. Cui primo quoq; tempore occurrendum est, ne totam progeniem coinquinet, & quidem celeriter, cum & alia pecora, tum praecipue oves contagione uexent. Sunt aut complura medicamina, quae icārco enumerabimus, non q̄a cunctis uti necesse sit, sed qm̄ nonnullis regionibus quaedā reperiri nequeunt, ex pluribus aliquod inuentum remedio sit. Facit aut cōmode primum ea compositio, quā paulo ante demonstrauimus, si ad ſecem, et amurcam, succumq; decocti lupini misceas portione equa detritū albū elleborum. Potest et scabiē tollere succus uiridis cicutae, quae uerno tpe, cum iam caulem nec adhuc semina facit, deſa contundit, atq; expressus humor eius fictili uase recondit, duabus urnis liquoris, admisto salis tortidi semodio. Quod ubi factū est, oblitum uas in sterquilinio defodit, ac toto anno ſimi uapore concoctū, mox promit, tepefactumq; medicamentum liniſ scabrae parti, quae prius aspera testā, uel pumice defricta redulceratur. Eidem remedio est amurca duabus partibus decocta, item uetus hominis urina testis cādentibus inusta. Quidam tamen hanc ipsam subiectis ignibus quinta parte minuunt, admiscētq; pari mensura succum uiridis cicutae. Deinde singularibus tritis, & piis liquidae, & fricti salis singulos sextarios infundunt. Facit etiam sulfuris triti, & piis liquidae modus equalis igne lento coactus. Sed georgicum carmē asfirmat, nullam esse praestantiorē medicinam.

Quam si quis ferro potuit resādere summum

Ulceris os, alitur vitium, vivitq; tegendo.

Itaq; referandum est, & ulcera medicamentis curandū. Subijci
deinde æque prudenter febriatibus ouibus, de talo vel inter du
as ungulas sanguinem emitti oportere, nā plurimum id quidem
Profuat incensos æstus auertere, & inter

Ima ferire pedis salientem sanguine venam.

Nos est sub oculis & de auribus sanguinem detrahimus. Clavi
quoq; dupliciter infestant ovem, siue cū subluuies, atq; itertrigo
in ipso discrimine ungula nascit, seu cum idem locus tuberculū
habet, cuius media ferè parte canino similis extat pilus, eiq; sub
est vermiculus. Subluuies & itertrigo picæ per se liquida, vel
alumine & sulfure, atq; aceto mistis rite eruentur, vel tenero pu
nico malo, prius q̄ grana faciat, cū alumine pinsito, supfusoq; ace
to, vel æris ærugine infriata, vel combusta galla cum austero vi
no lenigata, & superposita. Tuberculum, cui subest vermiculus,
ferro quamcunctissime circūsecari oportet, ne, dum amputatur, est
quod infra est animal vulneremus. Id enim cum sauciatur, vene
natam saniem mittit, qua respersum vulnus ita insanabile facit,
ut totus pes amputandus sit, cū tuberculum diligenter circūcider
is, candens serum vulneri per ardentem tedā instillato. Ovem
pulmonariā similiter ut suam curari cōuenit, inserta per auricu
lam, quā ueterinarij consiliginem uocant. De ea iā diximus, cū
maioris pecoris medicinā tradidimus. Sed is morbus æstate ple
rūq; concipit, si defuit aqua, propter quod uaporibus omni qua
drupedi largius bibendi potestas danda est. Celso placet, si est in
pulmonibus vitium, acris aceti tantum dare, quantum ouis sus
stinere possit, vel humanæ ueteris urinæ tepesactæ triū heminaꝝ
instar per sinistram narē corniculo infundere, atq; axūgiæ sextar
tem fauibus inferere. Est et insanabilis sacer ignis, quā pusulam
uocant pastores, ea nisi cōpesat intra primam pecudē, quæ tali
malo correpta est, uniuersum gregem cōtagione prosternit, sic q̄
dem quod nec medicamentorū, nec ferri remedia patiuntur. Nam pe
nè ad oēm tactum excandesat. Sola tamen ea fomenta nō asper
natur lactis caprini, quod infusum tantum ualeat, ut & blandia
tur igneam seuitiā, differens magis occidionem gregis, quā phre
bens. Sed ægyptiæ gentis auctor memorabilis Dolus Mendesius,
cuius cōmenta, quæ appellantur græcè ὑπομνήματα sub nomine
Democriti falsò produnt, censet propter hanc sapiens, ac diligēter.

COLVMELLAE.

ouium terga perspicere, ut si forte sit in aliqua tale vitium deprehensum, confestim scrobem defodiamus in limine stabuli, & viuiam pecudem, quæ fuerit pusulosa, resupinam obruamus, patiamurq; super obrutam meiere totum gregem, quod eo facto, morbus propulsetur. Bilis æstimo tempore non minima perniciēs potiōe depellitur humanæ veteris urinæ, quæ ipsa remedio est etiam pecori arcuato. At si molesta pituita est, canelæ bubulæ, uel nepetæ syluestris furculi lana inuoluti naribus inferunt, uersanturq; donec sternuat ovis. Fracta pecudum non aliter, quàm hominum crura sanantur, inuoluta lanis oleo, atq; uino insuccatis, & mox circumdatis ferulis conligata. Est etiam grauis perniciēs herbæ sanguinariæ, quam si pasta est ovis, toto uentre distenditur, contrahiturq; & spumam quandam tenuem tetri odoris expuit. Celeriter sanguinem mitti oportet sub cauda in ea parte, quæ proxima est clunibus, nec minus in labro superiore uena soluenda est. Suspiriose laborantibus, auriculæ ferro resandendæ, mutandæq; regiones, quæ in omnibus morbis, ac pestibus fieri debere censemus. Agnis quoq; succurrendum est uel febrientibus, uel ægritudine alia affectis, qui ubi morbo laborant, admitti ad matres non debent, ne in eas perniciem transferant. Itaq; separatim mulgendæ sunt oues, & coelestis aqua pari mensura lacti miscenda est, atq; ea potio febrientibus danda. Multi lacte caprino iisdem medentur, quod per corniculum infunditur faucibus. Est etiam mentigo, quam pastores ostiginem uocant, mortifera lactentibus. Ea plerumq; fit si per imprudentiam pastoris emissi agni, uel etiam hœdi rosidas herbas depauperint, quod minime committi oportet. Sed cum id factum est, uelut ignis sacer, os, atque labra foedis ulceribus obsidet. Remedio sunt hyssopus, & sal. æquis ponderibus contrita, nam ea mistura palatum, atq; linguam totumq; os perfricatur. Mox ulcera lauantur aceto, & tunc picæ liquida, cum adipe suillo perlinuntur. Quibusdam placet eruginis tertiam partem, duabus ueteris axungiae portionibus commiscere, tepesactoque uti medicamine. Nonnulli folia cupressi trita miscent aquæ, & ita perluunt ulcera, atque palatum. Castrationis autem ratio iam tradita est, neq; enim alia in agnis, quàm in maiore quadrupede seruatur.

De caprino pecore.

Cap. VI.

ET QVONIAM de oniarico satis dictū est, ad caprinū pe-
cus nunc reuertar. Id aut genus dumeta potius, q̄ campestem si-
tum desyderat, asperisq; et locis, ac syuestribus optime pasatur.
Nā nec rubos auersatur, nec uepribus offendit, et arbusculis, fru-
tetisq; maxime gaudet. Ea sūt arbutus, atq; alaternus, cythifusq;
agrestis, nec minus ilignei, querneiq; frutices, qui in altitudinem
nō profiliunt. Caper, cui sub maxillis binæ uerruculae collo depen-
dēt, optimus habet, amplissimi corporis, cruribus crassis, plena
et breui æruice, flacidis et p̄grauātibus auribus, exiguo capite,
nigro dēsoq; et nitido, atq; lōgissimo pilo. Nā et ipse tondetur.
Vsum in castrorum, ac miseris uelamina nautis.

Est autem mensium septem satis habilis ad procreandum, quo-
niam inmodicus libidinis, dum adhuc uberibus alitur, matrem
stupro superuenit, et ideo celeriter, et ante sex annos cōfenesat,
quod immatura ueneris cupidine primis pueritiæ temporibus ex-
haustus est. Itaq; quinquennis parum idoneus habetur fœminis
implendis. Capella præcipue probatur simillima hirco, quem de-
scripsimus, si etiam est uberis maximi, et lactis abundantissimi.
Hanc pecudem mutilam parabimus quieto cœlistatu, nam pro-
celloso, atq; imbrifero cornuta semper, nam et omni regione ma-
ritos gregum mutilos esse oportebit, quoniam cornuti ferè perni-
ciosi sunt propter petulantiam. Sed numerum generis huius ma-
iorem, q̄ centum capitum sub uno clauso nō expedit habere, cum
lanigeræ mille pariter commode stabulentur. Atq; ubi capræ pri-
mum comparantur, melius est unum gregem totum, q̄ ex pluris-
bus particulatim mercari, ut nec in pastioe separatim laciniæ di-
ducantur, et in caprili maiore concordia quietæ consistant. Huic
pecudi nocet æstus, sed magis frigus, et præcipue fœtæ, quæ geli-
adio hyemis conceptum fecit, nec tamen ea sola creant abortus,
sed etiam glans cum citra satietatem data est. Itaq; nisi pōt assa-
tim præberi, non est gregi permittenda. Tempus admissuræ per
autumnū ferè ante mensem Decembrem præcipimus, ut pro-
pinquante uere gemmantibus frutetis, cum primum syluæ noua
germinant fronde, partus edatur. Ipsum uero caprile uel natura-
li saxo, uel manu constratum eligi debet, quoniam huic pecori ni-
hil substernitur. Diligensq; pastor quotidie stabulum conuerit,
nec patitur stercus, aut humorem consistere, lutum ue fieri, quæ
cuncta sunt capris inimica. Parit autem, si est generosa proles,

frequenter duos, nonnunquam trigeminos. Pessima est foetura cum matres binæ, ternos hœdos efficiunt. Qui ubi editi sunt, eodem modo, quo agni educantur, nisi quod magis hœdorum lascivia compescenda, et arctius cohibenda est. Tum super lactis abundantiam samera, uel cythisus, aut edera præbenda, uel et cacumina lentisæ, aliæque tenues frondes obijciendæ sunt. Sed ex geminis singula capita, quæ uidentur esse robustiora, in supplementum gregis reseruantur, cætera mercantibus tradunt. Anniculæ, uel binæ capellæ (nam utraq; ætas partum edit) submitti hœdum non oportet. Neque enim educare, nisi trima debet. Sed anniculæ confestim depellenda soboles, binæ tãdiu admittendæ, dum possit esse uendibilis. Nec ultra octo annos matres seruandæ sunt, quod assiduo partu fatigatæ steriles existant. Magister autem pecoris acer, durus, strenuus, laboris patientissimus, alacer, atque audax esse debet, et qui per rupes, per solitudines, per uepres facile uadat, et non ut alterius generis pastores sequatur, sed plerunque ut antecedit gregem. Quare eum esse maxime strenuum opus est. Capellæ, dum dumeta pascunt, capris cédunt, subinde quæ cedit compesci debet, ne procurrat, sed placide, ac lente pabulet, ut et largi sit uberis, et non strigosissimi corporis.

De medicina caprarum.

Cap. VII.

ALIA namque genera pecorum, cum pestilentia uexantur, prius morbo, et langoribus macescunt, solæ capellæ quauis opimæ, atque hilares subito concidunt, uelut aliqua ruina gregatim prosternantur. Id accidere maxime solet ubertate pabuli. Quam obrem statim cum unam, uel alteram pestis percussit, omnibus sanis detrahendus. Nec tota die pascendæ, sed medijs quatuor horis intra septa claudendæ. Sin alius langor infestat, pabulo medicantur arundinis, et albæ spinæ radiabus, quas cum ferreis pilis diligenter contuderimus, admiscemus aquam pluuialem, solamque potandam pecori præbemus. Quod si ea res in ægritudine non depellit, uendenda sunt pecora, uel si neque id contingere potest, ferro necanda, sullendaque. Mox interposito spatio conueniet alium gregem reparare, nec tamen ante, quam pestilens tempus anni, siue id fuit, hyemis uertatur æstate, siue autumnus, uere mutetur. Cum uero singulæ domo laborabunt, eadem remedia, quæ

etiam ouibus, adhibebimus. Nam cum distendetur aqua cutis, quod uitium græci uocant ὑδρώμα, sub armo pellis leuiter incisa perniciosum transmittet humorem, tum factum uulnus picæ liquida curetur. Cum effœta loca genitalia tumbunt, aut secundæ non responderint, defruti sextarius, uel cum id defuerit, boni uini tantundem faucibus infundatur, & naturalia ærato liquore repleantur. Sed ne nunc singula persequar, sicut in ouillo percore prædictum est, caprino medebimur.

Casei faciendi ratio.

Cap. VIII.

CASEI quoque faciendi non erit omittenda cura utique longinquis regionibus, ubi mulctram deuehere non expedit. Is porro si tenui liquore conficiatur, quamcellerrime uendendus est, dum adhuc uiridis succum retinet, si pingui, & opimo, longiorem patitur custodiam, sed lacte fieri debet syncero, & quærecentissimo, nam requietum, uel mistum celeriter acorem concipit. Id plerumque coaguli agni, aut hædi coagulo, quauis possit & agrestis cardui flore conduci, et seminibus gneti, nec minus ficulneo lacte, quod emit tit arbor, si eius uirentem faucies corticem. Verum optimus caseus est, qui exiguum medicaminis habet. Minimum autem coagulum recipit sinu lactis argentei pondus denarii. Nec dubium, quoniam fiamululis glaciatus caseus incunctissime sapiat. Sed mulctra, cum est repleta lacte, non sine tepore aliquo debet esse, nec tamen admonenda est flammis, ut quibusdam placet, sed haud procul igne constitutuenda, & confestim cum concreuit, liquor in fiscellas, aut in calathos, uel formas transferendus est. Nam maxime refert primo quoque tempore serum percolari, & à concreta materia separari. Quam ob causam rustici nec patiuntur quidem sua sponte pigro humore defluere, sed cum paulo solidior caseus factus est, pondera superponunt, quibus exprimatur serum. Deinde ut formis, aut calathis exemptus est, opaco, ac frigido loco, ne possit uitiari, quous mundissimis tabulis componitur, & aspergitur tritis salibus, ut exudet acidum liquorē. Atque ubi duratus est, uehementius premittur, ut conspissetur. Et rursus torrido sale contingitur, rursusque ponderibus condensatur. Hoc cum per dies nouem factum est, aqua dulci eluatur, & sub umbra cratibus in hoc factis, ita ordinatur, ne alter alterum caseus contingat, et ut modice siccetur. Deinde quo

tenerior permaneat, clauso neq; uentis obnoxio loco stipatur per complura tabulata. Sic neq; fistulosus, neq; salsus, neq; aridus provenit. Quorum uitiorum primum solet accidere, si parū pressus, secundum, si nimio sale imbutus, tertium, si sole exustus est.

Hoc genus casei potest etiam trans maria permitti. Nam is, qui recens intra paucos dies absumi debet, leniore cura cōficiat, quippe fisciellis exemptus in salem, muriamq; demittitur, & mox in sole paulum siccatur. Nonnulli ante q̄ pecus numellis inducant, uirides pineas nūces in mulctram demittunt, & mox sup eas emulgent, nec separant, nisi cum transmiserint in formas coactam materiam. Ipsos quidam uirides conterunt nucleos, & lacti permiscunt, atque ita congelant. Sunt qui thymum cōtritum, cribroq; colatum cum lacte cogant. Similiter qualiscunque uelis saporis efficere possis, adiecto quod elegeris, condimento. Illa uero notissima est ratio faciendi casei, quem dicimus manu pressum, namq; is paulum gelatus in mulctra dum est tepesactus, rescinditur, & feruente aqua perfusus, uel manu figuratur, uel buxeis formis exprimitur. Est etiam non ingrati saporis muria perduratus, atq; ita malini ligni, uel culmi fumo coloratus. Sed iam redeamus ad originem.

De Suibus, & eorum medianis.

Cap. IX.

IN OMNI genere quadrupedū species maris diligenter eligitur, quoniam frequenter patri similior est progenies, q̄ matri. Quare etiam in suillo pecore probandi sunt totius quidem corporis amplitudine eximij, & qui quadrati potius, q̄ qui longi, aut rotundi sunt, uentre promisso, clunibus uastis, nec perinde cruribus, aut ungulis proceris, amplæ, & glandulosæ cerniis, rostris breuibus, & resupinis. Maximeq; quod ad rem pertinet, quam salacissimos oportet esse mares, q̄ & ab annicula ætate comode progenerant, dum quadrimatum agant, possunt tamen et semestres implere fœminam. Scrofæ probatur longissimi status, & ut sint reliquis membris similes descriptis uerribus. Si regio frigida, & pruinosa est, quamdurissimæ, densæq; & nigre setæ grex eligendus est. Si temperata, atque aprica, glabrum pecus, uel etiam pristinale album potest pasci. Fœmina sus habetur ad partus edendos idonea ferè usque in annos septem, quæ quanto fœcundior est celerius senescit. Annicula non improbe concipit,

sed iniri debet mense Februario. Quatuor quoque mensibus facta, quinto parere, cum iam herbae solidiores sunt, ut et firma lactis maturitas porcis contingat, et cum desierint uberibus ali, stipula pascatur, ceterisque leguminum caducis frugibus. Hoc autem fit longinquis regionibus, ubi nihil nisi submittere expedit. Nam suburbanis lactens porcus ere mutandus est. Sic enim mater non educando, labori subtrahitur, celeriusque iterum conceptum paritum edet. Idque bis anno faciet. Mares uel cum primum ineunt semestres, aut cum saepius progenerauerunt, trimi, aut quadrimi castrantur, ut possint pinguescere. Feminis quoque uulvae ferro exulcerant, et cicatrici claudunt, ne sint genitales. Quod facile non intelligo, quare ratio compellat, nisi penuria cibi, nam ubi est ubertas pabuli, submittere prolem semper expedit. Omne porro situm ruris pecus hoc usurpat, nam et montibus, et campis comode pasatur, melius tamen palustribus agris, quam sitientibus. Nemora sunt convenientissima, quae uestiuntur quercu, subere, fago, cerris, ilicibus, oleastris, tamaricibus, corylis, pomiferisque syluestribus, ut sunt albæ spinæ, græcæ siliquæ, iuniperus, lotos, pinus, cornus, arbutus, prunus, et paliurus, atque achrades pyri. Hæc enim diuersis temporibus mitescunt, ac penè toto anno gregem saturant. At ubi penuria est arborum, terrenum pabulum consectabimur, et sicco limosum præferemus, ut paludem rimentur, effodiantque lumbricos, atque in luto uoluentur, quod est huic pecori gratissimum, quin etiam ut aquis abuti possint, namque et id fecisse maxime per æstatem profuit, et dulces eruisse radículas aquatilis syluæ, tanquam scyrpi, iunci, et de generis arūdinis, quam uulgus cannam uocat. Nam quidem cultus ager opimas reddit sues, cum est graminosus, et pluribus generibus pomorum confitus, ut per anni diuersa tempora, mala, pruna, pyrum, multiformes nuces, ac ficum præbeat, nec tamen propter hæc paræ horreis, nam sæpe de manu dandum est, cum foris deficiat pabulum, propter quod plurima glans uel aisternis in aquam, uel fumo tabulatis recondenda est. Fabæ quoque, et similitum leguminum, cum uilitas permittit, facienda est potestas, et utique uere, dum adhuc lactant. Viridia pabula suibus plerumque nocent, itaque mane priusquam procedant in pascua, conditiuis cibis sustinentur, ne immaturis herbis citetur aluus. Eoque uicio pecus emaciatur, nec ut ceteri greges nuuersi claudi debet, sed per porticus

haræ faciendæ sunt, quibus aut à partu, aut etiam prægnantes includantur, nam præcipue suæ cæternatim, atq; inconditæ, cum sint pariter incluse, super alias aliæ cubant, & fœtus elidunt. Quare, ut dixi, iunctæ parietibus haræ construendæ sunt in altitudinem pedum quatuor, ne sus transilire septa queat, nam contegi non debet, ut à superiore parte custos numerum porcorum recenset, & si quem decumbens mater oppresserit, cubanti subtrahat. Sit autem uigilans, impiger, industrius, nauus omnium, quas pascat. Et matricum, & iuniorum meminisse debet, ut unus cuiusq; partum consideret. Semper obseruet enitentem claudatq; ut in hara fœtum edat. Tum denotet protinus quotq; & quales sint nati, & curet maxime nequis sub nutrice aliena educetur, nam facillime porci, si euaserint haram, miscent se, & scrofa cum decubuit, æque alieno, ac suo prebet ubera. Itaq; porculatoris maximum officium est, ut unamquamq; cum sua prole claudat, qui si memoria deficiat, quo minus agnoscat cuiusque progeniem, pice liquida eandem notam scrofæ, & porci imponat, & siue per litteras, siue per alias formas unumquemq; fœtum cum matre distinguat, nam in maiore numero diuersis notis opus est, ne confundatur memoria custodis. Attamen quia id facere gregibus amplis uidetur operosum, commodissimum est haras ita fabricare, ut limen earum in tantam altitudinem consurgat, quantum possit nutrix euadere, lactens autem supergredi non possit. Sic nec alienus irrepit, & in cubili suam quisque matrem nidus expectat, qui tamen non debet octo capitum numerum excedere. Non quin ignorem fœcunditatem scrofarum maioris esse numeri, sed quia cæterumne fatiscit, quæ plures educat. Atq; eæ, quibus partus summittitur, cocto sunt ordeo sustinendæ, ne ad maciem summam perducantur, & ex ea ad aliquam perniciem. Diligens autem porculator frequenter suile conuertrat, & sepius haras, nam quamuis prædictum animal in pabulationem spurce uersetur, mundissimum tamē cubile desiderat. Hic fere cultus est suili pecoris recte ualentis.

De medicina suum.

Cap. X.

SEQVITVR ut dicamus, quæ sit cura uitiosi. Febricitantium signa sunt, cum obstipæ suæ transuersa capita ferunt, ac per

pascua subito cum paululum procurrerunt, consistunt, et uertigine correptæ concidunt. Earum notanda sunt capita, quam in partem proclinentur, ut ex aduersa parte de auricula sanguinem mittamus. Item sub cauda duobus digitis à clunibus intermissis uenam feriamus, quæ est in eo loco satis ampla, eamq; sarmento prius oportet uerberari, deinde ab ictu uirgæ tumentem ferro resandi, detractoque sanguine colligari saligneo libro, uel et ulmeo. Quod cum fecerimus uno, aut altero die sub tecto pecudem continebimus, et aquam modicè calidam quantam uolent, farinamq; ordeæ singulos sextarios præbebimus. Strumosis sub lingua sanguis mittendus est, qui cum profluxerit, sale trito cum farina triticea confricari totum os conueniet. Quidam præsentius putant esse remedium, cum per cornu singulis ternos cyathos gari demittunt. Deinde fissas taleas ferularum lineo funiculo religant, et ita collo suspendunt, ut strumæ ferulis contingantur. Nauseantibus quoque salutaris habetur eburnea scobis sale fricta, et fabæ minutæ fræ commisto, ieiunisq; prius quam in pascua prodeant obiecta. Solet etiam uniuersum pecus egrotare ita, ut emacietur, nec cibos capiat, productumq; in pascua medio campo procumbat, et quodam uetero pressum somnos æstiuo sub sole captet. Quod cum facit, totus grex tecto clauditur stabulo, atque uno die abstinetur potione, et pabulo. Postridie radix anguinei cucumeris trita, et commista cum aqua datur sitientibus, quam cum pecudes biberunt, nausea correptæ uomitant, atque expurgantur, omniq; bile depulsa acercula, uel faba, dura muria conspersa, deinde (sicut hominibus) aqua calida potanda permittitur. Sed cum omni quadrupedi per æstatem fitis sit infesta, tum suillo maxime est inimica, quare non ut capellam, uel ouem, sic et hoc animal bis ad aquam duci præcipimus, sed si fieri potest, iuxta flumen, aut stagnum per ortum caniculæ detineri, quia cum sit æstuosissimum, non est contentum potione aquæ, nisi obesam illuuiem, atque distentam pabulis aluum demerferit, ac refrigerauerit, nec ulla re magis gaudet, quam rinis, atque cœnoso lacu uolutari. Quod si locorum situs repugnat, ne ita fieri possit, puteis extracta, et large canali bus immissa præbenda sunt pocula, quibus nisi affatim satientur pulmonariæ fiunt. Isque morbus optime sanatur auriculis inserta consiligine, de qua radícula diligenter, ac sæpius iam locuti sumus. Solet etiā uitiosi splenis dolor eas infestare, quod accidit, cū

ficatas magna prouenit, & ut Buccolicon loquitur poema,
Strata iacent passim sua quæq; sub arbore poma.
Nam pecus insatiabile est. Sues enim, dū dulcedinem pabuli con-
seētantur, supra modum æstate splenis incremento laborant. Cui
succurritur, si fabricentur canales ex tamaricibus, et rusco, repleā-
turq; aqua, & deinde sitientibus admoueātur. Quippe ligni suc-
cus medicabilis, epotus intestinum tumorem compestat.

De castratione suum.

Cap. XI.

CASTRATIONIS aut in hoc pecore duo tēpora seruā-
tur, ueris, & autumnis, & eius administrandæ duplex ratio. Pri-
ma illa, quam iam tradidimus, cū duobus uulneribus impressis
per unamquāq; plagam singuli exprimuntur testiculi, altera est
speciosior, sed magis periculosa, q̄ tamen non omittam. Cum uiri-
lem partem unā ferro resectam detraxeris, per impressum uulnus
scalpellum inserto, & mediam quasi cutem, quæ interuenit duo-
bus mēbris genitalibus, rescindito, atq; unciis digitis alterx quoq;
testiculum educto, sic fiet una cicatrix adhibitis cæteris remedijs,
quæ prius docuimus. Illud aut, quod pertinet ad religionem pa-
trisfamilias, nō reticendum putauit. Sunt quædā scrofæ, quæ mā-
dunt fœtus suos, quod cum sit, nō habetur prodigiū, nam sues ex
omnibus pecudibus impatientissime famis sunt, ita ut aliquādo,
si indigeant pabuli, nō tantum alienam (si liceat) sebolē, sed etiā
suā cōsumant. De armentis, cæterisq; pecudibus, et magistris, per
quos quadrupedum greges humana solertia domi, forisq; curan-
tur, atq; obseruantur (nisi fallor) satis accurate differui.

De canibus.

Cap. XII.

NUNC, ut exordio priore sum pollicitus, de mutis custodibus
loquar, quāquam canis falso dicitur mutus custos. Nam quis ho-
minum clarius, aut tanta uociferatione bestiam, uel furem præ-
dicat, q̄ iste latrat? quis famulus amantior domini? quis fidelior
comes? quis custos incorruptior? quis excubitor inueniri pōt uigi-
lantior? q̄s deniq; ultor, aut uindex cōstantior? Quare uel in pri-
mis hoc aīal mercari, tueriq; debet agricola, quod & uillā, et fru-
ctus, familiamq; & pecora custodit. Eius aut parandi, tuendiq;
triplex ratio est, nāq; unum genus aduersus hominū insidias eli-
gitur, & id uillā, quæq; iuncta sunt uillæ custodit, at alterum p

pellendis iniurijs hominum, ac ferarum, & id obseruat domi stabulum, foris pecora pascuntia. Tertium uenandi gratia comparatur, idq; nō solum nihil agricolam iniuat, sed & auocat, desidēq; ab opere suo reddit. De uillatico igitur, & pastoralis dicendum est, nam uenaticus nihil pertinet ad nostram professionem. Villæ custos eligēdus est amplissimi corporis, uasti latratus, canoriq;, ut prius auditu maleficum, deinde etiam conspectu terreat, & tamen nōnunquam, ne uisus quidem horribili fremitu suo fuget insidiātem. Sit autem coloris unius, isq; magis eligatur albus in pastoralis, niger in uillatico, nam uariis in neutro est laudabilis, pastor album probat, quoniam est feræ dissimilis, magnoque opus interdum discrimine est in propulsandis lupis sub obscuro mane, uel etiam crepusculo, ne si non sit albo colore conspicuus, pro lupo canem feriat. Villaticus, qui hominū maleficijs opponitur, siue luce clara fur aduenerit, terribilior niger cōspiciatur, siue nocte, ne cōspiciatur quidem propter umbræ similitudinem, quā obrem tectus tenebris canis tutiorem accessum habeat ad insidiā tē. Probatur quadratus potius, q̄ longus, aut breuis, capite tam magno, ut corporis uideatur pars maxima, deiectis, & propendentibus auribus, nigris, uel glaucis oculis acri lumine radiantibus, amplo uillosoq; pectore, latis armis, cruribus crassis & hirtis, cauda breui, uestigiorum articulis & ungibus amplissimis, qui græce δ'ρακὼς appellantur. Hic erit uillatici canis status præcipue laudandus. Mores autem neq; mitissimi, neq; rursus truces, atq; crudeles, quod illi furem quoq; adulantur, hi etiā domesticos inuadunt. Satis est seueros esse, nec blandos, ut nōnunquā etiam consenuos iratus intueantur, semper exandescant in exteros. Maxime autem debent in custodia uigilaces conspici, nec erronei, sed assidui, & circumspecti magis, q̄ temerarij. Nam illi nisi quod certum compererunt, non indicant, hi uano strepitu, & falsa suspitione conitantur. Hæc iccirco memorāda credidi, quia non natura tantum, sed etiam disciplina mores facit, ut cū emendi potestas fluierit, eiusmodi probemus, & cum educabimus domi natos, talibus institutis formemus. Nec multum refert an uillatici corporibus graues, & parum ueloces sint. Plus enim minus, & in gradu, quam eminus, & in spatioso cursu facere debent, nam semper circa septa, & intra ædificium consistere, immo ne longius quidē recedere debent, satisq; pulchre funguntur offi-

tio, si & aduenientem sagaciter adoriuntur, & latratu conteri-
 rent, nec patiuntur propius accedere, uel si constantius appro-
 pinquantem uolenter inuadunt. Primum est enim non adten-
 tari, secundum est laessitum fortiter, & perseueranter uindicta-
 ri. Atq; hæc de domesticis custodibus, illa de pastoralibus. Pecua-
 rius canis neq; tam strigosus, aut pernix debet esse, q̃ qui damas,
 cernosq; & uelocissima sectatur animalia, nec tam obesus, aut
 grauis, q̃ uillæ, horreiq; custos, sed & robustus nihilo minus, &
 aliquatenus promptus, ac strenuus, quoniam & ad rixam, &
 ad pugnam, nec minus ad cursum comparatur, cum & lupi res-
 pellere insidias, et raptorem ferū consequi fugientem, prædantiq;
 excutere, atq; auferre debeat. Quare status eius longior, produ-
 ctiorq; ad hos casus magis habilis est, q̃ breuis, aut etiam quadra-
 tus, quoniam (ut dixi) nonnunquam necessitas exigit celeritate
 bestiam consecrandam. Ceteri artus similes membris uillatiæ ca-
 nis æque probantur. Cibaria ferè eadem sunt utriq; generi præ-
 benda. Nam si tam laxa rura sunt, ut sustineant pecorū greges,
 omnes sine discrimine canes ordeacea farina, cum sero cōmode
 pascat. Sin autem sirculo confitus ager sine pasuo est, farreo, uel
 triticeo pane satiandi sunt, admisto tamen liquore coctæ fabæ,
 sed tepido, nā feruēs rabiē creat. Huic quadrupedi neq; fœminæ
 neq; mari, nisi post annum permittenda uenus est, quæ si teneris
 conceditur, carpit & corpus & uires, animosq; degenerat. Pri-
 mus effœta partus amouendus est, quoniam tiruncula nec recte
 nutrit, & educatio totius habitus aufert incrementum. Mares
 iuueniliter usq; in annos decem progenerant. Post id tempus in-
 eundis fœminis non uidentur habiles, quoniam seniorum pigra
 soboles existit. Fœminæ cōcipiunt usq; in annos nouem, nec sunt
 utiles post decimum. Catulos sex mensibus primis, dum corrobo-
 rentur, emitti non oportet nisi ad matrem lusus, ac lasciniæ cau-
 sa, postea & cathenis per diem continendi, & noctibus soluēdi,
 nec unquam eos, quorū generosam uolumus indolem cōseruare,
 patiemur alienæ nutricis uberibus educari, quoniam semper &
 lac & spiritus maternus, longe magis ingenij atq; incremēta cor-
 poris auget. Quod si effœta lacte deficiat, caprinum maxime cō-
 ueniet præberi catulis, dum fiant mensium quatuor. Nominibus
 autem non longissimis appellandi sunt, quo celerius quisq; uo-
 catus exaudiat, nec tamen breuioribus, q̃ quæ duabus syllabis

enuntientur, sicuti græcum est σκύλαξ, latinum ferox, græcum
 λήκων latinum celer, uel fœmina, ut sunt græci πούδης. ἄλκη
 ῥῶμη, latina, lupa, cœua, tigris. Catulorum caudas post diem
 quadragesimū, q̄ sint editi, sic castrare conueniet, neruus est, q̄
 per articulos spinæ prorepat, usq; ad ultimam partem caudæ. Is
 mordicus comprehensus, et aliquatenus eductus abrumpit̄, quo
 factō neq; in longitudinem cauda fœdum capit incrementum,
 et (ut plurimi pastores affirmant) rabies arcetur, letifer morbus,
 huic generi.

De morbis, & medicinis canum.

Cap. XIII.

FERE autem per æstatem sic muscis aures canum exulceran-
 tur, sæpe ut totas amittant, quod ne fiat amaris nuibus cōtritīs
 liniendæ sunt. Quod si ulceribus iam præoccupatæ fuerint, cōctā
 picem liquidam suillæ adipi mistam uulneribus stillari conue-
 niet. Hoc eodem medicamine contacti ricini decidunt, nā manu
 non sunt uellendi, ne ut ante prædixeram, faciant ulcera. Pulico
 se cani remedia sunt. Sume cyminum tritum pari pondere, cū ue-
 ratro, aquaq; mistum, et inlitum, seu cucumeris anguinei succū,
 uel si hæc non sunt, uetus amurcæ per totum corpus infusa. Si sca-
 bies infestabit, cythisi, & sesami tantundem conterito, & cū pi-
 cæ liquida permisceto, uitio samq; partem linito. Quod medica-
 mentum putatur etiam hominibus esse conueniens. Eadē pestis,
 si fuerit uehemētior, ædrino liquore aboletur, reliqua uitia sicut
 in ceteris animalibus præcepimus, curanda sunt. Hactenus de
 minore pecore, mox de uillaticis pastionibus, quæ continent uol-
 lucrum, pisciumq; & syluestrium quadrupedum curam, sequen-
 ti uolumine præcipiemus.

LVCII IVNII MODERATI
COLVMELLAE DE RE
RVSTICA LIBER
OCTAVVS.

De uillaticis pastionibus.

Cap. I.

9 VAE FERRE consumabant publi Silui
ne ruris exercendi, colendiq; scientiam, quæq;
pecuariæ negotiationis exigebat ratio, septē
memorauimus libris. Hic nunc sequentis nu
meri titulum possidebit, nec quia proximam
propriamq; rustici curam desyderent ea, quæ
dicturi sumus, sed quia non alio loco, quam
in agris, aut uillis debeant administrari, & tamen agrestibus
magis, q̄ urbanis prosint, quippe uillaticæ pastiones, sicut pecua
riæ non minimam colono stipem conferunt, cum & animum ster
core macerrimis uineis, & omni fusculo, atq; aruo medeantur,
& eisdem familiarem focum, mensamq; pretiosis dapibus opulē
tent, postremo uenditorum animalium pretio uillæ reditum au
gent, quare de hoc quoq; genere pastionis dicendum censui. Est
autem id ferè uel in uilla, uel circa uillam. In uilla est, quod ap
pellant græci δεικνῶντας, καὶ περιεργεῶντας, atq; etiam cum da
tur littoris facultas ἰχθυοτροφεία sedula cura exercentur. Ea
sunt omnia, ut latine potius loquamur, sicut animum cohortaliū
stabula, nec minus earum, quæ conclauibus septæ saginantur,
uel aquatiliū animalium receptacula. Rursus circa uillam po
nuntur μελισσῶντας καὶ χηνοτροφεία quin etiam λαγοτρο
φεία studiose administrant, quæ nos similiter appellamus apū
cubilia, apiaria, uel nantium uolucrum, quæ stagnis, piscinisq;
letantur, auitaria, uel etiam pecudum syluestrium, quæ nemori
bus clausis custodiuntur, uinaria.

De gallinarum generibus, gallis cohortalibus parandis, & nu
triendis.

Cap. II.

PRIVS igitur de his præcipiam, quæ intra septa uillæ pascū
tur, ac de alijs quidem forsitan ambigitur, an sint agrestibus pos
sidenda. Gallinarum uero plerunq; agricolæ cura solennis est.
Earū genera sunt uel cohortaliū, uel rusticarum, uel africanarū.
Cohortalis

Cohortalis est avis, quæ uulgo per omnes ferè uillas conspicitur. Rustica, quæ non dissimilis uillaticæ per aucupem decipit. Eaquæ plurima est in insula, quam nautæ in ligustico mari sitam producto nomine alitis, gallinariam uocitauerunt. Africana est, quæ plerique numidicam dicunt, meleagridi similis, nisi quod rutilam galeam, & cristâ capite gerit, quæ utraq; sunt in meleagride cærulea. Sed ex his tribus generibus cohortales fœminæ propriæ appellantur gallinæ, mares aut galli, semimares, capi, qui hoc nomine uocantur, cum sint castrati, libidinis abolendæ causa, nec tamen id patiuntur amissis genitalibus, sed ferro candente calcaribus iniustis, quæ cum ignea ui consumpta sunt, facta ulcera dum connescant, figulari creta linuntur. Huius igitur uillatici generis non spernendus est reditus, si adhibeatur educandi scientia, quæ plerique grecorum, & præcipue celebrare Delia. Sed & ij, quoniam procera corpora, & animos ad prælia pertinaces requirebant, præcipue tanagricum genus, & rhodium probabant, nec minus chalcidicum, et medicum, quod ab impito uulgo litera mutata melicum appellatur. Nobis nostrum uernaculum maxime placet omissio tamen illo studio grecorum, qui feroissimum quenque alitem certaminibus, & pugne præparabant. Nos enim censemus instituere uetigal industriæ patrisfamilias, non rixosarum animum lanistæ, cuius plerumque totum patrimonium pignus aleæ uictor gallinæus pyctes abstulit. Igitur cui placebit sequi nostra præcepta, consideret oportet primum quæ multas, & cuiusmodi parere debeat matrices. Deinde qualiter eas tueri & pascere, mox quibus anni temporibus earum partus exipere, tum demum ut incubent, & excludant efficere. Postremo ut commode pulli educetur operam dare. His enim curis, & ministerijs exercetur ratio cohortalis, quam greci uocant δευροτογοφία. Parandi autem modus est, ducentorum capitum, quæ pastoris unius curâ dispendant, dum tamen anus sedula, uel puer adhibeatur custos uagatium, ne obsidijs hominum, aut insidiosorum animalium diripiantur. Mercari porro nisi fœcundissimas aues non expedit. Eæ sint rubicundæ, uel fuscæ plumæ, nigrisquæ pennis, ac si fieri poterit, oēs huius, & ab hoc proximi coloris elegantur, sin aliter, euentur albæ, quæ ferè cum sint molles, ac minus uinaces, tum ne fœcundæ quidem facile reperiuntur, atque etiam cōspiciæ, propter quod insignæ candoris ab acapitribus, & aquilis sæpius abripiuntur.

Colu.

&

Sint ergo matricēs p̄bi coloris, robusti corporis, quadratæ, pector
 rosæ, magnis capitibus, rectis, rutilisq; cristulis, albis auribus, &
 sub hac specie quam amplissimæ, nec paribus ungulis, generosissi
 mæq; creduntur, quæ quinos habent digitos, sed ita ne cruribus
 emineant transuersa calcaria. Nam quæ hoc uirile gerit, insigne,
 contumax ad concubitus dedignatur admittere marem, raroq;
 fecunda, etiam cum incubat, calcis aculeis oua perfringit. Galli
 naces mares nisi salacissimos habere nō expedit, atq; in his quoq;
 sicut in fœminis, idem color, idemq; numerus unguium, status al
 tior queritur. Sublimes, sanguineæq; nec obliquæ cristæ, raudi,
 uel nigrantes oculi, breuia, & adunca rostra, maximæ, candidis
 simæq; aures, paleæ ex rutilo albicantes, quæ uelut incanæ barbæ
 dependent, iubæ deinde uariæ, uel ex auro flauæ per colla, ærui
 cæsq; in humeros diffusæ, tum lata, et musculosa pectora, lacertos
 æquæ similes brachijs, alæ tum procerissimæ, candæ duplici ordi
 ne singulis utrinq; p̄minētibus pinnis inflexæ, quinetiā uasta fœ
 mina, & frequenter horrentibus plumis hirta, robusta crura, nec
 lōga, sed infestis uelut sudibus nocenter armata. Mores aut̄ quis
 nō ad pugnam, neq; ad uictoriæ laudem præparentur, maxime tñ
 generosi probantur, ut sint elati, alacres, uigilaces, et ad sæpius ca
 nendum prompti, nec qui facile terreantur, nam interdum resiste
 re debent, & ip̄tegere coniugalem gregem, quin attollentē ni
 nas serpentem, uel aliud noxium animal interficere. Talibus aut̄
 maribus quinæ singulis fœminæ cōparantur. Nam Rhodij gene
 ris, aut mediæ p̄pter grauitatem, neq; patres nimis salaces, nec
 fœcundæ matres, quæ tñ ternæ singulis maritantur, & cum pauca
 oua posuerunt, inertes ad incubandum, multoq; magis ad exclus
 dendum, raro fœtus suos educant. Itaq; quibus cordi est ea gene
 ra propter corporū speciem possidere, cum exceperunt oua gene
 rosarū, uulgaribus gallinis subiiciunt, & ab his exclusi pulli nu
 triuntur. Tanagria plerunq; rhodijs, & medijs amplitudine pa
 res, non multum moribus à uernaculis distant, sicut & chaladi
 ci. Omnium tamen horum generū nothi sunt optimi pulli, quos
 conceptos ex peregrinis maribus, nostrates ediderunt, nam & pa
 ternam speciem gerunt, et salacitatem fœcunditatemq; uernaculā
 retinent. Pumiles aues, nisi quem humilitas earum delectat, nec
 propter fœcunditatem, nec propter alium redditum nimium pro
 bo, tam hercule, quàm nec pugnam, nec rixosæ libidinis ma

rem. Nā plerunq; ceteros infestat, & non patitur iriſceminas, cum ipſe pluribus ſufficere non queat. Impedienda eſt itaq; prociſitas eius ampullaceo corio, quod cum in orbiculum formatum eſt, media pars eius reſcinditur, & per exiſam partem galli pes inferitur, eaq; quaſi compede cohibentur feri mores. Sed, ut ppoſui, iam de tutela uniuerſi generis præcipiam.

De gallinarijs conſtituendis.

Cap. III.

GALLINARIA conſtitui debent parte uillæ, quæ hybernũ ſpectat orientem. Iuncta ſint ea furno, uel culinæ, ut ad aue perueniat ſumus, qui eſt huic generi præcipue ſalutaris. Totius autem officinæ, ideſt ornithonis tres continuæ extruuntur cellæ, quarum, ſicuti dixi, perpetua frons orienti ſit obuerſa. In ea dein de fronte exiguus detur unus omnino aditus mediæ cellæ, quæ ipſa tribus minima eſſe debet in altitudinem, & quoquoſus per deſeptem, in ea ſinguli dextro, leuoq; pariete aditus ad utranq; cellam iaciundi ſunt, iuncti parieti, qui eſt intrantibus aduerſus. Huic autem focus applicetur tam lōgus, ut nec impediatur prædictos aditus, & ab eo ſumus perueniat in utrāq; cellam. Eaq; longitudinis, & altitudinis duodenos pedes habeant, nec plus latitudinis, q̄ media ſublimitas. Diuidantur tabulatis, quæ ſupra ſequaternos, & infra ſeptenos liberos pedes habeāt, quoniam ipſa ſingulos occupant. Utraq; tabulata gallinis ſeruire debent, & ea paruis ab oriente ſingulis illuminari ſenellis, quæ & ipſæ matutinum exitum præbeant auiſus ad cohortem, nec minus ueſperinum introitum. Sed curādum erit, ut ſemper noctibus claudantur, quo tutius aues maneant. Intra tabulata maiores ſenellæ aperiuntur, & eæ clatris muniantur, ne poſſint noxia irreperre animalia, ſic tamen, ut illuſtria ſint loca, quo cōmodius habitent. Auiariusq; ſubinde debet ſpeculari aut incubantis, aut pariturientis foetus, nam etiam in ijs ipſis locis ita craſſos parietes edificare conuenit, ut exiſa per ordinem gallinarũ cubilia recipiāt, in quibus aut oua edantur, aut excludantur pulli. Hoc enim & ſalubrius, & elegantius eſt, q̄ illud, quod quidam faciunt, ut palis in parietes uehementer actis, uimineos qualos ſuperimponāt. Siue aut parietibus, ita, ut diximus, cauatis, aut qlis uimineis, pponēda erunt ueſtibula, per q̄ matrices ad cubilia uel pariendi, uel incubandi eā perueniant. Neq; n. debent ipſis nidis inuolare

& ij

ne dum adsiliunt, pedibus onera cōfringant. Ascensus deinde auibus ad tabulata per utranq; cellam datur iunctis parieti modicis asserculis, qui paulum formatis gradibus asperant, ne sint ad uolantibus lubrici. Sed ab cohorte forinsecus prædictis fenestellis scandulae similiter iniungantur, quibus irreperant aues ad requiem nocturnam. Maxime autem curabimus, ut & hæc auaria, & cetera, de quibus mox dicturi sumus, intrinsecus, & extrinsecus poliatur opere tectorio, ne ad aues seles habeant, aut coluber accessum, & æque noxiæ prohibeantur pestes. Tabulatis insistere dormientem auem non expedit, ne suo lædatur stercore, quod cum pedibus unis adhæsit, podagram creat. Ea perniciēs ut euitetur, perticæ dolantur in quadrum, ne teres leuitas earum supersiliens tem uolucrem nō recipiat. Conquadratae deinde foratis duobus aduersis parietibus induntur, ita ut à tabulato pedalis altitudinis, & inter se bipedalis latitudinis spatium distet. Hæc erit cohortalis officinae dispositio. Ceterum cohors ipsa, per quam uagant, non tam stercore, quam uligine careat, nam plurimum refert aquam non esse in ea nisi uno loco, quam bibant, eamq; mundissimam. Nam stercorosa pituitam conat. Puram tamen seruare nō possis, nisi clausam uasis in hunc usum fabricatis. Sunt autem, quæ aut aqua replentur, aut cibo plumbei canales, quos magis utiles esse ligneos, aut fictiles compertum est. Hi superpositis operculis clauduntur, & à lateribus super mediam partem altitudinis per spatia palmaria modicis foratur canis, ita ut auium capita possint admittere. Nam nisi operculis muniantur, quantulumcumq; aquæ uel ciborum inest, pedibus eueritur. Sunt qui à superiore parte foramina ipsis operculis imponant, quod fieri nō oportet. Nam supersiliens auis prolunice uentris cibos, & aquam conspurcat.

De cibarijs gallinarum.

Cap. IIII.

CIBARIA gallinis præbentur optima, pinsitum ordeum, & uicia, nec minus acercula, tamen et milium, aut panicum. Sed hæc ubi uilitas annonæ permittit, ubi uero ea est carior, excreta tritici minuta cōmode dantur. Nam per se id frumentum, et quibus locis uilissimum est, nō utiliter præbet, quia obest auibus. Potest et lolium decoctum obijci, nec minus surfures modice à farina excreti, qui si nihil habent faris, nō sunt idonei, nec tamen appetunt. Ieiunis cythisi folia, seminaq; maxime probantur, & sunt huic

generi gratissima. Neq; est ulla regio, in qua non possit huius ar-
busculæ copia esse uel maxima. Vinacea quâuis tolerabiliter pas-
cant, dari non debent, nisi quibus temporibus anni auis fœtus
non edit. Nam & partus raro, & oua faciunt exigua. Sed cum
planè post autumnum cessant à fœtu, possunt hoc cibo sustineri.
Attamen quæcunq; dabitur esca per cohortem uagantibus die in-
cipiente, & iam in uesperum declinante bis diuidenda est, ut &
mane non protinus à cubili latius euagentur, & ante crepuscu-
lum propter cibi spem temporis ad officinā redeant, possitq; nu-
merus capitum sæpius recognosci, nā uolatile pecus facile pasto-
ris custodiam decipit. Siccus etiā pulvis, & cinis ubicunq; cohortem
porticus, uel tectum protegit, iuxta parietes reponendus est,
ut sit, quo aues se perfundant. Nam his rebus plumam, pinnasq;
emundant, si modo credimus Ephesio Heracleto, qui ait sues cœ-
no, cohortales aues puluere, uel cinere lauari. Gallina post pri-
mam emitti, et ante horam diei undecimam claudi debet, cuius
uagæ cultus hic, quem diximus, erit. Nec tamen alius clausæ, ni-
si quod ea non emittitur, sed intra ornithonem ter^{ti} die pasitur
maiore mensura. nam singulis capitibus quaterni cyathi diurna
cibaria sunt, cum uagis terni, uel bini præbeantur. Habere etiam
clausam oportet amplum uestibulum, quò prodeat, & ubi apri-
tetur. Idq; sit retibus munitum, ne aquila, uel accipiter inuolet.
Quas impensas, & curas nisi locis, quibus harum rerum uigent
pretia, non expedit adhiberi. Antiquissima est autem cum in om-
nibus pecoribus, tum in hoc fides pastoris, qui nisi eā domino ser-
uat, nullus ornithonis quæstus uincet impensas. De tutela satis di-
ctum est, nunc reliquum ordinem prosequemur.

De seruandis, & supponendis ouis.

Cap. V.

CONFECTA bruma parere ferè id genus auium cōsuevit.
Atq; earum, quæ sunt fœcundissima, locis tepidioribus, circa Ca-
lendas Ianuarias oua edere incipiunt, frigidis autē regionibus
eodē mense post Idus. Sed abis idoneis fœcunditas earum elicienda
est, quo maturius partum edant. Optime præbetur ad satietatem
ordeni semicoctum, nā & maius facit ouorum incrementum, & fre-
quentiores partus. Sed is cibus quasi condiendus est interiectis cy-
thi folijs, ac semine eiusdē, quæ utraq; maxime putatur augere

& in

fecunditatem auium. Modus autem abariorum sit, ut dixi, uar-
 gis binorum cyathorum ordeī, aliquid tamē admiscendum erit
 cythisi, uel si id non fuerit, uiciā, aut milij. Curā autem debet
 esse custodi, cum parturient aues, ut habeāt quāmundissimis pa-
 leis constrata cubilia, eaq; subinde conuerrat, & alia stramenta
 quamrecentissima reponat, nam puliabus, alijsq; similibus ani-
 malibus replentur, quæ secum affert auis, cum ad idem cubile re-
 uertitur. Assiduus aut debet esse custos, & speculari parientes,
 quod se facere gallinæ testantur crebris singultibus interiecta uo-
 ce acuta. Obseruare itaq; dum edant oua, & confestim circūire
 oportebit cubilia, ut quæ nata sunt recolligantur, notēturq; quæ
 quoq; die sint edita, ut quamrecentissima supponantur glorientis-
 bus. Sic enim rustici appellant aues eas, quæ uolunt incubare.
 Cetera uel reponantur, uel ære mutentur. Aptissima porro sunt
 ad excludendum recentissima quæque. Possunt tñ etiam requieta
 supponi, dum ne uetustiora sint, q̄ dierum decem. Ferē aut, cum
 primū partum consumauerint gallinæ, incubare cupiunt ab Idi-
 bus Ianuarijs, quod facere non omnibus permittendum est, qm̄
 quidem nouellæ magis edendis, q̄ excubandis ouis utiliores sunt.
 Inhibeturq; cupiditas incubandi pinnula per nares traiecta. Ve-
 teranas igitur aues ad hanc rem eligi oportebit, quæ iam sæpius
 id fecerint, moresq; earum maxime pernosci, quoniam aliæ meli-
 us excubant, aliæ editos pullos cōmodius educant. At è cōtrario
 quædam & sua, & aliena oua cōminuunt, atq; consumunt, qd̄
 facientem protinus submouere conueniet. Pulli autem duarum,
 aut trium auium exclusi, dum adhuc teneri sunt, ad unam, quæ
 sit melior nutrix, transferri debent, sed primo quoq; die, dū ma-
 ter suos, & alienos propter similitudinem dignoscere nō potest.
 Verūtamen seruare oportet modum, neq; enim debet maior esse,
 q̄ triginta capitum. Negant enim hoc ampliorem gregem posse
 ab una nutrirī. Numerus ouorum, quæ subiiciuntur, impar ob-
 seruatur, nec semper idem. Nam primo tempore, idest mense Ia-
 nuario quindecim, nec unquā plura subiici debēt, Martio XIX.
 nec his pauciora, unū & uiginti Aprili, tota deinde æstate usq;
 in Calend. Octobris totidem. Postea supernacua est huius rei cu-
 ra, quod frigoribus exclusi pulli plerunque intereant. Pleriq; ta-
 men etiā ab æstiuo solstitio non putant bonam pullationē, quod
 ab eo tempore etiam si facilem educationem habent, iustū tamen

non capiunt incrementum. Verum suburbanis locis, ubi à matre pulli non exiguis pretijs ueneunt, nec plerunq; intereunt, pbanda est æstina educatio. Semper autem, cum supponuntur oua, cōsiderari debet, ut luna crescēte à decima usq; ad quintādecimā id fiat. Nam & ipsa suppositio per hos ferè dies est cōmodissima, & sic administrandum est, ut rursus cum excluduntur pulli, luna crescat, diebus quibus animantur oua, & in speciem uolucrū conformantur. Ter septenis opus est gallinæo generi. At pavinino, & anserino paulo amplius ter nouenis, quæ siquādo fuerint supponēda gallinis, prius eas incubare decē diebus fœtibus alienigenis patiemur. Tum demū sui generis quatuor oua, nec plura q̄ quinq; fouenda recipient. Sed & hæc quammaxima, nā ex pusillis aues minutæ nascuntur. Cum deinde quis uolet quam plurimos mares excludi, longissima quæq; & acutissima oua subiiciet, & rursus cum fœminas, quamrotundissima. Supponēdi autem consuetudo tradita est ab ijs, qui religiosius hæc administrant eiusmodi. Primum quā secretissima cubilia eligunt, ne incubantes matricēs ab alijs auibus inquietentur. Deinde ante q̄ consternant ea, diligenter emundant, paleasq; quas substraturi sunt, sulfure, & bitumine, atq; ardente teda perlustrant, & expiatas cubilibus iniiciunt, ita factis concanatis nidis, ne ab aduolantibus, aut etiam defiliētibus euoluta decidant oua. Plurimū etiam infra cubilium stramenta graminis aliquid, & ramulos lauri, nec minus ally capita cum clauis ferreis subiiciunt, q̄ cuncta remedia creduntur esse aduersus tonitrua, quibus uitiantur oua, pulliq; semiformes interimuntur ante, q̄ toti partibus suis cōsumentur. Seruat autem qui subiiciat, ne singula oua in cubili manu componat, sed totum ouorum numerum in alueolum ligneū conferat, deinde uniuersum leniter in præparatum nidū trāsfundat. Incubantibus aut gallinis iuxta ponēdus est cibus, ut saturre studiosius nidis immorent, ne uel longius euagatæ refrigerēt oua, quæ quis pedibus ipsæ conuertant, auarius tñ, cum defilierint matres, circumire debet, ac manu uersare, ut equaliter calore concepto facile animentur. Quin ēt si qua unguibus lesa, uel fracta sunt, ut remoueat, idq; cū fecerit, die undeuigesimo aduertat, an pulli rostellis oua puderint, & auscultet, si pipiant. Nā sepe ppter crassitudinem putaminū erumpere nō queunt. Itaq; hærētes pullos manu eximere oportebit, et mri fœnēdos subiicere,

& iij

idq; non amplius triduo facere, nam post unum & uigesimum diem silentia oua carent animalibus, eaq; remouenda sunt, ne incubans inani spe diutius detineatur effœta. Pullos autē nō oportet singulos, ut quisq; natus sit, tollere, sed uno die in cubili sinere cum matre, & aqua, ciboq; abstinere, dum omnes excludant. Postero die, cum grex fuerit effœtus, hoc modo deponitur. Cribro uigario, uel ēt loliario, qui iam fuerit in usu, pulli superponantur, deinde pulegiū surculis fumigentur, ea res uidetur prohibere pituitam, quæ celerime teneros interficit. Post hæc cauea cum matre claudendi sunt, & farre ordeaceo cum aqua incocto, uel adoro farre uino resperfo modice alendi. Nam maxime cruditas uitanda est, et ob hoc tertia die cauea cum matre continendi sunt, priusq; q̄ emittantur ad recentem cibum, singuli tentandi, neq̄d hesterni habeant in gutture, nam si uacua non est ingluuiēs, cruditatem significat, abstineriq; debent, dum cōcoquant. Longius autem non est permittendum teneris euagari, sed circa caueam continendi sunt, & farina ordeacea pasceudi, dum corroborentur. Cauendumq; ne à serpentibus adflent, quarum odor tam pestilens est, ut interimat uniuersos. Id uitatur sepius incenso cornu ceruino, uel galbano, uel muliebri capillo, quorum omnium ferè nidoribus prædicta pestis submouetur. Sed & curandū erit, ut tepide habeantur, nam nec calorem, nec frigus sustinent. Optimumq; est infra officinam clausos haberi cū matre, & post quadragesimum diem potestatem uagadi fieri. Sed primis quasi infantie diebus pertractandi sunt, plumuleq; sub cauda clunibus detrahendæ, ne stercore coinquinatæ dureſcant, & naturalia p̄cludant. Quod quamuis caueatur, sepe tamen euenit, ut alius exitum non habeat. Itaq; pinna pertunditur, & iter digestis cibis præbetur. Sed et iam ualidioribus factis, atque ipsis matribus etiam uitanda pituitæ perniciēs erit. Quæ ne fiat, mundissimis uasis, & quam purissimam præbeamus aquam, nec minus gallinaria semper fumigabimus, et emundata stercore liberabimus. Quod si tamen pestis peruaserit, sunt qui spicas alliū tepido madaſactas oleo faucibus inferant. Quidam hominis urina tepida rigant ora, et tādū comprimunt, dum eas amaritudo cogat per nares emoliri pituitæ nauſeam. Vna quoque, quam græci ἀγρία σαφύλιν uocant, cum cibo mista prodest. Vel eadem pertrita, & cum aqua potui data. Atque hæc remedia medio-

criter laborantibus adhibentur, nam si pituita circumuenit oculos, & iam cibos auis respuit, ferro resciuntur genæ, & coacta sub oculis sanies omnis exprimitur, atq; ita paulum triti salis uulneribus infriatur. Id porro uitium maxime nascitur cum frigore, & penuria cibi laborant aues. Item cum per æstatem consistens in cohortibus aqua potatur. Item cum ficus, aut uua immatura, nec ad satietatem permissa est, quibus scilicet cibis abstinendæ sunt aues, eosq; ut fastidiant efficit uua labrusca de uepribus immatura lecta, quæ cum farre triticeo minuto cocta obijatur esurientibus, eiusq; sapore offensa aues, omnem aspernantur uuam. Similis ratio est etiam caprisia, quæ decocta cum cibo præbetur auibus, & ita fici fastidium creat. Mox quoq; sicut in cæteris pecoribus eligenda quæq; optima, & deteriora uendenda. Seruetur etiam in hoc genere, ut per autumnii tempus omnibus annis, cū fructus earū cessat, numerus quoq; minuatur. Summonebimus autem ueteres, id est quæ trimatum excesserunt. Item quæ aut parum fœcundæ, aut parum bonæ nutrices sunt, & præcipue quæ oua uel sua, uel aliena consumunt. Nec minus, quæ uelut mares cantare, atq; etiam calcare cœperunt. Item serotini pulli, qui ab solstitio nati capere iustum incrementum non potuerunt. In masculis autem nō eadem ratio seruabitur, sed tandiu custodiemus generosos, quādiu fœminam implere potuerint. Nam rarior est in his auibus mariti bonitas. Eodem quoq; tempore cum parere desinent aues, id est ab Idibus Nouēbris, pretiosiores cibi subtrahendi sunt, & uinacea præbenda, quæ satis commode pascunt adiectis interdum tritici excrementis.

De ouis.

Cap. VI.

OVORVM quoq; longioris temporis custodia non aliena est huic curæ, quæ commode seruant per hyemem, si paleis obruas, æstate si fursuribus. Quidam prius trito sale sex horis adoperiunt, deinde eluunt, atq; ita paleis, aut fursuribus obruunt, nō nulli solida, multi etiam fresa faba coaggerant. Alij salibus integris adoperiunt. Alij muria tepesacta durant. Sed omnis sal quē admodum non patitur putrescere, ita minuit oua, nec finit plena permanere, quæ resementem deterret. Itaq; ne in muriā quidem qui dimittunt, integritatem onorum conseruant.

PINGVEM quoq; facere gallinam, quamvis fartoris, non rustici sit officium, tamen quia non egre contingit, præcipiendum putavi. Locus ad hanc rem desyderatur calidus maxime, & minimi luminis, in quo singulae caueis angustioribus, uel sportis incluse pēdeant aues, sed ita coarctatae, ne uersari possint. Verum habeant ex utraq; parte foramina. Vnum, quo caput exeratur, alterum, quo cauda, clunesq; ut & cibos capere possint, & eos digestos sic edere, ne stercore coinquantur. Substernatur autem mundissima palea, uel molle fœnum, idest cordum, nā si dure cubant, non facile pinguescunt. Pluma omnis è capite, & sub alis, atq; clunibus detergetur. Illic ne pediculum creet, hic ne stercore loca naturalia exulceret. Cibus autem præbetur ordeacea farina quæ cum est aqua conspersa, & subacta, formantur offæ, quibus aues saginantur. Eæ tamen primis diebus dari parcius debent, dum plus concoquere consuescant. Nam cruditas uitanda è maxime, tantumq; præbendum, quantum digerere possint. neq; ante recens admonenda est, q̄ tentato gutture apparuerit nihil ueteris escæ remansisse. Cum deinde satiata è auis, paululum deposita cauea dimittitur, sed ita ne uagetur, sed potius, siquid est, qd̄ eam stimulet, aut mordeat, rostro persequatur. Hæc enim ferè communis est cura faciendum. Nam illi, qui uolunt non solum opimas, sed etiam teneras aues efficere, mulsea recente aqua prædicti generis farinam conspergunt, & ita faciunt. Nonnulli tribus aquæ partibus unam boni uini miscent, madefactoq; triticeo pane obefant auem, quæ prima luna (quoniam id quoq; custodiendum est) saginari cœpta, uigesima pergliscit. Sed si fastidiet cibum, totidem diebus minuire oportebit, quot iam farturæ proæsserint, ita tamen, ne tempus omne opimandi quintam & uigesimam lunam superueniat. Antiquissimum est autē maximā quamq; auem lautioribus epulis destinare. Sic enim digna merces sequitur operam, & impensam.

De palumbis, & columbis faciendis, & columbarijs constitutendis.

Cap. VIII.

HAC EADEM rōne palumbos, colūbosq; cellares pinguis simos facere contingit. Neq; est tñ in columbis faciendis tantus

reditus, quantus in educandis. Nam et horum possessio non abhorret à cura boni rustici. Sed id genus minore tutela pascit longinquis regionibus, ubi liber egressus avibus permittitur, quàm vel summis turribus, vel editissimis ædificiis assignatas sedes frequentant patentibus fenestris, per quas ad requirendos cibos evolitât. Duobus tamen, aut tribus mēribus acceptant condititia cibaria, cæteris se ipsas pascunt seminibus agrestibus. Sed hoc suburbanis locis facere non possunt, quàm intercipiuntur variis aucupum insidijs. Itaque clausæ intra tectum pasci debent, nec in plano ulla loco, nec in frigido, sed in edito fieri tabulatum oportet, quod aspiciat hybernū meridiem. Eiusque parietes, ne iam dicta iteremus, ut in ornithone præcepimus, cōtinuis cubilibus excauent. Vel si ita non cōpetit, paxillis adactis tabulæ superponant, quæ vel loculamenta, quibus nidificent aves, vel fictilia columbaria recipiant, præpositis vestibulis, per quæ ad cubilia perveniant. Totus aut locus, et ipsæ columbarum cellæ poliri debent albo tectorio, quàm eo colore præcipue delectatur hoc genus avium. Nec minus extrinsecus leuigari parietes maxime circa fenestram, et ea sit ita posita, ut maiore parte hyberni diei solē admittat, habeatque appositam satis amplam caveam retibus emunitam, quæ excludat accipitres, et recipiat egredientes ad apricationem columbas. Nec minus in agros emittant matrices, quæ ovis, vel pullis incubant, ne quasi gravi perpetuæ custodiæ servitio contristatæ fescant. Nam cum paulum circa ædificia volitauerint, ex hilaratæ recreant, et ad fœtus suos uegetiores redeunt, propter quos ne longius quidem evagari, aut fugere conantur. Vasa, quibus aqua præbeat, similia esse debent gallinarijs, quæ colla bibentium admittant, et cupientes lauari, propter angustias non recipiât. Nam id facere eas nec ovis nec pullis, quibus plerumque incubant, expedit. Cæterum cibos iuxta parietem conveniet spargi, quoniā ferè partes eæ columbarij carent stercore. Commodissima cibaria putantur uicia, vel eruum, tum etiam lenticula, miliumque, et lolium, nec minus excreta tritici, et si qua sunt alia legumina, quibus et gallinæ aluntur. Locus autem subinde conuerri, et emundari debet, nam quanto est cultior, tanto letior avis conspiciatur, eaque tam fastidiosa est, ut sæpe sedes suas perosa, si detur evolandipotestas, relinquat, quod frequenter in his regionibus, ubi liberos habet egressus, accidere solet. Id ne fiat uetus est Democriti præ-

ceptum. Genus acapitris tinunculum uocant rustici qui ferè in
 edificijs nidos faciunt. Eius pulli singuli fictilibus ollis conduntur,
 stipantiaq; opercula superponuntur, & gypso lyta uasa in angu-
 lis columbarum suspendunt, quæ res auiibus amorem loci sic concili-
 liat, ne unquam deserant. Seligendæ uero sunt ad educationem
 neq; uetulae, nec nimium nouellæ, sed corporis maximæ. Curan-
 dumq; si fieri possit, ut pulli, quemadmodum exclusi sunt, nunq;
 separentur. Nam ferè, si sic maritatae sunt, plures educant fœtus.
 Sin aliter, certe nec alieni generis coniungantur, ut alexadrinæ,
 & campanæ. Minus enim impares suas diligunt, & iō nec mul-
 tum ineunt, nec sæpius fœtant. Plumæ color non semp, nec om-
 nibus idem probatus est, atq; ideo qui sit optimus, non facile di-
 cti est. Albus, qui ubiq; uulgo conspicitur, à quibusdam non ni-
 mium laudatur, nec tñ uitari debet in ijs, quæ clauso continen-
 tur, nam in uagis maxime est improbandus, quod eum facillime
 speculatur acapiter. Fœcunditas autem, quamuis longe minor
 sit, q̃ est gallinarum, maiorem tñ refert quæstum, nam & oëties
 anno pullos educat, si est bona matrix, & pretijs eorum domini
 complent arcam, sicut eximius auctor M. Varro nobis affirmat,
 qui prædidit èt illis seuerioribus suis temporibus, paria singula,
 millibus singulis sextertiorum solita uenire. Nam nostri pudet se-
 cūli, si credere uolumus, inueniri qui quaternis millibus numum
 binas aues mercentur. Quamquam uel hos magis tolerabiles pu-
 tem, qui oblectamenta deliciarum possidendi habendiq; cā gra-
 ui ere, & argento pensent, q̃ illos, qui ponticum phasim, & scy-
 thica stagna mæotidis eluant. Iam nunc gangeticas, & ægypti-
 as auestemulenter eructant. Potest tamē etiam in hoc auario,
 sicut dictum est, sagina exerceri, nam si quæ steriles, aut sordidi co-
 loris interueniunt, similiter ut gallinæ faciuntur. Pulli uero fa-
 cilis sub matribus pinguescunt, si iam firmis, prius q̃ subuolent,
 paucas subtrahas pinnas, et obteras crura, ut uno loco quiescāt,
 præbeasq; copiosum cibum parientibus, quo & se, & eos abun-
 dantius alant. Quidam leniter obligant crura, quoniā si fran-
 gantur, dolorem, & ex eo maciam fieri putent, sed nihil ista res
 pinguitudinis efficit, nam dum uincula exerere conantur, nō con-
 quiescunt, & hac quasi exercitatione corpori nihil adiūnt. Fra-
 cta crura nō plus q̃ bidui, aut summum tridui dolorem afferūt,
 & spem tollunt euagandi.

De alendis turturibus.

Cap. IX.

TURTURVM educatio superuacua ē, quoniam id genus in ornithone nec parit, nec excludit. A uolatura ita ut capitur, farturæ destinatur, eaq; leniore cura, q̄ ceteræ aues saginat. Verum non omnibus temporibus. Per hyemem, quamuis adhibeatur opera, difficulter glisat. Et tñ, quia maior est turdi copia, pretium turturum minuitur. Rursus æstate uel sua sponte, dūmodo sit facultas cibi, pinguescat. Nihil enim aliud, q̄ obijatur esca, sed præcipue milium, nec quia tritico uel alijs frumentis minus crascescant, uerum q̄ semine huius maxime delectantur. Hyeme tamen offa panis uino madefacta, sicut etiā palumbos, celerius opimant, q̄ ceteri cibi. Receptacula non tanq̄ columbis loculamenta, uel cellule cauata efficiuntur, sed ad lineam mutili per parietem defixi, tegeticulas cannabinas accipiunt, prætentis retibus, quibus prohibeantur uolare, quoniam si id faciant, corpori detrahunt. In his autem assidue pascuntur milio, aut tritico, sed easemina dari nisi sicca non oportet. Satiatq; semodius cibi in diebus singulis uicenos, & centenos turtures. Aqua semper recens, & quammundissima uasculis qualibus columbis, atq; galinis præbetur. Tegeticulæq; mundentur, ne sterco urat pedes, qd̄ tamen & id ipsum diligenter reponi debet ad cultus agrorum, arborumq; sicut & omnium auium, præterquam nantium. Huius auis etas ad saginam non tam uetus est idonea, q̄ nouella. Itaq; circa messem, cum iam confirmata est pullities, eligitur.

De turdis educandis.

Cap. X.

TURDIS maior opera, & impensa præbetur, qui omni quidem rure, sed salubrius in eo pascuntur, in quo capti sunt. Nam difficulter in aliam regionem transferuntur, quia caueis clausi plurimi despōdent, quod faciunt etiam cum eodem momento temporis à rete in auaria coniecti sunt. Itaq; ne id accidat, ueterani debent intermisceri, qui ab aucupibus in hunc usum nutriti, quasi alletores sint captiuorū, mæstitiamq; eorum mitigent inter uolando. Sic enim cōsuescent & aquam, & cibos appetere feri, si mæsuetos id facere uiderint. Locum æque munitum, & apricū, q̄ columbi desyderant, sed in eo trāsuersæ perticæ perforatis parietibus aduersis aptant, quibus insidāt, cum satiati cibo reqescere

uolunt. Eæ perticæ nō altius à terra debent subleuari, q̄ hoīs statura patiat̄, ut à stante contingi possint. Cibi ponuntur ferè partibus his ornithonis, quæ super se perticis non habent, quo muni- diores permaneant. Semper aut̄ arida ficus diligenter pinsita, & permista polline, præberi debet, tam large quidem, ut super sit. Hanc quidā mandunt, & ita obijciunt. Sed istud in maiore numero facere uix expedit, quia nec paruo conducuntur, q̄man- dant, & ab ijs ipsis aliquantū propter incanditatē consumit̄. Multi uarietatem ciboꝝ, ne unum fastidiant, præbendā putāt. Ea est cū obijciuntur myrti, & lentisci semina. item oleastri, & hederacæ baccæ, nec minus arbuti. Ferè enim etiam in agris ab eiusmodi uolucris hæc appetuntur, quæ in auarijs quoq; desidentium detergent fastidia, faciuntq; auidiorem uolaturam, qđ maxime expedit, nam largiore cibo celerius pinguescit, semp̄ tamen etiam canaliculi milio repleti apponuntur, quæ est firmis- sima esca. Nā illa, quæ supra diximus, pulmentarioꝝ uicē dan- tur. Vasa quibus recens, et munda præbeatur aqua, non dissimi- lia sint gallinarijs. Hac impensa, curaq; M. Terentius ternis sæ- pe denarijs singulos emptitatos esse significat auorum temporibus, quibus qui triumphabant, populo dabant epulum. At nūc ætatis nostræ luxuries quotidiana fecit hæc pretia, propter quæ ne rusticiis quidem contemnendus sit hic redditus. Atq; ea genera, quæ intra septa uillæ abant̄, ferè persecuti sumus. Nunc de his dicendum est, quibus etiam exitus ad agrestia pabula dantur.

De pauonibus educandis.

Cap. XI.

P A V O N V M Educatio magis urbani patrisfamilie, quàm tetrici rustici curam poscit. Sed ne hæc tamen aliena est agricolæ captantis undiq; uoluptates acquirere, quibus solitudines ruris eblandiant̄. Harum aut̄ decor auium etiam externos, nedum do- minos oblectat. Itaq; genus alitum nemorosiss, & paruulis insu- lis, quales obiacent Italiæ, facillime continet̄. Nam qm̄ nec sub- limiter potest, nec per longa spatia uolitare, tum èt quia furis, ac noxiore animalium rapinæ metus non est, sine custode tuto ua- gatur, maioremq; pabuli partem sibi acquirit. Fæminæ quidem sua sponte tanquā seruitio liberatæ studiosius pullos enutriunt. Nec curator aliud facere debet, q̄ ut diei certo tēpore signo dato, iuxta uillam gregem conuocet, & exiguum ordeī concurrētibus

obijciat, ut nec avis esuriat, & numerus aduenientium recognoscatur. Sed huius possessionis rara conditio est, quare mediterraneis locis maior adhibenda cura est, eaq; sic administret. Herbidus sylvestrisq; ager planus sublimi clauditur maceria, cuius tribus lateribus porticus applicantur, & in quarto duæ cellæ, ut sit altera custodis habitatio, atq; altera stabulum pavonum. Sub porticibus deinde per ordinem fiunt arundinea septa in modum canearum, qualia columbarij tectis superponuntur. Ea septa distinguuntur uelut clatris intercurrentibus calamis, ita ut ab utroq; latere singulos aditus habeant. Stabulum aut carere debet uligine, cuius in solo per ordinem figunt breues paxilli, eorūq; partes summæ lingulas edolatas habent, quæ transversis foratis peritici inducantur. Hæ porro quadratæ perticæ esse debent, quæ paxillis superponuntur, ut avem recipiant adsilientem. Sed iccirco sunt exemptiles, ut cū res exigit, à paxillis deductæ liberum aditum cōuerrentibus stabulum præbeant. Hoc genus avium, cum trimatum explevit, optime progenerat. Siquidem tenerior ætas aut sterilis, aut parum fœcunda est. Masculus pavo gallinacæ salacitatem habet, atq; ideo quinq; fœminas desyderat. Nam si unam, uel alteram fœtam sæpius compressit, uix dum concepta in aluo uitiat ova, nec ad partum finit perducī, quoniam inimatur a genitalibus locis exadunt. Ultima parte hyemis concitanti- bus libidinem abis utriusq; sexus accendenda uenus est. Maxime facit ad hanc rem, si fauilla leui torreas fabam, tepidamq; desieiunis quinto quoq; die, nec tamen excedas modum sex cyathorū in singulas aues. Hæc cibaria non omnibus promiscue spargēda sunt, sed in singulis septis, quæ arundinibus intexi oportere proposuerim, portione seruata quinq; fœminarum, & unius maris ponenda sunt cibaria, nec minus aqua, quæ sit idonea potui. Quod ubi factum est, mares sine rixa deducuntur in sua quisque septa cū fœminis, & æqualiter uniuersus grex pascit, nā etiam in hoc genere pugnaces inueniunt masculi, qui & à cibo, & à coitu prohibent minus ualidos, nisi sint hac rōne separati. Ferè aut locis apriis ineundi cupiditas exercet mares, cū fauonij spirare cœperūt. Id est tps ab idibus Februarijs ante Martiū mēsem. Signa sunt extimulatæ libidinis, cum semetipsum ueluti mirantem caudæ gēmantibus pinnis ptegit, idq; cum facit, rotare dicitur. Post admissuræ tēpus cōfestim matrices custodiendæ sunt, ne

COLVMELLAE.

alibi q̄ in stabulo fœtus edant, sæpiusq; digitis loca fœminarum tentanda sunt, nã in promptu gerunt oua, q̄bus iam partus ap propinquat. Itaq; includendæ sunt enitentes, ne extra clausum fœtum edant. Maximeq; temporibus ijs, q̄bus parturiunt, pluribus stramentis exaggerandum est auarum, quo tutius integri fœtus exapianf. Nam ferè pauones, cum ad nocturnã requiem uenerunt, prædictis perticis insistentes enitunt oua, quæ quo propius, ac mollius deciderint, illibatã seruant integritatẽ. Quoti die ergo diligenter mane temporibus fœturæ stabula circueunda erunt, & iacẽtia oua colligenda, quæ q̄to recentiora gallinis subiecta sunt, tanto cõmodius excluduntf. Idq; fieri maxime patrisfamilias rationi cõduat, nã fœminæ pauones, quæ nõ incubant, ter anno ferè partus edunt, at quæ fouent oua, totũ tẽpus fœcunditatis aut excludendis, aut et educandis pullis cõsumunt. Primus est partus quinq; ferè ouorũ. Secundus quatuor. Tertius aut trium, aut duorũ, neq; est quod cõmittaf, ut rhodie aues paoninis incubent, quæ ne suos q̄dem fœtus cõmode nutriunt, sed ueteres maxime quæq; gallinæ uernaculi generis eligantf. Eæq; nouẽ diebus à primo lunæ incremento, nouenis ouis incubent, sintq; ex his quinq; paonina, & cætera gallinacæi generis. Decimo deinceps die omnia gallinacæa subtrahantf, & totidẽ recentia eiusdem generis supponantf, ut trigesima luna, q̄ẽ ferè noua, cũ paoninis excludantf. Sed custodis cura non effugiat obseruare desilientem matricem, sæpiusq; ad cubile peruenire, & paonina oua, quæ propter magnitudinem difficilins à gallina mouentur, uersare manu, idq; quo diligentius faciat, una pars ouorũ notanda est atramento, quod signum habebit auarius an à gallina conuersa sint. Sed, ut dixi, meminerimus cohortales quam maximas ad hanc rem pparari, quæ si mediocris habitus sunt, non debent amplius q̄ terna paonina, & sena generis sui fouere. Cum deinde fecerit pullos ad aliam nutricem gallinacæi debent transferri, & subinde qui nati fuerint paonini ad unã cõgregari, donec quinq; & uiginti capitũ grex efficiatur. Sed cum erunt editi pulli, similiter ut gallinacæi primo die nõ amoneantur, postero die cũ educatrice transferantf in caueã, primisq; diebus alantf ordeaceo farre uino respsso, nec minus ex quolibet frumẽto cocta pulticula, et refrigerata. Post paucos deinde dies huic cibo adijciundũ erit cõsum porrũ tarentinũ, & caseus mollis uehementer

uehementer expressus, nam serum nocere pullis manifestum est. Locustæ quoq; pedibus adeptis utiles cibandis pullis habent, atq; ijs pasci debent usq; ad sextum mensem postmodum satis est orderum de manu præbere. Possunt aut post quintum, & trigessimum diem q̄ nati sunt, etiam in agro satis tuto educi, sequiturq; grex uelut matrem gallinam singultientem. Ea cauea clausa fertur in agrum à pastore, & emissa ligato pede longa linea gallina custoditur, ad quam circumuolant pulli, qui cum ad satietatem pasti sunt, reducuntur in uillam persequentes, ut dixi, nutritis singultus. Satis autem conuenit inter auctores non debere alias gallinas, quæ pullos sui generis educant, in eodem loco pasci. Nam cum conspexerunt pannoniam prolem, suos pullos diligere desinunt, & immaturos relinquunt, perosæ uidelicet, quod nec magnitudine, nec specie pannoni pares sint. Vitia quæ gallinæo generi nocere solent, eadem has aues infestant. Sed nec remedia traduntur alia, q̄ quæ gallinæis adhibentur, nam & pituita, & cruditās, & si quæ aliæ sunt pestes, iisdem remedijs, q̄ præposuimus, prohibentur. Septimum deinde mensem cum excesserunt, in stabulo cum cæteris ad nocturnam requiem debent includi. Sed erit curandum, ne humi maneant, nam qui sic cubitant, tollendi sunt, & supra perticas imponendi, ne frigore laborent.

De numidicarū, & rusticarū gallinarū educatione. Ca. XII.

NUMIDICARVM eadem est ferè, quæ pannonū educatione. Cæterum syluestres gallinæ, quæ rusticæ appellantur, in seruitute nō fœtant, & ideo nihil de his præcipimus, nisi ut abus ad satietatem præbeatur, quo sint conuiniarum epulis aptiores.

De anibus, quas græci ἀμφίβια, latini duplicis uitæ appellant. Cap. XIII.

VENIO nunc ad eas aues, quas græci uocant ἀμφίβια, quæ non tm̄ terrestria, sed aquatilia quoq; desiderant pabula, nec magis humo, q̄ stagno consueuerunt. Eiusq; generis anser præcipue rusticis gratus est, quod nec maximam curā possit, & solertiore custodiā præbet, quā canis, nā clangore prodit insidiantē, sicut et memoria tradidit in obsidione capitolij, cum aduētū Galloꝝ uociferatus est, canibus silentibus. Is aut non ubiq; haberi potest, ut existimat uerissime Celsus, q̄ sic ait. Anser neq; sine aqua, nec Colu.

sine multa herba facile sustinetur, neq; utilis est locis consitis, quia quicquid tenerum contingere potest, carpit. Si ubi uero flumen, aut lacus est, herbaeque copia, nec nimis iuxta satæ fruges, id quoque genus nutriendum est. Quod etiam nos facere censemus, non quia magni sit fructus, sed quia minimi oneris. Attamen præstat ex se pullos, atque plumam, quam non ut in ouibus lanam semel demere, sed bis anno, uere, et autumnno uellere licet. Atque ob has quidem causas, si permittit locorum conditio, uel paucos utique oportet educare, singulisque maribus ternas foeminas destinare. Nam propter grauitatem plures inire non possunt. Quinetiam intra cohortem, ut protecti sint secretis angulis haras facere oportet, in quibus cubitent, et foetus edant.

De anseribus educandis, et anserario constituendo. Ca. XIII.

QUI VERO greges nantium possidere studet, chenobosia constituent, quæ tum demum uigebunt, si fuerint ordinata ratione tali. Cohors ab omni cætero pecore secreta clauditur alta nouæ pedum, maceria portibusque circumdata ita, ut in aliqua parte sit cella custodis. Sub portibus deinde quadratæ haræ cementis, uel et laterculis extruuntur, quas singulas satis est habere quoquo uersus pedes ternos, et aditus singulos firmis ostiis munitos, quia per foeturam diligenter claudi debent, et extra uillam. Deinde non longe ab edificio, si est stagnum, uel flumen, alia non queratur aqua. Sin aliter, lacus piscinaque manu fiant, ut sint quibus inurinare possint aues. Nam sine isto presidio non magis, quam sine terreno recte uiuere queunt. Palustris quoque sed herbidus ager destinet, atque alia pabula conferantur, ut uicia trifolium, foenum graecum, sed præcipue genus intubi, quod σέγις græci appellant. Lactucæ quoque in hunc usum semina uel maxime serenda sunt, quoniam et mollissimum est olus, et libentissime ab his auibus appetitur. Tum etiam pullis utilissima est esca. Hæc cum præparata sunt, curandum est, ut mares, foeminaeque quam amplissimi corporis, et albi coloris eligantur. Nam est aliud genus uariū, quod à fero mitigatum domesticum factū est. Id neque æque fecundum est, nec tam pretiosum, propter quod minime nutriendū est. Anseribus admittendis tempus aptissimum est à bruma, mox ad pariendum, et ad incubandū à Calen. Martij usque ad solstitiū, quod fit ultima parte mensis Iunij. Ineunt autem non, ut priores aues, de

quibus diximus, insistentes humi, nam ferè in flumine, aut piscinis id faciunt. Singulaeq; ter anno pariunt, si prohibeantur foetus suos excludere, quod magis expedit, q̃ quod ipse suos foueat. Nam & à gallinis melius enutriuntur, & longe maior grex efficitur. Pariunt aut singulis foetibus ova, primo quina, sequenti quaterna, nouissimo terna, quem partum nonnulli permittunt ipsis matribus educare, quia reliquo tpe anni uacaturæ sunt à foetu. Minime autem concedendum est foeminis extra septum parere, sed cum uidebuntur sedem querere, comprimendæ sunt, atq; tentandæ. Nam si appropinquat partus, digito tanguntur ova, quæ sunt in prima parte locorū genitalium. Quam ob rem perducæ ad haram debent, includiq; ut foetum edant. Idq; singulis semel fecisse satis est, qm̃ una quæq; recurrit eodem, ubi primo peperit. Sed nouissimo foetu cum uolumus ipsas incubare, notandæ erunt uniuscuiusq; partus, ut suis matribus subiciant, quoniam negat anser aliena excludere ova, nisi subiecta sua quoq; habuerit. Supponunt autem gallinis huius generis ova, sicut pavonina, plurima quinq; pauissima tria. Iphis aut anseribus pauissima. VII. plurima XV. Sed custodiri debet, ut ouis subiciant radices urticarum, quo quasi remedio medicant, ne noceri possit excussis anserculis, quos eneant urticæ, si teneros pupugerint. Pullos aut formandis, excludendisq; triginta diebus opus est, cū sunt frigora, nam tepidis quinque & uiginti satis est. Sæpius tñ anser trigesimo die nascitur, atq; is dum exiguus est. Decem primis diebus pasatur in hara clausus cum matre, postea cum serenitas permittit, produatur in prata, & ad piscinas. Cauendumq; est, ne aut aculeis urticæ compungatur, aut esuriens mittatur in pascuum, sed ante concisis intubis, uel lactucæ folijs saturetur. Nam si adhuc parum firmus, & indigens ciborum peruenit in pascuum, frutiabus, aut solidioribus herbis oblectatur ita pertinaciter, ut collum abrumpat. Milium quoq; aut etiam triticum mistum cū aqua recte præbetur, atque ubi se paulum confirmauit, in gregem cœqualium compellitur, & ordeo alitur, quod & matribus præbere non inutile est. Pullos autem non expedit plures in singulas haras, q̃ uicenos adici, nec rursus omnino cum maioribus includi, quoniam ualidior enecat infirmum. Cellas, in quibus incubit, sicissimas esse oportet, substratasq; habere paleas, uel si eæ non sunt, gratissimum quodq; foenum. Cætera eadem, quæ in alijs

generibus pullos seruanda sunt, ne coluber, ne uipa, felesq; aut etiam mustella possit aspirare, quæ ferè perniciosæ ad internationem prosternunt teneros. Sunt qui ordeum maceratum incubantibus apponant, nec patiantur matricem sepius nidum relinquere, deinde pullis exclusis primis quinque diebus polentam, uel maceratam far, sicut pavonibus obijciunt. Nonnulli et uiride nasturtium coactum minutatim cum aqua præbent, eaq; eis est esca inuicidissima. Mox ubi quatuor mensium sunt, farturæ maximus quisq; destinatur, quoniam tenera ætas præcipue habetur ad hanc rem aptissima, et est facilis harum animi sagina. Nam præter polentam, et pollinem ter die nihil sanè aliud dari necesse est, dummodo largè bibendi potestas fiat ne uagandi facultas detur. Sintq; calido et tenebroso loco, quæ res ad creandas adipem multum conferunt. Hoc modo duobus mensibus pinguescunt, et ea propter etiam tenerissima pullities sæpe. XL. diebus redditur opima.

De anatibus, querquedula, et similibus. Cap. XV.

NEOSSOTROPHII cura similis, sed maior ipensa est, nam clausæ pascuntur anates, querquedula, boschides, phalerides, similesq; uolucres, quæ stagna, et paludes rimantur. Locus planus eligitur, isq; munitur sublimiter pedum quindecim maceria, deinde clatris superpositis, uel grandi macula retibus contegitur, ne aut euolandi sit potestas domesticis anibus, aut aquilis uel accipitribus inuolandi. Sed ea tota maceries opere tectorio leuigatur extra, intraq; ne feles, aut uipera perrepat. Media deinde parte neossotrophij lacus defoditur in duos pedes altitudinis, spatiumq; longitudini datur, et latitudini quantum loci conditio permittit. Ora lacus ne corrumpantur uolentia restagnantis undæ, quæ semper interfluere debet, opere signino consternuntur, eaq; non in gradus oportet erigi, sed paulatim cliuo subsidere, ut tanquam è litore descendatur in aquam. Solum aut stagni per circuitum, quod sit instar modi totius duarum partium lapidibus inculcatis, ac tectorio muniendum est, ne possit herbas euomere, præbeatq; nantibus aquæ puram superficiem. Media rursus terrena pars esse debet, ut collocatis conseratur, alijsq; familiaribus aquæ uiridibus, quæ inopacant animi receptacula. Sunt. n. quibus cordi est uel in syluulis tamaricū aut sirpox frutetis immorari, nec ob hanc tamen causam totus locus syluulis occupetur, sed ut dixi, per circuitum ual-

æt, ut sine impedimento, cū apriatate diei gestiunt aues, nandi
 uelocitate cōcertent. Nam quēadmodum desyderant esse ubi irre
 pant, & ubi delitescētibz flumiatibz aialibus insidient, ita of
 fendunt, si non sunt libera spatia, qua permeent extra lacū. De
 inde p uicenos undiq; pedes gramine ripæ uestiant. Sintq; post
 hunc agri modū circa materiā, lapide fabricata, & expolita ter
 roribz pedalia in quadratū cubilia, qbus nidificent aues, eaq; cō
 tegantur intersitis buxeis, aut myrteis fruticibus, qui nō excedāt
 altitudinē parietum. Statim deinde ppetuus canaliculus humi
 depressus cōstruat, p quem quotidie misti cū aqua aibi decurrāt,
 sic. n. pabulat id genus animum. Gratissima est et esca terrestris le
 guminis panicū, & milium, nec nō, & ordeum, sed ubi copia
 est, & glans, ac uinacea praebeant. Aquatilibz aut aibz, si sit fa
 cultas, datur cammarus, & riuālis allecula, uel si qua sunt incre
 menti parui flumioz animalia. Tempora concubitus, eademq; cæ
 teri syluestres alites obseruant Martij, sequentisq; mensis, p quos
 festucae, sirculiq; in auarijs passim spargēdi sunt, ut colligere pos
 sint aues, quibus nidos construant. Sed antiquissimum est, cū qs
 νεοστροφειον cōstituere uolet, ut praedictaz animū circa pa
 ludes, in qbus plerunq; foetant, oua colligat, et cohortalibus gal
 linis subiiciat. Sic. n. exclusi, educatiq; pulli deponūt ingenia syl
 uestria, clausiq; uinarijs haud dubitāter pgenerāt. Nā si mō cap
 tas aues, q cōsueuere libero uictu, custodiæ tradere uelis, parere
 cūctant in seruitute. Sed de tutela nantiū uolucrū satis dictū est.

De piscinis, & piscibus alendis.

Cap. XVI.

VERVM opportune, dum meminimus aquatiliū aialiū,
 ad curam pueniemus piscium, quoz redditum quāuis alienissimū
 agricultoribus putem (quid. n. tam contrarium excogitare que
 am, q̄ terrenum fluido) tamen non omittam, nam & harum stu
 dia rerum maiores nostri celebrauerunt, adeo quidem, ut & dulci
 bus aquis marinos clauderent pisces, atq; eadem cura mugilem,
 scaurumq; nutrirēt, qua nūc murena, & lupus educat. Magni
 enim aestimabat uetus illa Romuli, et Numae rustica progenies,
 si urbanae uitae cōparetur uillatica, nulla parte copiarum deficiat.
 Quamobrē nō solum piscinas, quas ipsi construxerāt, frequenta
 bant, sed & quos rerū natura lacus fecerat, cōuectis marinis semi
 nibz replebāt. Inde uelinus, inde & sabatinus, et itē uulsinen

2 ii

sis, & amicus lupos, auratasq; procreauerunt, ac si qua sint alia
 piscium genera dulcis undae tolerantia, mox istam curam sequens
 etas aboleuit, & lautitiae locupletum maria ipsa, Neptunumq;
 clauserunt. Et iam cum auorum memoria circūfertur. M. Philippi
 (uelut urbanissimum, quod erat luxuriosissimum) factum, atq;
 dictum. Nā is forte cassini, cum apud hospitem cœnaret, apposi-
 tumq; è uicino flumine lupum degustasset, atq; expuisset, impro-
 bum factum dicto persecutus. Peream inquit, nisi piscem putauit.
 Hoc igitur periurium multorū subtiliorem fecit gulam, doctaq;
 & erudita palata fastidire docuit fluuialem lupum nisi quē Ty-
 byeris aduerso torrente defatigasset. Itaq; Terentius Varro, Nul-
 lus est inquit hoc seculo nebulo, ac rhynchon, qui non iam dicat,
 nihil sua interesse, utrum eiusmodi piscibus, an ranis frequēs ha-
 beat uinariū. Attamē iisdem temporibus, quibus hanc memo-
 rabat Varro luxuriem, maxime laudabat seueritas Catonis, qui
 nihilominus & ipse tutor Luculli grandi aere sestertium millium
 quadringentorū piscinas pupilli sui uenditabat. Iam enim celer-
 bres erant delitiae popinales, cum ab mari deferrentur uinaria,
 quorū studiosissimi, uelut ante denictarum gentium Numanti-
 nus, & Isauricus, ita Sergius Orata, et Lianius Murena capto-
 rum piscium letabantur uocabulis. Sed quā sic mores obcalluere,
 non ut haec usitata, uerum ut maxime laudabilia, & honesta iu-
 dicarentur. Nos quoq; ne uideamur tot iam seculorū seri castiga-
 tores, hunc etiam quæstum uillaticum patrisfamilias demonstra-
 bimus, qui siue insulas, siue maritimos agros mercatus, propter
 exilitatem soli, quæ plerunq; litori uicina est, fructus terræ præci-
 pere non poterit, ex mari redditum constituat. Huius autem rei
 quasi primordium est, naturam loci contemplari, quo piscinas fa-
 cere constitueris. Non enim omnibus litoribus omne genus pisci-
 um haberi potest. Limosa regio planum educat piscem, uelut so-
 leā, rhombum, passerem. Eadem quoq; maxime idonea est cōchy-
 lijs, muriabus, & ostreis, purpurarumq; tum concharū pectun-
 culis, balanis, uel sphōdilis. At arenosi gurgites planos quidem
 non pessime, sed pelagios melius pascunt, ut auratas, ac denti-
 ces, punicasq; & indigenas, umbras uerum conchylijs minus
 apti. Rursus optime saxosum mare nominis sui pisces nutrit, qui
 scilicet, quod in petris stabulentur, saxatiles dicti sunt, ut meru-
 le, turdiq; nec minus mel anuri. Atq; ut litorum, sic et fretorum

differentias nosse oportet, ne nos alienigeni pisces decipiant. Nō enim omni mari potest omnis esse, ut belops, qui pamphilio pfun- do, nec alio pasatur, ut athlantico faber, qui & in nostro gadiū municipio generosissimis pisibus adnumeratur, eumq; prisca cō- suetudine Zeum appellamus, ut Scaurus, qui totius Asiæ, Græ- ciæq; litoribus Siçlia tenus frequentissimus exit, nunquā in ligu- sticum, nec per Gallias enauit ad hibericū mare. Itaq; ne si capti quidem pferantur in nostra uinaria, diuturni queant possideri. Sola ex p̄tiosis pisibus murena, quāuis tharsensis, carpathiq; pe- lagi, quod est ultimum uernacula, quouis hospes freto peregrinū mare sustinet. Sed iam de situ piscinarum dicendum est.

De positione piscinæ.

Cap. XVII.

STAGNUM censem eximie optimum, quod sic positū est, ut insequens maris unda priorem submoueāt, nec intra conseptū sinat remanere ueterē. Nāq; id simillimum est pelago, quod agi- tatum uentis assidue renouat, nec concalescere potest, qm̄ geli- dum ab imo fluctū reuoluit in partē superiorem. Id aut stagnū uel exaditur in petra, cuius rarissima est occasio, uel in litore con- struitur opere signino. Sed utcunq; fabricatum est, si semp influen- te gurgite riget, habere debet specus iuxta solum. Eorumq; alios simplices, & rectos, quō secedant squamosi greges, alios in cochle- am retortos, nec nimis spatiosos, i qbus murenæ deliteſcāt. Quā- quam nōnullis cōmisceri eas cū alterius notæ pisibus nō placet, qā si rabie uexant, qd̄ huic generi uelut canino solet accidere, se- uissime psequunt squamosos, plurimosq; mādēdo cōsumunt. Iti- neraq; si loci natura pmittit, omni lateri piscinæ dari cōuenit. Fa- cilis .n. uetus submouetur unda, cū quacunq; parte fluctus ur- geat, p aduersam pateat exitus. Hos aut meatus fieri censem p imiam consepti partē, si loci situs ita cōpetit, ut in solo piscinæ po- sita libella septem pedibus sublimius esse maris æquor ostendat, nā pisibus stagni hæc in altitudinē gurgitis mensura abūde ē. nec dubiū, qn̄ qto magis imo mari uenit unda, tātō sit frigidior quod est aptissimū nantibus. Sin aut locus, ubi uinarium consti- tuere censem, pari libra cū æquore maris est, in pedes nouē de- fodiat piscina, & infra duos à summa parte cuniculis riuī pdu- cantur, curandumq; est, ut quam largissime ueniāt, qm̄ modus il- le aquæ iacentis infra libram maris non aliter exprimitur, q̄ si

maior recentis freti uis inaccesserit. Multi putant in eiusmodi stagnis longos piscibus recessus, et fluxuosos in lateribus specus esse fabricandos, quo sint opaciores aestuantibus latebrae. Sed, si recens mare non semper stagnum permeat, id facere contrarium est. Nam eiusmodi receptacula nec facile nouas admittunt aquas, nec nisi difficulter ueteres emittunt, plusque nocet putris unda, quam prodest opacitas. Debent tamen similes uelut cellae parietibus excavari, ut sint, quae protegant refugientes ardorem solis, et nihilo minus facile, quam coeperint aquam, remittant. Verum meminisse oportebit, ut riuus, per quos exundat piscina, praefigantur aenei foraminibus exiguis cancelli, quibus impediatur fuga piscium. Si uero laxitas permittit, est littore scopulos, qui praecipue herbis algae uestiunt, non erit alienum per stagni spatia disponere, et quantum cominis ualeat hominis ingenium, representare faciem ueri maris, ut clausi quamminime custodiam sentiant. Hac ratione stabulis ordinatis aquatile pecus inducemus. Sitque nobis antiquissimum meminisse est in fluuiatili negotio, quod in terreno praecipit, et quid quaque ferat regio. Neque enim si uelimus, ut in mari nonnunquam conspeximus, in uuario multitudinem mulorum pascere queamus, cum sit mollissimum genus, et seruitutis indignantissimum. raro itaque unus, aut alter de multis millibus claustra patitur. At contra frequenter animaduertimus intra septa pelagicos greges inertis mugilis, et rapae lupi. Quare, ut proposueram, qualitatem littoris nostri contemplemur, si uitemus scopulos, an probemus. Turdi complura genera, merulasque, et anidas mustellas, tum est sine macula (nam sunt et uarij) lupos includemus. Item flutas, quae maxime probantur, murenas, et si quae sunt aliae saxatilis notae, quarum pretia uigent. nam uile ne captare quidem nedum alere conducat. Possunt ista eadem genera etiam littoris arenosi, stagnis contineri, nam quae limo, caenoque lutescunt, ut ante iam dixi, conchyliis magis, et iacentibus apta sunt animalibus. Neque est eadem lacus positio, quae recipit cubantes, atque erectos, neque eadem praebentur cibaria prostratis piscibus, quae erectis. Namque soleis ac rhombis, et simillimis aialibus, humilis in duos pedes piscina deprimitur in ea parte littoris, quae profluo recessu nunquam destituitur. Spissi deinde clatri marginibus infiguntur, qui super aquam semper emineant, et cum maris aestus intumuerit. Mox praeciunt in gyrum moles, ita ut complectantur sinu suo, nec tamen excedant stagni modum. Sic enim et ma-

ris atrocitas obiectu crepidinis frangitur, & in tranquillo confis-
 tens piscis sedibus suis non exturbatur, neque ipsum uiuarium reple-
 tur algarum cōgerie, quam tempore statibus eructat pelagi uolē-
 tia. Oportebit autem nonnullis locis moles interadi more Mæandri,
 paruis sed angustis itineribus, quæ quātalibet hyemis senitia ma-
 re sine fluctu transmittant. Hinc esca iacentium mollior esse de-
 bet quā saxatiliū. Nā quia dentibus carent, aut lambunt cibos, aut
 integros hauriunt, mandere quidem non possunt. Itaque præberi cō-
 uenit tabentes haleculas, & salibus exesam chalidem, putremque
 sardiniam, nec minus scauroꝝ branchias, uel quicquid intestini
 pelamis, aut lacertus gerit. Tum scombri, charcarique, & elacate
 uentriculos, & ne per singula enumerē, salsamentorū omniū pur-
 gamenta, quæ cætariorū officinis euerruntur. Nos autem plura no-
 minauimus genera, non quia cuncta cunctis littoribus exeunt,
 sed ut ex his aliqua, quorū erit facultas, præbeamus. Facit etiā ex
 pomis uiridibus ad aperta ficus. Et nuxes digitis infractæ sunt dā-
 dæ, nec minus elisum molle sorbum, quique sunt tibi sorbilibus pro-
 ximi, ut e mulctra, recens casens, si loci cōditio, uel lactis annona
 permittit. Nulla tamen æque, quā prædictæ salsuræ pabula cōmode dan-
 tur, quoniam odorata sunt. Omnis. n. iacēs piscis magis naribus
 escam, quā oculis uestigat, nam dum supinus semper cubat, subli-
 mius aspectat, & ea, quæ in plano sunt dextra, leuaque non facile
 peruidet. Itaque cum salsamenta obiecta sunt, eorum sequens odo-
 rem peruenit ad cibos. Cæteri autem saxatiles, aut pelagici satis ex
 his, sed ex recentibus melius pascuntur. Nam & halecula modo
 capta, & cammarus, exiguusque gobio, & quisquis denique est in-
 crementi minuti piscis, maiorem alit. Siquando tamen hyemis seni-
 tia non patitur eius generis escam dari, uel sordidi panis offæ,
 uel si qua sunt temporis poma concisa præbentur. Ficus quidem ari-
 da semper obijatur, eximia si sit (ut Beticæ, Numidiæque regiōum)
 larga. Cæterum illud cōmitti non debet, quod multi faciunt, ut ni-
 hil præbeant, quia semetipsos etiā diu clausi tolerare possint, nā
 nisi piscis domini cibarijs saginatur, cum ad piscatorium fore per-
 latus est, macies indicat eum non esse libero mari captum, sed de cu-
 stodia elatum, propter quod plurimum pretio detrahatur. Atque
 hæc uillatica pastio finem præsentī disputationi faciat, ne immo-
 dico uolumine lector fatigetur. Redibimus autem sequenti exordio
 ad curam syluestrium pecorum, cultumque apum.

LVCII IVNII MODERATI
COLVMELLAE DE RE
RVSTICA LIBER
NONVS.

u ENIO NVNC ad tutelam pecudū syl-
uestrium, & apium educationem, quas & ip-
sas Publi Siluine uillaticas pastiones iure di-
xerim. Siquidem mox antiquus lepusculis, ca-
preisq; ac similibus feris iuxta uillā plerūq;
subiecta dominiciis habitatiōibus ponebat ui-
uaria, ut & conspectu suo clausa uenatio pos-
sidentis oblectaret oculos, & cum exegisset usus epularum, uelut
ē cella promerentur. Apibus quoq; dabantur sedes adhuc nostra
memoria, uel in ipsis uillae parietibus exasis, uel in ptectis portici-
bus, ac pomarijs. Quare qm̄ tituli, quē scripsimus, huic disputar-
tioni rō reddita est, ea nūc quae pposuimus, singula psequamur.

De uiuarijs faciendis, & includendis pecudibus feris. Cap. I.

FERAE pecudes, ut capreoli, damaeq; nec minus origum, cer-
uorumq; genera, & aprorum modo lautitijs, & uoluptatibus
dominorum seruiunt, modo quæstui, ac redditibus. Sed qui uena-
tionem uoluptati suae claudunt, contenti sunt, utcunq; competit
proximus edificio loci situs, munire uiuarium, semperq; de manu
alios, & aquam præbere. Qui uero quæstum, redditumq; desyde-
rant, cum est uicinum uillae nemus (id enim refert non procul esse
ab oculis domini) sine cunctatione prædictis animalibus destina-
tur. Et si naturalis defuerit aqua, uel inducitur fluens, uel infossi
lacus signino consternuntur, qui receptam pluuiatilem contine-
ant. Modus syluae pro cuiusq; facultatibus occupatur, ac si lapi-
dis, & operae uilitas suadeat haud dubie cementis, & calce for-
matus circūdatur murus. Sin aliter, crudo latere, ac luto constru-
ctus. Vbi uero neutrum patrifamiliae conducat, ratio postulat ua-
ceris includi, sic enim appellatur genus clatrorum, idq; fabrica-
tur ex robore, quercu, uel subere, nam oleæ rara est occasio. Quic-
quid deniq; sub iniuria pluuiarum magis diuturnum est, pro cō-
ditione regionis ad hunc usum eligitur. Et si ueteris arboris trun-

cus, siue ut crassitudo postulat, erit fissilis stipes, compluribus locis per latus efforatur, et in circuitu uiuarij certis interuenientibus spatij defixus erigitur, deinde per trāuersa laterum caua transmittuntur ramices, qui exitus ferarum obserent. Satis est autē uacerras inter pedes octonos defigere, serisq; transuersis ita clatrare, ne spatiorum laxitas, quæ foraminibus interuenit, pecudi præbeat fugam. Hoc autem modo licet etiam latissimas regiones, tractusq; montium claudere, sicuti Galliarum, necnon & in alijs quibusdam provincijs locorum uastitas patitur, nam & fabricandis ingens est uacerris materie copia, & cetera in hanc rem feliciater suppetunt. Quippe crebris fontibus abundat solum, quod est maxime prædictis generibus salutare. Tum etiam sua sponte pabula feris benignissime subministrat, præcipueq; saltus eligunt, qui & terrenis fœtibus, & arboreis abundant, nam ut graminibus, ita frugibus roburneis opus habent, maximeq; laudantur, quæ sunt feracissimi, quernæ glandis, & ilignæ, nec minus cerreæ, tū & arbuti, cæterorq; pomorum syluestrium, quæ diligentius persecuti sumus, cum de cohortalibus pecudibus disputarem, nā eadem ferè sunt pecudum syluestrium pabula, quæ domesticarum. Contentus tamen nō debet eē diligens paterfamilias abis, quos suapte natura terra gignit, sed temporibus anni, quibus syluæ pabulis carent, condita messe, clausis succurrere, ordeoq; alere, uel adoreo farre, aut faba, plurimumq; etiam uinacæis, & quicquid denique uilissime constiterit dare, idq; ut intelligant feræ præberi, unam, uel alteram domi mansuefactam conueniet immittere, quæ peruagata totum uiuarium cunctantes ad obiecta cibaria pecudes perducit. Nec solum istud per hyemis penuriam fieri expedit, sed cum etiam fœtæ partus ediderint, quo melius educēt natos. Itaque custos uiuarij frequenter speculari debet, si iā effectæ sint, ut manu datis sustineantur frumentis. Nec uero patiens est oryx, aut aper alius, uel quis ferus ultra quadrimatum senescere, nam usq; in hoc tempus capiunt incrementa, postea marcescunt senectute, quare dum uiridis ætas pulchritudinem corporis conseruat, ere mutandi sunt. Cernus tamen compluribus annis sustineri potest, nam diu iuuenis possidetur, quod æui longioris uitam sortitus est. De minoris autem incrementi animalibus, qualis est lepus, hæc præcipimus, ut in ijs uiuarijs, quæ maceria munita sunt, farraginis, & olerū ferè intubi lactucæq; semina par-

uulis areolis per diuersa spatia factis inuolantur. Itemq; punicū
 cicer, uel hoc uernaculum, nec minus ordeum & cicercula condi-
 ta ex horreo promantur, et aqua cœlesti macerata obijciuntur, nā
 sicca non nimis ab lepusculis appetuntur. Hæc porro animalia,
 uel similia his (etiam silente me) facile intelligitur, q̄ non expedi-
 at conferre in id uinariū, quod uacerris circumdatum est, siqui-
 dem propter exiguitatem corporis facile clatris subrepunt, & li-
 beros noctæ egressus fugam molivuntur.

De Apibus.

Cap. II.

VENIO nunc ad alueorum curam, de quibus neq; diligen-
 tius quicquam præcipi potest, q̄ ab Higiniō iam dictum est, nec
 ornatius, q̄ Virgilio, nec eligātius, q̄ Celsō. Higinius ueterū au-
 ctorū placita secretis dispersa monumentis industrie collegit. Vir-
 gilius poeticis floribus illuminauit. Celsus utriusq; memorati ad-
 hibuit modum. Quare ne attentanda quidem nobis fuit hæc di-
 sputationis materia, nisi quod consumatio susceptæ professionis
 hanc quoq; sui partem desyderabat, ne uniuersitas inchoati ope-
 ris nostri uelut membro aliquo reiso, mutila, atq; imperfecta cō-
 spiceretur. Atque ea, quæ Higinius fabulose tradita de originibus
 apum non internisit, poetica magis licentiæ, quàm nostræ fi-
 dei concesserim. Nec sanè rustico dignum est sasari, fuerit ne
 mulier pulcherrima specie Mellissa, quam Iupiter in apem con-
 uertit, an (ut Euhemerus poeta dicit) crabronibus, & sole geni-
 tas apes, quas nymphæ Phruxonides educauerint, mox dictæo
 specu Iouis extitisse nutrices, easq; pabula munere dei sortitas, q̄
 bus ipsæ paruum educauerant alumnū. Ista enim, quāuis nō
 dedecant poetam, summam tamen, & uno tantummodo uer-
 siculo leuiter attigit Virgilius, cum sic ait,
 Dictæo cœli regem pauere sub antro.

Sed ne illud quidem pertinet ad agricolas, quādo & in qua re-
 gione primum natæ sint. Vtrum in Thessalia sub Aristæo, an in
 insula Cea, ut scribit Euhemerus, an Eriethonij temporibus in
 monte Hymeto, ut Euthronius, an Cretæ Saturni temporibus,
 ut Nicander. Non magis quàm utrum examina tanquam cæter-
 ra uidemus animalia concubitu sobolem procreent, an heredem
 generis sui floribus eligant, quod affirmat noster Maro, & utrū
 euomant liquorem mellis, an alia parte reddant. Hæc. n. & his

similia magis scrutantium rerum naturæ latebras, quæ rusticorum est inquirere. Studiosis quoque litterarum gratiora sunt ista in otio legentibus, quæ negotiosis agricolis, quoniam neque in opere, neque in re familiari quicquam iuvant.

Quot genera sint apum, et quod ex ijs optimum. Cap. III.

QVARE reuertamur ad ea, quæ alueorum cultoribus magis apta sunt. Peripateticæ sectæ cōditor Aristoteles in ijs libris, quos de animalibus cōscripsit, apum siue examinum genera cōplura demonstrat, earumque alias nāstas, sed glomerosas, easdemque nigras, et hirsutas alas habent, alias minores quidem, sed æque rotundas, et infusæ coloris, horridique pili, alias magis exiguas, nec tam rotundas, sed obesus tamen, et latas coloris meliusculi, nonnullas minimas, gracilesque, et acuti alvei ex aureolo, uarias, atque leues, eiusque auctoritatem sequens Virgilius maxime probat paruulas, oblongas, leues, nitidas, ardentes auro, et paribus lita corpora guttis, moribus etiam placidis. Nam quanto grandior apis, atque etiam rotundior, tanto peior. Si uero senior maxime pessima est, sed tamen iracundia notæ melioris apium facile delimitur assiduo interuentu eorum, qui curant aluearia, nam, cum sæpius tractantur, celerius mansuescunt. Durantque, si diligenter excoltæ sunt, in annos decem, nec ullum exanimem hanc ætatem potest excedere, quæ in demortuorum locum quotannis pullos substituunt. Nam ferè decimo ab interitione anno, gens uniuersa totius alvei cōsumitur. Itaque ne hoc in toto apiario fiat, semper propaganda erit soboles, obseruandumque uere cum se noua profundent examina, ut exapiantur, et domaliorum numerus augeatur, nam sæpe morbis intercipiunt, quibus quemadmodum mederi oportet, suo loco dicetur.

Quales pastiones, et qui situs pastionum apum esse debeat.

Cap. II.

INTERIM per has notas, quas iam diximus, probatis apibus destinari debent pabulationes, eaque sint secretissimæ, ut et noster præcipit Maro, uiduæ pecudibus, aprico, et minime pællorso cæli stas. Quod neque sit uentis aditus, nam pabula uenti (tu. Ferre domum prohibent, neque omnes, hædique petulæ Floribus insultent, aut errans bucula campo Decutiat rorem, et surgentes atterat herbas.

Eademq; regio fecunda sit fruticis exigui, et maxime thymi, aut origani, tum et tymbræ, uel nostratis cunilæ, quæ satureiam rusti a uocant. Post hæc frequens sit incremēti maioris surculus, ut ros marinus, et utraq; cythisus. Est. n. satina, et altera suæ spontis, itemq; semper uirens pinus, et minor ilex, nam prolixior ab omnibus improbat. Ederæ quoq; non propter bonitatem recipiuntur, sed quia præbent plurimū mellis. Arbores uero sunt præbatissimæ rutila, atq; alba ziziphus, nec minus amaranthus, tum etiā amygdalæ, et persia, atq; pyri, deniq; pomiferarum pleræq; ne singulis immorer. At syluestrium comodissime faciunt glandifera robora, quinetiam terebinthus, nec dissimilis huic lentiscus, et odorata cædrus. At tiliæ solæ ex omnibus sunt nocetæ, taxipudiantur. Mille præterea semina uel crudo æspite uirentia, uel subacta sulco, flores amicissimos apibus creant, ut sunt in irriguo solo frutices amelli, caules acathini, scapus asphodeli, gladiolus narcissi. At in hortēsi lira cōsita nitent candida lilia, nec his fordidiora leucoia, tū punice rosæ, luteolæq; et sarranæ uiolæ, nec minus cœlestis numinis hyacinthus, coritius itē, ficulusq; bulbos croci deponit, qui coloret, odoretq; mella. Iam uero notæ uilioris innumerabiles nascuntur herbæ, cultisq; atq; pascuis regionibus, quæ fauoræ ceras exuberāt, ut uulgares lapsanæ, nec his pretiosior armoratia, rapistriq; olus, et intubi syluestris, ac nigri papaueris flores. Tum agrestis pastinaca, et eiusdē noīs edomita, quam græci σαφυλῶνον uocant. Verum ex cunctis, quæ proposui, quæq; obmisi tēpīs compendia sequēs (nam inexputabilis erat numerus) saporis præcipui mella reddit thymus. Thymo deinde proxima tymbræ, serpyllumq; et origanū. Tertiæ notæ, sed adhuc generosæ marinus ros, et nostras cunilæ, quæ dixi satureiam. Mediocris deinde gustus amaranthini, ac ziziphi flores, reliquaq; quæ pposuimus, cibaria, sed ex omnibus deterrimæ notæ mel habetur nemorense, quod ex sparto, atq; arbuto prouenit, uillaticū, quod nascitur in oleribus, et stercorosis herbis. Et quoniam situm passionum, atq; etiam genera pabulorum exposui, nunc de ipsis receptaculis, et domiciliis examinum loquar.

De sedibus apum eligendis.

Cap. V.

SEDES Apibus collocanda est contra brumalē meridiem pcul à tumultu, et cœtu hominū, ac pecudū, nec calido loco, nec

frigido, nam utraq; re infestantur. Hæc aut sit ima parte uallis,
 & ut uacue cū pdeunt pabulatum apes, faalins editoribus ad
 uolent, & collectis utensilibus, cum onere per proclina nō egre
 deuolent. Si uille situs ita cōpetit, non est dubitandum, qn ædifi
 cio iunctum apiariū maceria circūdemus, sed in ea parte, quæ tei
 tris latrine, sterquiliniq; & balinei libera est odoribus. Verū si
 positio repugnabit, nec maxima tamē incōmoda congruent, sic
 quoq; magis expedit, & sub oculis domini esse apiariū. Sin autē
 cuncta fuerint inimica, certe uicina uallis occupetur, quō sæpius
 descendere nō sit graue possidenti, nā res ista maximam fidē de
 syderat, quæ quoniā rarissima est, interuentu domini tutius custo
 ditur, neq; ea curatorem fraudulentū tantū, sed etiā immundæ
 segnitie perosa est, æque n. dedignat, si minus pure habita est,
 ac si tractet fraudulentē. Sed ubicūq; fuerint aluearia, nō editissi
 mo claudantur muro, qui si metu prædonū sublimior placuerit,
 tribus elatis ab humo pedibus, exiguis in ordinem fenestellis api
 bus sit peruius, iungaturq; tuguriū, quo & custodes habitent, et
 condatur instrumentū, sitq; maxime repletum præparatis alueis
 ad usum nonorum examinum, nec minus herbis salutaribus, &
 siqua sunt alia, quæ languentibus adhibētur.

Palmaq; uestibulum, aut ingens oleaster obumbret,

Vt cum prima noui ducent examina reges,

Vere suo, ludetq; fauis emissa iuuentus

Vicina inuitet decedere ripa calori,

Obuiaq; hospitij steneat frondentibus arbor.

Tū perēnis aqua, si est facultas, inducat, uel extructo canali ma
 nu detur, sine qua neq; faui, neq; mella, nec pulli deniq; figurari
 queunt. Sine igif, ut dixi, præterfluēs unda, uel putealis, canali
 bus immissa fuerit, uirgis, ac lapidibus aggeretur apum causa,

Pontibus ut crebris possint consistere, & alas

Pandere ad æstiuum solem, si forte morantes

Sparserit, aut præceps Neptuno immerferit eurus.

Conferi deinde circa totum apiarium debent arbusculæ incremē
 ti parui, maximeq; propter salubritatem, nā sunt etiam remedio
 lāguentibus cythisi, tum deinde casie, atq; pini, & rosmarinus,
 quinetiā cunilæ, & thymi frutices, itemq; uiolarum, uel quæcūq;
 utiliter deponi patitur qualitas terræ. Grauis, & tetri odoris nō
 solum uirentia, sed et quælibet res prohibeant, sicuti cācri nidor,

cū est ignibus adustus, aut odor palustris cœni, nec minus uiten-
tur canæ rupes, aut ualles argutæ, quas græci $\chi\omicron\upsilon\varsigma$ uocant.

De uasis alueorum probandis.

Cap. VI.

IGITUR ordinatis sedibus, aluearia fabricanda sunt p̄ con-
ditione regionis, siue illa ferax est suberis, haud dubitāter utilissi-
mas aluos faciēmus ex corticibus, quia nec hyeme rigent, nec can-
dent æstate, siue ferulis exuberat, ijs quoq; cum sint naturæ corti-
cis similes, è quibus cōmode uasa texuntur. Si neutrū aderit, ope-
re textorio salicibus cōnectūtur, uel si nec hæc suppetent, ligno ca-
uatae arboris, aut in tabulas desectæ fabricabūtur. Deterima est
conditio ficilium, quæ & accenduntur æstatis uaporibus, & ge-
lantur hyemis frigore. Reliqua sunt alueorū genera duo, ut
uel ex fimo fingantur, uel lateribus extruantur. Quorū alterum
iure damnauit Celsus, quoniā maxime est ignibus obnoxium, al-
terum probauit, quāuis incōmodum eius præcipuum nō dissimu-
lauit, quod si res postulet, transferri nō possit. Itaq; non assen-
tior ei, qui putat nihilo minus eius generis habendas esse aluos.
Neq; n. solum id repugnat rationibus domini, quod immobiles
sint, cum uēdere, aut alios agros instruere uelit (hoc enim cōmo-
dum pertinet ad utilitatem solius patrisfamilias) sed quod ipsa-
rum apium causa fieri debet, cum aut morbo, aut sterilitate, aut
penuria locorū uexatas conueniat in aliam regionem mitti, nec
propter prædictam causam moueri poterunt, hoc maxime uitan-
dum est. Itaq; quāuis doctissimi uiri auctoritatem reuerēbar, ta-
men ambitione submota, quid ipse censerem, non omisi, nā quod
maxime mouet Celsum, ne sint stabula uel igni, uel furibus obno-
xia, potest uitari opere lateritio circumstructis aluis, ut impedia-
tur rapina prædonis, & contra flammarum uiolentiam protegā-
tur, easdemq; cum fuerint mouendæ, resolutis structuræ compa-
gibus, licet transferre.

Quemadmodum aluei collocandi sint.

Cap. VII.

SED Quoniam plerisq; uidetur istud operosum, qualiacunq;
uasa placuerint collocari, debet suggestus lapideus extendi per
totum apiariū in tres pedes altitudinis, totidemq; crassitudinis,
isq; sic extructus, diligenter opere textorio lenigari, ita ne ascen-
sus lacertis, aut anguibus, alijs ne noxijs animalibus præbeatur.
superponuntur

superponuntur deinde siue (ut Celfo placet) lateribus facta domicilia, siue (ut nobis) aluearia, præterquã à tergo circum structa, seu quod penè omnium in usu est, qui modo diligenter ista curant per ordinem uasu disposita ligantur, uel laterculis, uel cæmētis, ita ut singula binis parietibus angustis contineantur, liberaeq; frontes utrinq; sint, nam & qua procedunt, nonnunquam patefaciendæ sunt, & multo magis à tergo, quia subinde curant examina. Sin autem nulli parietes alneis interuenient, sic tamen collocandæ erunt, ut paulum altera ab altera distet, ne, cum inspiciantur ea, quæ in curatione tractantur, hærentem sibi alterâ concutiat, uianasq; apes conterat, quæ omnem motum imbecillius cereis operibus suis, tanquam ruinam timent. Ordines quidem uasorum superinstructos in altitudinem tres esse abunde est, quoniam summum sic quoq; parum commode curator inspiat. Ora cænearum, quæ præbent apibus uestibula, proniora sint, quàm terga ut ne influant imbres, & si forte tamen ingressi fuerint, non immorentur, sed per aditum effluant, propter quod conuenit aluearia portiabus supermuniri, sin aliter, luto punico frondibus illinitis adumbrari, quod tegmen cum frigora, & pluuias, tum æstus arcet. Nec tamen ita nocet huic generi calor æstus, ut hyems, itaq; semper ædificium sit post apiarium, quod aquilonis excipiat iniuriam, stabulisq; præbeat teporem, nec minus ipsa domicilia, quamuis ædificia protegantur, obuersa tamen ad hybernū orientem componi debebunt, ut apricum habeant apes matutinum egressum, et sint ex perrectiores, nam frigus ignauia creat, propter quod etiam foramina, quibus exitus, aut introitus datur, angustissima esse debent, ut quamminimum frigoris admittant, eaq; satis est ita forari, ne possint capere plus unius apis incrementum, sic nec uenenatus stellio, nec obscœnum scarabæi, uel papilionis genus, lucifugæq; blattæ, ut ait Maro, per laxiora spatia ianuæ fauos populantur, atq; utilissimum est pro frequentia domicilij, duos, uel tres aditus in eodem operculo distantes inter se fieri contra fallaciam lacerti, qui uelut custos uestibuli prodeuntibus inhians, apibus affert exitium, eaq; pauciores intereunt, cum licet uitare pestis obsidia per aliud uadentibus effugium.

De comparandis apibus, & quemadmodum syluestria examina capiuntur.

Cap. VIII.

Colu.

R

ATQVE Hæc de pabulationibus, domicilijs, & sedibus eli-
 gendis abunde diximus, quibus prouisis, sequitur ut examina
 desyderemus. Ea porro uel ære parta, uel gratuita contingunt.
 Sed quas pretio comparabimus, studiosius prædictis comproba-
 mus notis, et earum frequentiam prius quam meræmur, apertis aluea-
 ribus consyderemus, uel si non fuerit inspicendi facultas, certe id
 quod contemplari licet, notabimus, ut in uestibulo ianuæ com-
 plures consistant, & uehemens sonus intus murmurantiū exau-
 diatur, atq; etiam (si oēs intra domicilium silentes forte conquie-
 scant,) labris foramini aditus admotis, et inflato spiritu ex respō-
 dente earum subito fremitu poterimus æstimare uel multitudi-
 nem, uel paucitatē. Præcipue aut custodiendum est, ut ex uicinia
 potius, quam ex peregrinis regionibus petant, quoniam solent cæli noui-
 tate læssiri. Quod si non cōtingit, ac necesse habuerimus lon-
 ginq; itineribus aduehere, curabimus, ne salebris soliantur, op-
 timeq; noctibus collo portabunt, nam diebus requies danda est, et
 infundendi sunt grati apibus liquores, quibus intra clausum alan-
 tur. Mox cum perlatæ domum fuerint, si dies superuenerit, nec ape-
 riri, nec collocari oportebit alueum nisi uesperis, ut apes placide
 mane post totius noctis requiem egrediantur, speculariq; debemus
 ferè triduo, an uniuersæ se profundant, quod cum faciunt, si gā me-
 ditantur. Ea remedia, quibus debeant inhiberi, mox præcipientur.
 at quæ dono, uel aucupio cōtingunt, minus scrupulose p̄bant,
 quāquam, nec sic quidem uelim nisi optimas possidere, cum & impē-
 sam, & eandem operā custodis postulent bonæ, atq; improbæ, et
 quod maxime refert, non sunt de generes intermiscendæ, quæ insa-
 ment generosas, nam minor fructus mellis respondet, cum se gnio-
 ra interueniunt examina. Verūtamen quoniam interdum propter cō-
 ditionem locorū uel mediocre pecus (nam malum nullo quidem mo-
 do) parandum est, curā uestigandis examinibus hac rōne adhi-
 bebimus. Vbiq; saltus sunt idonei, mellifici nihil antiquius, quam
 quibus apes, utantur, uicinos eligunt fontes, eos itaq; conuenit ple-
 runq; ab hora secunda obsideri, speculariq; quæ turba sit aquan-
 tiū, nam si paucae admodum circūuolant, nisi tñ complura capita-
 rinorū diductas faciunt rariores, intelligenda est earum penuria,
 propter quam locum quoq; non esse mellificum suspicabimur, at
 si cōmeant frequentes, spem quoq; aucupandi examina maiorem
 faciunt, eaq; sic inueniunt. Primum quod longe sint explorādū est,

preparandumq; in hanc rem liquida rubrica, qua cum festuacis il-
 litis contigeris apum terga fontem libantium, comoratus eodem
 loco facilius redeñtes agnoscere poteris, at si non tarde id faciēt,
 scias eas in uicinio consistere, sin aut serius, pro morae tpe aestima-
 bis distantiam loci, sed cum animaduuerteris celeriter redeuntes,
 si non ægre persequeris iter uolantium, ad sedem perducere ex-
 aminis. In us aut, quæ longius meare uidebuntur, solertior ad-
 hibebitur cura, quæ talis est. Arundinis internodium cum suis ar-
 ticulis exaditur, et terebrať ab latere talea, et per id foramē exi-
 guo melle, uel de fruto instillato, ponitur iuxta fontem, deinde
 cum ad odorē dulcis liquoris cōplures apes irrepserunt, tollitur
 talea, et appposito foramini pollice non emittitur, nisi una, quæ,
 cum euasit, fugam suā demonstrat obseruāti, atq; is, dum sufficit,
 persequit euolantem. Cum deinde cōspicere desijt apē, tum alter-
 ram emittit, et si eandem petit cœli partem, uestigys prioribus
 inheret, et si minus aliam quoq; atq; aliam foramine adapto
 patitur egredi, regionemq; notet, in quā plures reuolent, et eas
 psequatur, donec ad latebrā perducatur examinis, quod si est ab-
 ditum specu, fumo elicitur, et cū erupit, aeris strepitu coercetur.
 nam statim sono territum, uel in frutice, uel in editiore syluæ fron-
 de confidet, et à uestigatore preparato uase reconditur, sin aut
 sedem habet arboris caue, et, aut extat ramus, quem obtinent,
 aut sunt in ipsius arboris trunco, tunc, si mediocritas patit, acu-
 tissima serra, quo celerius id fiat, pādatur primū superior pars, q̄
 ab apibus uacat, deinde inferior quatenus uidet inhabitari, tū
 reclus utraq; parte mundo uestimento cōtegatur, qm hoc quoq;
 plurimum refert, ac si qbus rimis hiat, illinitur, et ad locū pfer-
 tur, relictisq; paruis (ut iam dixi) foraminibus, more ceterarum
 aliorū collocatur, sed indagatorem conueniet matutina tpa uesti-
 gandi eligere, ut spatium diei habeat, quo exploret cōmeatus
 apum. Sæpe. n. si serius cœpit eas denotare, etiam cum in propin-
 quo sunt, iustis operū peractis se recipiunt, nec remeāt ad aquā,
 quo exenit ut uestigator ignoret, quā longe à fonte distet exa-
 men. Sunt qui per initia ueris apiastrum, atq; (ut ille uates ait)
 trita meliphylla, et cærinthæ ignobile gramen, aliasq; colligāt
 similes herbas, qbus id genus animalium delectatur, et ita alios
 perfricent, ut odor, et succus uasi inhereat, quæ deinde mun-
 data exiguo melle respergant, et per nemora non longe à fontis

bus disponant, eaq; cum repleta sunt examinibus, domum referant, sed hoc nisi locis, quibus abundant apes, facere non expedit, nam saepe inania uasa nacti, qui forte praetereunt, secum auferunt, Neq; tamen est tanti uacua perdere complura, ut uno, uel altero potiare pleno, at in maiore copia etiam si multa intercipiuntur, plus est quod in repertis apibus acquiritur, atq; haec est ratio capiendi syluestria examina.

Quemadmodum uernacula examina observantur, & in aluos condantur. Cap. IX.

DE INCEPS talis altera est uernacula retinendi, semper quidem custos sedule circumire debet aluearia. Neq; n. ullum tempus est, quo non curam desyderent, sed eam postulant diligentiolem, cum uernant & exundant nouis foetibus, qui nisi curatoris obsequio praeceps excepti sunt, diffugiunt, quippe talis est apium natura, ut pariter quaeque plebs generetur cum regibus, qui ubi euolandi uires adepti sunt, consortia dedignantur uetustioribus, multoque magis imperia, quippe cum rationabili genere mortaliu, tum magis egentibus consilij mutis animalibus nulla sit regni societas, itaque noui duces praecedunt, cum sua iuuentute, quae uno, aut altero die in ipso domicilij uestibulo glomerata consistens, egressu suo proprie desyderium sedis ostendit, eaq; uelut patria contenta est, si a procuratore praeceps assignetur. Sin autem defuit custos, uelut iniuria repulsa peregrinam regionem petit, quod ne fiat, boni curatoris est uernis temporibus observare alueos in octauam fere diei horam, postquam non temere se noua proripiunt agmina, eorumque egressus, regressusque ut diligentius custodiat, nam quaedam solent, cum subito euaserunt, sine cunctatione se proripere. Poterit exploratam fugam praesciscere uespertinis temporibus aurem singulis alueis admo- uendo, siquidem fere ante triduum, quae eruptionem facturae sint, uelut militaria signa mouentium, tumultus ac murmur exoritur. Ex quo, ut uerissime dicit Virgilius,
Corda licet uulgi praesciscere, namque morantes
Martius ille aeris rauri canor increpat, & uox
Auditur fractos sonitus imitata tubarum.
Itaque maxime observari debet, quae istud faciunt, ut siue ad pugnam eruperint (nam inter se tanquam ciuilibus bellis, & cum alteris quasi cum exteris gentibus praeliantur) siue fugae causa se proripuerint,

præsto sit ad utrūq; casum paratus custos. Pugna quidē uel unius inter se dissidentis, uel duorum examinum discordantium facile compesatur, nam ut idem ait,
 Pulueris exigui iactu compressa quiescit,
 Aut mulso passō ue, aut alio, quouis liquore simili resperso uide licet familiari dulcedine senientiū iras mitigante, nā eadē mire ēt dissidentes reges cōsiliant. Sunt. n. sæpe plures unius populi duces, & quasi procerū seditione plebs in partes diducit, qđ frequenter fieri phibendum est, qm̄ intestino bello totæ gētes consumuntur, itaq; si cōstat principibus gratia, manet pax incruēta. Sin aut̄ sæpius acie dimicantes notaueris, duces seditionū interficere curabis, dimicantiū uero plia p̄dictis remedijs sedant, ac deinde cū agmen glomeratum in proximo frondentis arbusculæ ramo cōsederit, aiaduertito, an totū examen in spēm unius uuæ dependeat, idq; signū erit aut unū regem inesse, aut certe plures bona fide recōsiliatos, quos sic patieris, dum in suū reuolent dormiculum, sin autem duobus, aut etiam compluribus uelut uberibus diductum fuerit examen, ne dubitaueris & plures proceres, & adhuc iratos esse, atq; in ijs partibus, quibus maxime uideris apes glomerari, requirere duces debebis, itaq; succo prædictarum herbarum, idest melissophili, uel apiastri manu illita, ne ad tactū diffugiant, leuiter inferes digitos, et diductas apes scrutaberis, donec auctorem pugnæ, quem elidere debes, reperiās.

Quæ sit forma regis apum.

Cap. X.

SUNT autem i reges maiores paulo, & oblongi magis q̄ ceteræ apes rectioribus cruribus, sed minus amplis pinnis pulchri coloris, & nitidi, leuesq; ac sine pilo, sine spiculo, nisi qs forte pleniorē quasi capillum, quē in uentre gerunt, aculeū putet, quo & ipso tñ ad nocendum nō utuntur, quidam etiam infusi, atq; hirsuti reperiuntur, quorū pro habitu, damnabis ingenium, Nam duæ sunt regum facies, duo corpora plenis.
 Alter erit maculis auro squallentibus ardens,
 Et rutilis clarus squamis, insignis & ore.
 Atq; hic maxime probatur, qui est melior, nam deterior sordido spūto similis tam fœdus est, q̄ puluere ab alto
 Cum uenit, & sicco terram spūit ore uiator. Et, ut idē ait,
 Desidia, latamq; trahens inglorius aluum. Omnes igitur duces notæ deterioris

Dede nec, melior uacua sine regnet in aula.

Qui tamen & ipse spoliandus est alis, ubi sepius cum examine suo conatur eruptione facta profugere, nam uelut quadam compe retinebimus erronem ducem detractis alis, qui fugæ destitutus præsidio, finem regni non audet excedere, propter quod ne ditionis quidem suæ populo permittit longius euagari.

Quomodo apium paucitas emendetur. Cap. XI.

SED Nonnunquam necandus est, cum uetus alueare numero apium destituitur, atque infrequentia eius aliquo examine replenda est itaque cum primo uere in eo uase nata est pullities nouus rex eliditur, ut multitudo sine discordia cum parentibus suis conuersetur, quod si nullam progeniem tulerint faui, duas, uel tres alueorum plebes in unum contribuere licebit, sed prius respersas dulcili liquore, tum demum includere, & posito cibo dum conuersari consuescant, exiguis spiramentis relictis triduo ferè clausus habere. Sunt qui seniore potius regem submoneant, quod est contrarium, quippe turba uetustior si elidatur, uelut quidam senatus iunioribus pareat necesse est, & si quæ sint imperia ualidior contra maciter spernentes, pœnis, ac mortibus afficiuntur. Illud tamen incommodum iuniori examini solet accidere, cum antiquarum apium relictus à nobis rex senectute deficiat, quod tanquam domino mortuo, familia nimia licentia discordat, cui facile occurritur, nam ex ijs alueis, quæ plures habent principes, dux unus eligitur, isque translatus ad eas, quæ sine imperio sunt, rector constituitur. Potest autem minore molestia in ijs domicilijs, quæ aliqua peste uexant, paucitas apium emendari, nam ubi cognita est clades infrequentis aluei, quos habeat fauos oportet considerare, tum deinde, ceræ, quæ semina pullorum continet, partem recidere, in qua regum generis proles animatur. Est autem facilis conspectus, quoniam ferè in ipso fine cerarum uelut papilla uberis apparet eminentior, et laxioris fistulæ, quæ sint reliqua foramina, quibus popularis notæ pulli continentur. Celsus quidem affirmat in extremis fauis transversas fistulas esse, quæ contineant regios pullos. Higinius quoque auctoritatem grecorum sequens negat ex uernaculo (ut cæteras apes) fieri ducem, sed in circuitu fauorum paulo maiora, quæ sint plebeij seminis inueniri recta foramina repleta quasi sorde rubri coloris, ex qua protinus alatus rex figuretur.

De condendo examine, & eius fuga inhibenda. Cap. XII.

EST ET illa uernaculi examinis cura, si forte prædicto tēpo re facta eruptione patriam fastidians sedem longiorem, fuga denūciavit. Id autem significat, cum sic apis euadit uestibulum, ut nulla intro reuolet, sed se confestim leuet sublimius. Crepitaculis æreis, aut testarum plerūq; uulgo iacentium sonitu terreat fugiens iuuentus. Ea q; quæ uel pauida, cum repetierit aliu māternam, & in eius aditu glomerata pependerit, uel statim se ad proximam frondem contulerit, protinus custos nouum loculamē tum in hoc præparatum pliniat intrinsecus prædictis herbis, deinde guttis mellis respersum admoneat. Tum manibus, aut etiā trulla cōgregatas apes recōdat. Atq; uti debet, adhibita cætera cura, diligenter compositum, & illitum uas interim patiaturs in eodem loco esse, dū aduesperascat. Primo deinde crepusculo trāsferrat, & reponat in ordinem reliquorū alueorū. Oportet autem etiam uacua domicilia collocata in apiarijs habere, nā sunt nonnulla examina, quæ, cum pcesserint, statim sedē sibi quærant in proximo, eādēq; occupent, quā uacua repererint. Hæc ferē acqrendarum, ac etiam retinendarum apium traditur cura.

Remedia apum laborantium morbo. Cap. XIII.

SEQVITVR ut morbo, uel pestilentia laborantibus remedia desyderentur. Pestilentie rara in apibus perniciēs nec tamen aliud, quā quod in cætero pecore præcepimus, quid fieri possit reperio, nisi ut longius aluei transferantur. Morborum autē facilius in his & causæ inspiciuntur, & inueniuntur medicinæ. Maximus autem annuus earum labor est initio ueris, quo tithymalli floret frutex, & quo sameram ulmi promunt, nāq; sicut nouis pomis, ita his primitiuis floribus illectæ auide uescuntur post hybernā famem, nil alioquin atra satietatem, tali nocente cibo, quo cum se affatim repleuerint, profluuio alui, nisi celeriter succurritur, intereunt, nam & tithymallus maiorū quoq; animalium uentrem soluit, & proprie ulmus apium. Ea q; causa ē, cur in regionibus Italiae, quæ sunt eius generis arboribus consitæ, raro frequentes durent apes. Itaq; ueris principio si medicatos cibos præbeas, iisdem remedijs & prouideri potest, ne tali peste uexentur, & cum iā laborāt, sanari, nā illud, quod Higinius maiores

secutus auctores prodidit, ipse non expertus assenerare nō audeo, uolentibus tamen licebit experiri. Siquidem præcipit apum corpora, quæ cum eiusmodi pestis incessit, sub fauis acervatim enectæ reperiuntur, sicco loco per hyemem reposita circa æquinoctiū uernum, cum clementia diei suaserit, post horam tertiam in solē pferre, siculneoq; cinere obruere. Quo factō, affirmat intra duas horas cum uiuido halitu caloris animatæ sunt, resumpto spiritu in præparatū uas, si obiciatur, irrepere. Nos magis ne intereant, quæ deinceps dicturi sumus, ægris examinibus exhibenda censemus, Inam uel grana mali punia tunsa, & uino amineo conspersa, uel uis passæ cum rore syriaco pari mensura pinsitæ, et austero uino insuccatæ dari debent, uel si per se ista frustata sunt, omnia eadē aquis ponderibus in unum lenigata, & fictili uase cū amineo uino inferuefacta, mox etiam refrigerata ligneis canalibus apponi. Nōnulli rorem marinum aqua mulsa decoctum, cū gelauerit, imbriabus infusum præbent libandum. Quidā bubulam, uel hominis urinam (sicut Higinius affirmat) alueis apponunt. Necnō etiam ille morbus maxime est conspicuus, qui horridas, contractasq; carpit, cum frequenter aliæ mortuarum corpora domicilijs suis efferūt, aliæ intra tecta, ut in publico luctu, mœsto silentio torpent. Id cum accidit, arundineis infusi canalibus offeruntur aibi, maxime decocti mellis, & cum galla, uel arida rosa detriti. Galbanum etiam, ut eius odore medicentur, incendi cōuenit, passōq; & defruto uetere fessas sustinere. Optime tamē facit amelli radix, cuius est frutex luteus, purpureus flos, ea cum uetere amineo uino decoctæ exprimitur, & ita liquatus eius succus datur. Higinius quidem in eo libro, quem de apibus scripsit, Aristomachus inquit, hoc modo succurrendū laborantibus existimat. Primū, ut omnes uitiosi faui tollantur, & abus ex integro recens ponatur, deinde ut fumigentur. Prodesse etiam putat apibus uetustate corruptis examen nouum contribuere, quāuis periculum sit, ne seditione consumentur, uerūtamen adiecta multitudine lataturas. Sed ut concordēs maneant, earum apiū, quæ ex alio domicilio transferuntur, quasi peregrinæ plebis submoueri reges debere, nec tamē dubium, quin frequentissimorum examinum faui, qui iam maturos habent pullos, transferri, & subijci paucioribus debeant, ut tanquam nouæ prolis adoptione domicilia cōfirmentur, sed & id cum fiet, animaduertendum, ut eos fauos subijcia

mus, quorum pulli iam sedes suas adaperiunt, et uelut opercula foraminum obductas ceras erodunt exerētes capita, nam si fauos immaturo fœtu transfulerimus, emorientur pulli, cum foueri desierint. Sæpe etiam uitio, quod græci φάγεδ' αὐαῖ uocant, intereunt. Siquidem cum sit hæc apium cōsuetudo, ut prius tantum cerarum confingant, quantum putant explere se posse, nonnunquam euenit, ut consumatis operibus cereis, ut examen conqui- rendi mellis causa longius euagatum subitis imbribus, aut turbi- nibus in syluis opprimatur, et maiorem partem plebis amittat, quod ubi factum est, reliqua pauca fas complendis non suffi- ciat, tunc quæ uacue cerarū partes computrescant, et uitis pau- latim serpentibus corrupto melle ipsæ quoq; apes intereant. Id ne fiat, duo populi coniungi debent, qui possint adhuc integras ceras explere, uel si non est facultas alterius examinis, ipsos fauos ante q̄ putrescant, uacuis partibus acutissimo ferreo liberare, nā hoc quoq; refert, ne admotum hebes ferramentum (quia non faci- le penetret) uehementius impressum fauos sedibus suis cōmoueat. Quod si factum est, apes domicilium derelinquunt. Est et illa causa interitus, quod interdum continuis annis plurimi flores p- ueniunt, et apes magis mellificijs, q̄ fœtibus student, itaq; non- nulli, quibus est minor harum rerum scientia, magnis fructibus delectantur, ignorantes exitium apibus imminere, quoniam et nimio fatigatæ opere plurimæ pereunt, nec ullis inuentutis sup- plementis frequentatæ nouissimæ reliquæ intereunt, itaq; si tale uer incessit, ut et prata, et arua floribus abūdent, utilissimum est tertio quoq; die aluorum exitus præcludi, exiguis foraminibus relictis, per q̄ non possint apes exire, ut ab ope mellifico euocatæ, qm̄ se nō sperent posse ceras oēs liquoribus stipare, fœtibus exple- ant. Atq; hæc ferè sunt examinum uitio laborantium remedia.

Quid quoquo tempore faciant apes, et quid earum curator fa- cere debeat.

Cap. XIII.

DE INCEPS illa totius anni cura, ut idē Higinus cōmo- diffime prodidit. Ab æquinoctio primo, quod mēse Martio circa VIII. Cal. Aprilis in octaua parte arietis cōfiatur, ad exortum uergiliarū dies uerni tps habentur duodequingenta, per hos primū ait apes curandas esse adapertis alueis, ut oīa purgamen- ta, quæ sunt hyberno tpe congesta, eximantur, et ut araneis, qui

fauos corrumpunt, detractis, fumus immittatur factus incēso but-
 bulo fimo, hic enim quasi quadā cognatione generis maxime est
 apibus aptus. Verniculi quoq; qui tineæ uocant, et item papi-
 liones enecandi sunt. Quæ pestes plerunq; fauis adherentes de-
 dunt, si fimo medullam bubulam misceas, et his incensis, nidore
 admoneas. Hac cura per id tempus, quod diximus, examina fir-
 mabuntur, eaq; fortius operibus inservient. Verum maxime custo-
 diendum est curatori, qui apes nutrit, cum alios tractare debet
 bit, uti pridie castus sit ab rebus uenereis, ne ue temulentus, nec
 nisi lotus ad eas accedat, abstineatq; ferè ab omnibus redolentis-
 bus esculentis, ut sunt salsamenta, et eorū omnia eliquamina,
 itemq; foetentibus acrimonijs alijs, uel ceparū, ceterarumq; rerū
 similiū. Duodequingagesimo die ab æquoctio uerno, cū sit uer-
 giliarum exortus circa. V. Idus Maij incipiūt examina uiribus,
 et numero augeri. Sed et ijsdē diebus intereunt, quæ paucas, et
 a gras apes habent. Eodemq; tempore progenerant in extremis
 partibus fauorū amplioris magnitudinis foetus, q̄ sint ceterarum
 apum, eosq; nonnulli putant esse reges. Verum quidam græcorū
 auctores οἰσγους appellant, ab eo, quod exagitent, neq; patian-
 tur examina conquiescere. Itaq; præcipiunt eos enecari. Ab exor-
 tu uergiliarum ad solstitium, quod fit ultimo mense Iunio circa
 octauam partem cancri ferè examinant alui, quo tempore uehe-
 mentius custodiri debent, ne nouæ soboles diffugiant. Tumq; per
 actō Solstitio, usq; ad ortum caniculæ, qui ferè dies triginta sunt
 pariter frumentā, et faui demetuntur. Sed in quemadmodū tol-
 li debeant, mox dicetur, cum de confectura mellis præcipiemus.
 Ceterum hoc eodem tpe progenerari posse apes iuuenco perem-
 pto, Democritus, et Mago, nec minus Virgilius prodiderunt.
 Mago quidem uentribus et bubulis idem fieri affirmat. Quam-
 rōnem diligentius psequi supernacuum puto consentiens Celso,
 qui prudentissime ait non tanto interitu pecus istud admitti, ut
 sic requirendum sit, uerū hoc tempore, et usq; in autumnī equi-
 noctium decimo quoq; die alui aperiendæ sunt, et fumigandæ.
 Quod cū sit molestum examinibus, saluberrimum tñ esse conue-
 nit. Suffitas deinde, et æstuantēs apes refrigerare oportet, cōspersis
 uacuis partibus aluorū, et quamrecentissimi rigoris aqua in-
 fusa. deinde siquid ablui non poterit, pinnis aquilæ, uel et cinisli-
 bet uastæ alitis, q̄ rigorem habent, emundari. Præterea ut tineæ,

si apparuerint, euerrantur, papilionesq; enecentur, qui plerunq;
inter aluos morantes apibus exitio sunt, nam & ceras erodunt,
& stercore suo uermes progenerant, quos aluorū tineas appella-
mus. Itaq; quo tpe malua florent, cum est earum maxima multi-
tudo, si uas aeneum simile miliario uespere ponat inter aluos, et
in fundum eius lumen aliquod demittatur, undiq; papiliones cō-
currunt, dumq; circa flāmulam uolitant, aduruntur, quod nec fa-
cile ex angusto sursum euolare, nec rursus lōgins ab igne possunt
recedere, cum lateribus aeneis arcūueniantur, ideoq; propinquo
ardore consumuntur. A canicula ferè post diem quinquagesimū
arcturus oritur, cum irroratis floribus thymi, & anilae, thymi-
braeque apes mella conficiunt, idq; optimae notae enitescit autumni
aequinoctio, quod est ante Calē. Octobris, cum octauam partē li-
brae sol attingit. Sed inter caniculā, & arcturi exortum cauendum
erit, ne apes intercipiantur uolentia crabronum, qui ante aluea-
ria plerunq; obsidiantur prodeuntibus. Post arcturi exortum cir-
ca equinoctium librae (sicut dixi) fauorum secunda est exemptio.
Ab equinoctio deinde quod conficiatur circa VIII. Calen. Octo-
bris ad uergiliarum occasum diebus XL. ex floribus tamaricis,
& syluestribus frutetis apes collecta mella cibarijs hyemis repo-
nunt, quibus nihil est omnino detrahendum, ne sepius iniuria
contristatae, uelut desperatione rerum profugiant. Ab occasu uer-
giliarum ad brumam, quae ferè conficiatur circa VIII. Calen. Ia-
nuarij, in octaua parte capricorni iam recondito melle utuntur
examina, eoq; usq; ad arcturi exortum sustinent. Nec me fallit
Hipparchi rō, quae docet solstitia, & equinoctia nō octauis, sed
primis partibus signorū confici. Verum in hac ruris disciplina se-
quor nunc Eudoxi, & Metonis, antiquorumq; fastus astrologo-
rum, qui sunt aptati publicis sacrificijs, quia & notior est ista uer-
tus agricolis concepta opinio. Nec tñ Hipparchi subtilitas pin-
guioribus, ut aiunt, rusticorū litteris necessaria est. Ergo uergilia-
rum occasu primo statim conueniet aperire aluos, et depurgare
quicquid immundi est, diligentiusq; curare, qm̄ per tpa hyemis
non expedit mouere, aut patefacere uasa. Quam ob cām dum
adhuc autumnū reliq̄ae sunt, apriāssimo die purgatis domicilijs
opercula intus usq; ad fauos admoūda sunt, omni uacua parte
sedis exclusa, quo facilius angustiae cauearum per hyemem conca-
lescant, idq; semper faciendū est etiam in ijs aluis, quae paucitate

plebis infrequentes sunt. Quicquid deinde rimarum est, aut foraminum luto, & fimo bubulo mistis illinemus extrinsecus, nec nisi aditus, quibus cōmeent, relinquemus. Et quāvis portici protecta uasa, nihilo minus congestu culmorum, & frondium supertegimus, quantumq; res patietur à frigore, & tempestatibus muniamus. Quidā exemptis interaneis ocāsas aues intus includūt, quæ tempore hyberno plumis suis delirescentibus apibus p̄bent teporem. Tum ē si sunt absumpta cibaria, cōmode pascunt̄ esurientes, nec nisi ossa earum relinquunt, sin aut̄ faui sufficient, permānent illibatae, nec quāvis amantissimas munditiarū offendūt odore suo. Melius tñ esse nos existimamus tpe hyberno fame laborantibus, ad ipsos aditus in canaliculis uel contusam, et aqua madefactam ficum aridam, uel defrutum, aut passum præbere. Quibus liquoribus mundā lanam imbuere oportebit, ut insisteres apes quasi per syphonē succum euocent. Vnas ēt passas, cū in frigerimus, paulū aqua respersas probe dabimus, atq; his cibariis non solū hyeme, sed ēt quibus temporibus (ut iā supra dixi) thymallus, atq; ēt ulmi florebut, sustinēda sunt. Post cōfectant̄ brumam diebus ferē quadraginta quicquid est repositi mellis (nisi liberalius à curatore relictum sit) consumunt, & sepe etiā uacuatis ceris usq; in ortum arcturi, qui est ab Idibus Februarijs iunæ fauis accubantes torpent more serpentum, & quiete sua spiritum conseruant, quem tamen ne amittant, si longior fames incesserit, optimum est per aditum uestibuli syphonibus dulcia liquamina immittere, & ita penuriam temporum sustinere, dum arcturi ortus, & hirundinis aduentus commodiores polliceātur futuras tempestates. Itaq; post hoc tempus, cum diei permittit hilaritas, procedere audent in pasua, nam ab æquinoctio uerno sine cunctatione, iam passim uagantur, & idoneos ad fœtū decerpunt flores, atq; intra tecta comportant. Hæc obseruāda per anni tpa diligentissime Higinius præcipit. Cæterum illa Celsus adiicit, paucis locis eā felicitatem suppetere, ut apibus alia pabula hyberna, atq; alia præbeant̄ æstiuā. Itaq; quibus locis post ueris tpa flores idonei deficiunt, negat oportere imota examina, relinq, sed uernis pastionibus absumptis, in ea loca trāsferri, q̄ serotinis floribus thymi, et origani, thymbræq; benignius apes alere possunt. Quod fieri ait & Achæiæ regionibus, ubi transferuntur in atticas pastiones, & Eubœa, & rursus insulis cycladibus,

cum ex alijs transferuntur scyrum, nec minus in Sicilia cū ex reliquis eius partibus in Hyblā cōferuntur. Idemq; ait ex floribus ceras fieri, ex matutino rore mella, quæ tanto meliorem qualitatem capiunt, q̄to incandiores sit materia cera cōfecta. Sed ante trāslationē diligenter alueos inspicere p̄cipit, ueteresq; & tineosos, & labantes fauos eximere. Nec nisi paucos, & optimos reservare, et simul ēt ex meliore flore quāplurimi fiāt, eaq; uasa, quæ q̄s trāsferre uelit, non nisi noctibus, & sine cōcussione portare.

De melle conficiendo, & qñ castrari debent alui. Cap. XV.

MOX VERE transacto sequitur, ut dixi, mellis uindemia, ppter quam totius anni labor exercetur. Eius maturitas intelligitur, cū animaduertimus fucos ab apibus expelli, ac fugari, quod est genus amplioris incrementi simillimū apis. Et, ut ait Virgilius, ignauū fucos pecus, & immune sine idustria fauis assidēs, nā neq; alimenta cōgerit, & ab alijs inuecta consumit. Verūtamen ad procreationem sobolis conferre aliquid hi fuci uidentur insidētes seminibus, quibus apes figurantur. Itaq; ad fouendā, & educandam nouam prolem familiaris admittuntur. Exclusis deinde pullis, extra tecta proturbantur. Et, ut idem ait, à præsepibus arcēt. Hos quidam præcipiunt in totum exterminari oportere, quod ego Magoni cōsentiens faciendū non censeo, uerum sēuitiæ modum adhibendum, nam nec ad ocadionē gens interimenda est, ne apes inertia laborent, quæ cum fuci aliquam partem abariorū absument, sardiendo damna fiunt agiliores, nec rursus multitudinem prædonum coalescere patiēdum est, ne uniuersas opes alienas diripiant. Ergo cum rixam fucorum, et apium sæpius cōmitti uideris, ad apertas alueos inspicies, ut siue semipleni faui sint, differantur, siue iam liquore completi, & superpositis ceris tanquā operculis obliiti demetantur. Dies uero castrandi ferè matutinus occupandus est. Neq; enim conuenit æstu medio exasperatas apes lacessiri, duobus ferramentis ad hunc usum opus est sesquipedali, uel paulo ampliore mensura factis, quorū alterum sit culter oblongus ex utraq; parte acie lata, uno capite ad uncū habens scalprum, alterū prima fronte planū, & acutissimū, quo melius hoc faui succidantur, illo eradant, et qcqd sordium deciderit, attrahatur. Sed ubi à posteriore parte nullum uestibulum patefactum habuerit alueare, fumum admonebimus factū gal-

bano, uel arido fumo. Ea porro uase fictili prunis immista cōdun-
tur, idq; uas ansatum simile angustæ ollæ figuratur. Ita ut alter-
ra pars sit acutior, per quam modico foramine fumus emanet, al-
tera latior, & ore patulo, per quam possit afflari. Talis olla, cū
est alueari obiecta, spiritu admoto fumus ad apes promouetur,
quæ confestim nidoris impatientes in priorem partem domicilij
& interdum extra uestibulum se conferunt, atq; ubi potestas fa-
cta est liberius inspicendi, ferè, si duo sunt examina, duo genera
quoq; fauorum inueniunt. Nam etiam in cōcordia suum quæq;
plebs morem figurandi, ceras, fingendiq; obseruat. Sed omnes fa-
ui semper cauearum tectis, & paululum lateribus adherentes,
dependent, ita ne solum contingant, quoniam id præbet exami-
nibus iter. Cæterum figura cerarum talis est, qualis & habitus
domicilij, nam & quadrata & rotunda spatia, nec minus lon-
ga suam speciem uelut formæ quædam fauis præbent. Ideoq; non
semper eiusdem figuræ reperiuntur faui, sed hi qualescunq; sint,
non omnes eximantur, nam priore messe, dum adhuc rura spatio-
nibus abundant, quinta pars fauorum, posteriore, cum iam me-
tuitur hyems, tertia relinquenda est. Atq; hic tñ modus non est in
omnibus regionibus certus, quoniam pro multitudine florum, et
ubertate pabuli apibus consulendum est. At si ceræ dependentes
in lōgitudinem decurrunt, eo ferramento, quod est simile cultro,
insecandi sunt faui, deinde subiectis duobus brachijs excipiendi,
atq; ita promendi. Sin autem transuersi tectis cauearum inhæ-
rent, tunc scalprato ferramēto est opus, ut aduersa fronte impres-
si descendant. Eximi autem debent ueteres uel uitiosi, & relinquī
maxime integri, ac melle pleni. Et si qui tandem pullos continēt,
ut examini progenerando reseruentur. Omnis deinde copia fa-
uorum conferenda est in eum locum, in quo mel conficere uoles, li-
nendaq; sunt diligenter foramina parietum, & fenestrarum, ne
quid sit apibus peruium, quæ uelut amissas opes suas pertinaci-
ter uestigant, & persecutæ consumunt. Itaq; ex hisdem rebus fu-
mus etiam in aditu loci faciendus est, qui propulset intrare tētan-
tes. Castrate deinde alui siquæ trasuersos fauos in aditu habebūt
conuertenda erunt, ut alterna uicē posteriores partes uestibula
fiant. Sic enim proxime cum castrabuntur, ueteres potius faui, q̃
nouī eximentur, ceræq; nouabuntur, quæ tanto deteriores sunt,
quanto uetustiores. Quod si forte aluearia circūstructa, & im-

mobilia fuerint, curæ erit nobis, ut modo à posteriore, mō à prio-
re parte castrentur, idq; fieri ante diei quintam horam debet.
deinde repeti uel post nonam, uel postero mane. Sed quotcumque
fauis sunt demessi, eodem die, dum tepent, mella conficere conue-
nit. Saligneus qualis, uel tenui uimine rarius contextus saccus
inuersæ metæ similis, qualis est, quo uinum liquatur, obscuro lo-
co suspenditur, in eum deinde carpti congeruntur faui. Sed adhi-
benda cura est, ut separentur eæ partes ærarum, quæ uel pullos
habent, uel rubras sordes, nam sunt mali saporis, et succo suo mel-
la corrumpunt. Deinde ubi liquatum mel in subiectum alueum
defluxit, transfertur in uasa fictilia, quæ paucis diebus apta sint,
dum musteus fructus defuerescat, isq; sæpius ligula purgandus
est. Mox deinde fragmina fauorum, quæ in sacco remanserunt,
retractata exprimuntur. Atq; id secundæ notæ mel defluit, et ab
diligentioribus seorsum reponitur, ne quod est primi saporis hoc
adhibito, fiat deterius.

De cera facienda.

Cap. XVI.

CERAE fructus, quamuis æris exigui, non tamen omittendus
est, cum sit eius usus ad multa necessarius. Expressæ fauorum reli-
quæ, postea quā diligenter aqua dulci perlutæ sunt, in uas æne-
um conijcitur, adiecta deinde aqua liquantur ignibus, quod ubi
factum est, cera per stramenta, uel iuncos defusa colatur, atq; ite-
rum similiter deintegro coquitur, & in quas quisq; uoluerit for-
mas, aqua prius adiecta, defunditur, eamq; concretam facile est
eximere, quoniam qui subest humor non patitur formis inhere-
re. Sed iam consumata disputatiōe de uillatis pecudibus, atq;
pastionibus, quæ reliqua nobis rusticarum rerum pars superest,
de cultu hortorum Publi Siluine, deinceps ita, ut & tibi, et Cal-
lioni nostro complacuerat, in carmen conferemus.

L. IVNI MODERATI COLV
MELLAE IN LIBRVM
DECIMVM DE CVL
TV HORTORVM
PRAEFATIO.

OENORIS TVI Siluine, quod stipu-
lanti sponderam tibi, reliquam pensiuncu-
lam percipe. Nam superioribus nouem libris
f hac minus parte debitum, quod nunc persol-
uo, reddideram, superest ergo cultus horticul-
tū insigniter neglectus quondā ueteribus agri-
colis, nunc uel celeberrimus, siquidem cū par-
tior apud priscos esset frugalitas, largior tamen pauperibus fuit
usus epularū, lactis copia, ferinaq; ac domesticarū pecudum car-
ne uelut aqua, frumentoq; summis, atq; humillimis uictum tole-
rantibus. Mox cū sequens, et pāpue nostra etas dapibus libidi-
nosis pretia constituerit, cōneq; non naturalibus desiderijs, sed
cēsibus aestiment plebeia paupertas summotā à p̄tiosioribus abis
ad uulgares cōpellitur. Quare cultus hortorum, qm̄ et fructus
magis in usu est, diligentius nobis, q̄ tradiderunt maiores, prae-
cipiendus est, isq; sicut institueram prosa oratione prioribus subne-
cteretur exordijs, nisi propositum meū expugnasset frequens po-
stulatio tua, quae puiat, ut poeticis numeris explerē georgiā car-
minis ommissas partes, quas tñ et ipse Virgilius significauerat, po-
steris post se memoranda relinquere, neq; enim aliter istud nobis
fuerat audendum, q̄ ex uoluntate uatis maxime uenerādi, cuius
quasi numine instigante (pigre sine dubio propter difficultatem
op̄is, uerūtamen nō sine spe prosperi succēssus) aggressi sumus te-
nuem admodum, et penē uiduatā corpore materiam, quae tam
exilis est, ut in cōsumatione quidem totius operis annumerari ue-
lut particula possit laboris nostri, p se uero et quasi suis finibus
terminata nullo mō speciose cōfici. Nā et si multa sunt eius quasi
mēbra, de qbus aliquid possumus effari, tñ eadē tā exigua sunt,
ut) quod aiunt gr̄ci) ex incōprehensibili paruitate arenae funis
effici nō possit. Quare qcqd est istud, quod elucubramus, pro-
priā sibi laudem nō uendicat, ut boni cōsulat, si non sit dedecori
prius editis à me scriptorū monimētis, sed iā praefari desinamus.

Hortorum

Ortorum quoq; te cultus Siluine docebo,
 Atq; ea, quæ quondam spatijs exclusus iniquis,
 Cum caneret lætas segetes, & munera Bacchi,
 Et te magna Pales, nec non cælestia mella,
 Virgilius nobis post se memoranda reliquit.

Principio sedem numerofo præbeat horto
 Pinguis ager putres glebas, resolutaq; terga
 Qui gerit, & fossus graciles imitatur arenas.
 Atque habilis natura soli, quæ gramine læto,
 Parturit, & rutilas ebuli creat uuida baccas.
 Nam neq; sicca placet, nec quæ stagnata palude
 Perpetitur querulæ semper conuitia ranæ.
 Tum, quæ sponte sua frondosas educat ulmos,
 Palmitibusq; feris lætatur, & aspera syluis
 Achrados, aut pruni lapidosos obruta pomis
 Gaudet, & iniussi consternitur ubere mali,
 Sed negat helleboros, & noxia galbana succo,
 Nec patitur taxos, nec strenua toxica sudat,
 Quamuis semihominis uesano gramine fœta
 Mandragoræ pariat flores, mæstamq; acutam,
 Nec manibus mitis ferulas, nec cruribus æque,
 Terga rubi, spinisq; ferat paliuron acutis.
 Viâni quoq; sint amnes, quos incolâ durus
 Attrahat auxilio semper sitientibus hortis,
 Aut fons illachrymet putei non sede profunda,
 Ne grauis hausturis tendentibus ilia uellat.
 Talis humus, uel parietibus, uel sepibus hirtis
 Claudatur, neu sit pecori, neu peruia furi,
 Neu tibi Dædaleæ quærantur munera dextræ,
 Nec Polycletea, nec Phragmonis, aut Ageladæ
 Arte laboretur, sed truncum forte dolatum
 Arboris antiquæ numen uenerare Ithyphalli
 Terribilis membri, medio qui semper in horto
 Inguinibus puero prædoni falce minetur.
 Ergo age nunc cultus, & tempora quæq; ferendis
 Seminibus. quæ cura satis, quo sydere primum
 Nascantur flores, pestiq; rosaria gemment,
 Colu,

A

Quo Bacchi genus, aut aliena stirpe grauata
 Mitis adoptatis curuetur frugibus arbor.
 Pierides tenui deducite carmine musæ.
 Oæani sitiens cum iam canis hauserit undas,
 Et paribus titan orbem librauerit horis,
 Cum satur autumnus quassans sua tempora pomis,
 Sordidus, & musto spumantes exprimet uuas,
 Tum mihi ferrato uersetur robore palæ
 Dulcis humus, si iam pluuijs defossa madebit.
 At si cruda manet cælo durata sereno,
 Tum iussi ueniant declini tramite riuī,
 Terra bibat fontes, & hiantia compleat ora.
 Quod si nec cæli, nec campi competit humor,
 Ingeniumq; loci, uel Iuppiter abnegat imbrem,
 Expectetur hyems, dum Bacchi gnoscitur ardor
 Aequore cœruleo cæletur, uertice mundi,
 Solis & aduersos metuant atlantides ortus.
 Atque ubi iam tuto nec dum confisus olympo,
 Sed trepidus profugit chelas, & spicula Phœbus
 Dira nepæ, tergoq; croti festinat equino,
 Nescia plebs generis, matri ne parate falsæ.
 Ista prometeæ genitrix fuit altera Cretæ,
 Altera nos enixa parens, quo tempore sæuus
 Tellurem ponto merfit Neptunus, & innum
 Concitans barathrum lethæas terruit undas.
 Tumq; semel stygium regem uidere trementem
 Tartara, cum pelagi streperent sub pondere manes.
 Nos fœcunda manus uiduo mortalibus orbe
 Progenerat, nos abruptæ tum montibus altis
 Deucalionæ cantes peperere, sed ecce
 Durior, æternusq; uocat labor. eia age segnes
 Pellite nunc somnos, & curui uomere dentis
 Iam uirides lacerate comas, iam sandite amictus.
 Tu grauib; rastris cunctantia perfode terga,
 Tu penitus latis eradere uiscera marris
 Ne dubita, & summi frequentia æspite mista
 Ponere, quæ canis iaceant urenda pruinis,
 Verberibus gelidis, iræq; obnoxia cauri,

Alliget & senus boreas, eurusq; resoluat.
 Post ubi rypheæ torpentia frigora brumæ
 Candidus aprica zephyrus relegauerit aëra,
 Sydereoque polo cædet lyra mersa profundo,
 Veris & aduentum nidis cantarit hirundo.
 Rudere tum pingui, solido uel stercore Aselli,
 Armentine fimo saturet iciunia terræ
 Ipse ferens olitor diductos pondere qualos.
 Pabula nec pigeat fesso præbere noualij
 Immundis, quæcunque uomit latrina, cloacis,
 Densa; iam pluuijs, durataq; summa pruinis
 Aequora dulcis humi, repetat mucrone bidentis.
 Mox bene cum glebis uiuacem cespitis herbam
 Contundat marra, uel fracti dente ligonis,
 Putria maturi soluantur ut ubera campi.
 Tunc quoque trita solo splendentia sarcula sumat,
 Angustosq; foros aduerso limite duæens
 Rursus in obliquum distinguat tramite paruo.
 Verum ubi iam puro discrimine peccita tellus,
 Deposito squallore nitens sua semina posat,
 Pingit & in uarios terrestria sydera flores,
 Candida leucoia, et flauentia lumina caltæ,
 Narcissiq; comas, & hiantis sena leonis
 Ora feri, calathisq; uirentia lilia canis,
 Nec non uel ninos, uel ceruleos hyacinthos.
 Tum quæ pallet humi, quæ frondens purpurat auro,
 Ponatur uiola, & nimium rosa plena pudoris.
 Nunc medica panacem lachryma, succoque salubri
 Glaucea, & profrigos uinctura papauera somnos
 Spargite, quæq; uiros acuiunt, aruantq; puellas.
 Iam megaris ueniant genitalia semina bulbi,
 Et quæ sila uenit getulis obruta glebis,
 Et quæ frugifero seritur uicina priapo,
 Exatet ut ueneri tardos eructa maritos.
 Iam breue chærophylum, & torpenti grata palato
 Intyba, iam teneris frondens lactucula fibris,
 Alliaq; infractis spicijs, & olentia late
 Vlpica, quæq; fabis habilis fabilia miscet.

Iam sifer, assyrioq; uenit quæ semine radix,
 Sectaq; præbetur madido sociata lupino,
 Ut pelusiæ proritet pocula Cytbi.
 Tempore non alio nili, quoq; sal gamba meræ
 Capparis, & tristes inulæ, ferulæq; minaces
 Plantantur, nec non serpentia gramina mentæ.
 Et bene odorati flores sparguntur aneti,
 Rutaq; palladiæ bacæ uictura saporem,
 Seq; læssenti fletum factura synapis,
 Atq; oleris pulli radix, lachrymosaq; cepa
 Ponitur, & lactis gustum quæ condiat herba
 Deiectura quidam fronti data signa fucarum,
 Viniq; suam iccirco profitetur nomine graio.
 Tum quoq; conseritur, toto quæ plurima terræ
 Orbe uirens pariter plebi, regi; superbo
 Frigoribus caules, & ueri cymata mittit.
 Quæ pariunt ueteres æsposo littore Cumæ,
 Quæ maruini, quæ signia monte Lepino,
 Pinguis item Capua, & caudinis faucibus horti,
 Fontibus & stabie celebres, & uesua rura,
 Doctaq; Parthenope Sebethide rosida lympa,
 Quæ dulcis pompeia palus uicina Salinis
 Herculeis, nitreoq; filer qui defluit amni,
 Quæ duri præbent cymosa stirpe Sabelli,
 Et Turni lacus, & pomosi Tyburis arua,
 Brutia quæ tellus, & mater Aritia porri.
 Hæc ubi credidimus resolutæ semina terræ,
 Assiduo grauidam cultu, curaq; fouemus,
 Ut redeant nobis cumulato fœnore messes.
 Et primum moneo largos inducere fontes,
 Ne sitis exurat concepto semine partum.
 At cum fœta suos nexus adoperta resoluit,
 Florida cum soboles materno pullulat aluo,
 Primitijs plantæ modicos tum præbeat imbres
 Sedulus irrorans olitor, ferroq; bicorni
 Pectat, & argentem sulcis exterminet herbam.
 At si dumosis positi sunt collibus horti,
 Nec summo nemoris labuntur uerticæ riuu,

Aggere præposito cumulatis area glebis
 Emineat, sicco ut consuescat puluere planta,
 Nec mutata loco sitiens exhorreat æstus.
 Mox ubi nubiginæ Phryxi, nec portitor Helles
 Signorum, & pecorum princeps caput efferet undis,
 Alma sinum tellus iam pandet, adultaq; poscens
 Semina depositis cupient denubere plantis,
 Inuigilate uiri, tanto nam tempora gressu
 Diffugiunt, nulloq; sono conuertitur annus.
 Flagitat ecce suos genitrix mitissima fœtus,
 Et quos enixa est partus iam quærit alendos,
 Prinignasq; rogat proles, date nunc sua matri
 Pignora, tempus adest, uiridi redimite parentem
 Progenie, tu cinge comas, tu differe crines.
 Nunc apio uiridi crispetur florida tellus,
 Nunc capitis porri longo resoluta capillo
 Lætetur, mollemq; sinum staphilinus inumbret.
 Nunc & odoratæ peregrino munere plantæ
 Sicanijs crocæ descendant montibus hyblæ,
 Nataq; iam ueniant hilari sampsucæ canopo,
 Et lachrymas imitata tuas Cinereia uirgo,
 Sed melior stactis ponatur achaica myrrha,
 Et male damnati mœsto qui sanguine surgunt
 Aeacij flores, immortalesq; amaranthi,
 Et quos mille parit diues natura colores,
 Disponat plantis olitor, quos semine seuit.
 Nunc ueniat quamuis oculis inimica coramble.
 Tamq; salutari properet lactuca sapore,
 Tristia quæ releuat longi fastidia morbi.
 Altera crebra uiret, fusco nitet altera crine,
 Vtraque Cælij, de nomine dicta Metelli.
 Tertia, quæ spisso, sed puro uerticæ pallet,
 Hæc sua cappadoce seruat cognomina gentis.
 Et mea, quam generant tarthesi littore gades.
 Candida uibrato discrimine, candida thyrsos est.
 Cypros item paphio, quam pingui nutrit in aruo
 Punicea depexa coma, sed lactea crure est.
 Quot facies, totidem sunt tempora quanq; serendi.

Cæliam primo deponit Aquarius anno,
 Cappadocamq; premit ferali mense luperus.
 Tuq; tuis Maiores tarthesida pange Calendis,
 Tuq; suis Paphien iterum iam pange Calendis,
 Dum cupit, & cupida querit se iungere matri,
 Et mater facili mollissima subiacet aruo.
 Ingenera nunc sunt genitalia tempora mundi.
 Nunc amor ad coitus properat, nunc spiritus orbis
 Bacchatur ueneri, stimulisq; Cupidinis actus
 Ipse suas adamat partes, & foetibus implet.
 Nunc pater æquoreus, nunc & regnator aquarum
 Ille suam Tethyn, hic pelliat Amphitriten.
 Et iam cœruleos partus enixa marito
 Vtraq; nunc referat, pontumq; natantibus implet,
 Maximus ipse deum posito iam fulmine fallax
 Acrisioneos ueteres inuitatur amores,
 Inq; sinus matris uiolento depluit imbre.
 Nec genitrix nati nunc aspernatur amorem,
 Sed patitur nexus flammata cupidine tellus.
 Hinc maria, hinc montes, hinc totus deniq; mundus
 Ver agit, hinc hominum, pecudum, uolucrumq; cupido,
 Atq; amor ignescit menti, seuitq; medullis,
 Dum satiata Venus fecundos compleat artus,
 Et generet uarias soboles, semperq; frequentet
 Prole noua mundum, uacuo ne torpeat æuo.
 Sed quid ego infreno uolitare per æthera cursu
 Passus equos audax sublimi tramite raptos
 Ista canat maiore deo, quem delphica laurus
 Impulit, & rerum causas, & sacramonem
 Orgia naturæ, secretaq; fœdera cœli.
 Extimulet uatem per dindyma castra Cybelles,
 Perq; Citheronem, nyseaq; per iuga Bacchi,
 Per sua Parnassi, per omissa silentia musis
 Pierij nemoris, bacchea uoce frementem
 Delie te Pæan, & te enie enie Pæan,
 Me mea Calliope cura leniore uagantem
 Iam renocat, paruoq; iubet decurrere gyro,
 Et secum graui connectere carmina filo.

Quæ canat inter opus musa modulante putator
 Pendulus arbustis, olitor uiridantibus hortis.
 Quare age quod sequitur, paruo discrimine sulci
 Spargantur cæcis nastura dira colubris,
 Indomito male sana cibo, quas educat aluos,
 Et satureia thymi referens, tymbraeq; saporem,
 Et tenero cucumis, fragiliq; cucurbita collo.
 Hispida ponatur anara, quæ dulcis Iaccho
 Potanti ueniat, nec Phœbo grata canenti.
 Hæc modo purpureo surgit glomerata corymbo,
 Myrtilo modo crine uiret, deflexaq; collo
 Nunc adoperta manet, nunc pinea uertice pungit,
 Nunc similis calatho, spinisq; minantibus horret,
 Pallida nonnunquam tortos imitatur achantos.
 Mox ubi sanguineis se floribus induit arbor
 Punica, quæ rutilo mitescit tegmine grani,
 Tempus haris satio, famosaq; tunc coriandra
 Nascentur gracili melantia grata cumino,
 Et baccæ asparagi spinosa prosilit herba,
 Et moloche, prono sequitur quæ uertice solem,
 Quæq; tuas audax imitatur Nysie uites,
 Nec metuit sentes, nam uepribus improba surgens
 Achrados, indomitasq; bronias alligat alnos.
 Nomine tum graio, cœu littera proxima primæ,
 Pangitur in cœra docti mucrone magistri,
 Sic et humo pingui ferratæ cuspidis ictu
 Deprimitur folio uiridis, pede candida, beta.
 Quin et odoratis messis iam floribus instat,
 Iam uer purpureum, iam uersicoloribus anni
 Fœtibus alma parens cingi sua tempora gaudet.
 Iam Phrygiæ loti gemmantia lunnina promunt,
 Et conuiuentes oculos uiolaria solunt,
 Osat et leo, et ingenuo confusa rubore
 Virgineas adoperta genas rosa præbet honores
 Cœlitibus, templisq; sabæum miscet odorem.
 Nunc uos pegasidum comites acheloidas oro,
 Menalidumq; choros dryadum, nymphasq; napeas,
 Quæ colitis nemus Amphrysi, quæ thessala tempe,

Quæ inga Cyllenes, & opæa rura Lycæi,
 Antraq; castalijs semper rorantia guttis,
 Et quæ sicanij flores legistis halesi,
 Cum Cereris proles uestris intenta choreis
 Aequoris Aethnei uernantia lilia carpsit,
 Raptaq; lethæi coniunx mox facta tyranni
 Syderibus tristes umbras, & tartara cælo
 Præposuit, ditemq; Ioui, letumq; saluti,
 Et nunc inferno potitur Proserpina regno.
 Vos quoq; iam posito luctu, mæstoq; timore
 Huc facili gressu teneras aduertite plantas,
 Tellurisq; comas sacris aptate canistris.
 Hinc nullæ insidiæ nymphis, non ulla rapina,
 Casta fides nobis colitur, sanctiq; penates,
 Omnia plena iocis, seairo plena cachinno,
 Plena mero, letisq; uirent conuiuia pratis.
 Nunc uer egelidum, nunc est mollissimus annus,
 Dum Phœbus tener, ac tenera decumbere in herba
 Suadet, & arguto fugientes gramine fontes
 Nec rigidos potare inuat, nec sole tepentes.
 Iamq; dioneis redimitur floribus hortus.
 Iam rosa mitescit, sarrano clarior ostro.
 Nec tam nubifugo Borea latonia Phœbe
 Purpureo radiat uultu, nec syrius ardor
 Sic micat, aut rutilius pyrous, aut ore coruscus
 Hesperus, eo remeat cum lucifer ortu,
 Nec tam sydereo fulget Thaumantias archi,
 Quàm nitidis hilares collucent fœtibus horti.
 Quare age uel iubare exorto, iam nocte suprema,
 Vel cum Phœbus equos in gurgite mersat hiberos,
 Sicubi odoratas prætexit amaracus umbras,
 Carpite, narassiq; comas, sterilisq; balanxi.
 Et tu, ne Corydonis opes despernat Alexis,
 Formoso Nays puero formosior ipsa
 Fer calathis uiolam, & nigro permista ligustro
 Balsama cum casia nectens, croceosq; corymbos,
 Sparge mero Bacchi, nam Bacchus condit odores.
 Et nos agrestes, duro qui pollicæ molles

Demetitis flores, cano iam uimine textum
 Syrpiculum ferrugineis cumulate hyacinthis.
 Iam rosa distendat contorti stamina iunā,
 Pressaq; flammeola rumpatur fisa calta,
 Merabus & uernis diues Portunus abundet,
 Et titubante gradu multo madefactus iaccho
 Aere sinus gerulus plenos granis urbe reportet.
 Sed cum maturis flauabit messis aristis,
 Atq; diem gemino titan extenderit astro,
 Hauserit & flammis laernei brachia cancri,
 Allia cum cepis, cereale papauer aneto
 Iungite, dumq; uirent nexos deferte maniplos,
 Et celebres fortis fortunæ diate laudes
 Merabus exactis, hilaresq; recurrere in hortos.
 Tum quoq; profisso, riguoq; inspersa nouali
 Oſima comprimate, & granibus densate cylindris,
 Exurat sata ne resoluti pulueris æstus,
 Paruulus aut pulex irrepens dente laceſſat,
 Neu formica rapax populari semina possit.
 Nec solum teneras audent erodere frondes
 Impliatuſ conchæ limax, hirsutaq; campe.
 Sed cum iam ualido turgescat lurida caule
 Brassica, cumq; tument pallentia robor a Betæ,
 Merabus atq; olitor gaudet securus adultis,
 Et iam maturis querit supponere falcē,
 Sæpe ferus duos iaculatur Iuppiter imbres
 Grandine dilapidans, hominumq; bouumq; labores
 Sæpe etiam gravidis irrorat pestifer undis,
 Ex quibus infestæ Baccho, glaucisq; salictis
 Nascuntur uolucres, serpitq; eruca per hortos,
 Quos super ingrediens exurit semina morsu,
 Quæ capitis uiduata coma, spoliataq; nudo
 Vertice, trunca iacent tristi consumpta ueneno.
 Hæc ne ruricolæ paterentur monstra, salutis
 Ipsa nouas artes uaria experientia rerum,
 Et labor ostendit miseris, ususq; magister
 Tradidit agricolis, uentos sedare furentes,
 Et tempestatem Thysis auertere sacris.

Hinc mala rubigo virides ne torreat herbas,
 Sanguine lactentis catuli placatur, & extis.
 Hinc caput arcadii nudum cuncte fertur aselli
 Tyrrhenus fixisse tages in limite ruris.
 Utq; Iouis magni prohiberet fulmina Tarchon,
 Sæpe suas sedes percinxit vitibus albis.
 Hinc amythaonius docuit quæ plurima Chiron,
 Nocturnas crucibus uolucres suspendit, & altis
 Culminibus uetuit feralia carmina flere.
 Sed ne dira nouas se getes animalia carpant,
 Profruit interdum medicantem semina pingui
 Palladia sine fruge salis conspergere amurca,
 Innata uel laris nigra satiare fanilla.
 Profruit, & plantis latice infundere amaros
 Marrubij, multoq; sedi contingere succo.
 At si nulla ualet medicina repellere pestem,
 Dardaniæ ueniunt artes, nudataq; plantas
 Fœmina, quæ iustis tum demum operata iuuenta
 Legibus, obsceno manat pudibunda cruore,
 Sed resoluta sinus, resoluta mœsta capillo,
 Ter circum areolas, & sepem duatur horti.
 Quæ cum lustrauit gradiens (mirabile visu)
 Non aliter quàm decussa pluit arbore nimbus,
 Vel teretis mali, uel rectæ cortice glandis,
 Voluitur ad terram distorto corpore campe.
 Sic quondam magicis sopitum cantibus anguem
 Vellere phryxæo delapsum uidit Iolchos.
 Sed iam prototomos tempus decidere caules,
 Et tarthesiacos, paphiosq; reuellere thyrsos,
 Atq; apio fascës, & secto cingere porro,
 Iamq; eruca salax fœcundo progenit horto.
 Lubrica iam lapathos, iam thanni sponte uirescunt,
 Et scylla, hirsuta sepes nunc horrida rusco
 Prodit, & asparagi corruda simillima filo,
 Humidaq; andrachne sitientes protegit antes,
 Et grauis atriplici consurgit longa fascis.
 Tum modo dependens trichili, modo more chelidri
 Sole sub æstiuo gelidas per graminis umbras

Intortus cucumis, prægnansq; cucurbita serpit.
 Vna neq; est illis facies, nam si tibi cordi
 Longior est, gracili capitis quæ uertice pendet,
 E' tenui collo semen lege, siue globosi
 Corporis, atq; utero nimium quæ uasta timescit,
 Ventre leges medio, sobolem dabit illa pacem
 Naryiæ picis, aut actæi mellis hymethi,
 Aut habilem lymphis hamulam, Baccho'ue lagenam,
 Tum pueros eadem fluuijs innare docebit,
 Liuidus at cucumis grauida qui nascitur aluo,
 Hirtus & ut coluber nodoso gramine tectus
 Ventre cubat flexo, semper collectus in orbem,
 Noxius exacuit morbos æstatis iniquæ.
 Fœtidus hic succo, pingui quoq; semine fartus.
 At qui sub trichila manantem repit ad undam,
 Labentemq; sequens nimio tenuatur amore
 Candidus effatæ tremebundior ubere porcæ.
 Mollior infuso calathis modo lacte gelato,
 Dulas erit, riguoq; madescit luteus aruo,
 Et feret auxilium quondam mortalibus ægris.
 Cum canis Erigones flagrans hyperionis æstu
 Arboreos aperit fœtus, cumulatq; moris
 Candida sanguineo manat fuscælla cruore,
 Tunc præcox bisera descendit ab arbore ficus,
 Armenijsq; & cereolis, prunisq; damasci
 Stipantur calathi, & pomis quæ barbara Persis
 Miserat (ut fama est) patrijs armata uenenis.
 At nunc expositi paruo discrimine leti
 Ambrosios præbent succos, oblita nocendi
 Quin etiam eiusdem gentis de nomine dicta
 Exiguo properant mitescere persica malo.
 Tempestina manent, quæ maxima Gallia donat,
 Frigoribus pigro ueniunt asiatica fœtu.
 At granis arcturi sub sydere parturit arbos
 Liuia chaladialis, & cænis æmula chijs,
 Purpureæq; chelidoniæ, pinguesq; mariscæ,
 Et calli strutis roseo quæ semine ridet,
 Albaq; quæ seruat flauæ cognomina cæræ,

Sassa libysca simul picto quoq; lydia tergo.
 Quin & tardipedi sacris iam rite solutis
 Nube noua feritur, cœli pendentibus undis
 Congilis illustri mittit quam Nursia campo,
 Quæq; amiteruinis desertur buniâ aruis.
 Sed iam maturis nos flagitat anxius uinis
 Euchius, ex cultosq; inber claudamus ut hortos.
 Claudimus imperioq; tuo paremus agrestes,
 Ac metimus leti tua munera dulcis Iacche,
 Inter lasanos satyros, panasq; bifformes
 Brachia iactantes uetulo marcentia uino.
 Et te menalium, te bacchum, teq; lyæum,
 Lenæumq; patrem canimus sub tectâ uocantes,
 Ferueat ut lacus, & multo completa falerno
 Exundent pingui spumantia dolia musto.
 Hactenus aruorum cultus Siluine docebam
 Syderei uatis referens præcepta Maronis,
 Qui primus ueteres ausus recludere fontes
 Ascreum cecinit romana per oppida carmen.

LVCII IVNII MODERATI
 COLVMELLAE DE RE
 RVSTICA LIBER
 VNDECIMVS.

Quæ intra uillam agi debeant ab homine officio uillicationis p
 posito. Caput. I.

LAVDIVS AVGVSTALIS
 tam ingennæ naturæ, quàm eruditiois adole
 scens complurium studioꝝ, et præcipue agru
 colatioꝝ sermonibus instigatus excudit mi
 hi, cultus hortorum prosa ut oratione compo
 nerem. Nec me tamen fallebat hic euētus rei,
 cum prædictam materiam carminis legibus
 implicarem, sed tibi Publi Siluine pertinaciter expetenti uersifica
 tionis nostræ gustum negare non sustinebā, facturus innox, si colli
 buisset, quod nunc aggredior, ut olitoris curâ subtexerē uillia of
 ficijs, qui quāuis primo rei rusticæ libro uidebar aliquatenus exe

cutus, quoniā tamen eam simili desyderio noster idem Augustalis sepius flagitabat, numere, quem iam quasi consumauerā, uoluminum excessi, & hoc undecimum præceptum rusticationis memorie tradidi. Villicum fundo familieq; præponi cōuenit ætatis, nec primæ, nec ultimæ, nam seruitia sic tirunculum cōtemnunt, ut senem, qm̄ ille nondum nouit opera ruris, hic exequi iam non potest. Atq; hunc adolescentia negligentem, senectus illum facit pigrum. Media igitur ætas huic officio est aptissima, poteritq; ab anno trigesimo usq; in sexagesimū, si non interueniant fortuita corporis uitia, satis ualidi fungi muneribus agricolæ. Quisquis autem destinabitur huic negotio, sit oportebit idem sciētissimus, robustissimūq; ut edoceat subiectos, et ipse conimode faciat, quæ præcipit, siquidem nihil recte sine exemplo docetur, aut discitur. Præstatq; uillicum magistrum esse operariorum non discipulum, cum etiam de patrefamilias prisca moris exemplū Cato dixerit, male agitur cum domino, quē uillicus docet. Itaq; in œconomiæ Xenophontis, quē M. Cicerō latino sermoni tradidit, uir egregius ille Ischomachus Atheniensis rogatus à Socrate utrum ne, si res familiaris desyderasset, mercari uillicum tanq̄ fabrum, an à se instituere consueuerit. Ego uero inq̄ ipse instituo. Etenim qui me absente in meum locum substituitur, & uicarius meæ diligentie succedit, is ea, quæ ego, scire debet. Sed hæc nimis prisca, & eius quidem temporis fuit, quo idem Ischomachus negabat quēquam rusticari nescire. Nos autem memores ignorantie nostræ uigentis sensus adolescentulos, corporisq; robusti peritissimis agricolis cōmendemus, quorum monitionibus, uel unus ex multis (nam est difficile erudire) non solum rusticationis, sed imperandi cōsequatur scientiam. Quidam enim, quamuis operum probatissimi artifices, imperitandi parum prudentes, aut senius, aut etiam lenius agēdo rem dominorum corrumpunt. Quare, sicut dixi, docendus, et à pueritia rusticis operibus edurandus, multisq; prius experimentis inspiciendus erit futurus uillicus. Nec solum an perdidicerit disciplinam ruris, sed an etiā domino fidem, ac beneuolentiam exhibeat, sine quibus nihil prodest uillici summa sciētia. Potissimum aut̄ est in eo magisterio scire, & æstimare, quale officium, & q̄s labor sit, cuiq; iniungendus, nam nec ualentissimus posset exequi, quod imperatur, si nesciat quid agat, nec peritissimus, si sit inualidus. Qualitas itaq; cuiusq; rei consyderanda est.

COLVMELLAE.

Quippe aliqua sunt opera tantummodo virium tanquam promouendi onera, portandiq; aliqua sociata viribus, & arti, ut foendi, arandiq; segetes, & prata defecandi, nonnullis minus virium plus artis adhibetur, sicut putationibus, insitiōibusq; vinei. Plurimum etiam sciētia pollet in aliquibus, ut in pastione percoris, atq; eiusdem medicina. Quorum omnium officiorum uillicus, quem iam prius dixi, estimator bonus esse nō potest, nisi fuerit etiam peritus, ut in uno quoq; corrigere queat perperā factū. Neq; enim satis est reprehendisse peccantem, si nō doceat recti uiam. Libenter igitur eadem loquor, tam docendus est futurus uillicus, q̄ futurus sigulus, aut faber. Et haud facile dixerim, nū illa tanto expeditiora sint discētibz artificia, quāto minus ampla sunt. Rusticatiōis autem magna, & diffusa materia est, partesq; si uelimus eius percensere, uix numero comprehendamus. Quare satis admirari nequeo, quod primo scriptorum meorum exordio iure conquestus sum. Ceterarum artium minus uitae necessariorum repertos antistites, agriculturæ neq; discipulos, neq; præceptores inuentos, nisi magnitudo rei pepererit reuerentiam uel discēdi, uel profitēdi penē immensam scientiam, cum tamen non ideo turpi desperatione oportuerit eam negligi. Nā nec oratoria disciplina deseritur, quia perfectus orator nusquam reperi est, nec philosophia, quia nullus consummatæ sapientiæ, sed è cōtrario plurimi semetipsos exhortantur uel aliquas partes earum addiscere, quāuis uniuersas percipere non possint. Et enim quæ probabilis ratio est obmutescēdi, quia nequeas orator esse pfectus, aut in socordiam compelli, q̄a desponderis sapientiam? Magnæ rei, quantulumcūq; possederis, fuisse participem non minima est gloria, Quis ergo inquis, docebit futurum uillicū, si nullus professor est? & ego intelligo difficillimum esse ab uno uelut auctore cuncta rusticationis cōsequi præcepta. Verū tamen ut uniuersæ disciplinæ uix aliquem consultum, sic plurimos partium eius inuenias magistros, per quos efficere queas perfectū uillicum, nā & arator reperitur aliquis bonus, & optimus fossor, aut sceni selector, nec minus arborator, & uinitor, tum etiam ueterinarius, & probus pastor, qui singuli rationem scientiæ suæ desyderanti nō subtrahant. Igitur complurium agrestium formatus artibus, qui suscepit officium uillicationis, in primis conuictum domesticum, multoq; et magis externum uitet. Somni, et uini sit absti-

nentissimus, quæ utraq; sunt inimicissima diligentiae. Nā et ebrioso cura officij pariter cum memoria subtrahitur, & somniculoso plurima effugiunt. Quid enim potest aut ipse agere, aut cuiquā dormiēs imperare? Tum etiam sit à uenereis amoribus auersus, quibus si se dediderit, nō aliud quicquā possit cogitare, q̄ illud, quod diligit. Nam uitij eiusmodi plectus animus, nec præmij iucundius, q̄ fructum libidinis, nec supplicij grauius, quā frustrationem cupiditatis existimat. Igitur primus omnium uigilet, fantiliāq; semper ad opera cunctantem pro temporibus anni festinanter producat, & strenue ipse præcedat. Plurimum enim refert colonos à primo mane opus aggredi, nec lentos per otium pigre procedere. Siquidem Ischomachus idem ille. Malo inquit unius, agilem atq; industriam, q̄ decem hominum, negligentem & tardam operam. Quippe plurimum affert mali, si operario meretricandi potestas fiat, nam ut in itinere conficiendo sepe dimidio maturius peruenit is, qui nauiter, & sine ullis concessationibus permeabit, q̄ is, qui cum sit unā profectus umbras arborum fonticulorumq; amœnitatem, uel auræ refrigerationem captauit, sic in agresti negotio diu nix potest, quid nauus operarius, ignauo & cessatore præstet. Hoc igitur custodire oportet uillicum, ne statim à prima luce familia cunctanter, & languide procedat, sed uelut in aliquod prælium cum uigore, et alacritate animi præcedentem eum tanquam ducem strenue sequatur, uarijsq; exhortationibus in opere ipso exhilaret laborantes. Et interdum tanquam deficiente succursurus ferramentum auferat, parumper, & ipse fungatur eius officio, moneatq; sic fieri debere, ut ab ipso fortiter sit effectum. Atq; ubi crepusculum inceserit, neminem post se relinquat, sed omnes subsequatur more optimi pastoris, qui è grege nullam pecudem patitur in agro relinquī. Tum uero, cum tectū subierit, idem faciat, quod ille diligens opilio, nec in domicalio suo statim delitescat, sed agat cuiusq; maximam curā. Sine q̄s (quod accidit plerunq;) sauciatus in opere noxam æperit, adhibeat fomenta, siue alter lāguidior est in ualitudinariū confestim deducat, & conuenientē ei ceterā curationem adhiberi iubeat. Eorū uero, qui recte ualebunt, nō minor habēda erit rō, ut cibis, & potio sine fraude à cellarijs præbeatur. Consuescatq; rusticos arca larem domini, focumq; familiarē semp epulari, atq; ipse in conspectu eorum similiter epulet. Sitq;

frugalitatis exemplum, nec nisi sacris diebus accubans cœnet, fe-
 stosq; sic agat, ut fortissimum quenq; & frugalissimum largitio-
 nibus prosequatur, nonnunquam etiam suæ mensæ adhibeat, et
 uelit alijs quoq; honoribus dignari. Tum etiam per ferias instru-
 mentum rusticum, sine quo nullū opus effici potest, recognoscat,
 & sepius inspiciat ferramenta, eaq; semper duplicia comparet,
 ac subinde resecta custodiat, ne si quod in opere uitiatum fuerit,
 à uicino petendū sit, quia plus in operis seruorum auocandis,
 q̃ in pretio rerum eiusmodi dependitur. Cultam uestitamq; fami-
 liam utiliter magis habeat, q̃ delicate, idest munitam diligenter
 à frigoribus, & imbribus, quæ utraq; prohibentur optime pelli-
 bus manicatis, & sagatis cucullis, idq; si fiat, omnis penè hyema-
 lis dies in opere tolerari potest. Quare tam uestem seruitiorum,
 q̃, ut dixi, ferramenta bis debet singulis mensibus recensere, nā
 frequēs recognitio nec impunitatis spem, nec peccandi locū præ-
 bet. Itaq; mancipia uincta, quæ sunt ergastuli, per nomina quo-
 tidie citare debet, atq; explorare, ut sint compedibus diligēter
 innexa, tum etiā custodiæ sedes an tuta, & recte munita sit, nec
 si quem dominus, aut ipse uinxerit, sine iussu patrisfamilie resol-
 uat. Sacrificia nisi ex præcepto domini facere nesciat, aruspiciem,
 sagamq; sua sponte non nouerit, quæ utraq; genera uana super-
 stitione rudes animos infestant. Non urbem, non ullas nundinas
 nisi uendendæ, aut emendæ rei necessariæ causa frequentauerit,
 neq; enim colonie suæ terminos egredi debet, nec absentia sua fa-
 milie cessandi, aut delinquendi spatium dare. Semitas, nouosq;
 limites in agro fieri prohibeat. Hospitem nisi ex amicitia domi-
 ni quamrariissime recipiat. Ad ministeria sua conseruos non ad-
 hibeat. Nec ulli terminos egredi (nisi magna coegerit necessitas)
 permittat. Pecuniam domini neq; in pecore, nec in alijs rebus p̃
 mercalibus occupet, hæc enim res auocat uillæ curam, & eum
 negotiatorem potius facit, quàm agricolam, nec unquam finit
 eum cum ratiōibus domini paria facere, sed ubi æris numeratio
 exigitur, res pro numis ostenditur. Itaq; tam istud uitandū ha-
 bebit, q̃ hercule fugiendū uenandi, aut aucupandi studium,
 quibus rebus plurimæ operæ auocantur. Iam illa, quæ etiam in
 maioribus imperijs difficulter custodiuntur, consyderare debet,
 ne aut crudelius, aut remissius agat cum subiectis, semperq; fo-
 ueat bonos & sedulos, parcat etiam minus probis, & ita tēpe-
 ret, ut magis

ret, ut magis eius uereantur seueritatem, q̄ ut seuitiam detesten-
tur. Poteritq; id custodire, si maluerit cauere ne peccet operari-
us, q̄, cum peccauerit, serò punire. Nulla est autem uel nequissi-
mi hominis amplior custodia, q̄ quotidiana operis exactio. Nā
illud uerum est. M. Catonis oraculum, nihil agēdo homines ma-
le agere discunt. Itaq; curabit uillicus, ut iusta reddantur. Itaq;
non egre consequetur, si semper se representauerit. Sic enim &
magistri singulorum officiorum diligenter exequētur sua munia
& familia post operis exercitationem fatigata, cibo quietiq; po-
tius ac somno, q̄ maleficijs operam dabit. In uniuersa porro uilli-
catione, sicut in cetera uita, pretiosissimū est intelligere quenq;
nescire se quod nesciat, semperq; cupere, quod ignoret addiscere.
Nam & si multum prodest scientia, plus tamen obest impruden-
tia, uel negligentia maxime in rusticatione, cuius disciplinæ ca-
put semel est fecisse quicquid exegerit ratio culturæ, nam quam-
uis interdum emendatum sit perperam factum uel imprudentia
uel negligentia, restamen ipsa iam domino decoxit. Nec mox
intantum exuberat, ut & iacturam capitis amissi restituat, &
questum resarciat. Prælabentis uero temporis fuga q̄ sit irrepa-
rabilis, quis dubitet? Eius igitur memor præcipue semp caueat,
ne improvidus ab opere uincatur. Res est agrestis insidiosissima
cunctanti, quod ipsum expressius uetustissimus auctor Hesiodus
hoc uersu significauit.

αἰεὶ δ' ἀμβολιεύῃς ἀνὴρ ἄταισι παλαίῃ.

Quare uulgare illud de arborum positione rusticis usurpatum,
serere ne dubites. Id uillicus ad agri totum cultū referri iudicet.
credatq; prætermittas non duodecim horas, sed annum perisse,
nisi sua quaq; die quod instat effecerit, nam cum proprijs penè mo-
mentis fieri quicq; debeat, si unum opus tardius q̄ oporteat per-
actum sit, ceteræ quoq; quæ sequuntur, culturæ, post iusta tpa se-
rius adhibentur, omnisq; turbatus operis ordo spem totius anni
frustratur, quare necessaria est mēstrui cuiusq; officij monitio ea,
quæ pendet ex ratione syderum & cœli, nam, ut ait Virgilius,
Tam sunt arcturi sydera nobis
Hædorumq; dies seruandi, & lucidus anguis,
Quam quibus in patriam uentosa per equora uectis
Pontus, & ostriferi fauces tentantur Abidi.

Contra quam obseruationem multis argumentationibus disse-

Colu.

B

ruisse me non infior in ijs libris, quos aduersus astrologos cōposueram, sed illis disputationibus exigebatur id, quod improbiſſime Chaldæi pollicentur, ut certis quasi terminis, ita diebus statis aeris mutationes rñdeant. In hac aut ruris disciplina non desyderatur eiusmodi scrupulositas, sed (quod dicitur pingui Minerua) quātūmuis utile contingeret nillico tempestatis futuræ p̄sagiū si persuasum habuerit, modo ante, modo post, interdum et stato die orientis, uel occidentis competere uim syderis, nā satis prouidus erit, cui licebit ante multos dies cauere suspecta tempora.

Quid quoque mense faciendum sit, temporibus accomodando opera.

Cap. II.

ITA QVE Præcipiemus quid quoq; mense faciendum sit, sic temporibus accomodantes opera ruris, ut permiserit status cœli. Cuius uarietatem, mutationemq; si ex hoc cōmentario fuerit præmonitus nillicus, aut nunquam decipietur, aut certe non frequenter, et ne discedamus ab optimo uate, qui ait, ille uere nouo terram proſcindere incipiat. Noui aut ueris principium non sic obseruare rusticus debet, quemadmodum astrologus, ut expectet certum diem illū, qui ueris initium facere dicitur, sed aliquid etumat de parte hyemis, qm̄ consumpta bruma, iam intepesat annus, permittitq; clementior dies opera moliri, possunt igit ab idibus Ianuarijs (ut principem mensem romani anni obseruet) auspicari culturarum officia, quorū alia ex pristinis residua consumabit, atq; alia futuri temporis inchoabit. Satis autem erit p̄ dimidios mēses exequi quodq; negotium, quia neq; præſtinatū opus nimium immature uideri possit ante quindecim dies factū, nec rursus post totidem nimium tarde. Idibus Ianuarijs uētoſa tempestas, et incertus status. XVIII. Cal. Febr. tempestas incerta. XVII. Cal. Febr. Sol in Aquarium transit, Leo mane incipit occidere, africanus, interdum auſter cum pluuia. XVI. Cal. Febr. Cancer desinit occidere, hyemat. XV. Cal. Febr. Aquarius incipit oriri, uentus africanus tēpestatem significat. XI. Cal. Febr. fidicula uespere occidit, dies pluuius. IX. Cal. Febr. ex occasu pristini syderis significat tempestatē, interdum et tempestas. VI. Cal. Febr. Leonis quæ est in pectore clara stella occidit, nonnunquā significatur hyems bipartita. V. Calē. Febr. auſter, aut africanus hyemat, pluuius dies. III. Cal. Febr. delphinus incipit occidere. Item si

dicula occidit. Pridie Cal. Feb. eorum, quæ suprascripta sunt sy-
derum occasus, tempestatē faciūt, interdum tantummodo signifi-
cat. Hoc igitur semestrium, & deinceps sequentia tempestatibus
annotatis percensuimus, quo cautior uillicus (ut iam dixi) uel ab-
stinere possit operibus, uel festinationē adhibere. Itaq; ab idibus
Iannarijs, quod habet tempus inter brumā, & aduentū fauo-
rū, si maior est uineæ, uel arbusi modus, quicquid ex autumnō
putationis sup̄fuit, repetendum est, sed ita ne matutinis t̄pibus
uitis sancietur, qm̄ pruinis, & geliadijs nocturnis adhuc rigētes
materiæ, ferrum reformidāt, itaq; dum hæ regelare sinunt, usq;
in horam secundam, uel tertiā poterunt uepres attenuari, ne in-
cremento suo agrū occupent, segetes emundari, acerui uirgarū
fieri. ligna deniq; confici, ut tum demū tepenti iam die putatio
administret. Aprijs ē, & macris, aut aridis locis prata iā pur-
gāda, & à pecore sunt defendēda, ut fœni sit copia. Siccos quo-
q; & pingues agros tempestiuum est prosādere, nā et uliginos-
si, & mediocri habitus sub æstate, uerē ne agendi sunt, macerri-
mi uero, & aridi post æstatem, primo autūno arandi, & subin-
de conserēdi. Sed iugerū agri pinguis hoc tpe anni cōmode dua-
bus operis prosādit, q̄a hybernīs pluuijs adhuc madens terra fa-
cilem cultum sui præbet. Eodemq; mense ante Cal. Feb. sarriēdæ
segetes autumnales, siue ille seminis adorei sunt, quod quidā sar-
uernaculum uocāt, seu tritici. Eorumq; tempestiua sarritio est, cū
enata frumenta quatuor fibrarū esse cœperūt. Ordeū quoq; ma-
turum, qbus superest opera, nūc demū sarrire debebunt. Sed &
faba eandē culturā exigit, si iam coliculus eius in quatuor digi-
tos altitudinis creuerit, nā prius sarruisse nimium tenerā nō ex-
pedit. Eruium qdem melius priore mēse, nec tñ improbe hoc ipso
uel proximo seremus, nā Martio nullo modo terræ cōmittēdum
esse rustici præcipiunt. Vineæ, quæ sunt palatæ, & ligatæ recte, iā
fodiunt. Surculi, q̄ primi florem afferunt, statim circa idus inse-
rendi sunt, ut cerasorū, tuberum, amygdalarū, persicorūq;. Ridi-
cis uel ēt palis conficiendis, idoneū tempus est, nec minus in ædi-
ficia succidere arborem cōuenit, sed utraq; melius fiunt Luna de-
crescente ab uigesima usq; in trigesimam, qm̄ omnis materia sic-
cassa indicatur carie non infestari. Palos una opera cadere, et ex-
putatos acuere cētum numero potest. Ridas aut querneas, siue
oleagineas findere, & dedolatas utraq; parte exacuere numero

sexaginta. Item ad lucubrationem uestertinam palos decem, uel
ridicis quinque cōficere, totidemq; per antelucanam lucubratio-
nem. Materies si roborea ē, ab uno fabro dolari ad unguem per/
quadrata debet pedum. XX. hæc erit uehis una. Pinus aut qn/
que & uiginti pedum æque ab uno expeditur, quæ & ipsa uehis
diatur, nec minus ulmus, & fraxinus pedum XXX. cupressus
autem pedum XL. tum etiam sexagenum pedum abies, atq; po-
pulus, singulis operis ad unguem quadrantur, atque omnes hæ
mensuræ similiter uehes appellantur. His etiam diebus maturi
agni, et reliqui fœtus pecudum, nec minus maiora quadrupedia
charactere signari debent. Calen. Feb. fidis incipit occidere, uen-
tus eurinus, & interdum auster cum grandine est. III. Nonas
Februar. fidis tota, & leo medius occidit, corus, aut septentrio.
nonnunquam fauonius. Nonis Feb. mediæ partes Aquarij oriū-
tur, uentosa tempestas. VII. Idus Febr. Calisto sydus occidit, fa-
uonij spirare incipiunt. VI. Idus Febr. uentosa tempestas. III.
idus Feb. eurus. per hosce dies locis maritimis, & calidis, & siccis
prata, uel arua purgantur, & in fœnum submittuntur. Reliquæ
partes uinearum propter brumam, uel frigora omissæ, nunc pa-
landæ, & alligandæ sunt, ne postea tumentes gemmæ ledantur,
et oculi atterantur. Item uinearum fossio hisdem locis peragēda,
arborumq; siue putatio, siue alligatio finienda est, quorum in-
sta certa esse non possunt. Inter nonas deinde, et idus, pomorum
seminaria faciendæ sunt, et maturæ plantæ de seminarijs in scro-
bes transferendæ. Pastinatio quoq; quæ mense Decembri, uel Ia-
nuario cœpta est, iam nunc includenda, & uitibus conferenda
est. Pastinatur autem terreni ingerum ita, ut solum in altitudi-
nem trium pedum defodiatur operis LXXX. uel in altitudinem
dipondij semissis, operis. L. uel ad bipaliū, cui est altitudo duorū
pedum, operis XL. Hæc tñ in agro sicco surculis cōserēdis mini-
ma pastinationis mensura est. Nā oleribus deponendis possit uel
sexquipedalis altitudo satisfacere, quæ plerumq; in singula inge-
ra triginta operis conficitur. Hoc eodē tempore stercoris pars in
prata digerenda, pars oleis & ceteris arboribus inspergenda,
quin etiam uiticaria diligenter faciendæ, malleolisq; quam recen-
tissimis curiosissime pangenda. Populos, & salices, & fraxinos,
prius q̄ frondeāt, plantasq; ulmorum nunc ponere utile est, aut
ante satas nunc ex putare, & circumfodere, ac summas earum

estinas radículas amputare. Sarmenta quoque (uineis nondum
fossis) atq; arborum ramos è segetibus, aut rubos, & quicqd. de
niq; iacens, fodientem, uel alio genere terram molientem pōt im
pedire, nunc eggeret, & ad sepem applicari oportet. Rosaria no
ua conferere, uel antiqua curare. Arundinetas nunc ponere, uel
et pristina colere. Salicta facere, uel deputare, runcare, ac fodere.
Genistā semine uel plantis in pastinato, uel et sulco deponere.
Trimestrium quoq; satio non est aliena huic tempori, quāuis tel
pidis regionibus melius administretur per mensem Ianuarium.
Idibus Februarijs Sagittarius uespere occidit, uehementer hye
mat. XVI. Cal. Martij uespere crater orit̃, ueti mutatio. Quin
todecimo Cal. Martij sol in pisces transitum facit, nonnunq̃ uen
tosa tēpestas. Tertiodecimo, & duodecimo Cal. Martij fauonius
uel auster cū grandine, & nimbis. Decimo Cal. Martij Leo de
finit occidere, uenti septentrionales, q̃ uocantur ornithie, per dies
triginta esse solent, tum & hirundo aduenit. IX. Cal. Martij ar
cturus prima nocte orit̃, frigidus dies aquilone, uel coro interdū
pluuia. VIII. Cal. Martij sagitta crepusculo incipit oriri, uariæ
tempestates, halcyonei dies uocant̃, in atlantico q̃dem mari sum
ma trāquillitas notata est. VII. Cal. Martij uentosa tempestas,
hirundo cōspiciatur. Per hos dies frigidis locis earū rerum, quas su
pra scripsimus, tempestina est administratio. Locis aut̃ calidiori
bus, quāuis sera, tñ necessaria. Ceterum malleoli, & uini radici
positio huius t̃pis esse uidet̃ optima, nec tñ deterior et̃ inter Cal.
& idus sequentis mensis, utiq; si non sit feruentissima regio, si ue
ro et̃ magis frigida, uel melior est. Insitio quoq; arborum, atque
uitiū tepidis locis hoc t̃pe commode administrabitur. Cal. Mar
tij africanus, interdum auster cum grādine. VI. nonas Martij uini
demiator apparet, quē gr̃eci τευυνηγες dicunt, septentriona
les uenti. IIII. Non. Martij fauonius, interdū auster hyemat.
Nonis Martij equus mane orit̃, flatus aquilonis. III. idus Mar
tij piscis aquilonius desinit oriri, septentrionales uenti. Pridie idus
Martij argo nauis exorit̃, fauonius, aut auster, interdū aquilo.
His diebus cōmode instruunt̃ horti, de quibus suo loco dicā se
cretius, ne inter hanc quasi turbā operum negligentius olitoris
officia descripsisse uidear, aut nunc ordinem reliquarū culturarū
cœptum interrupuisse. Igitur à Cal. Martij eximia est uitium pu
tatio usq; in decimū Calendarū Aprilium, si tñ se gemmæ nōdū

moveant. Surculi quoque; silentes ad insitionem nunc præcipue, uti
 literque; leguntur, et ipsa insitio vitium, atque; arborum longe nunc est
 optima. Frigidis quoque; locis, et humidis vitium satio nunc præci-
 pua est, sed et ficulnea cacumina iam tumentia utilissime ponun-
 tur. Sarritura quoque; frumetorum iteratur egregie, modios tres una
 opera recte sarrit. Prata purgare, et à pecore defendere iam tem-
 pestinum est, locis quidem calidis, et siccis et à mense Ianuario,
 ut supra diximus, id fieri debet, nam frigidis vel à quinquatribus
 prata recte submituntur. Scrobes omnis generis, quos eris autum-
 no cõsiturus, hoc tpe præparare oportebit, eorum quaternarij, hoc
 est quoquoersus pedum quatuor, si est cõmodum terrenum. XIII
 ab uno fiunt. Ternarij autem XVIII. Cæterum ad deponendas
 vites, vel non magni incrementi arbores, sulcus qui sit pedum cen-
 tum et viginti, latitudine bipedanea, in altitudinem deprimi
 debet dipondio semisse, eumque; similiter una opera efficit. Rosa-
 rium serotinum perfossum, et cultum habere iam tempus est. Oleis
 laborantibus circum radices amurcam, quæ salem non habeat, nunc
 conueniet infundere, maximis sex congi, mediocribus arboribus
 urnæ satisfaciunt, cæteris æstimanda erit portio, sed tamen quæ nihil
 vitij habuerint, aliquanto letiores fient, si amurca rigentur insul-
 sa. Nonnulli hoc optimum tempus esse seminarijs instituendis di-
 xerunt, tum et baccas lauri, et myrti, cæterorumque; uiridium se-
 mina in areolas differere præceperunt. Orthocissos, et ederas ab
 idibus Februarij, vel etiam Cal. Martijs poni oportere ijdẽ cen-
 suerunt. Idibus Martij nepa incipit occidere, significat tempesta-
 tem. XVII. Cal. April. nepa occidit, hyemat. XVI. Cal. April.
 Sol in Arietẽ transitum facit, fauonius, vel corus. XII. Cal. April.
 equus occidit mane, septentrionales uenti. X. Calen. April. Ari-
 es incipit exoriri, pluuius dies, interdum ningit. IX. et. VIII.
 Calendarum Aprilium, æquinoctium uernum, tempestatem si-
 gnificat. Ab idibus eadem, quæ supra, utique; peragenda sunt, op-
 time autem uliginosa, et pingua loca nunc demum profundum
 tur, et quæ mense Ianuario uernaecta fecimus, nunc ultima pte
 Martij sunt iteranda, et si quæ pergula vitium generosarum, vel
 si quæ in agris, aut uepribus singulares arbores maritæ à putato-
 ribus relictæ sunt, ante Calend. April. utique deputari debent,
 post quem diem sera, et in fructuosa fit huiusmodi rerum cultus
 ra. Milij quoque, et panici, hæc prima satio est, quæ pagi debet

circa Id. April. utriusq; seminis sextarij quini singula iugera occupant, quinetiam pecus lanatum, ceteraq; quadrupedia tepus idoneum est castrandi. Locis autem tepidis ab idibus Februarij usq; in idus April. In locis frigidis ab idibus Martij usq; in idus Maias omnia recte pecora castrantur. Calend. April. nepa occidit mane, tempestatem significat. Non. April. fauonius, aut auster, cum grandine, nonnunquam hoc idem pridie. VIII. Idus April. uergiliæ uespere celantur, interdum hyemat. VII. Idus April. & VI. & V. austri, et afrii, tempestatē significat. IIII. idus April. Sole oriente, Libra occidere incipit, interdum tempestatē significat. Pridie id. April. succulæ celantur, hyemat. His diebus locis frigidis prima uinearum fossio utique ante idus peragenda est, quæq; mēse Martio post cōfectum æquinoctium fieri debuerunt, nunc denique quāprimum exequenda sunt. Fici, uitesq; adhuc recte inferuntur. Seminaria, quæ sunt ante facta, ruri cari, & adhuc cōmode fodiri possunt. Oues tarentinæ radice lanaria lauari debent, ut tonsuræ præparentur. Idib. April. ut supra libra occidit, hyemat. XVIII. Calen. Maias uentosa tempestas, & imbres, nec hoc cōstanter. XV. Cal. Maias Sol in tauri transitum facit, pluuiam significat. XIII. Cal. Maias, succulæ se uesperis celant, pluuiam significat. XI. Cal. Maias uer bipartitur, pluuiæ, & nonnunquam grando. X. Cal. Maias uergiliæ cum Sole oriuntur, africus, uel auster, dies humidus. IX. Calen. Maias prima nocte fidicula apparet, tempestatem significat. IIII. Cal. Maias auster ferè cum pluuiæ. III. Calen. maias mane Capra exoritur, austrinus dies, interdum pluuiæ. Pridie Cal. Maias canis se uespere celat, tempestatem significat. Per hos dies eadem, quæ supra, persequemur. Possuntq; si iam librum remittunt inferi oleæ, uel emplastrari, ceteraq; pomiferæ arbores eodē emplastratiōis genere inferi, sed & prima pampinatio recte incōhatur, dum prorepentes oculi digito decuti possint. Siqua p̄terea in uineis aut fossor disturbauit, aut negligentia omisit, diligens uinitor restituere debet, & fracta iuga cōsydere, & resarare, aut disiectos palos reponere, ita ne teneros pāpinos explātet, eodem tpe secundi fœtus, pecudes signari oportet. Cal. Maias hoc biduo sol unam dicitur tenere particulā. VI. Non. Maias, succulæ cum sole exoritur, septētrionales uenti. V. Non. Maias cētaurus totus apparet, tēpestatē significat. III. Non. Maias idem sydus

pluuiam significat. Pridie nonas Maias nepa medius occidit, tēpestatem significat, nonis Maius uergiliæ exoriuntur mane, fauonius. VII. Idus Maias æstatis initium, fauonius, aut corus, interdum ēt pluuiæ. VI. Idus uergiliæ totæ apparent, fauonius, aut corus, interdum & pluuiæ. Tertio Idus Maias fidis mane oritur significat tempestatem. Per hos dies runcandæ segetes sunt, scēnificæ instituendæ. Bonus operarius prati ingerum desecat, nec minus mille ducentos manipulos unus obligat, qui sint singuli quaternarum librarum. Arbores quoq; tempus est ablaqueatas circumfodere & operire, una opera nouellas circumfodiet arbores octuaginta, mediocres LXV. magnas quinquaginta, hoc mense seminaria omnia crebro fodere oportebit, sed à Calēdis Martijs usq; in idus Septembres, omnibus mensibus nō solum seminarijs, sed etiā nouellis uineis danda fossio est. Iisdem diebus, ubi prægelidū, et pluuium cœlum est, oleæ putantur, & emuscantur. Ceterū tepidis regionibus duobus tēporibus anni facere istud oportebit. Primo ab idibus Octob. usq; in idus Decembres, iterū ab idibus Februaria, usq; in idus Martias, si tamen arbor librum non remittit. Hoc eodē mense in pastinato seminario nouissima positio est olearis taleæ, eamq; oportet, cum panxeris, fimo, & cinere mistis oblinire, et super ponere muscum, ne sole findatur, sed hoc idē opus melius fiet ultima parte mensis Martij, uel prima mensis Aprilis, & ceteris temporibus, quibus præcepimus seminaria, plantis uel ramis conferere. Idibus Maijs fidis mane exoritur, auster aut euronotus, interdum dies humidus. XVII. Calen. Iunias idem, quod supra Calen. XVI. & XV. Calen. Iunias, euronotus, uel auster cum pluuiæ. XIII. Calen. Iun. Sol in geminos introitū facit. XII. Cal. Iun. siccule exoriuntur, septentrionales uenti, nō nunquam auster cum pluuiæ. XI. & X. Calen. Iunias arcturus mane occidit, tempestatem significat. VIII. & VII. et VI. Cal. Iunias capra mane exoritur, septentrionales uenti. Ab Idibus usq; in Calendas Iunias ueteranam uineam prius q̄ florere incipiat, iterum fodere oportet, eādēq; & ceteras omnes uineas itidem pampinare. Quod si sepius feceris, puerilis una opera ingerum uineti pampinabit, quibusdam regionibus oues nunc tōdentur, & pecoris nati, aut amissi ratio acapitur. Item qui lupinū stercoreādi agri causa ferit, nunc demum aratro subuertit. Cal. Iun. & III. Non. Aquila exoritur, tempestas uentosa, et interdum

pluuia. VII. idus Iunij, arcturus occidit, fauonius, aut corus. IIII. Id. Iun. delphinus uespere exoritur, fauonius, interdū rorat. His diebus si non opere uicti sumus, eadē, quæ extremo mense Maio, facienda sunt, item oēs arbores fructiferae circumfossæ aggerari debent, ut ante solstitium id opus peractum sit, quinetiam pro conditione regionis, & cœli, terra uel profanditur, uel iteratur. Eaq; si est difficilis, profanditur operis tribus, iteratur duabus, tertiatur una. Lirantur aut ingera duo opera una, at si facilis est terra, profanditur ingerū duabus operis, iteratur una. Lirantur una, ingera quatuor, cū in subacta iam terra latiores porcae sulcantur. Quæ rō colligit, ut per autumnū facile possint unoingo, tritiā obseri modij centumquingenta, cæterorūq; leguminum modij centum. Iisdem diebus area triturae preparanda est, ut quæq; res defecta erit, in eam conferat. Vinearū quoq; cultus, quibus maior est modus, iteratus esse debet. Ante solstitiū pabulum (si facultas est) uel nunc, uel etiā superioribus XV. diebus, qui fuerint ante Cal. Iunij, pecori præberi oportet. A Cal. autē Iunijs, si iam deficiat uiridis herba, usq; in ultimū autumnū frondem cæsam præbeamus. Idi. Iunijs calor incipit. XIII. Calē. Iul. sol introitum in cancro facit, tempestatem significat. XI. Cal. Iulij, anguifer, qui à græcis dicitur ὀφιοῦχος mane occidit, tempestatem significat VIII. & VII. & VI. Cal. Iulij solstitium, fauonius, & calor. III. Calen. Iul. uentosa tempestas. His diebus eadem, quæ supra. Sed et uiciā in pabulum secare oportet, prius q̄ siliquæ eius durētur, ordeum metere, fabam serotinam ducere, fabam maturam conterere, & paleam eius diligenter recondere, ordeum terere, paleasq; omnes recondere, aluos castrare, quas sub inde nono quoq; aut decimo die ab ægnoctio uerno usq; ad Cal. Maias consyderare, et curare oportebat. Nunc aut si sunt pleni, atq; operculati faui demetendi sunt. Sin aut maiore pte uacant, aut sine operculis adaperiti sint, nondū esse maturos significatur, itaq; mellatio est differenda. Quidam in prouincijs transmarinis uel hoc uel sequēte mēse sesama serūt. Cal. Iulij fauonius, uel anguifer, & calor. Quarto Non. Iul. corona occidit mane. p̄die Non. Iul. cancer medius occidit, calor. Octauo idus Iul. capricornus medius occidit. Septimo idus Iul. Cepheus uespere exoritur tēpestatem significat. Sexto idus Iul. p̄dromi flare incipiūt. His diebus eadē, quæ supra. Sed & profassum uernaetum optime nunc

COLVMELLAE.

iteratur, & sylvestris ager decrescente luna utilissime extirpat. Idibus Iulijs Procyon exoritur mane, tempestatē significat. Ter tiodecimo Calen. Augustas sol in Leonem transitum facit, fauonius. Nono Calen. Augustas leonis in pectore clara stella exoritur interdum tempestatem significat. Octavo Calen. Augustas aquarius incipit occidere clare, fauonius, uel auster. Septimo Calen. Augustas canicula apparet, caligo aestuosa. Sexto Cal. Augustas aquila exoritur. IIII. Cal. Augustas leonis in pectore clare stellae exoriuntur, interdum tempestatem significat. III. Cal. Augustas aquila occidit, significat tempestatem. His diebus locis temperatis, & maritimis messis conficiat, & intra dies triginta qua defecta est, stramenta praefixa in aerium congerunt. Iugerum stramentorum opera una defecat, quibus remotis prius quam sol acrior exurat terram, omnes arbores, quae fuerant in segete, circum fodere, & adobruere oportet. Item quibus magna sementis praeparatur, nunc debent iterare. Nam de fodiendis, colendis, uel nouellis uineis, saepius iam dixi nullum esse mensem omittendum, donec autumnale aequinoctium conficiat. Meminisse autem oportebit, ut per hos, & Augusti mensis dies antelucanis, & uespertinis temporibus frondem pecudibus cedamus. Item quascunque uineas culturi sumus, ne per aestum, sed mane usque in tertiam, & a decima usque in crepusculum fodiamus. Quibusdam regionibus sicut in Cilicia, & Paphlagonia hoc mense sesama feruntur. Italiae autem regionibus humidis possunt ultimo mense Iunio feri. Quinetiam tempus est ficulneis arboribus caprificum suspendere. Quod quidam existimant ideo fieri debere, ne fructus decidat, & ut celerius ad maturitatem perueniat. Cal. Augusti Ethesiae. Pridie Nonas Augusti leo medius exoritur, tempestatem significat. VII. Idus Augusti. Aquarius occidit medius, nebulosus aestus. Pridie Idus Augusti fides occidit mane, & autumnus incipit. His diebus eadem, quae supra. Nonnullis tamen locis faui demetuntur, qui si non sunt melle repleti, nec operculati, differenda est in mensem Octobrem mellatio. Idibus Augusti delphini occasus tempestatem significat. XIX. Cal. Septembris eiusdem syderis matutinus occasus tempestatem significat. XIII. Cal. Septembris sol in uirginem transitum facit. Hoc & sequenti die tempestatem significat, interdum & tonat. Hoc eodem die fides occidit. X. Cal. septembris ex eodem sydere tempestas plerumque oritur, & pluuia. VII. Cal. Septem-

bris vindemiator exoritur mane, & arcturus incipit occidere, interdum pluuia. III. Cal. Septembris humeri uirginis exoritur Ethesiae desinunt flare, & interdum hyemat. Pridie Cal. Septembris Andromeda uesperis exoritur, interdum hyemat. His quidem diebus arbores ficorum inoculantur, quod genus insitionis emplatratio uocatur. Idque licet uel commodius facere superiore mense post Idus Iulias, quo tpe etiam aliarum arborum nonnulli emplatrationem faciunt. Quibusdam locis, ut in Bætica maritimis regionibus, & in Africa uindemia conficitur. Sed frigidioribus regionibus puluerationem faciunt, quam uocant rustia occationem, cum omnis gleba in uineis refringitur, & resoluatur in puluerem. Hoc eodem tpe, prius quam uineae puluerentur, si perexilis est, uel rara ipsa uitis, lupini modum tres, uel quatuor in singula ingera sparguntur, & inocantur, qui, cum fruticauerint, prima tum fossione conuersi satis bonum stercus uineis praebent. Multi etiam, si pluuius est status caeli, sicut suburbana regione Italiae pampinis uitam spoliant, ut percoqui fructus possint, nec putrescere imbribus. At est contrario locis calidioribus, ut modo nominatis provinciis, circa uindemiam adumbrantur, uel stramentis, uel alijs tegumentis uinae, ne uentis, aut caloribus exarescant. Hoc idem tempus est aridis uinis, fisisque conficiendis, de quibus quemadmodum passae fiant, suo loco dicemus, cum uillicae persequemur officia. Filix quoque, aut carex ubicumque nascitur, Augusto mense recte extirpatur, melius tamen circa Idus Iulias ante caniculam exortum. Calen. Septembris calor. quarto Non. Septembris piscis austrinus desinit occidere, calor. Non. Septembris arcturus exoritur, fauonius, uel corus. VII. Idus Septembris piscis aquilonius desinit occidere, & capra exoritur, tempestatem significat. Tertio Idus Septembris fauonius, aut africanus, uirgo media exoritur. His diebus locis maritimis, & calidis uindemia, & cetera, quae suprascripta sunt, commode administrantur. Iteratio quoque arationis pacta esse debet, si serius terra persassa est. Sin autem celerius, et tertiatum solum esse conuenit. Hoc etiam tpe qui consueuerunt uina condire, aquam marinam praeparant, & aduectam decoquunt, de qua conficienda, cum uillicae officia exequar, praecipiam. Idibus Septembris ex pristino sydere nonnunquam tempestatem significat. XV. Cal. Octobris arcturus exoritur, fauonius, aut africanus, interdum eurus, quem quidam uulturnum appellat. XIII. Cal. Octobris spica uirginis exoritur, fauonius, aut

COLVMELLAE.

corus. XIII. Cal. Octobris sol in Libram transitum facit, crater matutino tpe apparet. XI. Cal. Octobris pisces occidunt mane, item aries occidere incipit, fauonius, aut corus, interdum auster cum imbris. X. Cal. Octobris argo navis occidit, tempestas significat, interdum et pluuiam. IX. Calen. Octobris centaurus incipit mane oriri, tempestatem significat, interdum et pluuiam. VIII. Calendas Octobris, et VII. et VI. æquinoctium autumnale, pluuiam significat. V. Cal. Octobris hœdi exoriuntur, fauonius, nonnunquam auster cum pluuiâ. IIII. Cal. Octobris uirgo desinit oriri, tempestatem significat. His diebus uindemiæ pluribus regionibus fiunt, quarum maturitatem alij aliter interpretati sunt. Quidam cum uidissent partem aliquam uuarum uire scere, crediderunt tempestiuam esse uindemiam. Quidam cum coloratas, et perlucidas uuas animaduertissent, nonnulli etiam cum pampinos, ac folia decidere consyderassent, quæ omnia fallacia sunt, quoniam immaturis uuis omnia eadem possunt accidere, propter intemperiem solis, aut anni. Itaque nonnulli gustu explorare maturitatem tentauerunt, ut siue dulcis esset sapor uuæ, siue acidus, proinde æstimarent. Sed et hæc ipsa res habet aliquam fallaciam. Nam quedam genera uuarum nunquam dulcedinem capiunt propter austeritatem nimiam. Itaque opportunum est (quod nos facimus) ipsam naturalem contemplari maturitatem. Naturalis autem maturitas est, si cum expresseris uinacea, quæ acinis cellantur, iam infuscata, et nonnulla propemodum nigra fuerint. Nam colorem nulla res uinaceis potest asferre, nisi naturæ maturitas, presertim cum ita in media parte acinorum sint, ut et à sole æstuant, et à uentis protegantur, humorque ipse non patitur ea percoqui, aut infuscari, nisi suapte natura. Hoc igitur cum exploratum habuerit uillicus, sciat uindemiam sibi esse faciendam. Sed ante quam fructum cogere incipiat, cuncta præparanda erunt superiore (si fieri posset) mense. Si minus, certe ut ante quindecim dies dolia partim picata, partim defricata, et diligenter lota marina, uel aqua salsa, et recte siccata. Tum et opercula, collaque, et cætera, sine quibus probe confici mustum non possunt. Torcularia uero, et fora diligenter emundata, lotaque. Et, si res ita exegerit, picata, præparataque habeat ligna, quibus defrutum, et saporem decoquat. Tum etiam salem, atque odoramenta, quibus condire uina consueuerint, multo ante reposita esse oportet. Nec tamen hæc cura

totum auocet eum à cetera ruris cultura, nam & napinae, iteq; rapinae sicaneis locis per hos dies fiunt. Farraginaria quoq; pecori futura per hyemem praesidio, itemq; siliqua, quod rustici foenum graecum uocant nec minus in pabulum uicia nunc demum conferuntur. Tum etiam lupini haec erit praecipua satio, quae quidam uel ab area protinus in agrum deferri putant oportere. Milium, & panicum hoc tpe demetitur, quo faseolus ad escam feritur, nam ad percipiendum semen ultima parte Octobris circa Calen. Nouemb. melius obruitur. Quare cum haec cuncta in agris exequi debeant, possit eorum curam, quae intra uillam facienda sunt, uillicae delegare. Ita tamen, ut ipse consideret an recte facta sint. Cal. Octobribus, & VI. Non. interdum tempestatem significat. Quarto Non. Octobris auriga occidit mane, uirgo desinit occidere, significat nonnunquam tempestatem. III. Non. Octobris corona incipit exoriri, significat tempestatem. Pridie Non. Octobris haedi oriuntur uespere, aries medius occidit. aglo. VIII. Idus Octobris coronae clara stella exoritur. VI. Idus Octobris uergiliae exoriuntur uespere, fauonius, & interdum africanus cum pluuia. Tercio, et pridie Idus Octobris corona tota mane ex oritur, auster hybernus, & nonnunquam pluuia. Per hos dies frigidis regionibus uindemia, & cetera, quae supra scripta sunt, fieri solent. Iisdemq; regionibus frumenta matura seruntur, & praecipue far adorem. Locis etiam opacis triticum nunc recte seritur. Et quoniam sementis mentionem fecimus, non intempestiue quantum cuiusq; seminis ingerum agri recipiat referemus. Iugerum agri recipit tritici modios quatuor uel quinque, farris adorei modios nouem uel decem, ordei modios quinque uel sex, milij uel panicum sextarios quatuor uel quinque, lupini modios octo uel decem, faseoli modios quatuor, pisi modios tres uel quatuor fabae modios sex, lentis modium unum, uel paulo amplius, lini seminis modios nouem uel decem, cicerculae modios tres uel quatuor ciceris modios duos uel tres, sesami sextarios quatuor uel quinque, uiciae pabularis modios septem uel octo, uiciae seminalis modios quinque uel sex, erui modios quatuor uel quinque farraginis ordeaceae modios septem uel octo, siliquae modios sex, medicae singulos cyathos serere oportet in areolis longis pedum denum, latis pedum quinum. Canabis, grana sex in pede quadrato ponunt. Idibus Octobris, & sequenti biduo interdum tempestas, nonnunquam rorat. XIII. Calend.

COLVMELLAE.

Nouembris sol in Scorpionem transitum facit. Tertiodecimo, & duodecimo Calen. Nouemb. solis exortu uergiliæ incipiunt occidere, tempestatem significat. Vndecimo Calen. Nouemb. Tauri cauda occidit, auster, interdum pluuia. Octauo Calen. Nouembris cetaurus exoriri mane desinit, tempestatem significat. Septimo Calend. Nouemb. nepæ frons exoritur, tempestatem significat. Quinto Calen. Nouembris uergiliæ occidunt, hyemat cum frigore, & geliadijs. Quarto Calen. Nouemb. arcturus uespere occidit, uentosus dies. Tertio Calend. & pridie Nouembris, Casiope incipit occidere, tempestatē significat. Per hos dies quæcūq; semina differri debent, arbusculæq; omnis generis recte ponuntur. Vlmī quoq; uitibus recte maritantur, ipseq; uites in arbutis, & uineis commode propagantur. Seminaria runcare, & fodere tepus est. Tum etiam arbores ablaqueare, nec minus uineas, easdemq; putare. Itemq; in arbutis uitem deputare, seminaria, q̄ suo tempore pampinata non sunt, arbusculæq; ficorum in seminarijs putari, & ad singulos stylos redigi debent, quæ tamē melius, dum tenera sunt, per germinatiōem pampinantur. Sed cū omnia in agricultura strenue facienda sint, tum maxime sementis. Vetus est agricolarum prouerbiū. Maturam sationem sepe decipere solere, seram nunquam, quin mala sit. Itaq; in totū præcipimus, ut quisq; natura locus frigidus erit, is primus conseratur, ut quisq; calidus, nouissimus. Vicia, & faba stercore agrū dicuntur. Lupinum nisi in florem uerteris, nihil agrum stercora ueris. Sed nec ulla res magis uacui operis aut seritur, aut conditur. Nam & primis temporibus ante aliam sementim potest id obrui, & nouissimis post coactos fructus tolli. Sementi facta in occare oportet, quod sparseris. Duo ingera tres operæ commode occubunt, arboresq; quæ intererūt, ablaqueabunt, quamuis antiqui singulis operis singula ingera sarriri, et occari uelint, quod an recte fieri possit, affirmare non ausim. Eodem tempore fossas, rinosq; purgare, & elices, sulcosq; aquarios conuenit facere. Iisdem temporibus si sit, fraxineam, si minus, orneā, si nec hæc sit, iligneam frondem bubus recte præbebimus. Glandis quoq; non inutile est singulis ingis modios singulos dare, nec tamen amplius, ne laborent, nec minus diebus. XXX. præbueris, nam si paucioribus diebus detur (ut ait Higinius) per uer scabiosi boves fiunt. Glans autem paleis immiscenda est, atq; ita bubus appo-

nenda. Tum etiam syluam si quis barbaricam, idest consenuineā uelit facere, recte conseret glandibus, & cæteris seminibus. Tum & olea distringenda est, ex qua uelis uiride oleum efficere, quod sit optimum ex uaria oliua, cum incipit nigrescere, nā acerbum nisi ex alba olea fieri non debet. Calen. Nouembribus, & postridie caput tauri occidit, pluuiam significat. III. Non. Nouembris fidicula mane exoritur, hyemat, & pluit. VIII. Idus Nouembris idem sydus totum exoritur, auster, uel fauōius, hyemat. VII. Idus Nouēbris stella clara Scorpionis exoritur, significat tempestatem, hyemat, uel uulturnus, interdum rorat. Sexto Idus Nouembris Vergiliæ mane occidunt, significat tempestatē, hyemat. Quinto Idus Nouembris hyemis initiū, auster, aut eurus, interdum rorat. His diebus usq; in idus, quæ superiore mense facere nō potueris, adhuc tolerabiliter efficies. Sed & proprie hoc obseruabis, ut pridie, q̄ plenilunium sit, si minus certe ipso plenilunio omnem, quam saturus es, fabā uno die spargas, sed postea licebit ab auibus, & pecore defensam obruas. Eamq; si ita cōpetierit lunæ cursus, ante idus Nouēbris occatam habeas quā pinquissimo, & nouo loco, si minus quamstercoratisissimo. Satis erit in singula iugera uehes stercoris comportare numero decem & octo. Vehes aut stercoris habet modios octoginta. Ex quo colligitur oportere in denos quoquoersus pedes, modios quinos stercoris spargere. Quæ ratio docet uniuerso iugero satisfacere modios. M. CCCCXL. Tum etiam conuenit oleas ablaqueare. Et si sunt parū fructuosæ, uel cacuminibus retorridæ frondis, magnis arboribus quaternos modios stercoris caprini circumspargere, in cæteris autem pro magnitudine portionem seruare. Eodem tempore uineis ablaqueatis columbinum stercus ad singulas uites, quod sit instar unius sextarij, uel urinæ hominis cōgios, uel alterius generis quaternos sextarios stercoris infundere. Iugerum uinearum in senos pedes positarum duæ operæ ablaqueāt. Idibus Nouembris dies incertus, sepius tamen placidus. Sextodecimo Calend. Decembris fidis exoritur mane, auster, interdum aquilo magnus. Quintodecimo Calendas Decembris aquilo, interdum auster cum pluuiā. Quartodecimo Calendas Decembris sol in Sagittarium transitū facit, saculæ mane oriuntur, tempestatē significat. Duodecimo Calendas Decembris tauri cornua uesper occidunt, aquilo frigidus, et pluuiā. Undecimo Calē. Decembris

COLVMELLAE.

fulcula mane occidit, hyemat. Decimo Calēdas Decēbris *lepus* occidit mane, tempestatem significat. Septimo Calend. Decēbris *canicula* occidit solis ortu, hyemat. Pridie Calen. Decēbris tota *fulcula* occidit, fauonius, aut auster, interdum pluuia. His diebus, quae praeterita erunt superioribus opera consequi oportet. Et si non plurimum serimus, optimum est intra Calen. Decēbris sementem conficere. Sed etiam longis noctibus ad diuturnū tempus aliquid adiiciendum est. Nam multa sunt, quae in lucubratione recte aguntur. Sine enim vineas possidemus, pali, & ridice possunt dolari, ex acuiq; siue regio ferula, uel corticis ferax ē, apibus aluearia fieri debent, siue palmae spartinae fecunda est, fisci nae, sportaeq; seu uirgultorum corbes ex uimine. Ac ne cetera nunc persequar, nulla regio non aliquid affert, quod ad lucubrationem confici possit. Nam inertis est agricolae expectare diei breuitatem, praecipue in ijs regionibus, in quibus brumales dies horarum nouem sunt, noctesq; horarum quindecim. Possit etiam salix decisa pridie ad lucubrationem expurgari, & ad uitium ligamina preparari. Quae si natura minus lenta est, ante dies quindecim praecidenda, & purgata in stercore obruenda est, ut lentescat. Sin autem iam pridem cesa exaruit, in piscina maceranda est. Tum etiam per lucubrationem ferramenta acuire, & ad ea facere, uel facta manubria aptare, quorum optima sunt ilignea, deinde carpineae, post haec fraxineae. Calendis decēbris dies incertus, sapis tamē placidus. Octauo Idus Decēbris Sagittarius medius occidit, tempestatem significat. Septimo Idus Decēbris aquila mane oritur, africanus, interdum auster, irrorat. Tertio Idus Decēbris corus, uel septentrio, interdum auster cum pluuia. His diebus quae praeterita erunt superiore mense opera peragi debebunt, utiq; in locis temperatis, aut calidis, nam frigidis recte fieri iam non possunt. Idibus Decēbris Scorpio totus mane exoritur, hyemat. Sexto decimo Calen. Ianuarij sol in Capricornum transitū facit, brumale solstitium, ut Hipparcho placet, itaq; tempestatē saepe significat. XV. Cal. Ianuarij uentorum commutationem significat. X. Calend. Ianuarij capra occidit mane, tempestatem significat. Nono Calen. Ianuarij brumale solstitium (sicut Chaldaei obseruant) significat. Sexto Calen. Ianuarij delphinus incipit oriri mane, tempestatem significat. Quarto Calend. Ianuarij aquila uespere occidit, hyemat. Tertio Cal. Ianuarij canicula occidit

occidit uestpere, tempestatem significat. Pridie Calend. Ianuarij tempestas uentosa. His diebus qui religiosius rem rusticā colunt, nisi si uinearum cā pastines, negant debere terram ferro cōmoueri. Itaq; quicquid citra id genus effici potest, id ab his comprehēditur, ut olea legatur, & oleum conficiatur, ut uitis paletur, & capite tenuis alligetur, ut iuga uineis imponantur, & capistrentur. Ceterum palmare, idest materias alligare hoc tpe non expedit, quia plurimæ propter rigorem, qui sit ex frigore, frangunt. Possunt et his diebus cerasi, & tuberes, et armeniæ, atq; amygdale, ceteræq; arbores, quæ primæ florent, inferi commode. Nonnulli et legumina serunt. Calend. Ianuarij dies incertus. Tertio Nonas Ianuarij Cancer occidit, tempestas uaria. Pridie Nonas Ianuarij media hyems, auster multus, interdum pluvia. Nonis Ianuarijs fidis exoritur mane, tempestas uaria. Sexto Idus Ianuarij auster, interdum fauōius. Quinto Idus Ianuarij auster, interdum imber. Pridie Idus Ianuarij incertus status cœli. Per hos quoq; dies abstinent terrenis operibus religiosiores agricolæ, ita tñ ut ipsis Calendis Ianuarijs auspicandi causa omne genus operis instaurent. Ceterum differant terrenam molitionem usq; in proximas Idus. Sed nec ignorare debet uillicus, quid uni iugo bouum quoquo mense per singulos dies præstari satis sit. Quare huius quoq; curæ rōnem subiiciemus. Mense Ianuario paleas cum erui macerati sextarius sex, uel paleas cum acerculæ fresæ semodio, uel frondis corbem pabulatorium modiorū viginti, uel paleas quantum uelint, & fœni pondo viginti, uel affatim uiridē frondem ex ilicæ, uel lauro, uel quod his omnibus præstat, farraginem ordeacæ dabit siccam, Februario mense idē, Martio idē. Vel si opus facturi sunt, fœni pondo quinquaginta. Aprili frondem querneam, & populneā. Ex Calen. ad Idus, uel paleas, uel fœni pondo quadraginta. Maio pabulum affatim, Iunio ex Calendis frondem affatim, Iulio idem, Augusto idē, uel pabuli ex eruo pōdo quinquaginta, Septēbri frondē affatim, Octobri frondem, & ficulnea folia. Nouēbri ad Idus frōdē, uel folia ficulnea quæ sint corbis unius. Ex Idibus glandis modium unū paleis immistum, & lupini macerati modium unū paleis immistum, uel maturā farraginem. Decēbri frondem aridam, uel paleas cum erui semodio macerato, uel lupini, qđ ex semodio macerato exierit, uel glandis modium unū, ut supra scriptū est, uel farraginem.

Colu.

C

Prosa de cultu hortorum, & herbis hortensibus.

Cap. III.

ET QVONIAM percensuimus opera, quæ suis quibusq; temporibus anni uillicum exequi oporteret, memores pollicati nostri subiungemus cultus hortorū, quorū æque curam suscipere debet, ut & quotidiani uictus sui lenet sumptum, & aduenienti domino præbeat, quod ait poeta, inemptas ruris dapes. Democritus in eo libro, quem georgicon appellauit, parum prudenter censet eos facere, qui hortis extruant monimenta, quod neq; late re fabricata materies perennare possit, pluuijs ac tempestatibus plerunq; infestata, neq; lapides supra rei dignitatem poscat impensa, si uero amplū modū sepire quis uelit, patrimonio eē opus. Ipse igitur ostendā rationem, qua non magna opera hortum ab incurſu hominum, pecudumq; munimus. Vetusissimi auctores uinam sepē structuli prætulerunt, quia non solum minorē impensam desyderaret, uerum et diuturnior inmensis temporibus permaneret, itaq; uepres efficiendi cōsitis spinis rōnem talem reddiderunt. Locus, quē sepire destinaueris, ab æquinoctio autūnali simul atq; terra maduerit imbribus, arcū allādus est duobus sulcis tripedaneo spatio inter se distantibus. Modum altitudinis, & latitudinis eorū abunde est esse bipedaneum, sed eos uacuos per hyemare patiemur preparatis seminibus, quibus obserantur, ea sint uastissimarum spinarum, maximeq; rubi, & paliuri, et eius, quam græci uocāt κυνόσβατον, nos sentem canis appellamus. Horum aut ruborum semina quā maturissima eligi oportet, & erui moliti farine immiscere, quæ cū est aqua conspersa, illinitur uel nauticis ueteribus funibus, uel quibuslibet alijs restibus, siccati deinde funiculi reponuntur in tabulato, mox ubi bruma confecta est, intermissis quadraginta diebus circa hirūdinis aduentū, cum iam fauonius exoritur, post idus Februarij, siqua in sulcis per hyemem cōstitit aqua exhauritur, resolutaq; humus, quæ erat autumno regeſta, usq; ad mediam sulcorū altitudinem reponitur. Prædicti deinde funes de tabulato prompti explicantur, & in longitudinem per utrunq; sulcū porrecti obruunt, sed ita ut non nimium supergeſta terra semina spinarum, quæ inhaerent toris funiculorū enasci possint, ea ferē circa trigefimum diem præpūt, atq; ubi cœperunt aliquod incrementum habere, sic insuescā debent, ut in id spatium, quod sulcis interiacet, inclinentur. Opor

tebit autem uirgeam sepem interponere, quam superscendat sentes utriusque sulci, et sit, quo interdum quasi adminiculo, prius quam corroborentur, acquiescant. Hunc neprem manifestum est interiri non posse, nisi radicitus effodere uelis. Ceterum et post ignis iniuriam melius renasa nulli dubium est, et haec quidem claudendi horti ratio maxime est antiquis probata. Locum autem prius eligi conueniet, si permittit agri situs, iuxta uillam praecipue pinguem, quique adueniente riuo, uel si non sit fluens aqua, fonte puteali possit irrigari. Sed ut certam perennitatis puteus habeat fidem, tum demum effodiendus est, cum sol ultimas partes uirginis obtinebit, idest mense Septembri ante equinoctium autumnale, si quidem tunc maxime explorant uires fontium, cum ex longa siccitate aestatis terra caret humore pluuiali. Prouidendum est autem, ne hortus areae subiaceat, ne per tritura uenti possint paleas, aut puluerem in eum perferre, nam utraque sunt oleribus inimica. Mox ordinandi pastinandiisque soli, duo sunt tempora, quam duae quoque olerum sationes, nam et autumno, et uere plurima ferunt, melius tamen uere riguis locis, quam et nascentis anni clementia exaripit prodeuntia semina, et sitis aestatis restringitur fontibus. At ubi loci natura neque manu illata, neque sine spontis aqua ministrari patitur, nullum quidem aliud auxilium est, quam hyemales pluuiae. Potest tamen etiam in siccissimis locis opus custodiri, si depressius pastinetur solum, eiusque abunde est gradum effodere tribus pedibus, ut in quatuor consurgat regestum. At ubi copia est rigandi, satis erit non alto bipalio, idest minus quam duos pedes ferramento nouale conuerti. Sed curabimus, ut ager quem uere conseri oportet, autumno circa Calendas Nouembris pastinetur. Quem deinde uelimus autumno instituere, mense Maio conuertemus, ut aut hyemis frigoribus, aut aestiuis solibus et gleba soluatur, et radices herbarum necent, nec multo ante stercorare debebimus, et cum sationis appropinquabit tempus, ante quintum diem exherbadus erit locus, stercorandusque, et ita diligenter fossione iterandus, ut fimo terra commisceatur. Optimus uero stercois est ad hunc usum asini, quia minimus herbarum creat, proximum uel armati, uel ouium si sit anno maceratum, nam quod homines faciunt, quauis habeatur excellentissimum, non tamen necesse est adhibere, nisi aut nude glacie aut sine ullo robore solutissimae arenae, cum maior. scilicet uis alimentum desideratur. Igitur solum, quod conserere uere destinauerimus,

COLVMELLAE.

post autumnum patiemur effossum iacere brumæ frigoribus, & pruinis inurendū. Quippe è contrario sicut calor æstatis, ita uis frigoris excoquit terram fermetatamq; soluit, quare peracta brumæ tum demum sterus inijciatur, et circa Idus Ianuarias humus refossa in areas diuidetur, quæ tamen sic informandæ sunt, ut facile runcantium manus ad dimidiam partem latitudinis earum perueniant, ne qui persequuntur herbas, semina proculcare cogant, sed potius per semitas ingrediant, & alterna uicè dimidias areas eruncant. Hæc quæ ante sationem faciendæ sunt dixisse abunde est. Nunc quid quoq; tempore uel colendum, uel serendum sit, præcipiamus, & primum de his generibus loquendum est, quæ pñt duobus feri temporibus, idest autumno, & uere. Sunt autem semina brassicæ, & lactucæ, cinaræ, erucæ, nasturcū, coriandri, chærephyli, anethi, pastinacæ, siferis, papaueris. Hæc enim uel circa Calendas Septembris, uel melius ante Calēdas Martias Februario seruntur. Locis uero siccis, aut tepidis qualis sunt Calabriæ, et Appuliæ maritima, possunt circa Idus Ianuarias terræ committi. Rursus quæ tantum autumno conseri debent (si tamen uel maritimum, uel apricum agrum incolimus) hæc ferè sunt, allium, cæpæ capitula, ulpicum, sinapis. Sed etiam nunc quo quidq; tempore terræ mandari plerunq; conueniat, per menses digeramus. Ergo post Calendas Ianuarias confestim recte ponetur lepidiū. Mense autem Februario uel planta uel semineruta, atq; asparagus, & iterum cæpe semen, & porri, nec minus si uernū, & æstiuum fructum uoles habere, syriacæ radices, & rapæ, napiq; semina obrues, nam allij, & ulpicij ultima est huius temporis positio. At circa Calendas Martij locis apriis licet porrum (si iam ingranduit) transferre. Item panacem ultima parte Martij mēsis. Deinde circa Calendas Apriles æque porrum, atq; inulam, & ferotinam plantam rute. Item ut maturius nascatur cucumis, cucurbita, caparis ferenda est, nam semen betæ, cum punicum malum florebit, tum demum optime seritur. Porri autem caput circa Idus Maias tolerabiliter adhuc transfertur. Post hoc nihil ingruente æstate obrui debet, nisi semē apij, si tamen rigaturus es, sic enim optime per æstatem puenit. Cæterū Augusto circa uulcanalia tertia satio est, eaq; optima radices, & rapæ, itemq; napi, & siferis, nec minus oleris atri, atq; hæc sunt sationum tempora. Nunc de ijs, quæ aliquam curam desyderant, singulis loquar,

quæq; præteriero intelligi oportebit nullâ operam postulare nisi runcatoris, de qua semel hoc dicendū est, omni tempore consulendum esse, ut herbae exterminentur. Ulpicum, quod quidā allium punicum uocant, græci aut̃ ἀφροσκόγον ov appellant, longe maioris est incrementi, q̃ allium. Idq; circa Calendas Octobris, ante q̃ deponatur ex uno capite in plura diuidetur. Habet. n. uelut allium plures coherentes spicas, eaq; cum sint diuisæ, liratim feri debent, ut in puluinis posita minus infestetur hyemis aquis. Est autem lira similis ei porcæ, quam in sationibus campestribus rustici faciunt, ut uliginem uitent, sed hæc in hortis minor est faciendâ, et per summâ partē eius, idest in dorso inter palmaria spatia spicae ulpici, uel alliij (nā id quoq; similiter cōseritur) disponendæ sunt. sulci lirarum inter se distent semipedali spatio. Deinde cū ternas fibras emiserunt spicae, sarriantur, nā quo sæpius id factum est, maius semina capiunt incrementum. Deinde ante q̃ caulem faciāt, omnem uiridem superficiem intorquere, et in terram prosternere conueniet, quo uastiora capita fiant. Regionibus autē pruinosis neutrum horum per autumnum feri debet, nam brumali tempore corrumpuntur, quod serè mense Ianuario mitescit, et iccirco frigidis locis tempus optimum est allium, uel ulpicum ponēdi circa Idus prædicti mensis. Sed quādocunq; uel cōseremus, uel iam maturatione in tabulatum reponemus, seruabimus in ijs locis, qbus aut obruentur, aut eruentur, ut luna infra terrā sit. Nam sic sata, et rursus sic recondita existimantur, neq; acerrimi saporis existere, neq; mandentium halitus inodorare. Multi tñ hæc ante Calēdas Ianuarias medijs diebus serunt mense Decembri, si cœli tepor, et situs terræ permittit. Brassica, cum VI. foliorum erit, transferri debet, ita ut radix eius liquido fimo prius illita, et inuoluta tribus alge taniolis pangatur. Hæc. n. res effiat, ut in coctura celerius madescat, et uiridem colorem sine nitro conseruet. Est autē frigidis, et pluuijs regionibus positio eius optima post Idus Aprilis, cuius depresso plantæ, cum tenuerint quantum olitoris ratio patitur, sæpius sarrita, et stercoreata melius cōualescit, pleniorisq; incrementi, et coliculum facit, et cymam. Nonnulli hanc eandē locis apritioribus à Calendis Martijs deponunt, sed maior pars eius in cymam profilit, nec postea hybernū caulem amplum facit, cum est semel desecta. Possis autem uel maximos caules bis transferre, idq; si facias, plus seminis, et maioris incrementi præ-

bere dicuntur. Lactuca totidem foliorum quot Brassica trāsferri debet. Locis quidem apriis & maritimis optime autūno ponit̃, mediterraneis et frigidis contra, hyeme non æque cōmode dispergitur, sed & huius quoq; radix simo liniri debet, maioremq; copiam desyderat aquæ, sicq; sit tenerioris folij. Sunt autem cōplura lactucæ genera, quæ suo quoq; tpe feri oportet, earum, quæ fusa, & ueluti purpurei, aut etiā uiridis coloris, & crissi folij, uti Cæciliana, mense Ianuario recte differitur. At Cappadocia, q̃ pallido, & pexo, densq; folio uiret, mense Februario, quæ deinde candida est, & crispissimi folij, ut in provincia Batia est finibus gaditani muniapij, mense Martio recte pangitur. Est & cyprij generis ex albo rubicunda, leui & tenerrimo folio, quæ in idibus Aprilis cōmode disponitur. Fere tñ aprico cæli statu, quibus locis aquarum copia est, penè toto anno lactuca feri potest, q̃ quotardius caulē faciat, cum aliquod incrementum habuerit, exiguam testam media parte accipiat, eo quasi onere coerita in latitudinem se diffundit, eadem est rō etiam intybi, nisi quod hyemem magis sustinet, ideoq; uel frigidis regionibus proximo autumnō feri potest. Cinaræ sobolem melius per autumnī æquinoctium disponemus, semen cōmodius circa Cal. Martij seremus, eiusq; plantam circa Cal. Nouemb. deprimemus, & multo cinere stercorabimus. Id enim genus stercoris huic oleri uidet̃ aptissimū. Sinape, atq; coriandrum, nec minus erucā, et ozimū ita uti sata sunt sua sede immota permanent, neq; est eorū cultus alius q̃ ut stercorata runcentur. Possunt aut̃ non solum autumnō, sed & uere cōferi. Plantæ quoq; sinapis prima hyeme translatae plus cymæ uere afferunt. Panax utroq; tpe leui, & subacta terra rarissime differt̃, quo maius incrementum capiat, melius tamen eius uernasatio est. Porrum si sectiuum facere uelis, densius satum præceperunt priores relinqui, & ita cum increuerit, secari. Sed nos docuit usus longe melius fieri, si differas, & eodem more, quo capitatum modis spatijs, idest inter quaternos digitos depangas, et cū conualuerit, desecēs. In eo autem, quod magni capitis efficere uoles, seruandum sit, ut ante q̃ translatum deponas, omnes radículas amputes, & fibrarum summas partes intondeas. Tum testula, uel conchæ, quasi sedes in singulis subiectæ seminibus adobriuntur, ut fiant capita latioris incrementi. Cultus autem porri capitati assidua sarritio, & stercoratio est, nec alius tñ sectiui nisi

quod toties rigari, et stercorari, sarririq; debet, quoties demetitur, semen eius locis calidis mense Ianuario, frigidis Februario serit. cuius incrementum quo maius fiat, raris linteolis complura grana illigant, atq; ita obruunt. Enatum autem in his locis, quibus aqua subministrari non potest deferri debet circa æquinoctium autumnum, at quibus possis humorem præbere, mense Maio recte transferit. Apium quoque possis plantis serere, nec minus semine. Sed præcipue aqua letat, et ideo secundum fontem commodissime ponit. Quod si quis id velit lati folij facere, quantum seminis possint tres digiti comprehendere, raro linteolo illiget, et ita in areolas dispositum releet. Vel si crispæ frondis id fieri maluerit, semen eius inditum pilæ, et saligneo palo pinsitum, expoliatumque, similiter in linteolis ligatum obruet. Potest etiam atra hanc operam fieri crispum qualitercunque satum, si cum est natum, incrementum eius supuoluto cylindro coercet. Satio eius est optima post idus Martias usque in solstitium, nam teporem desiderat. Ferè etiã his diebus optima serunt, quorum cum semen obrutum est, diligenter inculcat panicula uel cylindro, nam si terram suspensam relinquant, plerumque corrumpitur. Pastinaca, et siser, atque inula conualescunt alte pastinato, et stercorato loco, sed quamrarissime ponenda sunt, ut maiora capiant incrementa. Inulam uero interuallo trium pedum feri conuenit, quoniam uastos facit frutices, et radicibus, ut oculus arundinis serpit, nec est alius cultus horum omnium, nisi ut sarritionibus herbe tollantur. Commodissime autem deponentur prima parte Septembris, uel ultima Augusti parte. Atrium, quod grecorum quidam uocant ἡ τρωσὲ λίουον nonnulli σπύγετιον pastinato loco semine debet conferri maxime iusta materiam, quoniam et umbra gaudet, et qualicunque conualescit loco, idque cum semel seueris, si non totum radicatus tollas, sed alter nos frutices in semen summittas, æuo manet, paruaque sarritionis exigit culturam, seritur à uulcanalibus usque in Calend. Septembris, sed etiam mense Ianuario. Menta dulcem desiderat uigilantiam, quam ob causam iuxta fontem mense Martio recte ponit. Cuius si forte semina defecerunt, licet de noualibus syluestre metastrium colligere, atque ita in uersis cacuminibus disponere, quæ res feritatem detrahit, atque edonitatem reddit. Rutam autumno semine satam mense Martio differre oportet in apricum, et cinerem aggerare, rucarique, donec conualescat, ne herbis eneæt, sed uelata manu.

debebit runcari, quam nisi contexeris, perniciofa nascuntur ulcera. Si tamen per ignorantiam nuda manu runcaueris, & prurigo, atq; tumor inceserit, oleo subinde perunguito. Eiusdem fruticis pluribus annis permanet innoxius, nisi si mulier, quæ in menstruis est, contigerit eum, & ob hoc exaruerit. Thymum, & trās marina cumila, & serpyllum, sicut priore libro iam retuli, magis aluearia curantibus, q̄ olitoribus studiose conferuntur. Sed nos ea condimentorum causa (nam sunt quibusdā esculentis aptissima) non alienum putamus etiam in hortis habere locum neque pinguem, neq; stercoreatum, sed apricum desyderant, ut quæ macerrimo solo per se maritimis plerūq; regionibus nascuntur. Hæ res & semine, & plantis circa æquinoctium uernū seruntur, melius tamen est thymi nouellas plantas disponere, quæ cum subactō solo depressæ fuerint, ne tarde cōprehendant, aridi thymi fruticē contundi oportet, atq; ita pinsito pridie q̄ uolueris uti, aqua medicare, quæ, cum succum eius præperit, depositis fruticibus infundit, donec eos recte confirmet. Cæterum cumila uinacior est, q̄ ut impensius curanda sit. Lepidiū cum ante Cal. Martias habueris dispositum, uelut porrum sectiuum demetere poteris, rarius tñ, nā post Cal. Nouemb. secundum non erit, qm̄ frigoribus uiolatum emoritur, biennio tñ sufficiet, si diligenter sarritum, & stercoreatū fuerit. Multis ēt locis uinacitatem suam usq; in annos decem prorogat. Beta florente punico malo semine obruit, & simulatque quinque foliorum est, ut brassica differet æstate, si riguus est hortus, at si siccans autūno cum iam pluuiæ inceserint, disponi debebit, chærephylum, itemq; olus atriplicis, quod græci uocant ἀτρίπλεξ. Circa Cal. Octob. obrui oportet nō frigidissimo loco, nā si regio seuas hyemes habet, post idus Februarias semine differenda sunt, suaq; de sede partienda. Papauer, & anethum eandem habent conditionem sationis, quam chærephylum & ἀτρίπλεξ. Satini asparagi, quam corudam rustici uocant, semina, ferè biennio præparant. Ea cū pingui, & stercoreoso solo post idus Februarias sic obrueris, ut quantum tres digiti seminis cōprehendere queunt, singulis fossulis deponas. Ferè post quadragesimum diem inter se implicant, et quasi unitatē faciunt, quas radículas sic illigatas, atq; cōnexas olitores sphōgias appellant, easq; post quatuor & uiginti mēses in locum apricum, & bene madidum, stercoreatumq; transferri cōuenit. Sulci aut inter se pedali mēsurā

distantes fiunt non amplius dodratalis altitudinis, in quam ita
 sphongiolas deprimiuntur, ut facile superposita terra germinent,
 sed in locis siccis partibus sulcorum imis disponenda sunt semina, ut
 tanquam in alueolis maneant, at uliginosis est contrario in summo por
 ce dorso collocanda, ne humore nimio ledantur. Primo deinde
 anno, cum ita consita sunt, asparagum, quem emisserint, infringi
 oportet, nam si ab imo uellere uolueris, adhuc teneris inualidisque
 radiculis tota sphongiola sequetur. Reliquis annis non erit de
 cerpendus, sed radicitus uellendus, nam nisi ita fiat, stirpes praefra
 ctæ angunt oculos sphongiarum, et quasi excæcant, nec patiun
 tur asparagum emittere. Cæterum stylus, qui nouissime autum
 nali tempore nascitur, non omnis est tollendus, sed aliqua pars eius in
 semen summittenda est. Deinde cum spinam fecerit, collectis semi
 nibus ipsis, Scorpiones ita uti sunt, in suo loco perurendi sunt, et
 deinde sulci omnes cõsariendi, herbaeque eximendæ, mox uel stercurus,
 uel cinis iniiciendus, ut tota hyeme succus eius pluuijs manas ad
 radicem pueniat. Vere deinde prius quam cœperit germinare, ca
 preolis, quod genus bicornis ferramenti est, terra commoueat,
 ut et facilius stylus emicet, et relaxa humo plenioris crassitudi
 nis fiat radix. Raphani radix bis anno recte feritur, Februario
 mense, cum uernum fructum expectamus, et Augusto mense circa
 uulcania, cum maturius, sed hæc satio sine dubio melior habet. Cu
 ra est eius, ut terra stercoreata, et subacta obruat, post ubi cœpe
 rit aliquod incrementum subinde aggeret. Nam si super terram
 emerferit, dura, et fungosa fiet. Cucumis, et cucurbita, cum copia
 est aquæ, minorem curam desyderant, nam plurimum iuuantur
 humore. Sin autem sicco loco feri debuerint, quo rigationem mi
 nistrari non expediat mense Februario sesquipedali altitudine sul
 ci faciendi sunt. Post idus deinde Martias quasi tertia pars altitu
 dinis sulci stramentis inditis tegenda, mox stercoreata terra usque
 in dimidiū sulcū aggeranda, positisque seminibus tam diu est aqua
 præbenda, donec enascantur, atque ubi conualescere cœperint, adie
 ctæ humo incrementa eorum proseguenda sunt, donec sulcus cœque
 tur. Sic exculta semina sine rigatione tota æstate satis ualebunt,
 fructumque incūdioris saporis, quam rigua præbebunt. Aquosis autem
 locis prinio quoque tempore non tamen ante Cal. Mart. semē po
 nendum est, ut deferri possit æquinoctio confecto, idque de media
 parte cucurbitæ semen inuerso cacumineposito, ut fiat incre

COLVMELLAE.

mēti uastioris, nam sunt ad usum uasorum satis idoneae, sicut alexandrinae cucurbitae, cum exaruerint. At si esculentae meri praeparabis, recto cacumine de collo cucurbitae sumptum semen ferendū erit, quo prolixior & tenuior fructus eius enascatur, qui scilicet maius ceteris inuenit pretium. Sed custodiendum est, ut quāminime ad eum locum, in quo uel cucumis, aut cucurbitae consitae sunt, mulier admittatur, nam ferè contactu eius languescunt incrementa uirentium, si uero etiam in mensuris fuerit, visu quoque suo nouellos foetus necabit. Cucumis tener, & iucundissimus fit, si ante quā seras, semen eius lacte maceres. Nonnulli etiam quo dulcior existat, aqua mulsa idem faciunt, sed quā prae maturum fructū cucumeris habere uolet, confecta bruma stercorata terram inditam cophynis obserat, modicumque praebet humorem. Deinde cū enata semina fuerint, tepidis diebus, & insolatis iusta aedificiū sub diuo ponat, ita ut ab omnia afflatu protegantur. Ceterum frigoribus, ac tempestatibus sub tectum referat, idque tādū faciat, dum æquinoctium uernum conficiatur, postea totos cophynos demittat in terram. Sic enim percoquem fructum habebit. Possunt etiam, si sit operæ pretium, uasis maioribus rotulae subijci, quo minore labore producantur, & rursus intra tecta recipiantur. Sed nihilo minus specularibus integri debebunt, ut etiam frigoribus serenis diebus tuto producantur ad solem. Hac ratione ferè toto anno Tiberio Caesari cucumis praebabatur. Nos autem leuiore opera istud fieri apud aegyptiae gentis Dolum Mendesium legimus, qui praecipit aprico, et stercoroso loco alternis ordinibus ferulas, alternis rubos in hortis consitas habere. deinde eas confecto æquinoctio paulum infra terram secare, & ligneo stylo laxatis uel rubi, uel ferulae medullis stercus immittere, atque ita semina cucumeris inserere, quae scilicet incremento suo coeant rubis, & ferulis. Nam ita non sua, sed quasi materna radice aluntur, sicque insitam stirpem frigoribus quoque cucumeris praebere fructum. Satio secunda eius seminis ferè quinquatribus obseruatur. Capparis plurimis provinciis sua sponte non alibus nascitur, sed quibus locis eius inopia est, si ferenda fuerit, siccum locum desiderabit. Isque debet ante circumdari fossula, quae repleatur lapidibus, et calce, uel punico luto, ut sit quasi quaedam lorica, ne possint eam perire praedicti seminis frutices, qui ferè per totum agrum uagantur, nisi munimento aliquo prohibiti sint. Quod tamen non tan-

tum incommodum est (subinde enim possunt extirpari) quātum quod noxiū uirius habent, succoq; suo sterile solum reddūt. Cultu aut nullo, aut leuissimo contenta est. Quippe quæ res etiā in desertis agris citra rustici operam conualescat. Seritur utroq; æq; noctio. Cepina magis frequenter subactam postulat terram, q̄ alius conuersam. Itaq; ex Calen. Nouembris profundi solum debet, ut hyemis frigore, & geliadijs putrescat, intermissisque quadraginta diebus, tum demum iterari, et interpositis uno, ac uiginti diebus tertiari, ac protinus stercorari, mox bidentibus æqualiter perfossum in areas disponi deletis radiabus omnibus. Deinde ad Calendas Februarias sereno die conueniat semina spargi, quibus aliquod satureiæ semen intermiscendum erit, ut eam quoq; habeamus, nam & uiridis esui est iucunda, nec arida inutilis ad pulmentaria condienda. Sed æpina uel sæpius, certe non minus debet q̄ quater sarriri. Cuius si semen exape uoles, capita maxima generis ascaloni, quod est optimū, mense Februario disponito quaternorum uel et quinum digitorum spatij distantia, & cum cœpint uirere, ne minus ter consarrito, deinde cum fecerint caulē, humilioribus quasi canteriolis interpositis rigorem styliorum conseruato, nam nisi arundines transuersas in modum ingatæ uinæ crebras disposueris, thalli ceparum uentis prosternentur, totumq; semen excutietur, quod scilicet nō ante legendum est, q̄ cum maturescere cœperit, coloremq; nigrum habere. Sed nec patiendum est, ut perarescat, aut totum decidat, uerum integri thalli uellendi sunt, & sole siccandi. Napus et rapa duas sationes habent, & eandem culturā, quam raphanus. Melior est tamen satio mensis Augusti. Ingerum agri quatuor sextarios seminis eorum posat, sed ita ut radicis syriacæ super hanc mensuram paulo plus quā heminā seminis recipiat. Qui æstate ista seret, caueat, ne propter siccitates culex adhuc tenera folia prorepentia consumat. Id quoq; ut uitetur, puluis etiam, qui supra cameram inuenitur, uel et fuligo, quæ supra focos tectis inheret, colligi debet deinde pridie q̄ satio fiat, commisceri cum seminibus, & aqua conspergi, ut tota nocte succum trahant, nam sic macerata postero die recte seruntur. Veteres quidem auctores, ut Democritus, præcipiunt semina omnia succo herbe, quæ sedū appellatur, medicare, eodemq; remedio aduersus bestiolas uti, qd̄ uerum esse nos experientia docuit. Sed frequentius tñ, quoniam

COLVMELLAE.

eius herbae minus larga est facultas, fuligine, & praedicto pulvere utimur, satisq; commode tuemur his incolumitatem plantarum. Rapae semina Higinus putat post trituram iacentibus adhuc in area paleis inspergi debere, quoniam sunt uastiora capita, cum subiaccens soli duritia non patitur in altum descendere. Nos istud saepe frustra tentauimus, itaq; rapum, & raphanum, & napum melius existimamus subacta terra obrui. Seruatq; adhuc antiquorum consuetudinem religiosiores agricolae, qui cum ea serunt, precantur, ut & sibi, & uicinis nascantur. Locis frigidis, ubi timor est, ne autumnalis satio hyemis geliadijs perurat, arundinibus humiles canterij fiunt, usq; uirga transuersa imponuntur, & uirgis stramenta supra iaciuntur, & sic à pruinis semina defenduntur. Vbi uero aprijs regionibus post pluuias noxia inceserunt animalia, quae à nobis appellantur eruce, graece autem κέρως nominantur, uel manu colligi debent, uel maturinis temporibus frutices olerum cōcuti. Sic enim dum adhuc torpent nocturno frigore, si deciderint, non amplius in superiorem partem prorepunt. Id tamen supernacuum est facere, si ante sationem semina, uti iam praedixi, succo herbae sedi macerata sunt. Nihil enim sic medicatis nocent eruce. Sed Democritus in eo libro, qui graece inscribitur περὶ αἰτίας τῶν ἀνθρώπων affirmat has ipsas bestiolas enecari, si mulier, quae in menstruis est, solutis crinibus, & nudo pede unamquamq; aream ter arcumeat, post hoc enim decidere omnes uermiculos, & ita emori. Haecenus praecipendum existimauimus de cultu hortorum, & officijs uillia, quem quamuis instructum, atq; eruditum omni opere rustico esse oportere prima parte huius exordij censuerim, quoniam tamen plerunq; euenit, ut eorum, quae didicerimus, memoria nos deficiat, eaq; sepius ex commentarijs renouanda sint, omnium librorum meorum argumenta subiecti, ut, cū res exegisset, facile reperiri possit, qd in quoq; querendum, & qualiter quidq; faciendum sit.

231

LVCII IVNII MODERATI
COLVMELLAE DE RE
RVSTICA LIBER
DVODECIMVS.
ET VLTIMVS.

Villica.

x ENOPHON Atheniensis eo libro Publi
Siluine, qui *œconomicus* inscribitur, prodidit
maritale coniugium sic comparatum esse natu-
ra, ut non solum iucundissima, uerumetiam uti-
lissima uitæ societas iniretur, quod iam pridem
etiã Cicerò ait, & ne genus humanum tempo-
ris lōginitate occideret, propter hoc marem cum fœmina esse
coniunctum. Deinde ut ex hac eadem societate mortalibus adiu-
toria senectutis, nec minus propugnacula præpararentur, tum
etiã cum uictus, & cultus humanus non uti feris in propatulo, ac
syluestribus locis, sed domi sub tecto accurandus erat, necessariũ
fuit alterutrũ, foris & sub dio esse, qui labore, & industria cõpa-
ret, intus q̃ tectis reconderet, atq; custodiret, siquidẽ uel rusticari
uel nauigare, uel etiã alio genere negotiari necesse erat, ut ali-
quas facultates acq̃reremus. Cũ uero paratæ res sub tectũ essent
congestæ, aliũ esse oportuit, qui & illas custodiret, & cætera
conficeret opera, q̃ domi deberent administrari, nam & fruges,
& cætera alimenta terrestria indigebant tecto, & ouium, cæte-
rarumq; pecudum fœtus, atq; fructus clauso custodienda erant,
nec minus reliqua utensilia, quibus aut alitur hominũ genus,
aut etiam excolitur. Quare cum & operam & diligentiam, ea
quæ proposuimus, desyderarent, nec exigua cura foris acquirere-
tur, quæ domi custodiri oporteret, iure, ut dixi, à natura compa-
rata est opera mulieris ad domesticam diligentiam, uiri aut ad
exeritationẽ forensem & extraneã. Itaq; uiro calores, et frigora
perpetienda, tum et itinera, & labores pacis ac belli, idest rusti-
cationis, & militariũ stipendiũ distribuit. Mulieri deinceps, qđ
omnibus his rebus eã fecerat inhabilẽ, domestica negotia curan-
da tradidit. Et quoniam hunc sexum custodiæ, & diligẽtiæ assi-
gnauerat, icarco timidiorem reddidit, q̃ uirilem, nã metus plu-
rimũ confert ad diligentia custodiendi. Quod autẽ necesse erat.

foris, & in aperto uictum quærentibus nonnunquam iniuriam propulsare, iccirco uirum, q̄ mulierem fecit audaciorē. Quia uero partis opibus æque fuit opus memoria & diligentia, nō minorem fœminæ, q̄ uiro earum rerum tribuit possessionem. Tum ēt quod simplex natura non oēs res commodas amplecti uolebat, iccirco alterum alterius indigere uoluit, qm̄ quod alteri deest, præstō plerunq; est alteri. Hæc in æconomico Xenophon, & deinde Cicerō, qui eum latine consuetudini tradidit, non inutiliter disseruerunt, nā & apud græcos, & mox apud Romanos usque in patrum nostrorū memoriā ferē domesticus labor matronalis fuit tanquā ad requiem forensium exercitationum omni cura deposita patribus familias intra domesticos penates se recipientibus. Erat. n. summa reuerentia cum cōcordia & diligentia, mista, flagrabatq; mulier pulcherrima diligentiae æmulatione, studens negotia uiri cura sua maiora, atq; meliora reddere. Nihil conspiciēbatur in domo diuiduum. Nihil, quod aut maritus, aut fœmina proprium esse iuris sui diceret, sed in commune conspirabatur ab utroq; ut cum forēsis negotijs, matronalis sedulitas industrie rationem parem faceret. Itaq; nec uillicū quidem, aut uillicæ magna erat opera, cum ipsi domini quotidie negotia sua reuicerēt, atq; administrarent. Nunc uero cum plerēq; sic luxu, & inertia defluant, ut ne lanificū quidem curam suscipere dignentur, sed domi sedentes confectas uestes fastidio habeant, peruersaq; cupidine p̄tiosiores alias à uiris pelliceant, quæ grandi pecunia, et totis penē censibus redimunt, nihil mirum est easdem ruris, & instrumentorū agrestium cura grauari, sordidissimūq; negotium ducere paucorū dierum tempus in uilla morari. Quam ob cām cum in totum nō solum exoleuerit, sed ēt, occiderit uetus ille matrum familiarū mos Sabinarum atq; Romanarū, necessaria irrep̄sit uillicæ cura, quæ tuere officia matronæ, qm̄ & uillicū quoq; successerunt in locum dominorū, qui quondam prisca consuetudine non solum coluerant, sed habitauerant rura. Verū, ne uidear intempestiue censorium opus obiurgandis moribus nostrorū temporum suscepisse, iam nunc officia uillicæ prosequar.

Cura rei domesticæ, & p̄cepta, q̄ uillicæ exeq̄ debeat. Cap. I.

E A porro (ut institutum ordinē teneamus, quem priore uolūmine incolauimus) iuuenis esse debet. i. non nimīū puella p̄pter

eadem causas, quas de etate uillicæ retulimus, integræ quoque ualitudinis, nec fœdi habitus, nec rursus pulcherrimi, nam illibatū robur & uigilijs, & alijs sufficet laboribus, fœditas fastidiosum nimia species desidiosum faciet eius contubernalem. Itaque curandum est, ut nec uagum uillicam, nec auersum cōtubernio suo habeamus, nec rursus intra tecta desidem, & complexibus adiacentem fœminam. Sed nec hæc tantum, quæ diximus, in uillicæ custodienda sunt. Nam in primis considerandum erit, an à uino, ab escis, à superstitionibus, à somno, à uiris remotissima sit, & ut cura eā subeat, quid meminisse, quid in posterum prospicere debeat, ut ferè eum morem seruet, quem uillico præcepimus, quæ pleraque similia esse debent in uiro, atque fœmina, & tam èt malum uitare, quàm premium recte factorum sperare. Tum elaborare, ut quæ minimam operam uillicus intra tectum impendat, cui et primo mane cum familia prodeundum est, & crepusculo peractis operibus fatigato redeundum. Nec tamen instituendo uillicam, domesticarum rerum uillico remittimus curam, sed tantummodo laborem eius, adiutrice data, leuamus. Cæterum munia, quæ domi capeſcenda, non in totum muliebri officio relinquenda sunt, sed ita deleganda ei, ut idētidem oculis uillicæ custodiantur. Sic enim erit diligentior uillica, si meminerit ibi esse, cui ratio frequenter reddenda sit. Ea porro persuasissimum habere debet, aut in totum, aut certe plurimum domi se morari oportere. Tunc quibus aliquid in agro faciendum erit seruis, eos foras emittere, quibus autem in uilla quid agendum uidebitur, eos intra parietes continere, atque animaduertere, ne diuturna cæssatione frustrentur opera. Quæ domum autem inferuntur diligenter inspicere, ne delibata sint, & ita explorata, atque inuiolata recipere, tum separare, quæ consumenda sunt, & quæ superflui possunt custodire, ne sumptus annuus menstruus fiat, tum si quis ex familia cœperit aduersa ualitudine affici, uidendum erit, ut is quam commodissime ministretur. Nā ex huiusmodi cura nascitur beneuolentia, nec minus obsequium. Quinetiam fidelius, quàm prius seruire student, qui conualuerint, cum est ægris adhibita diligentia.

Quemadmodum tractare debeat penora, siue cellaria. Cap. II.

POST hæc meminisse debet, quæ inferantur, ut idoneis, & salubribus locis recōdita sine noxa permanant. Nihil. u. magis curant

dum est, q̄ preparare, ubi quidq; reponatur, ut, cum opus sit, p̄-
 matur. Ea loca qualia esse debeant, & in primo volumine, cum
 uillam constitueremus, & in undecimo, cum de officio uillae di-
 sputaremus, iam dicta sunt. Sed ne nunc quidem demonstrare
 breuiter pigebit, nam quod excelsissimum est conclave pretiosissi-
 ma uasa, & uestem desyderat, quod deniq; horreum siccum atq;
 aridum, frumentis habet idoneum, quod frigidum comodissime
 uinum custodit, quod bene illustre fragilem supellectilē, atque ea
 postulat opera, quae multi luminis indigent. Preparatis igit̄ res
 ceptaculis, oportebit suo quidq; loco generatim, atq; ēt spāliter
 nonnulla disponere, quo facilius, cū quid expostulabit usus reci-
 pere possit. Nam uetus est prouerbiū, paupertatem certissimam
 esse, cū alicuius indigeas, uti eo nō posse, quia ignoretur, ubi pro-
 iectum iaceat, quod desyderat. Itaq; in re familiari laboriosior
 est negligentia, q̄ diligentia. Quis enim dubitet nihil esse pul-
 chrius in omni rōne uitae, dispositione atq; ordine? quod ēt ludi-
 cris spectaculis licet sepe cognoscere. Nam ubi chorus canētium
 non ad certos modos, neq; numeris praeētis magistri cōsensit, dis-
 sonum quiddam, ac tumultuosum audientibus canere uidet̄, at
 ubi certis numeris, ac pedibus uelut facta cōspiratione consensit,
 atq; concinnit, ex eiusmodi uocum concordia non solum ipsis ca-
 nentibus amicū quiddam, & dulce resonat, uerūetiā spectātes,
 audientesq; latissima uoluptate permulcent̄. Iam uero in exerci-
 tu neq; miles, neq; imperator, sine ordine ac dispositione qcquā
 ualet explicare, cū armatus inermem, eques peditē, plastrū eq̄-
 tes, si sint permisti, confundant. Hae eadem rō p̄parationis, atq;
 ordinis ēt in nauigijs plurimum ualet, nam ubi tempestas inces-
 sit, & est rite disposita nauis, suo quidq; ordine locatum armamē-
 tum sine trepidatione minister promit, cum est à gubernatore po-
 stulatum. Quod si tantū haec possunt, uel in theatris, uel in exer-
 citibus, uel etiam in nauigijs, nihil dubium est, quin cura uillicae
 ordinem, dispositionemq; rerum, quas reponit, desyderet. Nā &
 unūquodq; facilius consyderatur, cum est assignatum suo loco, et
 siquid forte abest, ipse uacuius locus admonet, ut quod deest, req̄-
 ratur. Siquid uero curari, aut concinnari oportet, facilius intelli-
 gitur, cum ordine suo recensetur, de quibus omnibus. M. Cicero
 auctoritatē Xenophontis secutus in oeconomico sic inducit Ischo-
 machum si sitanti Socrati haec narrantem.

Distributio

PRAEPARATIS idoneis locis instrumentum, & supellectilem distribuere coepimus, ac primum ea secreuimus, quibus ad res diuinas uti solemus, postea mundum muliebre, qui ad dies festos comparatur, deinde ad uirilem, item dierum solennium ornatum, nec minus calciamenta utriusque sexui conuenientia, tum iam seorsum arma, ac tela seponebantur, & in altera parte instrumenta, quibus ad lanificia utuntur. Post quae ad cibum conficiendum uasa (ut assolent) constituebantur, inde quae ad lauatiōem, quae ad exornationem, quae ad mensam quotidianam, atque epulationem pertinerent, exponebantur. Postea ex ijs, quibus quotidie utimur, quod menstruum esset seposuimus, quod annuum, quoque in duas partes diuisimus, nam sic minus fallit, qui exitus futurus sit. Haec postquam omnia secreuimus, tum suo quaeque loco disposuimus. deinde quibus quotidie seruuli utuntur, quae ad lanificia, quae ad cibaria coquenda, & conficienda pertinent. Haec ipsa ei, qui uti solet, tradidimus, & ubi ea ponerent, demonstrauimus, & ut salua essent, praecipimus. Quibus autem ad dies festos, & ad hospitum aduentum utimur, & ad quaedam rara negotia, haec primo tradidimus, & loca singulis demonstrauimus, et cuique sua annumerauimus, atque annumerata ipsi excripsimus, eumque admonuimus, ut quodcumque opus esset, sciret unde daret, & meminisset, atque annotaret quid, & quando, & cui dedisset, & cum recepisset, ut quodque suo loco reponeret. Igitur haec nobis ab antiquis per Ischomachi personam praepcepta industriae, ac diligentiae tradiderunt, quae nunc nos uillicae demonstramus. Nec tamen una eius cura esse debet, ut clausa custodiat, quae tectis illata recepit, sed subinde recognoscat, atque consideret, ne aut suppellex, uestis, ne condita sita dilabatur, aut fruges, aliaue utensilia negligentia, desidiaue sua corrumpantur. Pluuys uero diebus, uel cum frigoribus, aut pruinis mulier sub dio rusticum opus obire non poterit, ut ad lanificium reducat, praeparatae sint, & petita lana, quo facilius instalanificio persequi, atque exigere possit. Nihil enim nocebit, si sibi atque actoribus, & alijs in honore seruilis uestis domi confecta fuerit, quo minus patrisfamilias rationes onerentur. Illud uero etiam in perpetuum custodiendum habebit, ut eos, qui foris rusticari debebunt, cum iam est uilla familia proefferit, regrat, ac si quis (ut euenit)

Colu.

D

curā contubernalis eius intra tectum tergiuersans sefellere, causam desidia sāsitetur, exploretq; utrum aduersa ualitudine inhibitus restiterit, an pigritia delituerit. Et si cōpererit, uel simulantem langorem sine cunctatione in ualitudinariū deducat. Præstat enim opere fatigatum sub custodia requiescere, nūn, aut alterum diem, q̄ pressum nimio labore ueram noxā concipere. Deniq; uno loco quamminime oportebit eam consistere, neq; enim sedentaria eius opera est, sed modo ad telam debet accedere, ac siquid melius sciat docere, si minus addiscere ab eo, qui plus intelligat, modo eos, qui cibum familie conficiunt inuisere, tum etiam culinam, & bubilia, nec minus præsepia mundāda curare. Valetudinaria quoq; uel si uacent ab imbecillis, identidē aperire, & immunditijs liberare, ut cum res exegerit, bene ordinata, & ornata, & salubria languentibus pbeātur. promis quoq; & cellarijs aliquid attendentibus, aut metuentibus interuenire, nec minus interesse pastoribus in stabulis fructū cogentibus, aut fœtus ouium, aliarum ue pecudum subrumantibus, tonsuris uellerum quoq; interesse, & lanas etiam diligenter percipere, et uelleram ad numerum pecoris recensere, tum insistere atriensibus, ut supellectilem exponant, & ferramenta deterfa nitidentur, atque rubigine liberentur. Ceteraq; si refectiōem desyderant, fabris conānanda tradantur. Postremo his rebus omnibus constitutis, nībil hanc arbitror distributionem profuturam, nisi, ut iam dixi, uillicus sapiens, & aliquando tamen dominus, aut matrona consyderauerit, animadueneritq; ut ordinatio constituta cōseruetur. Quod etiam in bene moratis ciuitatibus semper est obseruatum, quarum primoribus, atque optimatibus, non satis uisum est bonas leges habere, nisi custodes earum diligentissimos ciues creassent, quos græci νομοφύλακες appellant. Horum erat officium, eos, qui legibus parerēt, laudibus prosequi, nec minus honoribus, eos autem, qui non parerent, pœna mulctare. Quod nunc scilicet faciunt magistratus assidua iurisdicōe uim legum custodientes. Sed hæc in uniuersum administranda tradidisse abunde sit.

Quæ, & qualia uasa parare debeat penoribus, & salgamis cōdiendis.

Cap. IIII.

NVNC de cæteris rebus, quæ omisse erāt prioribus libris, quā uillicæ reseruabantur officijs, præcipiemus, & ut aliquis ordo custodiatur, incipiemus à uerno tempore, quā serè maturis, atq; trimestribus consumatis sationibus uacua tempora iam contingūt ad ea exequenda, quæ deinceps docebimus. Paruarum rerum curam non defuisse pœnis, græcisq; auctoribus, atq; et romanis memoria tradidit. Nam & Mago Carthaginienſis, et Hamilcar, quos secuti uidentur græcæ gentis non obscuri scriptores Mnaseas, atq; Paxamus, tum demum nostri generis, postquam à bellis otium fuit, quasi quoddam tributum uictui humano conferre dedignati nō sunt, ut M. Ambinius, & Menas Licinius, tum etiā C. Matius, quibus studium fuit pistoris, & coq, nec minus cellarij, diligentia suis præceptis instituere. His aut omnibus placuit eum, qui rerū harum officij suscepit, castum esse, continentēq; oportere, quā totum in eo sit, ne contrahent pocula, uel cibi, nisi aut ab impube, aut certe abstinentissimo rebus uenereis, quibus si fuerit operatus uel uir, uel fœmina, debere eos flumine, aut peni aqua, prius q̄ penora contingant, ablui, propter quod his necessarium esse pueri, uel uirginis ministerium, per quos pmanē, quæ usus postulauerit. Post hoc præceptum locū & uasa idonea salgamis pparari iubent, locū esse debere auersum à sole, quā frigidissimum, & siccissimū, ne situ penora mucorem contrahant. Vasa aut fictilia, uel uitrea plura potius, q̄ ampla, & eorū alia recte picata, nonnulla tñ pura pro ut cōditio conditura exegerit. Hæc uasa dedita opera fieri oportet patenti ore, & usq; ad imum equalia, nec in modum doliorū formata, ut exemptis ad usum salgamis qcquid superest equali pondere usq; ad fundum deprimatur, cū ea res innoxia penora cōseruet, ubi nō innatent, sed semper sint iure submersa, quod in utero dolij uix fieri posset propter inæqualitatem figuræ, maxime aut ad hoc necessarium esse aceti, & duræ murie usum, quæ utraq; sic conficiuntur.

Quemadmodum ex uino uapido acetum fiat. Cap. V.

IN Vini uapidi, ut acre fiat, sextarios duodecunquaginta, fermenti libram, si aridæ pondo quadrantem, salis sextariū subterrito, et subtrita cū quartario mellis aceto diluito, atq; ita in p̄dictā mēsuram adiuncto. Quidā ordeï tosti sextarios quatuor, & nubes ardētes inglādes quadraginta, et mētæ uiridis pondo selibrā.

D ij

COLVMELLA E.

in eandem mensuram adiungunt. Quidam ferri massas exurunt, ita ut ignis speciem habeant, easque in eandem mensuram demittunt. Tum etiam ex emptis nucleis ipsas nuces pineas uacuas numero quinq; uel sex incendunt, & ardentes eodem demittunt. Alij nubus sapineis ardentibus idem faciunt.

Quomodo muria dura fiat.

Cap. VI.

MURIAM duram sic facito, dolum quampotentissimi oris locato in ea parte uillæ, quæ plurimum solis accipit. Id dolum aqua cœlesti repleto, ea est enim huic rei aptissima, uel si non fuerit pluuialis, certe fontana dulcissimi saporis, tum indito sportam iuniceam, uel sparteam, quæ replenda sit sale candido, quo candidior muria fiat, cum sale per aliquot dies uidebis liquefcere, ex eo intelliges nondum esse muriam maturam. Itaque subinde alium salẽ tandiu ingeres, donec in sporta permaneant integer, nec minuat, quod cum animaduuerteris, scies habere muriam maturitatẽ suã, & si aliam in id uas facere uolueris, hæc in uasa bene picata diffundes, & opertam in sole habebis, omnem enim mucorem uis solis aufert, & odorem bonum præbet. Est aliud murie mature experimētum, nam ubi dulcem caseum demiseris in eam, si pessum ibit, scies esse adhuc crudam, si innabit, maturam.

Quæ per quatuor anni tpa herbe, et quomodo condiantur. Cap. VII.

HIS preparatis circa uernum æquinoctiũ herbas in usum colligi, & reponi oportebit, cymã, caulẽ, capparim, apy coliculos, rutam, olus atrum cum suo caule ante quod de folliculo exeat, itẽ ferulas cum coliculo silentes, quatenerrimum florem pastinacæ agrestis, uel satinae cum coliculis, silentẽ florem uitis albæ, & asparagi, & rusi, & thanni, & digitelli, & puleij, & nepetæ, & lapsanae, & battis, et eius coliculũ, qui miluinus pes appellatur, quetiã tenerum coliculũ fœniculi. Hæc oia una conditura cõmode seruantur, idest aceti duas partes, & tertiã duræ murie si miscueris, sed uitis alba, rusus, & thannũ, & asparagus, lapsana, et pastinaca, & nepeta, & battis generatim in alueos cõponuntur, et sale cõspersa biduo sub umbra, dum cõsudent, reponunt. Deinde si tñ remiserint humoris, ut suo sibi iure ablui possint, si minus supfusa dura muria lauant, & pondere imposito exprimunt. Tum suo quodque uase condit, et ius, ut supra dixi, quod est mustum duabus

partibus aceti, & una muriæ infunditur, fœniculiq; aridi, quod est peruindemiam proximo anno lectum spissamentum imponitur, ita ut herbas deprimat, & ius usq; in summum labrum fidelie perueniat. Oulus atrum, & ferulam, & fœniculum cum legis sub tecto exponito, dum flaccescat. deinde folia, & corticem omnem folliculorum detrahito. Caules si fuerint pollicæ, crassiores arundine secato, et in duas partes diuidito, ipsos quoq; flores, ne sint immodiæ, diduci, & partiri oportebit, atq; ita in uasa cōdi. deinde ius, quod supra scriptum est, infundi, & paucas radículas laseris, quod græci σίλφιον uocant, adiectas, ita spissamento fœniculi aridi contegi, ut ius superueniat. Cymā caulem, capparim, pedem milui, puleium, digitellū compluribus diebus sub tecto siccat, dum flaccescat, & tum eodem mō condiri cōuenit, quo ferulam rutā satureiam anilam. Sunt qui rutam muria tm̄ dura sine aceto condiant, deinde, cū usus exigit, aqua, uel etiam uino abluant, & supfuso oleo utantur. Hac conditura posset cōmode satureia uiridis, & æque uiridis anila seruari.

Oxygala quomodo fiat.

Cap. VIII.

OXYGALAM sic facito, ollam nouam sumito, eamq; iuxta fundum terebrato. deinde cauum, quem feceris, surculo obthurato, & lacte ouillo quamrecentissimo uas repleto, eoq; adiuncto uiridiū condimentorū fasciculos origani, mentæ, æpe, coriādri. Has herbas ita in lacte demittito, ut ligamina earum extent. Post diem quintum, surculum, quo cauum obthuraueras, eximito, & serum emittito, cum deinde lac cœperit manare, eodē surculo cauum obthurato, intermissoq; triduo, ita, ut supra dictum est, serum emittito, & fasciculos condimentorum exemptos abijcto, deinde exiguum aridi thymi, et anilæ aridæ super lac distringito, concisiq; sectini porri quantum uidebitur, adiuncto, & permisceto, mox intermisso biduo rursus serum emittito, cauumq; obthurato, & salis triti, quantum satis erit, adiuncto, et misceto, deinde operculo imposito, & oblinito, non ante aperueris ollam q̄ usus exegerit. Sunt qui satini, uel et syluestris lepidij herbā cum collegerunt, in umbra siccent, deinde folia eius abiecto caule, die & nocte muria macerata, expressaq; lacti misceant sine cōdimentis, & salis q̄tum satis arbitrant, adiunctant, tum cætera, quæ supra præcipimus faciant. Nonnulli recentia folia lepidij cum dulci lacte

D iij

in olla miscent, & post diem tertium quemadmodū p̄cepimus, serum emittunt. deinde compertam satireiam uiridem, tum etiā arida semina coriandri, atq; anethi, & thymi, et apij in unum bene trita adiungunt, salemq; bene coctum cribratum permiscent. Cetera eadem, quæ supra, faciunt.

Conditura lactuce.

Cap. IX.

CAULES lactuce ab imo depurgatos eatenus, quæ tenera folia uidebuntur, in alueo salire oportet, diemq; unum, & noctē sinere, dum muriam remittant, deinde muria eluere, & expressos in cratibus pandere, dū assiccescant, tum substernere anethū aridum, & fœniculum, rutæq; aliquid & porri concidere, atque ita miscere, tum siccatos coliculos ita componere, ut fascioli uirides integri interponantur, quos ipsos ante dura muria die, et nocte macerare oportebit, similiterq; assiccatos cū fasciculis lactucarum condi, et supersundi ius, quod sit acetii duarum partiū, atq; unius murie. deinde arido spissamēto fœniculi sic comprimi, ut ius supernatet, quod ut fiat, is, qui huic officio præerit, sæpe suffundere ius debet, nec pati sitire salgama, sed extrinsecus munda sponsa uasa pertergere, & aqua fontana quamrecentissima refrigerare, simili ratione intubum, et cacumina rubi, quæ lactucam condire oportet, nec minus thymi & satireie, & origani, tum etiam armoraciorum cymam, hæc autem, quæ suprascripta sunt, uerno tempore componuntur.

Cepæ, pyrorū, & malorū, ceterorūq; pomorū cōpositio. Cap. X.

NUNC quæ p̄ æstatem circa messē, uel ēt exactis iam messibus colligi, & reponi debeāt, præcipiemus. Pompeianā, uel ascaloniam cepam, uel ēt marsicam simplicem, quā uocant unionem rustiā, eligito. Ea est aut, quæ non fruticauit, nec habuit soboles adherentes. Hanc prius in sole siccato, deinde sub umbra refrigeratam substrato thymo, uel canila cōponito in fidelia, & infuso iure, quod sit acetii trium partiū, & unius murie fasciculum canilæ superponito, ita ut cepa deprimatur, quæ cum ius combiberit, simili mistura uas suppleat. Eodem tempore corna, et pruna onychina, & pruna syluestria, nec minus genera pyrorū, & malorū condiunt. Corna quibus pro oliuis utamur. Item pruna syluestria, & pruna onychina adhuc solida, nec maturissima let

genda sunt, nec tamen nimium cruda, deinde uno die umbra ficanda, tū equis partibus acētum, & sapa, uel defrutum misceatur, & infundatur. Oportebit autem aliqd salis adijcere, ne uermiculus, aliud ue animal innasā possit. Verū cōmodius seruantur si due ptes sapæ cū acēti una pte misceant. Pyra dolobelliana, crustumina, regia, ueneria, uolema, neuiana, latertiana, decumana, laurea, mirappia, pruna purpurea, cū imatura non tū pcruda legeris, diligenter inspiciat, ut sint integra sine uitio, aut uermiculo, tū in fidili picata fidelia cōponito, & aut passo, aut defruto cōpleto ita ut omne pomū submersum sit, opculo deinde imposito gypsato. Illud in totū p̄cipiendū existimari, nullū esse genus pomi, quod nō possit melle seruari. Itaq; cū sit hæc res interdum egrotantibus salutaris, censeo uel pauca poma in melle custodiri, sed sepata generatim, nā si cōmisceas, alterū ab altero gñe corrūpit, & qm̄ opportune mellis fecimus mentionē, hoc eodem tpe alui castrandæ, ac mel cōficiendum, cera facienda est, de qbus nono libro iā diximus, nec nūc aliam curā exigimus a nillico, q̄ ut administrantibus intersit, fructumq; custodiat.

De mella facienda, qua in condituris utuntur. Cap. XI.

CAETERVM cum eodem tpe mella, nec minus aqua mulsa in uetustatem reponi debeat, meminisse oportebit, ut cū secundarium mel de fauis fuerit exceptum, ceræ statim minute resoluatur, & aqua fontana, uel cœlesti macerent, exp̄ssa deinde aqua colet, & in uas plumbeum defusa decoquatur, omnisq; spurcitia cum spumis eximatur, quæ decocta, cum tam crassa fuerit q̄ defrutum, refrigeretur, et bene picatis lagenis condatur. Hac quidam mella pro aqua mulsa utuntur, nonnulli etiam pro defruto in condituras oliuarum, quibus quidem magis idoneam censeo, quod cibarium saporem habet, nec potest languentibus pro aqua mulsa remedio esse, quoniam si bibatur, inflationem stomachi, et præcordiorū facit, itaq; seposita esse, & ad condituras destinata.

De aqua mulsa facienda.

Cap. XII.

PER se facienda erit optimo melle aqua mulsa. Hæc autē non uno mō componit, nam qdam multos ante annos cœlestē aquā uasis includunt, & sub dio in sole habent. deinde cum sæpius eā in alia uasa transfuderint, & eliquauerint (nam quoties etiam

D iij

COLVMELLAE.

per longum t̃ps diffunditur, aliquod crassamentū, in imo simile
fēi reperitur) ueteris aquae sextarium cum libra mellis miscent.
Nonnulli tñ cum austeriorem uolunt efficiere gustum, sextarium
aquae cum dodrante, pondo mellis diluūt, & ea portione replet
tam lagenā, gypsata m̃q; patiunt per caniculæ ortū in sole qua-
draginta diebus esse, tum demū in tabulatū, qđ fīmū acipit,
reponunt. Nonnulli, quibus non fuit curae coelestem inueterare
aquā, recentē sumunt, eamq; usq; in quartā partem decoquunt.
deinde cū refrixerit, siue dulciore mulsam facere uolunt, duobus
aquae sextarijs, sextariū mellis permiscunt. Si uero austeriore, sex-
tario aquae dodrantem mellis adiungunt, et his portionibus factā
in lagenam diffundunt, eamq; ut supra dixi XL. diebus insola-
tam, postea in tabulatum, quod suffumigatur, reponunt.

De caseo in usus domesticos seruādo, & de quibusdā herbis con-
diendis. Cap. XIII.

CASEO usibus domesticis præparando, hoc maxime idoneū
t̃ps est, quo & caseus seri minimum remittit, et ultimo tpe, cum
iam exiguū lactis est, non tam expedit operas morari ad for̃ fru-
ctibus deferendis, & sanè saepe deportati per aestum, acore uitiā-
tur. Itaq; præstat eos hoc ipso tpe in usum conficere. Id autē ut
quādo optime fiat opilionis offm̃ est, cui septimo libro præcepta de-
dimus, q̃ sequi debeat. Sunt et quēdā herbæ, quas appropinquā-
te uindemia cōdire possis, ut portulaca, & olus cordū, quod q̃-
dam satium battim uocant. Hæ herbæ diligenter purgant, &
sub umbra expandunt. deinde quarto die sal in fundis fideliarū
substernit, & separatim unaquæq; earum cōponit, acetoq; infu-
so iterum sal superponitur, nam his herbis muria non conuenit.

De malis, & pyris in sole siccandis. Cap. XIII.

HOC Eodem tēpore, uel etiam primo mense Augusto mala,
& pyra dulcissimi saporis mediocriter matura eliguntur, & in
duas, uel tres partes arundine, uel osseo cultello diuisa in sole po-
nuntur, donec arefiant. Eorum si est multitudo, non minimam
partem abariorum per hyemem rustici uindicant, nam pro pul-
mentario cedit, sicuti ficus, quæ cum arida seposita est, hyemis tē-
poribus rusticorum abaria adiunat.

De ficis aridis.

Cap. XV.

E A Porro neq; nimium uicta, neq; iminatura legi debet, & in eo loco expandi, qui toto die solem accipiat. Pali autē, quatuor pedibus inter se distantes figuntur, & perticis iugantur, factæ de inde in hunc usum cannæ ingis superponuntur, ita ut duobus pedibus absint à terra, ne humorē, quem ferè noctibus remittit humus, trahere possint, tunc ficus iniicitur, & crates pastorales culmo, uel caricæ, uel felicæ textæ ex utroq; latere super terram planæ disponuntur, ut cum sol in occasum fuerit, erigant, & inter se acclines testudineato tecto more tuguriorū inarescentem ficum à rore, & interdum à pluuia defendant, nam utraq; res prædictum fructum corrumpit. Cum deinde aruerit, in orchas bene picatas meridiano tempore calentem ficum condere, & calcare diligenter oportebit, subiecto tñ arido fœniculo, & iterum uasis repletis superposito, quæ uasa cōfestim operculare, & oblinire conuenit, & in horreū sicissimum reponi, quo melius ficus perēnet. Quidam lectis ficis pediculos adimunt, & in sole expandunt, cum deinde paulum siccatae sunt, ante q̄ indurescant in labra fistilia, uel lapidea congerunt, & eas pedibus lotis pulcant, atq; iis admiscēt torrefacta sesama cum aniso ægyptio, & semine fœniculi, & cymini in modum farine redacta. Hæc cum bene procurcauerint, & totam fici massam cōminutæ pulueri permiscuerint, modicas offas folijs ficulneis inuoluunt, ac religatas in uoco, uel qualibet herba offas reponunt in crates, & patiuntur siccarī, deinde cum per aruerunt, picatis uasis eas condunt. Nonnulli hanc ipsam formā fici oras sine pice includunt, & oblita uasa, clibano, uel furno terrefaciūt, quo celerius oīs humor excoquat, sic siccata in tabulatum reponunt, & cum exegerit usus, testam cōminuunt. nam duratam massam fici aliter eximere non pñt. Alij pinguiissimā quāq; uiridem ficoꝝ eligunt, & arundine, uel digitis diuisam dilatant, atq; ita in sole arefcere patiunt, quas deinde bñ siccatas meridianis teporibus, cū calore solis emollitæ sunt colligunt, et ut est mos Afris, atq; Hispanis, inter se cōpositas cōpriunt in figurā stellæ flosculorumq; uel in formam panis redigentes, tum rursus in sole assiccant, & ita in uasis recondunt.

De uuis passis faciendis, & sorbis seruandis.

Cap. XVI.

SIMILEM curam uuae desyderant, quas dulcissimi saporis albas maximis acinis, nec spissis luna decrefcente, sereno & sicco cœlo post horam quintam legi oportet, & in tabulas paulisper porrigi, ne inter se pondere suo pressæ collidant. deinde abeno uel in olla noua fictili ampla, præparatam lixiuiam cineris sarmenti calefieri conuenit, quæ cum feruebit exiguum olei quãoptimi adijci, & ita permisceri. deinde uuas pro magnitudine binas uel ternas inter se colligatas in abenum feruens demitti, et exiguum pati, dum decolorent, nec rursus cõmittere, ut excoquantur, nam quadã moderatiõe temperamentoq; opus est. Cum deinde exemeris, in crate disponito rarius q̃ ut altera alteram cõtingat. Post tres deinde oras unãquãq; uuam conuertito, nec in eodem uestigio reponito, ne in humore, qui defluxerit, corrumpatur, nõ etibus autem contegi debent quemadmodum fici, ut à rore, uel pluuia tutæ sint, cum deinde modice aruerint, in uasa noua sine pice operculata & gypsata, sicco loco reponito. Quidam uuam passam folijs ficulneis inuoluunt, & assiccant. Alij folijs uiti gineis, nõnulli plataninis seminietas uuas contegunt, & ita i amphoras recondunt. Sunt qui culmos fabæ exurant, & ex eo, qd cremauerint, cinere lixiuiam faciant. deinde in lixiuiæ sextarios decem salis tres cyathos, & olei cyathum adijciant, tum adhibito igne calefaciant, & cætera eodem modo administrent. Quod si uidebitur in abeno parum inesse olei, subinde q̃tum satis erit adijciatur, quo sit pinguior, & nitidior uua passa. Eodem tempore sorba manu lecta curiose in urceolos picatos adijcto, & opercula picata imponito, et gypso linito, tum scrobibus bipedaneis sicco loco intra tectũ factis urceolos ita collocato, ut oblita ora eorũ deorsum spectent. deinde terrã cõgerito, et modice desuper calcato. Melius est aut pluribus scrobibus pauciora uasa distantia inter se disponere, nã in exẽptione eorũ dum unum tollis, si reliqua cõmoueris, celeriter sorba uitiant. Quidã hoc idem pomũ etiã in defruto cõmode seruant adiecto spissamento aridi fœniculi, quo deprimant ita sorba, ut semper ius supernatet, ac nihilo minus picata opercula diligẽter gypso linunt, ne possit spiritus introire.

De aceto ficulneo faciẽdo.

Cap. XVII.

SUNT quedam regiones, in quibus uini, ideoq; et aceti penuria est. Itaq; hoc eodem tpe ficus uiridis quam maturissima legen

da est, utiq; etiam si iam pluvie inceserunt, et propter imbres in terram decidit, quæ cum sublecta est, in dolium, uel in amphoras conditur, & ibi sinit fermentari. deinde cū exacuit, & remisit liquorē, quicquid est aceti diligenter colatur, & in uasa picata bene olida diffundit. Hoc primæ notæ acerrimi aceti usum præbet, nec unquā situm, aut mucorem contrahit, si non humido loco positum est. Sunt q̄ multitudini studētes aquā ficiis pmisceāt, et sub inde maturissimas ficus recentes adiçant, & patient in eo iure tabescere, donec satis acris aceti sapor fiat. Postea in iunceis fiscellis, uel sparteis sacis pcolant, liquatumq; acetum inferuefiāt, dum spumā & oēm spuratiā eximant, tum torridi salis aliquid adiçant, quæ res prohibet uermiculos, alia'ne innasci animalia.

Quæ præparanda sint uindemiæ.

Cap. XVIII.

Q V A M V I S priore libro, qui inscribit uillicus, iā diximus quæ ad uindemiam præparanda sunt, non tñ alienum est etiam uillicæ de ysdem rebus præcipere, ut intelligat suæ curæ esse debere quæcunq; sub tecto administrantur circa uindemiam. Si ager amplius, aut uineta, aut arbuta grandia sunt, perenne fabricanda decemmodiæ, & trimodiæ, & fiscellæ texendæ, & picandæ, nec minus falcule, & ungues ferrei quamplurimi parandi, & exacueni sunt, ne uindemiator manu dstringat uuas, & non minima fructus portio dispersis acinis in terram dilabatur. Funiculi quoq; fiscellis aptandi sunt, & lora trimodijs, tum lacus uinarij, & torcularij, et fora, omniq; uasa (si uicinū ē mare) aqua marina, si minus, dulci eluenda sunt, & cōmundanda, & diligenter assiccanda, ne humorem habeant. Cella quoq; uinaria oī stercore liberanda, & bonis odoribus suffiēda, nequē redoleat fœtorē, acorem'ue. Tum sacrificia Libero Liberæq; & uasis pressorij quā sanctissime, castissimeq; faciēda, nec per uindemiā ab torculari, aut uinaria cella recedendum est, ut oīa, quæ mustum cōficiunt, pure mundeq; faciant, ne furi locus detur præsentē fructum interapiēdi. Dolia quoq; & seriæ, cæteraq; uasa ante quadragesimū uindemiæ diē picanda sunt, atq; aliter ea, q̄ demersa sunt humi, aliter quæ stant supra terrā. Nā ea, quæ demersa sunt ferreis lampadibus ardentibus calefiunt, et cū picem in fundum destillauit, sublata lampade rutabulo ligneo, & ferrea curuata radula ducitur, quod destillauit, aut quod in lateribus hæsit.

COLVMELLAE.

deinde penicillo detergit, & feruentissima pice infusa nouo alio rutabulo, & scopula picatur. At quæ supra terram consistunt, complures dies ante quæ curentur, in solem producantur, deinde cum satis insolata sunt, in labra conuertuntur, & subiectis paruis tribus lapidibus suspenduntur, atque ita ignis subiicitur, & tandiu incenditur, donec ad fundum calor tam uehemens perueniat, ut apposita manus patiens eius non sit, tum dolio in terram demisso, et in latus deposito pix feruentissima infunditur, uoluntaturque, ut omnes dolii partes linantur. Sed hæc die quieto à uentis fieri debent, ne admoto igne cum afflauerit uentus, uasa rumpantur. Sunt autem satis sexquicullaribus dolijs picis duræ pondo uice nauina. Nec dubium, quin si quinta pars picis bruttiæ in uniuersam cocturam adiiciatur, utilissimum sit omni uindemiæ.

De pluribus generibus conditurarum, quibus uinum confirmatur. Cap. XIX.

C V R A quoque adhibenda est, ut expressum mustum perenne sit, aut certe usque ad uenditionem durabile. Quod quemadmodum fieri debeat, & quibus condituris adiunari, deinceps subiiciemus. Quidam partem quartam eius musti, quod in uasa plumbea coniecerunt, nonnulli tertiam decoquunt. Nec dubium, quin ad dimidiam si quis excoxerit, meliorem saporem facturum sit, eoque his usibus utiliore, adeo quidem, ut etiam uicæ defruti, sapa, mustum quod est ex ueteribus uineis, condire possit. Quæcumque uini nota sine condimento ualet perennari, optimam esse eam censemus, nec omnino quicquam permiscendum, quo naturalis sapor eius infuscetur. Id enim præstantissimum est, quod suapte natura placere poterit. Cæterum cum aut regionis uitio, aut nouellarum uinearum mustum laborabit, eligenda erit pars uineæ (si est facultas) amineæ, si minus, quæbellissimi uini, quæque erit & uetustissima, & minime uliginosa. tunc obseruabimus decreſcentem lunam, cum est sub terra, et sereno siccoque die uuas quamaturissimas legemus, quibus perculatis, mustum quod defluxerit, ante quam prælo pes extrahatur, satis de lacu in uasa defrutaria deferemus, leuique primum igne, & tenuibus admodum lignis, quæ cremia rustica appellantur fornacem incendemus, ut ex comodo mustum serueat. Isque, qui præerit huic decoquendo, cola uincea, uel sparteæ ex crudo, id est non malleato sparto præparata habeat. Itemque fasciculos ex fœniculi

sustibus illigatos, quos possit utiq; ad fundum uasorum demittere, ut quicquid fecis subsederit, exagitet, & in summum reducat, tum colis omnem spuratiam quæ redundarit, expurget, nec absistat id facere, donec uidebitur eliquatum omni fecæ mustū carere, tum siue mala cydonia, quæ percocta sublaturus sit, seu quoscūq; uoluerit convenientes odores adiiciat, & nihilo minus subinde fœniculo peragitet, nequid subsederit, quod possit plumbeū perforare. Cum deinde iam acriore potuerit ignem uas sustinere, idest cum aliqua iam parte mustum excoctum in se feruebit, tum codices, & uastiora ligna subiiciantur, sed ita ne fundum contingāt. Quod nisi uitatum fuerit, uel uas ipsum, quod aliquando cōtingit, pertundetur, uel si id factum non erit, utiq; aduretur mustū, & amaritudine concepta condituris fiet inutile. Oportebit autē ante q̄ mustum in uasa defrutaria coniiciatur, oleo bono plumbea intrinsecus imbui, bene fricari, atq; ita mustum adiici, ea res non patitur defrutum aduri.

De sapa, & defruto coquendis.

Cap. XX.

QVINETIAM diligenter factum defrutum, sicut uinum solet aescere, quod cum ita sit, meminerimus anniculo defruto, cuius iam bonitas explorata est, uinum condire, nā uitioso medicamine, fructus qui perceptus est, uitatur. Ipsa autē uasa, quibus sapa, aut defrutum coquitur, plumbea potius q̄ ænea esse debēt, nam in coctura æruginem remittunt ænea, & medicaminis saporem uitiant. Odores autē uino ferè apti sunt, qui cum defruto coquantur, iris, fœnum græcum, schœnum. Harum rerum singulæ libræ in defrutariū, quod æperit musti emphoras nonaginta, cū iam deferbuerit, & expurgatum erit, tum adiici debent. deinde si natura tenue mustum erit, cum ad tertiam partem fuerit decoctum, ignis subtrahendus est, & fornax p̄tinus aqua refrigeranda, quod si fecerimus, nihilo minus defrutum infra tertiā partē uasis confidet. Sed id quāuis aliquid detrimenti habeat, prodest tamen, nam quanto plus decoquitur (si mō nō est adustum) melius, & spissius fit. Ex hoc autem defruto, quod sic erit coctū, satis est singulos sextarios singulis amphoris immisceri. Nā cū amphoras musti nonaginta in defrutario decoxeris, ita ut iam exiguum supersit de coctura, quod significat decoctū ad tertias, tū demū medicamina adiuncto, quæ sunt aut liquida, aut resinosa,

ideſt piſis liquida nemeturica, cum eā diligenter ante aqua marina decocta perlueris, decem ſextarios, item reſinae terebinthinae ſeſquilibram. Hæc cum adijciſ, plumbeū peragitabis, ne aduratur, cum deinde ad tertias ſubſederit coctura, ſubtrahere ignem, et plumbeum ſubinde agitabis, ut defrutum & medicamenta coeant, deinde cū uidebitur mediocriter calere defrutum, reliqua aromata contuſa, & cribrata paulatim inſperges, & iubebis ru tabulo ligneo agitari, quod decoxeris, eoſq; dum defrigeſcet. Quod ſi non ita, ut præcipimus, permifcueris, ſubſident aromata, & adurentur. Ad prædictū aut modum muſti adijci debent ij odores, nardi folium, iris illyrica, nardum gallicum, crocum, palma, cyperū, ſchœnum, quorū ſingulorū ſelibra ſatiſfacient. Itē myrrhæ quincunx, calami pondo libræ, caſiæ ſelibram, amomi pondo quadrans, croci quincunx, cripæ pampinacæ librā. Hæc ut dixi, arida contuſa, & cribrata debent adijci, & his cōmiſceri riſis, quod eſt genus crude piſis, eaq; quanto eſt uetuſtior, tanto melior habetur, nam longo tempore durior facta, cum eſt contuſa in puluere redigitur, & his medicaminibus admifcet. Satis eſt autem prædictis ponderibus ſex libras eius miſceri. Ex hac compoſitione, quantum in ſextarios muſti quadragenos octonos adijciendum ſit incertum eſt, qm̄ pro natura uini eſtimari oportet, quod ſatis ſit. Cauendumq; eſt, ne conditus ſapor intelligat, nam ea res emptorem fugat. Ego tamen, ſi humida fuerit uindemia, trientem, ſi ſicca, quadrantem medicaminis in binas amphoras miſcere ſolitus ſum, ita ut quatuor urnarū cēt muſti modus. Urna aut quatuor & uiginti ſextarios continet. Nonnullos agricolas ſingulis amphoris quadrantē medicaminis indidiſſe ſcīo, ſed hoc coactos ſeſſiſſe propter nimiam infirmitatem uini eiſmodi, quod uix triginta diebus integrum permanebat. Hoc tamen muſtum ſi ſit lignorum copia, ſatius eſt inferueſcere, & omnem ſpumā cum ſcābus ex purgare, quo facto decima pars decidet, ſed reliqua perennis erit. At ſi lignorum penuria eſt, marmoris, uel gypſi, quod flos appellatur, uncias ſingulas, item ad tertias decocti defruti ſextarios binos ſingulis amphoris miſcere oportebit, ea res etiam ſi non in totum perennat, certe uſq; in alteram uindemiam plerunq; uini ſaporem ſeruat.

De defruto, quod adijcitur in uinum ad uetuſtatē. Cap. XXI.

MVSTVM quamdulcissimi saporis decoquatur ad tertias, & decoctum, sicut supra dixi, defrutum uocatur, quod cū defrixit, transfertur in uasa, & reponit, ut post annum sit in usu. Postest tñ etiam post dies nouem, q̄ refrixerit, adijci in uinū, sed melius est, si anno requiuerit. Eius defruti sextarius in duas urnas musti adijcitur, si mustum ex uineis collinis ē, sed si ex campestribus, tres heminae adijciuntur. Patimur autem, cum de lacu mustum sublatum est, biduo deferuescere, & purgari. Tertio die defrutum adijcimus. deinde interposito biduo, cum id mustum pariter cum defruto deferbuerit, purgatur, & ita coadijatur in binas urnas ligula cummulata, uel mensura semuncia bene plenae salis cocti, & triti. Sal aut quamcandidissimus conijcitur in urceo fictili sine picæ, qui urceus, cū recipit salem, diligenter totus oblinitur luto paleato, & ita igni admonetur, ac tādī iā torretur, quādiu strepitum edit, cum silere cœpit, finē habet cocturæ. Præterea fœnum græcū maceratur in uino uetere per triduum, deinde eximitur, & in furno siccatur, uel in sole, idq; cū est aridum factum, molitur, & ex eo molito post salituram musti cochlear cummulatum, uel simile genus poculi eius, qui est quarta pars cyathi adijcitur in binas urnas. deinde cum iam perfecte mustum deferbuit, et constitit, tantundem gypsi floris miscemus, quantum salis adieceramus, atq; ita postero die purgamus dolium, & nutritum uinum operimus, atq; oblinimus. Hac conditura Columella patruus meus illustris agricola uti solitus est in ijs fundis, in quibus palustres uineas habebat. Sed idem, cum collina uina condiebat, aquā salsam decoctam ad tertias pro sale adijciebat, ea porro facit sine dubio maiorem mensuram, & odoris melioris. sed periculum habet, ne uitietur uinū, si male cocta sit aqua. Sumitur autem hæc, ut iam dixeram, quamlongissime à litore, nā liquidior, & purior est, quantum altiore mari hausta est. Eam si quis (ut Columella faciebat) reponet, post triēnium in alia uasa eliquatā transfundat. deinde post alterum triennium decoquat usq; ad partem tertiā, longe meliorem habebit conditurā uini. Nec ullū periculū erit, ne uina uitientur. Satis est aut sextarios singulos adijcere salsæ, eosq; in binas musti urnas, quibus multi etiā binos immisceant, nōnulli et ternos sextarios, idq; ego facere nō recusẽm, si genus uini tantum ualeat, ut aquæ salsæ non intelligatur sapor. Itaq; diligens paterfamilias, cum parauerit fundū,

statim prima uindemia tres, aut quatuor notas condituræ toti-
dem amphoris musti experietur, ut exploratum habeat quātum
plurimū salsæ uinū, quod fecerit, sine offensa gustus pati possit.

Picis liquida alterū medicamen, quo mustum cōdias. Ca. XXII.

PICIS liquida nemeturica metretam adde in labrum, aut
in alueum, & in eodem infundito lixiuie cineris congios duos,
deinde permisceto spatha lignea, cum requieverit, eliquato lixi-
uiam. deinde iterum tantundem lixiuie addito, eodem pacto per-
misceto, & eliquato. Tertio quoq; idem facto. Cineris autem li-
xiuia odorem picis aufert, & eluit spuratiam. Post eodē addito
picis brutiæ, si minus, alterius quāpurissimæ quinq; libras. Hæc
minute concidito, & admisceto picis nemeturicæ, tum aquæ ma-
rinæ quam uetustissimæ si erit, si minus, ad tertiam partem recē-
tis aquæ marinæ decoctæ congios duos iniçito. Apertū labrū fini-
to in sole per caniculæ ortum, et spatha lignea permisceto quam
sepissime, usque eo, dum ea, quæ addideris, in picæ colliquefcāt,
& unitas fiat. Noctibus aut labrum operire cōueniet, ne irrore-
tur, deinde cū aqua marina, quā addideris, sole cōsumpta uide-
bitur, sub tectum uas totum ferre curabis. Huius aut medicami-
nis quidam pondo quadrantem in sextarios. XLVIII. miscere
soliti sunt, et hac conditura cōtenti esse. Alij cyathos tres eius me-
dicamenti adiçunt in totidē sextarios, quot supra diximus.

De picæ, qua utuntur Allobroges ad conditurā uini picati. C. 23.

PIX corticata appellatur, qua utuntur ad condituras Allobro-
ges. Ea sic conficitur, ut dura sit, & quanto facta est uetustior, eo
melior in usu est, nam omni lentore misso facilius in puluerem re-
soluitur, atq; cribratur. Hanc ergo conteri, & cribrari oportet,
deinde cum bis mustum deferbuerit, quod plerūq; est intra quar-
tum diē, q̄ de lacu sublatum est, diligenter manibus expurgat.
Et tunc demum prædictæ picis sextans & semuncia in sextarios
quinq; & quinquaginta adiçitur, & rutabulo ligneo pmiscet,
nec postea tangitur, dum conseruescat, quod tamen nō amplius
diebus quatuordecim à conditura patiendum est, nā oportebit
post hunc numerum dierū confestim uinum emundare, & si qd
fecis aut labris uasorū, aut lateribus inhæsit, eradi, ac suffricari,
et protinus operculis impositis oblini. At si ex eadem picæ totam
uindemiam

uindemiam condire uolueris, ita ne gustus picati uini possit intelligi saterit eidem picis sex scrupula, in sextarios quinq; et quadraginta, tum demum miscere, cum mustum deferbuerit, & feces expurgatae fuerint, oportebit, atq; salis decocti, contritiq; semuniam in eundem modum musti adijcere. Nec solum huic notae uini sal adhibendus est, uerum, si fieri possit, in omnibus regionibus omne genus uindemiae hoc ipso pondere salendum est, nam ea res mucorem uino inesse non patitur.

De picæ nemeturica ad condituras.

Cap. XXIIII.

P I X nemeturica in Liguria conficitur. Ea deinde ut fiat cōdituris idonea, aqua marina quā longissime à litore de pelago sumenda est, atq; in dinudiā partem decoquenda, quæ cum in tñm refrixerit, quantum ne contacta corpus urat, partem aliquam eius, quæ satis uidebit, prædictæ picæ immiscemus, et diligēter lignea spatha, uel ēt manu pagitabimus, ut siqd inest uitij eluatur, deinde patiemur picē cōsidere, et cū sederit, aquā eliqbimus. Postea bis, aut ter ex reliqua parte aquæ decoctæ tādīu lauabimus, & subigemus eā, donec rutila fiat, tum eliquatam in sole quatuordecim diebus patiemur esse, ut quisquis ex aqua humor remansit, assicetur, noctibus aut uas tegendum erit, ne irroret. Cū hoc modo picem præparauerimus, & uina, cū iā bis deferbuerint, cōdire uoluerimus, in musti sextarios octo & quadraginta, cyathos duos picis prædictæ sic adijciemus. Ex ea mensura, quam condituri sumus, sextarios duos musti sumere oportebit. deinde ex his sextarijs in picis sextantem paulatim mustum infundere, & manu tanquam mulsū subigere, quo facilius coeat. Sed ubi toti duo sextarij cum picæ coierint, & quasi unitatem fecerint, tū eosdē in id uas, unde sumpseramus, pfundere, et ut pntisceatur medicamen, rutabulo ligneo pagitare cōueniet.

De aqua salsa, uel muria ad uina condienda. Cap. XXV.

Q V O N I A M quidam, immo ēt ferè omnes græci aqua salsa uel muria mustum cōdiunt, eā quoq; partem curæ nō omittēdam putauit. In mediterraneo, quō non est facilis aquæ marinæ inuectio, sic erit ad condituras conficienda muria. Huic rei uel maxime est idonea cœlestis aqua, si minus ex fonte liqdisimo pfluens. Harū ergo alterutram curabis quamplurimā, & quam

Colu.

E

optimis uasis cōditam ante quinquennium in sole ponere. deinde cū cōputruerit, tādīn pati, donec ad pristinum modum pueniat. Quod cū factum fuerit, alia uasa habeto, & in ea sensim aquā eliquato, donec ad fecem puenias, semp enim in requieta aqua crassamen aliqd in imo reperitur. Sic curata cū fuerit, in modum defruti ad tertias decoquenda est, adiunguntur aut in aquae dulcis sextarios quinquaginta, salis sextarius, & mellis optimi unus sextarius. Hec pariter decoqui, & oēm spuratiā expurgari oportet. deinde cum refrixerit, tum quātūcūq; humoris est, tū in amphoram musti portionem adiūci. Quod si ager maritimus est, silētibz uentis de alto quāquiescentissimo mari sumenda est aqua, et in tertiam partē decoquenda, adiectis, si uidebit, aliquibus aromatis ex ijs, quae supra retuli, ut sit odoratioꝝ uini curatio. Mustum aut ante q̄ de lacu tollas, uasa rore marino, uel lauro, uel myrto suffumigato, & large repleto, ut in efferuescendo uinū se bñ purget. Postea uasa nucibus pineis suffricato, qđ uinū uolueris dulcius eē postero die, qđ austerius q̄nto die, quam sustuleris, cōdire oportebit, & ita supplere, & oblinire uasa. Nonnulli ēt suffumigatis serijs prius condituram addunt, & ita mustum infundūt.

Remedia acescentis uini.

Cap. XXVI.

IN QVO agro uinū acescere solet, curandū est, ut cū uinam legeris, & calcaueris, prius q̄ uinacea torculis exprimant, mustum in corbē defundas, et aquae dulcis puteanae ex eodem agro partē decimā adiūcias, & coquas, donec ea aqua, quā adieceris, decocta sit. Postea cū refrixerit, in uasa defundas, & opias, et oblinas, ita diutius durabit, & detrimēti nihil fiet. Melius ē, si uerē seruata cōpluribus annis aquā addideris, longe q̄ melius, si aquae nihil addideris, & decimā musti decoxeris, frigidum q̄ in uas trāstuleris, etsi in sextarios. VII. musti heminā gypsi miscueris, postea quā decoctū refrixerit. Reliquū mustū, qđ ē uinaceis fuerit expressum, primo quoq; tpe absunito, aut are cōmutato.

De uino dulci faciendo.

Cap. XXVII.

VINUM dulce sic facere oportet. Uuas legito, i sole p tridū expandito, quarto die meridiano tpe calidas uuas p̄cūcato, mustum lixiū (hoc est ante q̄ praelo pressum sit, quod in lacum musti fluxerit) tollito, cū deforbuerit in sextarios quinquaginta irim

bene pinsitam nec plus unciae pōdere addito, uinum à seibus eli
quatum diffundito. Hoc uinū erit suauē, firmū, corpori salubre.

De alijs salubribus conditurarum generibus. Cap. XXVIII.

A L I A medicaminum genera uini cōdituris, & firmitati ap
tissima sic facito. Irim quācandidissimam pinsito, fœnum græcū
ueterē uino maceratū, deinde in sole expositū, aut in furno, ut
siccescat, præparato tum cōmolito minutissime. Hæc odoramen
ta trita, idest irim cribratā, quæ sit instar pondo quincuncem &
trientem, fœni græci pondo quincuncem & trientem, schœni pō
do quincuncem in unum permisceto, tum in serias singulas, quæ
sint amphorarium septenum, addito medicaminis pondo uncia,
& scrupula octo gypsi. Cum ex locis palustribus mustum erit, in
singulas ternas heminas, cum de nouellis uineis erit, sextarium,
cum de ueteribus, & locis siccis, heminas singulas adiūcto. Ter
tio die quā calcaueris condituram infundito, sed ante q̄ condias
musti aliquantum in seriā de seria transferto, ne in cōdiendo cū
medicamento efferuescat, & fluat. Sic aut curatum gypsum &
medicamentum, in labello permisceto, quā tum serijs singulis fue
rit necessariū, idq; medicamentum musto diluito, & idipsum ad
serias addito, & pmisceto, cū deferbuerit, statim repleto, & obli
nito. Omne uinū cum condieris, nolito statim diffundere, sed si
nito in dolijs quiescere. postea cum de dolijs, aut de serijs diffun
dere uoles, uere florente rosa defecatū quālimpidissimum in uas
sa bene picata, & pura transferto, si in uetustatem seruare uoles,
in cado duarū urnarum, quā optimi uini sextarium, aut seicis ge
nerosæ recentis sextarios tres addito, aut si uasa recentia, ex qbus
uinum exēptum sit habebis, in ea confundito. Si horum quid fe
ceris, multo melius, & firmitus erit uinum, & si bonos odores ad
dideris, omnem malum odorem, & saporem prohibueris, nā nul
la res alienum odorem celerius ad se ducat, q̄ uinum.

Quemadmodum mustum semper dulce tanquam recens perma
neat.

Cap. XXIX.

M V S T V M ut semp dulce tanquā recens permaneant, sic faci
to. Ante q̄ prælo uinacæa subiūciantur de lacu quā recentissimum
addito mustum in amphoram nouam, eamq; oblinito, & impi
cato diligenter, ne quicq; aquæ introire possit. Tunc in piscinam

E 4

frigida, & dulcis aq̄ totā amphorā mergito, ita nequa ps extet. deinde post dies. XL. eximito, sic usq; in annū dulce p̄manebit.

Optima uini curatio, et remedia languentis uini. Cap. XXX.

AB EO tempore, quo primum dolia operculaueris, usq; ad æquinoctium uernū semel in diebus. XXXVI. uinum curare satis est, post æquinoctium uernū bis, aut si uinum florere incipiet, sæpius curare oportebit, ne flos eius pessum eat, & sapore uitiet. Quāto maior æstus erit, eo sæpius conuenit uinum nutriri, refrigerariq; & uentilari, nam quādiu bene frigidum erit, tandiu recte manebit. Labra, uel fauces doliorum semper suffricari nucibus pinzis oportebit, quoties uinum curabitur. Siqua uina erunt duriora, aut minus bona, quod agri uitio, aut tempestate sit factum, sumito fecem uini boni, & panes facito, & in Sole arefacto, & coquito in igne, postea terito, & pondo quadrantem amphoris singulis infricato, & oblinito, bonum fiet.

Siquē aīal in mustū ceciderit, et interierit remedia. Ca. XXXI.

SI QVOD animal in mustum ceciderit, & interierit, uti serpens, aut mus, forex ue, ne mali odoris uinum faciat, ita ut repperit corpus fuerit, id igne aduratur, cinisq; eius in uas, quod ceciderat, frigidus infundatur, atque rutabulo ligno permisceatur. ea res erit remedio.

Vinum ex Marrubio.

Cap. XXXII.

VINVM Marrubij multi utile putant ad omnia intestina uitia. et maxime ad tussim. Cum uindemiā facies, in arrubij caules teneros, maxime de locis incultis, & macris legito, eosq; in Sole siccato. deinde fasciculos facito et tomice palmea aut iuncea ligato, et in seriā mittito, ita ut uinculū extet. In musti dulcis sextarios. CC. marrubij libras. VIII. adiūcto, ut simul cū musto deferuescat, postea eximito marrubium, & purgatum uinum diligenter oblinito.

Vinum scylliten.

Cap. XXXIII.

VINVM scylliten ad conuocandum, & ad corpus reficiendum, itemq; ad ueterē tussim, & ad stomachū hoc modo condire oportet. Primum ante dies quadraginta q̄ uinum uoles uini

demiare, scyllā legito, eamq; secato quā tenuissime, sicut raphaniradicem, taleolasq; sectas suspende in umbra, ut adsiccentur. deinde cum aridae erunt, in musti aminei sextarios. XLVIII. eiusdē aridae scyllae pondo librā addito, eāq; inesse patere diebus XXX. postea eximito, & defecatum uinum in amphoras binas adiūcto. Alij scribunt in musti sextariis. XLVIII. scyllae aridae pondo libram, & quadrantem adiūci oportere, quod & ipsum nō improbo. Alij hoc ipm scyllae pondus, qđ supra dixi, in aceti duas urnas ut scylliticū fiat adiūcūt, et p XL. dies in eē patiuntur.

De aceto scyllitico.

Cap. XXXIIII.

QVI autem Scylliticū acetum facere uolunt, decem bambatae in tres amphoras musti mitis aceti acris congiū, aut duplum, si non est acre, & in ollam, quae fert amphoras tres, decoquis ad palmum, idest ad quartas, aut si nō dulcē mustum ad tertias dispumetur, sed mustum de submassa, & limpidum sit.

Vinū absynthiten, & hyssopiten, & abrotoniten, & reliquarum notarum quomodo facias.

Cap. XXXV.

VINVM absynthitē, & hyssopiten, et abrotoniten, et thymiten, & maratritē, & glyarixiten sic cōdire oportet. Pontici absynthij pōdo librā cū musti sextarijs. IIII. decoq; usq; ad quartas, reliquū, quod erit, id frigidū adde ī musti aminei urnā. Idē ex relijs rebus, quae suprascriptae sunt, facito. Possunt ēt puleij aridi tres librae cum congio musti ad tertias decoqui, & cū refrixerit liquor, exempto puleio in urnā musti adiūci, idq; mox tussientibus per hyemem recte datur, uocaturq; uini nota glechonites.

De musto tortiuo.

Cap. XXXVI.

MVSTVM tortiuum est, quod post primā pressurā uinaceorum circūciso pede exprimitur. Id mustum coniicies in amphorā nouam, & implebis ad summum, tū adiūcies ramulos rorismarini aridi lino colligatos, & patieris unā defervescere p dies septē. deinde eximes ramulorū fasciculum, & purgatū diligenter uinū gypsabis. Sat erit autem rorismarini sesquilibram in duas urnas musti adiūcere. Hoc uino post duos menses possis p remedio uti.

Vinum simile graeco facere.

Cap. XXXVII.

E iij

COLVMELLAE.

VVAS præcoquas quā maturissimas legito, easq; per triduum in sole siccato, quarto die calcato, & mustum, quod nihil habeat ex tortino, conuato in seriam, diligenterq; curato, ut cum defuerit, faeces expurgentur. deinde quinto die, cum purgaueris mustum, salis cocti, & cribrati duos sextarios, uel quod est minimum, aduato unum sextarium in sextarios musti. XLIX. Quidam etiam defruti sextarium miscent, nonnulli etiam duos aduiciunt, si existimant uini notam parum esse firmam.

Vinum myrtiten quomodo facias.

Cap. XXXVIII.

VINVM myrtiten ad tormina, & ad alui proluuiē, & ad imbecillum stomachum sic facito. Duo sunt genera myrti, quorum alterum est nigrum, alterum album. Nigri generis bacæ, cum sunt maturæ leguntur, & semina earum eximuntur, atq; ipsæ sine seminibus in sole siccantur, & in fictili fidelia sicco loco reponuntur. deinde per uindemiam ex uetere arbusco, uel, si id nō ē, ex uetustissimis uineis amineæ bene maturæ uinæ Sole calido leguntur, & ex his mustum aduicatur in seriam, & statim primo die ante q̄ id ferueat, bacæ myrti, quæ fuerant repositæ, diligenter conteruntur, & totidem earum libræ contusarum appenduntur, quot amphoræ condiri debent, tum exiguum musti sumitur ex eā seria, quam medicaturi sumus, & tāq̄ farina conspergitur, quicquid contusum, & appensum est. Post hæc complures ex eā massulæ fiunt, & ita per latera seriæ in mustum demittuntur, ne altera offa sup̄ alteram pueniat. Cum deinde bis mustum defuerit, & bis curatū est, rursus eodē modo, & tantūdem ponderis bacæ, sicut supra dixi, cōtunditur, nec iā ut prius massulæ fiūt, sed in labello mustum de eadē seria sumit, prædicto ponderi permiscetur, sic ut sit instar iuris crassi, quod cum est pmutū, in eandem seriā confundit, & rutabulo ligneo peragitatur, deinde post nonnum diem q̄ id factum est, uinum purgat, et scopulis aridæ myrti seriā suffriatur, operculumq; superimponitur, neqd̄ eo decidat. Hoc factō, post septimum diem rursus uinum purgatur, & in amphoras bene picatas, & bñ olidas diffundit, sed curandum est, ut cum diffundis, liquidum, et sine fecē diffundas. Vinū aliud myrtiten, sic temperato, mel atticū ter inferuere facito, & toties dispumato, uel si atticum nō habueris, quam optimum mel eligito, & quater, uel quinquies dispumato, nā quanto est deter

rius, tanto plus habet spuritiæ, cum deinde mel refrixerit, bacas, albi generis myrti quam maturissimas legito, & perfriato, ita ne interiora semina cōteras, mox fiscello ligneo inclusas exprimito, succumq; earum, qui sit sextario & sex cum mellis decocti sextario immisceto, & in lagunculam diffusum oblinito, sed hoc mense Decembri fieri debebit, quo ferè tempore matura sunt myrti semina, custodiendumq; erit, ut ante q̄ bacæ legantur, si fieri potest, septem diebus, sin autem ne minus triduum serenum fuerit, aut certe non pluerit, & ne rorulentæ legantur cauendum. Multi nigram, uel albam myrti bacam, cū iam maturuit, distringunt, et duabus horis eam cū paululum in umbra expositā siccauerunt, perterunt ita, ut q̄tum fieri pōt, interiora semina integra permaneant, tum per lineum fiscum, quod pertriuierant, exprimunt, & per colum iuncum liquatū succum lagunculis bene picatis condunt, neq; melle, neq; alia re ulla immista. Hic liquor non tam est durabilis, sed quādiu sine noxa manet, utilior est ad ualeitudinem q̄ alterius myrtei notæ cōpositio. Sunt q̄ hunc ipsum expressum succū, si sit eius copiosior facultas, in tertiā partē decoquāt, & refrigeratum picatis lagunculis condant, sic confectū diutius permanet. Sed quod non decoxeris, poterit innoxium durare biennio, si modo munde, & diligenter id feceris.

Passum quemadmodum fiat.

Cap. XXXIX.

PASSVM optimum sic fieri Mago præcipit, ut & ipse fecit. Vnam præcoquem bene maturam legere, acina arida, aut uitiōsa reijcere, furcas, uel palos, qui cannas sustineant, inter quater nos pedes figere, & perticis iugare. Tum insuper cannas ponere, & in sole pandere uuas, & noctibus tegere, ne irrorentur. Cum deinde exaruerint acina decerpere, & in dolium, aut in seriam conijcere, eodem mustum quam optimum, sic ut grana submersa sint, adijcere, ubi combiberint uuæ, seq; impleuerint, sexto die in fiscellā conferre, & prælo premere, passumq; tollere. Postea uina æos calcare adiecto recentissimo musto, quod ex alijs uuis factum fuerit, quas per triduum insolaueris tum permiscere, & subactā brisam prælo subijcere, passumq; secundarium statim uasis oblinitis includere, ne fiat austerius. deinde post uiginti, uel triginta dies, cum deferbuerit, in alia uasā deliquare, et confestim opcula

E iij

COLVMELLAE.

gypsare, & pelliculare. Passum si ex uua apiana facere uolueris, uuam apianam integram legito, aana corrupta purgato, & se-
cernito. Postea in perticis suspēdito, perticæ uti semper in sole sine
facto, ubi satis corrugata erunt aana demito, & sine sapiōibus
in dolium cōiūcto, pedibusq; bene calcato, ubi unum tabulatum
feceris, uinū uetus conspergito. postea alterum supercalcato, item
uinum conspergito. eodem modo tertium calcato, & infuso uino
ita superponito, ut supernatet, & finito dies quinq; . postea pedi-
bus procalcato, & in fisa noua uuas premito. Quidā aquam
coelestem ueterem ad hunc usum preparant, & ad tertias deco-
quunt. deinde cum sic uuas ut supra scriptum est, passas fecerūt,
decoctam aquam pro uino adiūunt, & cetera similiter admi-
nistrant. Hoc ubi lignorum copia est, uillissime constat, & est in
usu uel dulcius, q̄ superioris notæ passi.

Lora optima quomodo fiat.

Cap. XL.

Q V A N T V M uini uno die feceris, eius partē decimā quot
metretas efficiat considerato, et totidem metretas aquæ dulcis in
uinacæa, sed quibus unius diei uinum expressum erit, addito. Eo-
dem & spumas defruti, siue sapæ, & fecem ex lacu cōfundito, &
permisceto, eamq; intritā macerari una nocte finito, postero die
pedibus procalcato, & sic permistam prælo subijcto. Quod de-
inde fluxerit aut dolijs, aut amphoris condito, & cum deferbue-
rit, obturato. Commodius autem seruatur in amphoris. Hanc
ipsam loram. M. Columella ex aqua uetere faciebat, & nonnun-
q̄ plus biennio innoxiam seruabat.

Mustum lixiuum quomodo fiat.

Cap. XLI.

M V S T V M lixiuum de lacu statim tollito. Hoc autem erit,
quod distillauerit, ante q̄ nimum calcetur uua, sed de arbusi-
no genere, quod sicco die legeris id facto, coniūctes in urnam musti
mellis optimi pondo. x. & diligenter permistum recondes in la-
gēna, eamq; protinus gypsabis, iubebisq; in tabulato reponi. Si
plus uolueris facere, pro portione qua supra mel adiūctes, post tri-
gesimum et alterum diem lagēnā aperire oportebit, et in aliud
uas mustum eliquatum oblinire, atq; in furnum reponere.

De conditura cydoneorum.

Cap. XLII.

CONDITURA ex cydoneis fit hoc modo. In cacabo figuli nouo, uel in stagneo coquitur musti arbutini aminei urna, et mala cydonea grandia expurgata uiginti, et integra mala dulcia granata, quæ punica uocantur, et sorba non permitia diuisa exemptis seminibus, quæ sint instar sextariorum trium. Hæc ita coquunt, ut oia poma deliquescant cum musto, et sit puer, qui spatha lignea, uel arundine permiscet poma, ne possint aduri. Deinde cum fuerint decocta, ut non multum iuris supersit, refrigerantur, et percolantur, eaquæ, quæ in colo subsiderunt, diligenter contrita leuigantur, et iterum in suo sibi iure lento igni, ne adurantur, carbonibus decoquuntur, donec crassamen in modum fecis existat. Prius tamen quam de igne medicamentum tollatur, tres hemine roris syriaci contriti, et cribrati super oia adiunguntur, et spatha permiscantur, ut coeant cum cæteris. Tum refrigeratum medicamentum adiungitur in uas fictile nouum picatum, idque gypsatum alte suspenditur, ne pallorem trahat.

De caseo condendo.

Cap. XLIII.

CASEI aridi ouilli proximi anni frustra ampla facto, et impicato uase componito, tum optimi generis musto adimpleto, ita ut superueniat, et sit ius aliquanto copiosius, quam caseus, nam caseus combibit, et sit uiciosus, nisi mustum semper supernatet. Vas autem, cum impleueris, statim gypsabis. deinde post dies uigintilicabit aperiri, et uti, quia uoles adhibita conditura. Est autem etiam per se non iniucundus.

Vna ollares quemadmodum componantur, et seruentur. Cap. XLIIII.

VVAS bumastos, uel duracinas, uel purpureas cum desecueris à uite, continuo pediculos earum impicato dura pice. deinde labellum fictile nouum impleto paleis quicquidissimis cribratis, ut sine puluere sint, et ita uuas supponito, tum labello altero adoperito, et circumlinito luto paleato, atque ita in tabulato siccissimo composita labra paleis siccis obruito. Ois autem una sine noxa seruari potest, si luna decrescante, et sereno celo post horam quartam, cum iam insolata est, nec roris quicquam habet, uiti detrahatur, sed ignis in proximo de cumano fiat, ut pix serueat, in qua pediculi uarum statim demittantur. In doliū bene picatum defruti amphorā coniuncto, deinde transversos fustes spisse arcuato, ita ut defrutum non contingant, tum

superponito fictiles novas patinas, & in his sic uiam disponito, ut altera alteram non contingat, tum opercula patinis imponito, & linito, deinde alterum tabulatum, & tertium, & quādiu magnitudo patitur doliū similiter instruito, & eadem rōne uas componito. deinde picatum operculum doliū defruto large linito, & impositum anere obthurato. Nonnulli adiecto defruto contenti sunt transuersas perticas arētare, & ex his uas ita suspendere, ne defrutum cōtingant. deinde operculum impositum oblinire. Quidā uas, cum ita, ut supra dixi, legerūt, doliola noua sine picā in Sole siccant. deinde cū ea in umbra refrigerauerunt, fursures ordeaceos adiungunt, & uas ita superponūt, ut altera alteram nō cōprimat, tum generis eiusdē fursures in fundunt, et alterum tabulatum uarum eodē mō collocāt, idq; faciunt usq; dum doliū alternis fursuribus, & uis cōpleant. mox opercula imposita linunt, & uas siccissimo, frigidissimoq; tabulato reponunt. Quidā eadem rōne arida populnea, uel abiegna scobe uirides uas custodiunt. Nonnulli sicco flore gypsi obruunt, uas, quas non nīmīū maturas uitibus detraxerunt. Alij cum legerunt uā, siqua sunt in ea uitiosa grana, forficibus amputant, atq; ita in horreo suspendunt, in quo triticum suppositū est. Sed hęc ratio rugosa facit aīna, & penē tam dulcia quam est uua passa. M. Columella patrus meus ex ea creta, qua fiūt amphorae, lata uasa in modum patinarū fieri inbebat, eaq; intrinsecus, & exterius crasse picari, quae cum praeprauerat, tum demū purpureas, & bumastos, & numisianas, et duracinas uas legi praeapiebat, pediculosq; earum sine mora in feruentē picem demitti, & in praedictis patinis separatim sui cuiusq; generis ita cōponi, ne uae inter se contingerent, post hoc opercula superponi, & oblini crasso gypso, tum demum picē dura, quae igni liquata esset, sic picari, nequis humor trāsire posset, tota deinde uasa in aqua fontana, uel aīsternina ponderibus impositis mergi, nec ullā ptē earū pati extare, sic optime seruatur uua. Sed cum est exēpta, nisi eo die consumitur, acēsat. Nihil est tñ certius, q̄ uasa fictilia facere, quae singulas uas laxē recipiant. Ea debent quatuor ansas habere, qbus illigata uiti depēdeant, itemq; opercula eorū sic formari, ut media diuise sint, ut cū suspensa uasa singulas uas receperint, ex utroq; latere apppositi operculi duae partes coeant, et cōtegant uas, & hęc uasa, & opercula extrinsecus, & intra dili

genter picata esse debebunt. Deinde cum contexerunt uuas, luto, paleato multo adoperiri, sed uuae dependentes à matre sic in pul-
tarios condi debebunt, ne quæ partes uasa contingant. Tempus
aut, quo includi debent, id serè est, quo adhuc siccitatibus, & se-
reno cælo crassa, uariaq; sunt acina. Illud in totū maxime præci-
pimus, ne in eodē loco mala, & uuae cōponantur, ne ue in uici-
no, unde odor malorū possit ad eas puenire. nā huiusmodi hali-
tu celeriter acina corrumpunt, & tñ custodiendorū pomorū ratio-
nes, quas retulimus, non omnes oībus regionibus aptæ sunt, sed
pro conditione locorū, & natura uuarum aliæ alijs conueniunt.
Antiqui plerūq; siratulas & uenuculas, & maiores amineas, et
gallicas, quæq; maiores, & duri, & rari acini erant, uasis conde-
bant. nunc aut circa urbem maxime ad hunc usum numisianæ p-
bantur. Hæc sereno cælo, cum iam sol rorem sustulit, quarta, uel
quinta hora (si mō Luna decrescat, & sub terris est) modicè ma-
turæ lectissimæ leguntur. deinde in cratibus ita ponuntur, ne al-
tera alteram collidat, tum demum sub tectum referuntur, & ari-
da, uel uitiosa grana forsiabibus amputantur, & cum paulū sub
umbra refrixerint, ternæ, aut etiam quaternæ pro capacitæ ua-
sorū in ollas demittuntur, & opercula diligenter picæ obthurā-
tur, ne humorem transmittant, tum uinaceorum pes bene prælo
expressus proruitur, & modicè separatis sapiōibus, resolutaq; in-
trita folliculorum in dolio substernitur, & deorsum uersus spectā-
tes ollæ cōponunt, ita distantes, ut interculcari possint uinacea
quæ cum diligenter conspissata primū tabulatum fecerunt, aliæ
ollæ eodem modo cōponuntur, expleturq; secundum tabulatum.
deinde similiter dolium completur tabulatis ollarum, spisseq; ui-
naceis inculcantur, mox usq; ad summum labrum uinaceæ con-
densantur, & statim operculo superposito cinere in modū gypsi
temperato doliū linitur. Monēdus tamen erit, qui uasa emptu-
rus est, ne bibulas, aut male coctas ollas emat, nā utraq; res trās-
misso humore uitiat uuam. Quinetiā oportebit, cum ad usum p-
muntur ollæ, tota singula tabulata detrahi, nā cōspissata uina-
cæa, si semel mota sunt, celeriter acescunt, & uuas corrumpunt.

Mala granata quemadmodum seruentur.

Cap. XLV.

SEQVVTVR uindemiam rerum autumnalium com-
positiones, quæ & ipsæ curam uillicæ distendunt. Nec ignoro

COLVMELLAE.

plurima in hunc librum nō esse collata, quæ C. Matius diligenti-
tissime persecutus est. Illi enim propositum fuit urbanas mensas,
et lauta conuiuia instruere. Libros tres edidit, quos inscripsit no-
minibus coci, & cetarij, & salgamarij, nobis tñ abunde sunt ea,
quæ ex facili rusticæ simplicitati non magna impensa possunt con-
tingere. Vti sunt in primis omnium generum mala. Quidam, ut
à granatis incipiam, pediculos puniceos, sicuti sunt, in arborem
torquent, ne pluuijs mala rumpant, & hiantia dispereant, eaq;
ad maiores ramos religant, ut immota permaneant. deinde spar-
teis restibus arborem cludunt, ne aut cornis, aut corniabus, alijs
ue auibus pomum laceretur. Nonnulli uascula fictilia dependen-
tibus malis aptant, & illita luto paleato arboribus hæere pati-
untur. Alij sceno, uel culmo singula inuolunt, et insuper luto pa-
leato crasse linunt, atq; ita maioribus ramis illigant, ne, ut dixi-
uento commoueantur. Sed hæc omnia, ut dixi, sereno cælo admi-
nistrari sine rore debent, quæ tamen aut facienda non sunt, quia
læduntur arbusculæ, aut certe non continuis annis usurpanda,
presertim cum liceat etiam detracta arboribus eadem innoxia
custodire. Nam & sub tecto fossilæ tripedanæ siccissimo loco si-
unt, eoq; cum aliquantum terræ minutæ repositum est, insigun-
tur sambuci ramuli. deinde sereno cælo granata leguntur cum
suis pediculis, & sambuco inseruntur, quoniam sambucus tã ap-
tam, & laxam medullam habet, ut facile malorum pediculos re-
cipiat, sed cauere oportebit, ne minus quatuor digitis à terra ab-
sint, & ne inter se poma contingant. Tum factæ scrobi operculū
imponitur, & paleato luto circumlinitur, eaq; humo, quæ fuerat
gesta, superaggeretur. Hoc idem in dolio fieri potest, siue q; uo-
let resolutam terram usque ad dimidium uas elicere, seu, quod
quidam malunt fluuialem arenam ceteraq; eadem ratione per-
agere. Pænus quidem Mago præcipit aquam marinam uehemē-
ter calefieri, & in ea mala granata, lino sparto'ue illigata pau-
lum demitti, dum decolorentur, & exempta per triduum in sole
ficcari, postea loco frigido suspendi, & cum res exegerit, una no-
cte, & postero die usque in eam horam, qua fuerit utendum,
aqua frigida dulci macerari. Sed & idem auctor est creta figu-
lari bene subacta recentia mala crasse illinire, & cum argilla ex-
aruit, frigido loco suspendere. Mox cum exegerit usus, in aquā
demittere, & cretam soluere. Hæc ratio tanquam recen-

tissimum pomum custodit. Idem iubet Mago in uræo nouo scobem populneam, uel iligneam, et ita disponere, ut scobs inter se calcari possit. Deinde facto primo tabulato rursus scobem substernere, et similiter mala disponere, donec uræus impleatur, qui cum fuerit repletus, operculum imponere, et crasso luto diligenter oblinire. Omne autem pomum, quod in uetustatem reponitur, cum pediculis suis legendum est, sed, si sine arboris noxa fieri possit, etiam cum ramulis. nam ea res plurimum ad perennitatem confert. Multi cum ramulis suis arbori detrahunt, et creta figulari cum diligenter mala obruerunt, in Sole siccant. deinde siquam rimam creta facit, luto linunt, et assiccata frigido loco suspendunt.

Mala orbiculata, sestiana, melimela, et alia genera quomodo seruantur.

Cap. XLVI.

MULTI eadem ratione, qua granata, in scrobibus, uel do-
lyis seruant cydonea. Nonnulli folijs ficulneis illigant, deinde cre-
tam figularem cum amurca subigunt, et ea linunt mala, quæ
cum siccata sunt, in tabulato frigido loco, et sicco reponunt. Non
nulli hæc eadem in patinas nouas sicco gypso ita obruunt, ut al-
tera altera non contingant. Nihil tamen certius, aut melius experti
sumus, quam ut cydonea maturissima integra sine macula, et sereno
cælo decrescente Luna legantur, et in lagena noua, quæ sit pa-
tentissimi oris deterfa lanugine, quæ malis inest, componantur le-
uiter, et laxæ, ne collidi possint. deinde cum ad fauces usque fuerint
composita, uimineis surculis sic transversis arcentur, ut modicæ ma-
la comprimant, nec patiantur ea cum acceperint liquorē, subleua-
ri, tum quā optimo, et liq̄dissimo melle uas usque ad summū ita
repleatur, ut pomū submersum sit. Hæc ratio non solum ipsa mala cu-
stodit, sed et liquorem mulsei saporis præbet, qui sine noxa possit
interdum dari febriatantibus, isque uocat̃ melimeli, sed cauendū
est, ne quæ in melle custodire uolueris, immatura mala cōdantur,
quoniam cruda si lecta sunt, ita indurescant, ut usui non sint. Illud ue-
ro, quod multi faciunt, ut ea diuidant osseo cultro, et semina exi-
mant, quod putent ex eis pomū uitiari, sup̄uacuum est, sed ratio,
quā nunc docui, adeo quod certa est, ut et si uermiculus inest,
non amplius tamen corrumpantur mala, cum prædictum liquorē acce-
perint. nam ea mellis est natura, ut coerceat uitia, nec serpere ea.

patiat, quia ex causa etiam ex animi corpus hominis per annos plurimos innoxium conseruat, itaq; pnt alia genera maloru sicuti orbiculata, sestiāna, melimela, matiana hoc liquore custodi, sed quia uident in melle dulciora fieri sic condita, nec proprium saporem cōseruare, arcule sagineae, uel et tiliacae, quales sunt, in quibus uestimenta forensia condunt, huic rei paulo ampliores pparari debent, eaq; in tabulato frigidissimo, et sicissimmo loco, quo neq; fumus, neq; teter perueniat odor, collocantur. deinde substrata pdicta poma sic cōponi, ut flosculi sursum, pediculi deorsum spectent, quēadmodum et in arbore nata sunt, et ne inter se altere ab altero cōtingat. Ita obseruandū est ut unūquodq; genus separatim proprijs arculis reponatur. nā cum unā clausa sunt diuersa genera inter se discordant, et celerius uitiuntur. Propter quod etiā consensualium uinearum, non tam est firmum uinum, q̄ si per se syncerum amineum, uel apianū, aut etiā fēanum condideris. uerū sic, ut prādicti, cum diligenter mala fuerint cōposita, operculis arcularum contegantur, et luto paleato linantur opercula, ne introire spūs possit, atq; ea ipsa nōnulli sicut in alijs generibus, ut supra iam diximus, populnea quidā, etiam abiegna scobe interposita, mala custodiunt. Hec tamē poma non matura, sed acerbissima legi debent.

De conditura inule.

Cap. XLVII.

IN VLA E conditura sic fiet, cū eius radicem mēse Octobris (quo maxime matura est) ē terra erueris, aspero linteolo, uel etiā cilicio detergito qcquid arenae inhærebit. deinde acutissimo cultello summatim eradito, et quae plenior radícula fuerit, p modo crassitudinis in duas, uel plures ptes digiti lōgitudine diffinito. deinde ex aceto modice in cacabo aeneo coquito, ita ne taleolae inuri possint. Post hēc in umbra triduo siccentur, et ita in fideliam picatam recōdantur, adiecto passo, uel defruto, qd̄ super natet, spissamentoq; cinilae imposito contextum uas pelliculetur. Alia inule cōditura. Cū radices eius raseris, taleolas, ut supra factō, et in umbra triduo, uel et quatriduo ficcato. deinde siccitas in uasis sine pice, interiecta cinila coniuncto, cinila imposita, sex partibus aceti una pars sapae misceatur cum hemina salis cocti, ut hoc iure macerentur taleolae, donec quāminimū amaritudinis resipiant. Postea exemptae iteq; siccentur per dies quinq; in

umbra, tum crassamentū vini seculenti, nec minus, si sit, mulsi, et utriusq; eorū quartā partem boni defruti confundito in ollam, q̄ cum inferbuerit, taleolas inulæ adiūto, & statim ab igne remoueto, ac rudicula lignea peragitato, donec perfectæ refrigerant. Postea trāsfundito in fideliā picatam, operculo tegito, tumq; pelliculato. Tertia eiusdē inulæ conditura. Cū radículas diligenter eraseris. minute cōsāssas in muria dura macerato, donec amaritudinem dimittāt. deinde effusa muria, sorba q̄ optima & maturissima semine detractō cōtere, et cū inula misce, tū siue passum, seu q̄ optimū defrutum adiūto, & uas obturato. Quidā, cū cōdiuerunt inulā, muriaq; macerauerūt, exiccāt, et maliscydoneis tritis, q̄ in defruto, uel melle decoxerant, miscent, atq; ita supfundunt passum, uel defrutum, & uas operculatum pelliculant.

Sampsā quem admodum fiat.

Cap. XLVIII.

ACERBAM pauseā mense Septēbri, uel Octōbri, dum adhuc uindemia est, contunde, & aqua calida paululū maceratā exprime, fœniculiq; seminibus, & lentisā cum cocto sale modicæ permistā recode in fideliā, & mustum q̄ recentissimum infunde. Tum fasciculū uiridis fœniculi superpositum merge, ut oliuæ premātur, & ius superemineat. Sic curata oliua tertio die posis uti. Albā pauseā, uel orchitem, uel radiolū, uel regiā dum cōtundes, primū quāq; ne decoloretur, in frigidā muriā demerge, cuius cum tm̄ paratæ habueris, quantum satis fuerit implende amphoræ, fœniculi aridi, fasciculum substerne in imo. deinde uiridis fœniculi semina, & lentisā districta, et purgata in urceolo habeto, tū exēptā de muria oliuā exprimito, et pmistā p̄dictis seminibus in uas adiūto. deinde recētis musti duas ptes, & unā duræ muriæ pmistas adiūto cū ad fauces puenerit ius fœniculi aridi fasciculos supponito, p̄mitoq; ut infra ius mersa oliua maneat. Hac conditura cōpositis oliuis toto anno commode uteris. Quidā oliuā nō cōtundunt sed acuta arūdine infecant, idq; operosius q̄dem, sed melius est, q̄a hæc candidior est oliua, q̄ ea, q̄ ex cōtusiōe liuorem cōtrahit. Alij siue cōtunderint, siue infecuerint oliuas, modico sale cocto, & p̄dictis seminibus imiscent. deinde sapā, uel passum, uel si est facultas, mellā infundunt. Mella autē quō fiat paulo ante hoc ipso libro p̄cepimus. Cætera oīa similiter administrant. Posias oliuas, uel regias sine macula q̄candi

COLVMELLAE.

diffimas manu districtas eligito. deinde substrato fœniculo arido in amphoram cōijāto, intermistis seminibus lentisā, nec minus fœniculi, & cum ad fauces uas repleueris, adiāto muriā durā, tum spissamento factō de arūdinum folijs, oliuam premito, ut infra ius mersa sit, & iterum infundito muriā duram, dū ad summum amphoræ labrum perueniat. At hæc oliua per se parū incunda est, sed ad eas condituras, q̄ lautioribus mensis adhibent, idonea maxime est. nam cum res exigit, de amphora promitur, & contusa recipit quācūq; uolueris condituram. Pleriq; tamen sectium porrum, & rutam cum apio tenero, & mentā minute concidunt, et contusis oliuis miscent. deinde exiguum aceti piperrati, & plusculum mellis, aut mulsi adiūunt, oleoq; uiridi irrorant, atq; ita fasciculo apij uiridis cōtegitur. Quidā sic lectæ oliuæ in modios singulos ternas heminas salis permiscent, & adiectis seminibus lentisā, fœniculoq; substrato amphoram usq; ad fauces replent oliuis. deinde aceto nō acerrimo infundunt, & cū iam penē amphoram impleuerunt, fœniculi spissamento deprimunt baccam, & rursus acetum usq; ad summum labrum adiūciunt. Postea quadragesimo die omne ius defundūt, & sapæ, uel defruti tres partes cum aceti una permiscent, & amphoram replent. Est & illa probata cōpositio, ut cum muriā dura pausea alba maturuerit, omne ius defundatur, & immistis duabus partibus defruti, cum aceti una, repleatur amphora. Eadē conditura possit etiā regia cōponi, uel orchita. Quidam unam partem muriæ, & duas aceti miscēt, eoq; iure oliuas poseas colymbadas faciunt, quibus si per se quis uti uelit, satis incundas experietur, q̄ uis & hæc, cum exeunt de muriā, condituram qualemcūq; recipere possunt. Oliuæ poseæ, cum iam decolorantur, ante q̄ mitescant, cum petiolo leguntur, & in oleo q̄optimo seruantur. Hæc maxime nota etiam post annum representat uiridem saporem oliuarum. Nonnulli etiā cum de oleo exemerunt, trito sale aspersas pro nouis apponunt.

De Epityro.

Cap. XLIX.

EST & illud condituræ genus, quod in ciuitatibus græcis plerunq; usurpatur, idq; uocant epityrum, oliua pausea, uel orchita cum priniū ex albo decoloratur, sitq; luteola, sereno cælo matuū dstringitur, & in uannīs uno die sub umbra expanditur, & figui

siqui adherent pediculi, foliaq; aut furculi leguntur. postero die cribratur, & nouo fisco inclusa prælo supponitur, uehementerq; premitur, ut exudet quātulūcūq; habet amurcæ. Patimur aut nonnunquam tota nocte, & postero die pondere pressam bacam uelut exaniari, tum resolutis corticulis eximimus eam, & in singulos modios oliuæ triti salis cocti singulos sextarios ifundimus. itemq; lentisæ semen, rutæq; & fœniculi folia sub umbra siccata, quæ uti satis uidetur conisa minute, admiscemus, patimurq; horis tribus, dum aliquatenus baca salem combibat, tum supersundimus boni saporis oleum, ita ut obruat oliuam, & fœniculi aridi fasciculū deprimimus, ita ut ins supernatet. Huic autem condituræ uasa noua fictilia sine picæ præparantur, quæ ne possint oleum sorbere, tanquam oliuariæ metretæ imbuuntur liquamine, tum demum & assicantur. Sequitur autem frigus hyemis, p quod oliuitas, sicut uindemia, curam uillicæ repetit.

Nigræ oliuæ conditura.

Cap. I.

PRIVS itaq; (quoniam incohauimus) de condituris oliuæ præcipiemus, ac statim conficiendi olei rōnem subiiciemus. Pau seæ bacæ, uel orchitæ, nōnullis regionibus etiam naviæ conuiuio rum epulis præparantur. Has igitur, cum iam nigruerint, nec adhuc tamen permaturæ fuerint, sereno cælo distringere manu conuenit, lectasq; cribrare, & secernere, quæcūq; maculosæ, seu uitiosæ, minoris ue incrementi uidebunt. deinde in singulos modios oliuæ salis integri ternas heminas adijcere, & in uimineos qualos confundere superposito copioso sale, ita uti oliuas contingat, sicq; triginta dies pati consudascere, atq; omnem amurcam extillare, postea in alueum diffundere, mundaq; sponsia salem, ne permaneant, detergere, tum in uas adijcere, & sapa, uel defrutto amphorā replere superposito spissamento aridi fœniculi, quod oliuā deprimat. Pleriq; tñ tres partes defruti, aut mellis, & unā miscent aceti, aliqui duas partes, & unam aceti, & eo, quo con diunt, iure. Quidam, cū oliuam nigrā legerunt, eadē portione, qua supra, saliunt, et sic collocant in qualis, ut inustis seminibus lentisæ alterna tabulata oliuæ, & salis usq; in summum cōponunt. Deinde post quadraginta dies cum oliua quicqd habuit amurcæ exudauit, in alueū defundunt, & cribratā separant ab seminibus lentisæ, sponsiaq; detergent, nequid adhæreat salis,

Colu.

F

tum in amphoram confundunt adiecto defruto, uel sapa, uel et melle, si est copia, ceteraq; similiter faciunt. In singulos modios oliuæ singulos sextarios maturi seminis anisi, lētisq; , & ternos cyathos seminis fœniculi, si id non est, ipsum fœniculū concisum quantum satis uidebitur, adiā oportet. Deinde in singulis modijs oliuarū salis cocti, & non moliti ternas heminas admisceri, & ita in amphoris condi, easq; fasciculis fœniculi obthurari, & quotidie per terrā uolutari. deinde tertio quoq; , aut quarto die quicquid amurcæ inest mitti. Post. XL. dies in aluenum diffundi, & à sale tantūmodo separari, sic ne spongia detergeant oliuæ. sed ita ut erunt exemptæ, massulis salis mistis in amphorā cōdantur, & spissamentis impositis ad usus in cellam reponant. Maturam oliuam in statura factā colymbadem, de muria tollito, spongia tergito. deinde cāna uiridi sandito duobus, uel tribus locis, & triduo in aceto habeto, quarto die spōgia extergito, in urcē, aut cacabum nouū mittito substrato apio, & modica ruta. Concisis deinde pleno uase oliuis imitte defrutū usq; ad os. Lauri turiones in hoc usu mittito, ut oliuas deprimant, post dies uiginti utere.

Sirapa quomodo fiat.

Cap. LI.

OLIVA nigra maturissima sereno cœlo legit, eaq; sub umbra uno die in cannis porrigitur, et quæcunq; est uitiosa, baccæ separantur. Item si qui adhæserāt pediculi, adimunt, foliaq; , & surculi, quicunq; sunt intermixti, eximunt. Postero die diligenter cribrantur, ut siquid inest stercoris separet. deinde intrita oliua nouo fisco includit, & prælo subiicitur, ut tota nocte exprimat. Postero die iniicitur quāmundissimis molis suspensis, ne nucleus frangatur. Et cū est in sampsam redacta, tunc sal coctus, tritusq; manu p̄miscetur cū ceteris aridis condimentis. Hæc aut sunt, carenum, cuminum, semen fœniculi, anisum ægyptium. Sat erit aut totidē heminas salis adijcere, quot sunt modij oliuarū, & oleū superfundere, ne exarescat. Idq; fieri debet, quotiescunq; uidebit afficari. Nec dubiū est, quin optimi saporis sit, quæ ex oliua posita facta est. Ceteræ supra duos menses sapor eius nō permanet integer. Videntur autē alia genera huic rei magis esse idonea, sicut lianiæ, & culmineæ. Verūtamen habet præcipua in hos usus olea calabrica, quam quidā propter similitudinem oleastellum uocant.

Oleum quemadmodum fiat.

Cap. LII.

MEDIA est oliuitas plerūq; initium mensis Decēbris. Nam & ante hoc tempus acerbū oleum conficiat, quod uocat estiuū, & circa hunc mensem uiride premittit, deinde postea maturū. Sed acerbum oleū facere patrisfamilias rōnibus nō conducat, qm̄ exiguum fluit, nisi bacca tempestatibus in terrā decidit, & necesse ē eam sublegere, ne à domesticis pecudibus, feris uel consumat. Viridis autē notā conficere uel maxime expedit, cum & satis fluit, et pretio penē duplicat domini redditum. Sed si uasta sunt oliueta, necesse est, ut aliqua pars eorum maturo fructui reseruetur. Locus autem, in quo confici oleum debeat, etiam descriptus est priore uolumine. Pauca tamen ad rem pertinentia cōmemoranda sunt, quæ prius omiseram. Tabulatum, quo feratur olea, necessarium est, quamuis præceptum habeamus, ut uniuscuiusq; diei fructus molis, et prælo statim subiiciatur. Verū tamen quia interdum immodica multitudo bacæ torculariorum uincit laborem (si labor est) esse oportet pensile horreū, quo imponantur fructus, idq; tabulatum simile esse debet granario, & habere lacusculos tā multos, q̄ postulat modus oliuæ, ut separetur, & seorsum reponat uniuscuiusq; diei coactura. Horum lacusculorum solum lapide, uel tegulis oportet costerni, & ita decline fieri, ut celeriter omnis humor per canales, aut fistulas defluat, nam ē inimicissima oleo amurca, quæ si remansit in bacca saporem olei corrumpit. Itaque cum lacus, quemadmodum diximus, extruxeris, asserculos inter se distantes semipedalibus spatijs supra solum ponito, & cannas diligenter spisse textas inuicem, ita ut ne baccam transmittere queant, & oliuæ pondus possint sustinere. Iuxta omnes autem lacusculos, ea parte, qua defluet amurca, sub ipsis fistulis in modū fossularum concanum panimentum, uel canū lapidem esse oportebit, in quo cōsistat, et unde exhauriri possit qcqd defluerit. Præterea lacus, uel dolia p̄parata sub tecto h̄re oportebit, quæ seorsum recipiant sui cuiusq; generis amurcā, siue quæ syncera fluxerit, siue ēt quæ salē receperit, nam utraq; usibus plurimis idonea est. Oleo autē conficiendo molæ utiliores sunt, q̄ trapetū, trapetū, q̄ canalis, & solea. Molæ q̄facillimam patiuntur administrationem, qm̄ pro magnitudine bacarū uel submitti, uel ēt eleuari possunt, ne nucleus, qui saporem olei uitiat, confringatur. Rursus tra-

F ij

petum plus operis, faciliusq; q̄ solea, & canalis effiat. Est & organum erectae tribulae simile, quod tudicula vocatur, idq; nō incommode opus effiat, nisi q̄ frequenter uitiatur, & si bacae plus sculum ingesseris, impeditur. Pro conditione tñ, & regionum cōsuetudine praedictae machine exercantur, sed est optima molarū, tum ēt trapeti. Hec ante q̄ de oleo conficiendo differerem, p̄fari necesse habui. Nūc ad ipsam rem ueniendū est, q̄ multa omissa sint, quae sicut ante uindemiā, sic ante oliuitatem preparāda sunt tanq̄ lignorum copia, quae multo ante apportanda est, ne cū res desyderauerit, operae auocentur. Tum scale, corbulae, decemmodiae, trimodiae satoriae, quibus districta bacca suscipitur, fisci, furnes cānabini, & spartei, conchae ferreae, quibus depletur oleum, opercula, quibus uasa olearia cōteguntur, spongiae maiores, & minores, urcei, quibus oleum progeritur, cannae tegetes, quibus oliua exapitur, & siqua sunt alia, quae nunc memoriā meam refugiunt. Hec omnia, & multo plura esse debent, qm̄ in usu deperierunt, & pauciora sunt, quorū siquid suo tempore defuerit, opus intermittitur. Sed iam quod pollicitus sum exequar. Cū primum bacae uariare coeperint, & iam quaedā nigrae fuerint, plures tñ albae sereno cōlo manibus distringi oliuam oportebit, & substratis tegetibus, aut cannis cribrari, et purgari. Tum diligenter mādātam protinus in torcular deferri, & integram in fisanis nouis includi, praelisq; subiici, ut quantum possit paulisper exprimatur. Postea resolutis corticulis emolliri debebunt, adiectis binis sextariis integri salis in singulos modios. Et aut regulis, si consuetudo erit regionis, aut certe nouis fisanis sampsa exprimi. Quod deinde primum defluerit in rotundum labrum (nam id melius ē, q̄ plumbeum quadratum, uel structile gemellar) protinus capulātor depleat, et in fictilia labra huic usui preparata defundat. Sint autem in cella olearia tres laborum ordines, ut unus primae notae, idest primae pressurae oleum recipiat, alter secundae, tertius tertiae. Nam plurimum refert non miscere iterationem, multoq; minus tertiationem cum prima pressura, quoniam lōge melioris saporis ē, quod minore ui praeli, quasi lixiniū defluerit. Cum deinde paululum in labris primis constiterit oleū, eliquare id capulātor in secunda labra debet, & deinde in sequētia usq; ad ultima, nam quanto saepius translatione ipsa uentilatur, & quasi exercetur, tanto fit liquidius, & amurca liberatur. Sat erit

autem in singulis ordinibus tricenā cōponi labra, nisi uasta fuerint oliueta, & maiorem numerum desyderauerint. Quod si frigoribus oleum cū amurcā congelabitur, plusculo sale cocto utiq; utendū erit, ea res resoluit oleum, & separat ab omni uitio. Neq; uerendum est, ne falsum fiat, nam quantūcūq; adieceris salis, nihilo minus saporem nō recipit oleum. Solet autem ne sic quidem resolui, cum maiora frigora inceserunt, itaq; nitrum torretur, et contritum inspergitur, & cōmuscetur, ea res eliquat amurcā. Quidam, quāuis diligentes olearij bacā integrā praelo nō subiiciunt, quod existimant aliquid olei deperire, nam cum praeli pōdus acceperit, non sola exprimit amurcā, sed & aliquid secū pingitudinis attrahit. Illud autem in totū præcipiendum habeo, ut neq; fumus, neq; fuligo quādiu uiride oleum confiatur, in torcular admittatur, aut in cellam oleariā, nā est utraq; res inimica huic rei, peritissimiq; olearij uix patiuntur ad unam lucernā opus fieri. Quapropter ad eum statum cœli & torcular, & cella olearia cōstituenda est, qui maxime à frigidis uentis auersus est, quoniam minime uapor ignis desyderatur. Dolia autem, & serice, in quibus oleum reponitur, non tātum eo tpe curāda sunt, cum fructus necessitas cogit, sed ubi fuerint à mercatore uacuata confestim uillica debet adhibere curam, ut siquæ feces, aut amurcæ in fundis uasorum subsederint, statim emundentur, & non calidissima lixivia, ne uasa ceram remittant, sed semel, atq; iterum eluentur. deinde aqua tepida leuiter manibus defricentur, & sepius eluantur, atq; ita spongia omnis humor assicetur. Sunt q̄ cretam figularem in modum liquidæ fecis aqua resoluant, & cū uasa lauerint, hoc quasi iure intrinsecus oblinant, & patiantur arescere. Postea cum res exigit, pura eluunt aqua, nonnulli prius amurcā, deinde aqua uasa perluunt, & assiccant, tum consyderant nunqd ceram nouam dolia desyderēt, nam ferè sexta quaq; oliuitate cerari oportere antiqui dixerunt, quod fieri posse nō intelligo. Nam quemadmodum noua uasa si calefiant, liquidā ceram facile recipiant, sic uetera non crediderim propter olei succū ceraturam pati. Quam tamen & ipsam ceraturam nostrorum temporum agricolæ repudiauērunt, existimaueruntq; satius esse noua dolia liquida gummi perluere, siccataq; suffumigare alba cera, ne pallorem capiant. Eamq; suffitionem semper faciendā indicant quotiescūq; uel noua, uel uetera uasa curantur, et oleo

COLVMELLAE.

nouo præparantur. Multi cum semel noua dolia, uel serias crassa gummi linerunt, una in perpetuum gummitione contenti sunt. Et sanè quæ semel oleum testa combibit, alteram gummitiõnem non recipit. Respuit enim olei pinguitudo talem materiam, qualis est gummis. Post mensem Decembrem circa Calendas Ianuarias eadem ratione, qua superius, distringenda erit olea, & statim exprimenda, nam si reposita in tabulatum fuerit, celeriter coalescet, quoniam hyemalibus pluuijs amurcæ plus concipit quæ est contraria huic rei. Cauendum est itaq; ne ex ea fiat oleum cibarium, quod uno modo uitari poterit, si proutinus illata de agrobacca commolita, & expressa erit, quæ sic administrata fuerit, ut supra diximus. Pleriq; agricolarum crediderunt, si sub tecto bacca deponatur, oleum in tabulato crescere, quod tam falsum est, quod in area frumenta crescere, idq; mendacium uetus ille Porcius Cato sic refellit. Ait enim in tabulato corrugari oliuam, minoremq; fieri. Propter quod cum facti unius mensurâ rusticus sub tecto reposituerit, & post multos dies eam molere uoluerit, oblitus prioris mensuræ, quam intulerat, ex alio acerno similiter seposito quantũ cuiq; mensuræ defuit supplet. Eoq; facto uidetur plus olei geta, quàm recens bacca reddere, cum longe plures modios acceperit. At tñ si id maxime uerũ esset, nihilo minus ex portio uirdis olei plusq; multitudine mali contrahitur, quod & Cato dixit. Et sic quidem quicquid ponderis, aut mensuræ oleo accedit, si portionem uelis in factum adiectæ bacce computare, non prouentum, sed detrimentum senties. Quapropter dubitare non debemus lectam oliuam, primo quoq; tempore commolere, præloq; subijcere. Nec ignoro etiam cibarium oleum esse faciendum. Nam ubi exesa uermiculis oliua decidit, uel tempestatibus, & pluuijs in lutum defluxit, ad præsidium aquæ calidæ decurritur, abenumq; calefieri debet, ut immunde bacce eluantur. Sed id non feruentissima fieri oportet. uerum modicè calida, quo commodior gustus olei fiat, nam si excoctus est, etiam uermiculorum, cæterarumq; immunditiarum saporem trahit. Sed cum fuerit oliua elota, reliqua, sicut supra præcepimus, fieri debebunt. Fiscis autem non iisdem improbum & cibarium oleum premi oportebit. Nam ueteres ad caducam oliuam, noui autem ordinario aptari oleo, semperq; cum expresserint facta, statim feruentissima debent aqua, bis aut ter elui. dein de, si sit profluens, impositis lapidibus, ut pōdere pressi detineant

tur inmergi, uel si nec flumen est, in lacu aut piscina quam puris-
sime aquae macerari, & postea uirgis uerberari, ut sordes, faecesque
decidant, & iterum elui, siccarique.

De oleo gleuano.

Cap. LIII.

QVAMVIS non erat huius temporis olei gleuani compositio, tamen huic parti uoluminis reseruata est, ne parum opportune
uini conditionibus interponeretur. Hac autem ratione confici de-
bet. Vas olearium quam maximum, & aut nouum, aut certe bene
solidum preparari oportet. deinde per uindemiā musti quā opti-
mi generis, & quā recentissimi sextarios sexaginta cum olei pondo
octoginta in id confundi, tum aromata non cribrata, sed ne minu-
te quidem contusa, uerū leuiter confracta in reticulum iuncinum,
aut lineum aduici, & ita cum saxi pondusculo in olei, atque musti
partem demitti. Sint autem istae portionibus pensatae, quas infra subi-
imus, calami, schœni, cardamomi, xilobalsami, corticis de pal-
ma, foenigræci uetere uino macerati, & postea siccati, atque et tor-
refacti, iunci radices, tum et iridis græcæ, nec minus anisi ægyptij
pari pondere, idest uniuscuiusque libram, & quadrantem, ut su-
pra diximus, reticulo inclusa demittito, & metretam linito, post
septimum diem aut nonum per se metretæ siquid fecis, aut spuritiæ
faucibus inhaerebit, manu eximito, & detergito. deinde oleum eli-
quato, nouisque uasis recondito, mox reticulū eximito, & aroma-
ta in pila quamundissime contundito, tritaque in eandem metretam
reponito, & tantundem olei quantum prius, infundito, & obthura-
to, in sole ponito. Post septimum diem oleum depleto, & quod reli-
quum est musti picato cado recodito, nam id si non exhauseris me-
dicamentum, dabitur potandum imbecillis bubus, & cætero pecori.

Oleum ad unguenta quæ admodum facias. Cap. LIIII.

OLEVM autem secundarium non insuauis odoris quotidianam
unctionem præbere poterit dolore neruorum laborantibus, ante
quam oliua nigrescat, cum primum decolorari cœperit, nec tamen adhuc
uaria fuerit, maxime lianiam, si erit, si minus, regiam, si nec hæc fue-
rit, tunc culminiā bacam manu stringito, & statim purgatam plo
integrā subiūcto, & amurcā exprimito. deinde suspensa mola oli-
uam frangito, eamque uel in regulas, uel in nouo fisco adiūcto, subie-
ctamque plo sic premito, ne uasa intorqueas, sed tamen ipsius pli potere

E iij

COLVMELLAE.

quantulūcūq; exprimi patiaris. deinde cum sic fluxerit, ptinus capulator amurca separare, & diligēter seorsum in noua labra trāsferre debet. Cū postea fuerit exp̄ssum, reliquū eius olei qđ eli quat poterit ad escā uel cū alia nota mīstū, uel p se approbari.

De falsura suillae carnis.

Cap. LV.

HACTENVS de oleo abunde diximus, nunc ad minora redeamus. omne pecus, & praeipue suem pridie q̄ occidatur, portione prohiberi oportet, quo sit caro ficior. nā si biberit, plus humoris falsura habebit. Ergo sitientem cum occideris, bene exossato. nam ea res minus uitiosam, & magis durabilem falsuram facit. deinde cum exossaueris, cocto sale, nec nimium minuto, sed suspensa mola infracto diligenter salito, et maxime in eas partes, quibus ossa relicta sunt, largum salem infarcto, compositisq; supra tabulatum tergoribus, aut frustis uasta pondera imposito, ut exanietur. Tertio die pondera remoueto, & manibus diligēter falsurā fricato, eāq; cum uoles reponere, minuto, & trito sale aspergito, atq; ita reposito, nec desieris eius quotidie falsurā fricare, donec matura sit. Quod si serenitas fuerit ijs diebus, quibus perfricatur caro, patieris eam sale conspersam esse nouem diebus. At si nubilum, aut pluuia, undecima, uel duodecima die ad lacum falsuram deferri oportebit, & salem prius excuti, deinde aqua dulci diligenter perlui, necubi sal inhereat, & paululum assiccata in carnario suspendi, quo modicus fumus perueniat, qui siquid humoris adhuc continetur, ficcare eum possit. Hae falsura luna decrescēte maxime per brumam, sed et mense Februario, ante Idus comode fiet. Est & alia falsura, quae et locis calidis omni tempore anni potest usurpari, quae talis est. Cum ab aqua pridie sues prohibiti sunt, postero die macantur, & uel aqua candente, uel extenuibus lignis flammula facta glabrantur (nā utroq; modo pilii detrabuntur) caro in libraria frusta conciditur. deinde in seriā substernitur sal coctum, sed modice (ut supra diximus) infractū. deinde ossula carnis spisse componuntur, & alternis sal ingeritur, sed cum ad fauces seriā peruenitum est, sale reliqua pars repletur, et impositis ponderibus in uas comprimitur, eaq; caro semper conseruatur, & tanq̄ salsamentum in muria sua permanet.

Rapa, & napos quemadmodum condias.

Cap. LVI.

RAPORVM quamrotundissima sumito, eaq; si sunt lutoſa, detergito, & summam cutem nouacula decerpito. deinde (ſicut conſueuerunt Salgamarij) decuſſatim ferramento lunato inadiſto. Sed caueto, ne uſq; ad inum prædas rapum. Tum ſalem inter inſuras raporum non nimium minutum aſpergito, et rapa in alueo, aut ſeria cõponito, & ſale pluſculo aſperſa triduo ſinito, dum exudent. Poſt tertiam diem mediam fibram rapi gultaſto, ſi reæperit ſalem. Deinde cum uidebitur ſatis reæpiſſe, exemptis omnibus, ſingula ſuo ſibi iure eluito. Vel ſi non multum liquoris fuerit, muriam duram adiũcto, & ita eluito, et poſtea in quadratam aſtam uimineam, quæ neq; ſpiſſe, ſolide tñ, & craſſis uiminibus contexta ſit, rapa componito. deinde ſic aptatam tabulam ſuperponito, ut uſq; ad fundum, ſi res exigat, intra aſtam deprimi poſſit. Cum aut eam tabulam ſic aptaueris, graui pondera ſuperponito, & ſinito nocte tota, & uno die ſiccari. Tum in dolio picato ſictili, uel in uitreo componito, & ſic inſundito ſinapi & aceto, ut a iure contegantur. Napi quoq; ſed integri, ſi minuti ſunt, maiores aut inſecti, eodem iure, quo rapa condiſi poſſunt. Sed curadum eſt, ut hæc utraq; anuſum, aut cymam faciant, dum ſunt tenera, cõponantur. Napos maturos integros, aut rursus amplos in tres, aut quattuor partes diuiſos in uas coniũcto, & aceto inſundito, ſalis quoq; cocti unũ ſextarium in congiũ aceti adiũcto, poſt trigeſimum diẽ uti poteris.

Sinapim quemadmodum facias. Cap. LVII.

SEMEN ſinapis diligẽter purgato, et cribrato. deinde aqua frigida eluito, & cum fuerit bene lotum, duabus horis in aqua ſinito, poſtea tollito, et manibus expreſſum in mortariũ nouum, aut bene emundatum coniũcto, et piſtillis conterito, cum contritum fuerit, totam intritam ad medium mortarium contrahito, & comprimito manu plana. deinde cum compreſſeris, ſcarificato, et impositis paucis carbonibus uiuis aquam nitratam ſuffundito, ut omnem amaritudinem eius, & pallorẽ exaniet, deinde ſtatim mortarium erigito, ut omnis humor eliquetur. Poſt hoc album acre acetum adiũcto, et piſtillo permisceto, colatoq;. Hoc ius ad rapa condienda optime facit. Cæterum ſi uelis ad uſum conuiuiorum præparare, cum exaniueris ſinapi, nucleos pineos quamrecentiſſimos, & amylum adiũcto, diligenterq; conterito

COLVMELLAE.

infuso aceto. Cetera, ut supra dixi, facito. Hoc sinapi ad embam
mata non solum idoneo, sed etiam specioso uteris, nam est candor
ris eximij, si sit curiose factum.

Oleris atri, & fiseris radicem quēadmodū condias. Ca. LVIII.

PRIVS q̄ olus atrum coliculum agat, radicem eius exerito
mense Ianuario, uel etiam Februario, & diligēter defricato, ne
quid terreni habeat, & in aceto, & sale composito. deinde post
diem trigessimū eximito, & corticem eius delibratum abijcto.
Ceterum medullam eius concisam in fideliam uitream, uel nouā
fictilem coniuncto, & adiuncto ius, quod sicut infrascriptum est fie
ri debebit. Sumito mentam, & uiam passam, & exiguan cepā
aridam, eamq; cum torrido farre & exiguo melle subterito. Quae
cum fuerit bene trita, sapae, uel defruti duas partes, & aceti unā
permisceto, atq; ita in eandem fideliam confundito, eamq; oper
culo contectam pelliculato. Cum deinde uti uoles, cum suo iure
concisas radicales promittis, & oleum adiuncto. Hoc ipso tempore
fiseris radicem ~~mentam~~ eadem ratione, qua supra condire, sed cū
exegit ~~ius~~, eximes de fidelia, & oxymelli, cum exiguo oleo su
perfunde.

Moretum oxyporum, uel ut alij, oxygarum quemadmodum cō
ponas. Cap. LIX.

ADDITO in mortarium satureiam, mētā, rutā, corian
druū, apium, porrum sectiuum, aut si non erit, uiridem cepam,
folia lactucae, folia eruce, thymum uiride, uel nepetam, tum etiā
uiride puleium, & caseum recentem, et falsum, ea omnia pariter
conterito, acetiq; piperati exiguum permisceto. Hanc misturā cū
in catillo composueris, oleum superfundito. Cum uiridia, quae
supra dicta sunt, contriueris, nuces inglandes purgatas quātum
satis uidebitur, inserito, acetiq; piperati exiguum permisceto, &
oleum infundito. Sesamum leuiter torrefactum cum ijs uiridibus,
quae supra dicta sunt, conterito. Item aceti piperati exiguum per
misceto, cui supra oleum superfundito. Caseum gallicum, uel cui
iuscūq; nota uolueris minutatim concidito, & conterito, nu
cleosq; pineos, si eorū copia fuerit, si minus, nuces auellanas tor
refactas adempta cute, uel amygdalas aequae supra condimenta
pariter misceto, acetiq; piperati exiguum adiuncto, & permisce

to, compositumq; oleo superfundito. Si condimenta uiridia non erunt, puleium aridum, uel thymum, uel origanum, aut aridam satireiam cum caseo conterito, acetumq; piperatum, & oleū adiūcto. Possunt tamen hæc arida, si reliquorum non sit potestas, etiā singula caseo misceri. Piperis albi si sit, si minus, nigri uncia tres apud seminis uncia duæ, laseris radialis quod σίλφιον græci uocant, se scundiam, casei sextantem. Hæc confusa & cribrata melli permisceto, & in olla noua seruato. deinde cum exegerit usus, quantulūcūq; ex eo uidebitur aceto, & garo diluito. Ligustici unciam, passæ uuæ detractis uinacis sextantem, piperis albi, uel nigri quadrantem. Hæc, si maiorem impensam uitabis, possunt melli admisceri, & ita seruari. At si pretiosius oxyporum facere uoles, hæc eadem cum superiore compositione miscabis, & ita in usum repones, quod si etiam cum laser non habueris pro silphio, mellis adijcies pondo semundiam.

CLAVSVLA M peracti operis mei Publi Siluine nō alienum puto indicem lecturis, si modo fuerint, q. dignentur ista cognoscere, nihil dubitasse me penè infinita eē, quæ potuerint huic inseri materie, uerum ea, quæ maxime uidebantur necessaria, memoria tradenda censuisse, nec tamen animis, natura dedit cunctarum rerum prudentiam, nam etiam quicūq; sunt habitus mortaliū sapientissimi, multa fuisse dicuntur, non omnia.

FINIS.

LVCII IVN. MOD. COLUMELLAE LI

ber de arboribus Qui cum tertius eius de rustica libroge
haberetur, tum ex ipsius Columellae uerbis ut patet
præfatiõe octauī Libri, tum alijs argumentis,
temere in alienum locum irrupisse depre/
hensus est, neque inter illos
annumerandus.

De uitiario faciēdo.

Cap. I.

q VONIAM de cultu agrorū abunde pri/
mo uolumine præcepisse uidemur, non intem/
pestina erit arborū, uirgultorumq; cura, quæ
uel maxima pars habetur rei rusticæ. Placet
igitur, sicuti Virgilio, nobis quoque duo esse
genera surculorum, quorum alterum sua spō/
te gignitur, alterum cura mortalium proce/
dit. Illud, quod non ope humana puenit, materiæ est magis ap/
tum, hoc, cui labor adhibetur, idoneum fructibus, unū hoc itaq;
præcipuum est, atque id ipsum genus tripartito diuiditur, nā ex
surculo uel arbor procedit, ut olea ficus, uel frutex, ut rose arun/
dines, uel tertium quiddam, quod neq; arborem, neq; fruticem p/
prie dixerimus, sicuti est uitis. Arborum, & fruticum docebimus
cultum, si prius de uitibus præceperimus. Qui uineam uel arbu/
stum constituere uolet, seminaria prius facere debebit, sic. n. sciet
cuius generis uitem positurus sit, nam quæ pretio parata dispo/
nitur, certam generositatis fidem non habet, quoniam dubium
est, an is, qui uendidit, legendis seminibus adhibuerit diligentiā,
tum ēt quod ex longinquo petitur, parum familiariter nostro so/
lo uenit, propter quod difficilins conualescat alienū exteræ regio/
nis. Optimū est itaq; eodē agro, quo uitē dispositurus es, uel cer/
te uicino facere seminariū, idq; multū refert loci natura. Nam si
colles uineis, uel arbuſtis occupaturus es, providendū est, ut sicis
fimo loco fiat seminariū, & iā quasi ab incunabilis uitis exiguo
assuescat humori, aliter cū trāstuleris de humido ī aridū locū, ui/
duata pristino alimēto deficiet, at si cāpestres, et uliginosos agros
possidebis, pderit quoq; seminariū simili loco facere, et uitē lar/
go cōsuescere humori, nāq; exilis, cū in aquosum agrū trāsfertur

utcuq; patrescit, ipsum autem agrum, quem seminario destinaueris planum, & succosum, sat erit bipalio uertere, quod uocant rustia sextertium, ea repastinatio altitudinis habet plus sesquiped, minus tamen q̄ duos pedes. Eiusmodi bipalio, iugerum agri uertitur operis quinquaginta. Collem autem, & cliuum modū iugeri continentem, si ne minus duobus pedibus alte repastinabis operis sexaginta, uel si eodem loco, quo uineam ordinaturus es, facere uoles seminarium, tribus pedibus alter repastinabis iugerum operis octoginta, ita tamē si neq; lapis, neq; tophus, aut alia materia difficilior interuenerit, quæ res quot opas absumat, parum certum est. Nos autem de terreno loquimur.

Qualia semina, & quando legas.

Cap. II.

PERACTA repastinatiōe, mense Februario, uel prima parte Martij semina legito, sunt autem optima, quæ de uitis notatis leguntur. Nā cui cordi est bona seminaria facere, circa uindemiam uites, quæ & magnum, & incorruptum fructū ad maturitatem perduxerint, rubrica cū aceto (ne pluuijs abluat) permixta denotat, nec hoc uno tantūmodo anno facit, sed cōtinuis tribus, uel pluribus uindemijs easdem uites inspicit, an perseuerent esse fecundæ. Sic. n. manifestum est generositate uitium, nō anni ubertate fructum puenire. Si compluribus uindemijs eundem tenorem seruarint ex eiusmodi uitis lecta semina multū, bonumq; uinum præbunt, nāq; qualiscunq; generis uinæ, quæ incorruptæ ad maturitatem proueniunt, longe melioris saporis uinum faciunt, q̄ quæ præripiuntur æstu, aut alia de causa.

Quēadmodū semina eligas, & de habitu terræ. Cap. III.

SEMINA autem eligito grandi acino, tenui folliculo, paucis minutisq; uinaceis, dulci sapore. Optima habentur à lumbis. secunda ab humeris. tertia summa in uite lecta, quæ celerrime comprehendunt, & sunt feraciora, sed & quæcelerrime senescunt. Pampinaria sarmenta deponi non placet, quia sterilia sunt. Locis pinguibus, & planis, & humidis præcoques uites serito raris acinis, brenibus nodis imbecillas, nā talī generi uitium eiusmodi ager aptus est. Locis aridis, & macris, & siccis uitē sere natura feracem, & ualidā, crebrisq; acinis, quod si pingui agro ualidas uites deposueris, pampinis magis eluxuriabunt, & qualēcunq;

COLVMELLAE.

fructum tulerint, ad maturitatem non perducent. Rursus imbel-
 illæ exili agro celeriter deficient, exiguumq; fructum dabunt.
 Vnūquodq; genus uitium separatim serito, ita suo quodq; tem-
 pore putabis, & uindemiabis. Semina nouella cum uetere sar-
 mento deposita cito cōprehēdunt, et ualenter crescunt, sed celeri-
 ter senescūt, at q̄ uetere sarmēto pangunt, tardius cōualescūt,
 sed tardius deficiunt, semina quārecentissima terræ mandare con-
 uenit. Si tamen mora interuenerit, quo minus statim serantur,
 quādiligentissime obrui tota oportet eo loco, unde neq; pluias,
 neq; uentos sentire possint, plantaria facito ab exoriente, & à de-
 cima Luna, & à uigesima. Hæc melior est uitibus satio, sed cū se-
 ris, frigidus uentos uitato. Malleolum sic deponito, uirgam mal-
 leolarem non amplius, q̄ sex gemmarum esse conuenit, ita tamē
 si breuia internodia habeat, eius imā partem, quam in terrā de-
 missurus es, acutissima falce iuxta nodum, sic ne gemmā lēdas,
 rotunda plaga amputato, & statim fimo bubulo linito, tum in
 terram bene pastinatam, & stercorata rectum sarmentū defi-
 gito, ita ne minus quatuor gēme abscondantur. Pedale quoquo-
 uersus spatium sat erit inter semina relinqui. Cū cōprehēderint,
 identidem pampinentur, ne plura sarmenta q̄ debent, enutriāt.
 Itē q̄ sepiissime fodiantur, ferro ne tangātur. Vigesimo & quar-
 to mense resecentur, post trigessimū & sextum mensem transferā-
 tur. In agro requieto uineā ponito, nam ubi uinea fuerit, quod
 citius decimo anno seueris, ægrius cōprehendet, nec unq̄ roborā-
 bitur. Agrū ante q̄ uineis obseras, explorato, qualis saporis sit,
 talem. n. etiam gustus uini præbebit. Sapor aut̄ (sicuti primo do-
 cuimus uolumine) cōprehendetur, si terram aqua diluas, & cū
 colaueris, tum demū aquā degustes. Aptissima uitibus terra est
 arenosa, sub qua consistit dulcis humor, probus cōsimilis ager cui
 subest tophus. Aequē utilis cōgesta, & mota terra. Sabulū quo-
 q; cui subest dulcis argilla, uitibus conuenit. Omnis aut̄ qui per
 æstatē finditur ager, uitibus, arboribusq; inutilis, terra inferior
 alit uitem, et arbore superior custodit. Saxa summa parte terræ,
 & uites, & arbores lēdunt, ima parte refrigerant, & mediocrī
 raritudine optima est uitibus terra. Sed ea, q̄ trāsmittit imbres,
 aut rursus in summo diu retinet, uitanda est. Vtilissima est autē
 superior modicē rara, circa radices densa. Mōtibus, clinisq; diffi-
 culter uineæ cōualescunt, sed firmū, probumq; saporem uini præ-

bent. Humidis, & planis locis robustissimæ, sed infirmi saporis uinum, nec perenne faciunt. Et quoniã de seminibus, atq; habitu soli præcepimus, nunc de genere uinearũ disputabimus.

De generibus uinearum.

Cap. IIII.

VITES maxime gaudent arboribus, quia naturaliter in sublimine procedunt, tum & materias ampliores creant, & fructum equaliter percoquunt. Hoc genus uitium arbusrium uocamus, de quo pluribus suo loco dicemus. Vinearum autem ferè genera in usũ tria sunt, ingata, humi proiecta, & deinde tertia, quæ est à terra subrecta, more arborum se consistens. Id genus comparatum ingatæ quadam parte deficitur, quadam superat. Ingata plus aeris recipit, & altius fructum fert, & equalius cõcoquit, sed difficalior est eius cultus. At hæc ita constituta est, ut et arari possit, eoq; ubertatem maiorem consequitur, quod sæpius, & minore impensa excolitur. At quæ protinus in terram proiecta est, multum sed nõ bonæ notæ uinum facit. Vineæ optime repastinata agro reponitur. Nonnunquam tamen uel melius quibusdam locis, sulcis cõmittitur. Interdum etiam scrobibus deponitur, sed, ut dixi, repastinabitur ingerum in altitudinem pedum triũ operis octoginta. Sulcum autem terrenum pedum duorum altum, & longum septuaginta, una opera effodit. Scrobes ternarios, id est quoquoersus pedum triũ una opa facit XVIII. Vel sicuti cordi est laxius uites ponere, scrobes quaternarios, id est quoquoersus pedum quaternum una opera. XII. facit. Vel bipedancos quoquoersus una opera. XX. effodit. Curandum autem est, ut locis aridis, & cliuosis altius uites deponantur, quàm si humidis, & planis. Item si scrobibus, aut sulcis uineam posituri erimus, optimum erit ante annum scrobes, uel sulcos facere. Vineæ, quæ angustissime conferitur, quoquoersus quinque pedum spatio interposito ponitur, laxius uero inter pedes. VII. uel VIII. Sed quæ rarissime (ut et facile arari possit) inter denos pedes constituitur. Hæc positio uinearum modum sine dubio agri maiorem occupat, sed ualentissima, & fructuosissima est. Cũ semina depones inum scrobem, uel sulcum bidentibus fodito, mollemq; reddito. Vitẽ, quã ponis, fac ut ad orientẽ spectet adminiculo religata. In imo scrobe lapides, circa podo quinq; ita ponito ne uicẽ p̃māt,

COLVMELLAE.

sed tamen iuxta radices sint. Præterea post hæc vineæ hæmi-
nam uivæ albæ in nigra, uivæ nigræ in alba ponito, atq; ita scro-
bem, uel sulcum cum stercorata terra ad medium completo. Tri-
ennio deinde proximo paulatim scrobem, uel sulcum usq; in sum-
mum completo, sic uites consuescent radices deorsum agere. Spa-
tium autem radiibus, qua repant, lapides præbent, & hyeme
aquam repellunt, æstate humorem præbent vineæ, quæ et ra-
dices agere cogunt. Quoniam præcepimus quemadmodum ui-
tes ponendæ sint, nunc culturam earum docebimus.

Quemadmodum uites coli debeant.

Cap. V.

VINEAM nouellam omnes gemmas agere finito, simul atq;
pampinus instar quatuor digitorum erit, tum demum pampina-
to, & duas materias relinquito, alteram, quam uitis constituen-
dæ causa submittas, alteram subsidio habeas, si forte illa ordina-
ria interierit, hanc rustici custodem uocant. proximo deinde an-
no, cum putabis uitem, meliorem unam uirgam relinquito, tertio
anno uitæ, in quâ formam uoles, dum tenera est, cõponito. Si in-
gatam erimus facturi, unâ materiam submittito, ita ut duas gẽ-
mas, quæ sunt proximæ à terra, falce acuta radas, ne possint ger-
minare, deinde tres sequentes relinquas, reliquâ partem uirgæ am-
putes. Sin autem uitem in se cõsistere uoles, sicuti arbori brachia
submitti patieris, & dabis operam, ut in orbem quam rectissime
formetur. Nam præterquod quod speciem habet sic composita, tum
etiam minus laborat, cum undiq; uelut æquilibrio stabilita in
se requiescit. Sat erit autem, cum primo brachia submittentur,
singulas gẽmas singulis sarmētis relinq, ne p̄tinus onere grauet̃.
Post hanc putationem lectis sarmētis, bidentibus alte & equali-
ter uineam fodito, uel si ita late disposita erit, arato. Ab idibus
Octobr. ablaqueare incipito, ante brumam ablaqueatam habe-
to. Per brumam uitem ne colito, nisi si uoles eas radices quæ in
ablaqueatione apparebunt, persequi, tum demum optime ampu-
tabis, sed ita ne codicem lēdas, sed potius instar digiti unius à
matre relinquas, & ita radicem reseces. Nam quæ propius ab-
raditur, præterquam quod uulnus uiti præbet, eoq; nocet, tum et
de ipsa cicatrice plures radices prorepunt. Itaque optimum est
exiguam partem relinqui, atq; ita summas partes, quas æstinas
rustici appellant, rescare, quæ sic resectæ inolescunt, nec ultra ui-
tibus

tibus obsunt. Possunt etiam soboles per brumam cædi eo magis
 quod frigoribus extirpatæ minus recreantur. Peraçta ablaquea-
 tione ante brumam tertio quoq; anno macerati stercore, ne mi-
 nus sextarijs binis ad radices uitiû posuisse conueniet, præterquã
 columbinum, quo siquid amplius, q̃ herminam posueris, uiti no-
 æbit. Post brumã deinde ante æquinoctium uernũ, quod ē octa-
 uo Cal. Aprilis, ablaqueationē adæquato. Post idus Aprilis ter-
 ram ad uitem aggerato, æstate deinde q̃ potes sæpissime occato.
 Ingerum uineæ quinq; operis ablaqueat, quinq; foditur, tribus
 occatur. Ingerum ualentis, & iã constitutæ uineæ quatuor opis
 putatur, sex alligatur. Arbusto nihil eiusmodi potest apte finiri,
 quoniã inæqualitas arborũ non patitur operis iusta comprehēdi.
 Quibusdam placet uitem proximo anno translata nō puta-
 re, sequenti deinde anno purgare, & unam uirgam, quam sub-
 mittamus, ad tertiam gemmam rescare, tertio deinde, si uitis re-
 cte conualuerit, una plus gēma submittere, quarto duas gēmas p-
 ximæ putationi adijcere, atq; ita qnto demũ anno uitē ingare.
 Hunc eundē ordinem culturæ nos quoq; expti comprobauimus.

De rescanda uinea uetere, & propaganda. Cap. VI.

VETEREM uineam si in summo radices habebit, rescare
 nolito, alioquin etiam nouella uinea, quæ ex resectione enata fue-
 rit, uim inutilem habebit, summa parte terræ natantibus radici-
 bus, quamobrem neq; fructum uberē pericipies, & nihilo minus
 æliter consenescet. Eiusmodi itaq; uinea, si non aridos in corpo-
 re habet truncos, & flecti potest, factis sulcis optime sternis, atq;
 ita renouellatur. Sin autem eo usq; exaruit, ut curuari nō possit,
 primo año summam, ita ne radices eruas, aut lēdas, ablaquea-
 to, & sterco ad radices addito, atq; ita putato, ut paucas, et cer-
 tas materias relinquant, & fodias diligēter, & sæpius pampines,
 ne omnino superuacua sarmenta nutriat. Sic exulta firmas, &
 longas materias creabit, quas sequenti anno scrobibus inter ordi-
 nes factis propagabis, ac deinde per triennium post diuin conua-
 lescent sæpius fodies, matremq; ipsam enecabis, nihil in posterum
 prospiciens ei, quam sublaturus es. In postremum annum matrē
 radiatus tolles, atq; ita nouellam uineam ordinabis. Sin autem
 uetus uinea dūtaxat generis boni radices in alto fitas habebit,
 ita ut ablaqueatæ non conspiciantur, eam uineam circa Calen.

Colu.

G

COLVMELLAE.

Martias ante q̄ resces ablaqueato, & protinus cum alte ablaqueaueris, resecatō. Quatuor digitos ab radiabus trūcum relinquito, & si fieri poterit, iuxta aliquem nodum ferrula defecato, & plagam acutissimo ferro deleuato, deinde minutam terram mediocriter stercoratam ita superponito, ut adobruito trunco ne minus tres digiti terræ super plaga sint. Hoc iccirco ne sole inarescat, & ut melius materias det ex percepto humore, quem terra præbet. At quæ mali generis, & infructuosa uinea est, summāsque partes et muādas, et exesas habet, si radices eius satis alte posite sunt, optime inferet, ita ut ablaq̄ata, et nudata pars ima secūdu terrā sic amputet, ne cū aggerata fuerit, supra terram extet.

De propagatione.

Cap. VII.

PROPAGATIONVM genera tria sunt ī usu maxime. unum, quo uirga edita à matre sulco committitur. alterum, quo ipsa mater prosternitur, atq; in plures palos per suas uirgas diuidit. Tertium, quo uitis scinditur in duas, uel tres partes, si diuersis ordinibus diducenda est. Hoc genus tardissime conualescit, quia uitis diuisa medullam amittit. Et quoniam genera proposuimus, unūquodq; qualiter faciendum sit, demonstramus. Virgam cum à matre in terram deprimere uoles, scrobē quoquo uersus quatuor pedum facito ita, ut propago non ledatur alterius radiabus. Deinde quatuor gemmas, quæ in inum scrobem perueniant, relinquito, ut ex ijs radices citentur, reliquam partem, quæ continens matri est, abradito, ne superuacua sarmenta procreet. Diuersæ autem, quæ supra terram extare debent, ne passus fueris plus, q̄ duas, aut ut maxime tres gēmas habere. Reliquas, quæ in terram abscondūtur, exceptis quatuor imis, fac abradas, ne in summo radices uitis citet. Hoc modo ppagata celeriter conualescet, & tertio anno à matre separabitur. Sin autem ipsam uitē sternere uoles, iuxta radicem ita, ne ipsam ledas, curiose fodito, et uitē ita supplantato, ne radicem abrumpas. Cum eam straueris, et uideris quousq; possit pertingere, sulcum facies unū, in quem uitē integrā demittas. deinde ex eo sulco, quasi ramos fossarum facies, per quos uti quæq; uirga postulauerit, propagetur, atque ita terra adoperies. Sin autem uitis exiguam materiē habebit, & in diuersos ordines diducenda erit, neq; aliter potuerit palos, ad quos perducatur, pertingere, q̄ ut diffluet, curabis,

ut quam acutissima falce ab ea parte, qua bifurca est, findas, et eodem ferro acuto plagam emendes, sicubi inæqualiter findi uidebitur, sic diducta poterit in plures ordines diuidi. Non inutilis est etiam illa propagatio, quam nos reperimus, si quando in ordinem uitis deest, neque est tam proœra uirga, quæ cum in imum scrobem demissa fuerit, retorqueri, et erigi supra terram possit. Breuitatem ne reformidaueris, sed qualēcūq; uirgam, cuius cacumen in imum scrobem puenit, deprimito, et obruito. deinde gemmas, quæ secundum ipsam matrem sunt, submittito, ut materias à superiore parte atent. Tum demum post triennium à matre amputato, et ad suum palum eam partem, quam à matre præcideris, reduito, et caput uitis facto. Propaginis scrobem ne minus triennio paulatim completo, summas radices prædito, crebro fodito.

De insitionibus fructuosis, quæ uites fecundas faciunt.

Cap. VIII.

CUM uitem inserere uoles, optimi generis sarmenta fructuaria tum, cum gemmas agere incipient, uento austro à matre prædito. Sarmentum, quod inseris, de summa uite sit rotundum, bonis, crebrisq; nodis. Tres deinde nodos integerrimos relinquito infra tertiam gemmam ex utraq; parte duorum digitorum spatium in modum cunei tenuissime scalpello acuto, ita ne medullam lædas, adradito. Vitem deinde, quam insiturus es, resecato, et plagam leuato, atq; ita findito, et paratos furculos in fissuram demittito, eatenus qua adrasa sunt, ita ut cortex furculi corticem uitis æqualiter contingat, quicquid inserueris uiti diligenter libro ligato, atq; luto paleato bene subactō oblinito, operitoq; plagam, et ita alligato, ne aqua, uentus ne penetrare possit. deinde supra lutum, muscum imponito, et ita deligato, ea res præbet humorem, nec iarescere finit. Infra insitionem, et alligaturam falce acuta leuiter uitam uulnerato ex utraq; parte, ut ex his potius plagis humor defluat, quam ex insitione ipsa abundet, nocet. n. nimius humor, nec patitur furculos insertos comprehendere. Quibusdam antiquorū terebrari uitam placet, atq; ita leuiter adrasos furculos demitti. Sed nos meliore ratione hoc idem fecimus, nam antiqua terebra scrobem facit, et per hoc urit eam partem, quam perforat, perusta autem perraro unquam comprehendit insertos furculos. Nos rursus terebram, quam gallicam dicimus, huic insitioni aptauimus, ea excavat, nec urit, quod non scro-

COLVMELLAE.

bem, sed ramenta facit. Itaque cauatum foramen cum purgauerimus, undiq; ad rasos surculos inserimus, atque ita circūlinimus. Talis insitio facillime conualescit. Igitur secundum æquinoctium perfectam uitium insitionem habeto, humida loca, de uua alba, sicca, de nigra inserito. Infructuosas uites fecundas sic facito. Vites, quæ exiguum dant fructum, aceto acri cum cinere rigato, ipsumq; codicem eodem cinere linito. At si quæ fructum quem ostendunt, ad maturitatem nō perducunt, sed prius q̄ mitescāt uuæ, inarescunt, hoc modo emendabuntur, cū scipiones amplitudinē aëni habuerint, radicē tenuis uitē prædito, plagā acri aceto pariter, ac lotio ueteri permista terra linito, eodemq; radices rigato, sepe fodito. Hæc materias citant, uuæq; succum perferunt.

Vt uua complura genera aënorū habeat. Cap. IX.

EST ETIAM genus insitionis, quod uuas tales creat, in quibus uarij generis, colorisq; reperiuntur aëni. Hoc autē ratione tali efficitur. Quatuor, uel quinque, siue etiam plures uoles, uirgas diuersi generis sumito, easq; diligenter, & æqualiter compositas colligato, deinde in tubulum fictilem, uel cornu arcte inserito, ita ut aliquantum extent ab utraq; parte, easq; partes, q̄ extabunt resolutio, in scrobem deinde imposito, & terra stercoreata obruito, & rigato, donec gemmas agant. Cum inter se uirgæ cohæserint, post biennium, aut triennium, facta iam unitate dissolues tubulum, & circa medium ferè crus, ubi maxime uidebuntur coisse, uitem serra prædito, & plagam leuato, terramq; minutam aggerato, ita ut tribus digitis alte plagam operiat, ex eo codicē cum egerit coles duos optimos submittito, reliquos deijcito, sic uuæ nascentur, quales proposuimus. Vt autem uuæ sine uinaceis nascantur, malleolum scandito, ita ne gemmæ ledātur, medullamq; omnem eradito, tum demum in se compositum colligato, sic ne gemmas allidas, atq; ita terra stercoreata deponito, et rigato, cum coles agere cœperit, sepe & alte refodito. Adulta uitis tales uuas sine uinaceis creabit.

Vindemiam quomodo putes. Cap. X.

VINDEMIA Facta statim putare incipito ferramētis quā optimis, et acutissimis, ita plagæ leues fient, neq; in uite aqua consistere poterit, quæ simulatq; immorata est, corrumpit uitē, uer-

mesq; & alia creat animalia, quæ materiã exedunt, plagas aut rotundas facto, nã celerius cicatricem ducunt. Sarmenta lata, uetera, male nata, contorta, omnia hæc prædido, nouella, & fructuaria, & interdum sobolem idoneam, si iam superficies parum ualebit, submitto, brachiaq; conseruato, quã celerrime poteris putationem perficito, arida & uetera, falæ quæ amputari non possunt, acuta dolabra abradito. In agro macro, & sicco uineam imbecillam à bruma amputato, quã partem non deputaueris, circa Cal. Feb. repetito. ab idibus Decemb. ad idus Ianuarias ferro tangi uitem, & arborem nõ cõuenit. Cum uicẽ putabis, inter duas gemmas secato, nã si iuxta ipsam gemmam secueris, laborabit, nec materiã citabit. Cicatrix aut semper deorsum spectet, ita neq; aqua, neq; sole laborabit, humoremq; recte capiet, in agro crasso, ualidaq; uinea plures gẽmas, & palmas relinquito, in exili pauciores. Si ubi in uite brachium desyderabis, falæ acuta semel, aut bis eo loco alte instar digiti mucrone ferito. Brachium quãuis longum caue totũ tollas, nisi totũ aruerit. Vineã nouellã ante brumã ablaqueatam habeto, ut oēs imbres, limiq; cõcipiat. Vites arboresq; quo citius ablaqueaueris, erũt ualentiores. Sed quæcũq; in cliuis erũt positæ, ita ablaqueadæ sũt ut à superiore parte secundũ codicem lacusculi fiant, ab inferiore aut puluinuli altiores exantent, quo plus aquæ, limiq; cõtineant. Vineã uetus neq; ablaqueadã eẽ, ne radices, quas in summo hẽt, inarescãt, neq; arãda, ne radices abrũpanẽ. Bidentibus sepe, et alte fodito equaliter, et stercore, uel palea conspergito solũ ante brumã, uel cũ circũ ipsam uitẽ sũmatim ablaqueaueris, stercorato.

De Pampinatione.

Cap. XI.

VINEAM Quã bene putare, tam diligenter pampinare utile est, nã & materiæ, quæ fructũ habent, melius conualescũt, & putatio sequentis anni expeditius, tum eẽ uitis minus cicatri cosa fit, quoniam quod uiride, & tenerum decerpitur, protinus conualescit. Super hæc quoq; melius uinẽ maturescunt. Ante dies decem, q̃ uinea florere incipit, pampinatam habeto. Quicquid supernacui enatum fuerit, tollito, quod in cacumine, aut in brachijs natũ erit, decerpito, dũtaxat quæ uiam nõ habebunt. Cacumina uirgarum, ne luxurient, demutilato. Vinas, quæ meridie, aut occidentẽ spectabũt, ne purant suo sibi pampino tegito.

G iij

COLVMELLAE.

De fossura.

Cap. XII.

SIMV Latque uua uariari cœperit, fodito tertiam fossuram, & cū iam maturescet, ante meridiem prius q̄ calere incipiet, & cum desierit, post meridiem fodito, pulueremq; excitato, ea res & à sole, & à nebula maxime uuam defendit. Lutulentam terram neq; arare, neq; fodere oportet, quia ualde durescit, & finditur. Bidentibus terram uertere utilius est, q̄ aratro. Bidens equaliter totam terram uertit, aratrum præterquam quod scamna faciat, tum etiam boues, qui arant, aliquantulum uirgarum, & interdū totas uites frangunt. Finis autem fodiendi uineam nullus est, nam quanto sæpius foderis, tanto uberiores fructum repies.

Ne rubigo uineam uexet.

Cap. XIII.

PALEARVM acernos inter ordines uerno tpe positos habeto in uinea. Cū frigus contra t̄pis consuetudinem intellexeris, oēs acernos incendito, ita fumus nebulā, & rubiginē remouebit.

Ne formica uitem ascendat.

Cap. XIII.

LVPINVM terito, & cū fratribus miscto, eoq; imam uitē linea circumlinito, uel bitumen cum oleo coquito, eo quoq; imas uites tangito, formicæ non excedent.

Ne forices, aut uolucra uitem lædat.

Cap. XV.

VITES, quæ secundum ædificia sunt, à foricibus, aut muribus infestantur. Id ne fiat plenam Lunam obseruabimus, cum erit in signo Leonis, uel Scorpionis, uel Sagittarij, uel Tauri, & notu ad Lunam putabimus. Genus est animalis, uolucra appellantur, id serè prærodit teneros adhuc pampinos, & uuas, quod ne fiat, falces, quibus uineā putaueris, peracta putatione sanguine urfino linito, uel si pellem fibri habueris, in ipsa putatione quoties falcē acueris, ea pelle adiem detergito, atq; ita putare incipito. Quoniam de uineis abūde diximus, de arbustis præpiamus.

De arbustis.

Cap. XVI.

VITEM maxime opulus alit, deinde ulmus, deinde fraxinus. Opulus quoniam frondem nō idoneam habet, à plerisq; improbat. Ulmus autē, quam atiniam uocant rustici, generosissima

est, & letissima, multamq; frondem habet, eaq; maxime serenda est locis pinguibus, uel etiam mediocribus, sed si aspera, & siticula loca arboribus obserenda erunt, neq; opulus, neq; ulmus tã idoneæ sunt, q̃ orni, eæ syluestres fraxini sunt paulo latioribus tñ folijs, q̃ ceteræ fraxini, nec deteriore frondem, q̃ ulmi præstant. Capræ quidem, & oues libentius etiam hanc frondem appetunt. Igitur qui arbusum constituere uolent, ante annum q̃ deponat arbores, scrobes faciant quatuor pedum quoquoersus, deinde circa Calen. Martias, in eandem scrobem ulmum, & opulum, uel fraxinum deponant, ut si ulmus defecerit, opulus, uel fraxinus locum obtineant, si autem utraque uixerint, altera eximatur, & alio loco deponatur. Arbusum inter quadragenos pedes dispositum esse conuenit, sic enim & ipsæ arbores, & appositæ uites melius conualescent, fructumq; meliorem dabunt. Segetes etiã, quæ in eo erunt, minus umbra laborabunt. Arborem, quam deposueris, sæpius circumfodito, quo celerius adolescat, & citra triennium ferro ne tetigeris. Completis sex & triginta mensibus ad recipiendam uitem formabis, & supernacuos ramos amputabis, alterna brachia in modum scalarum relinquens, alternisq; annis, sexto anno, si iam firma uidebitur, maritabis hoc modo. Ab ipso arboris crure pedale spatium intermittito, deinde sulcum in quatuor pedes longum, in tres altum, in dupondium & semissem latum cum feceris, pati minime duobus mensibus eum tempestatibus uerberari, tum demum circa Calen. Martias uitem, de seminario, ne minorem quidem decem pedum sternito, & admiculato, arboriq; iungito, eam proximo anno ne putaueris, tertio uero ad unam uirgam redigito, paucasq; gemmas relinquitto, ne ante q̃ inualuerit, in altitudinem repat. deinde ubi amplius incrementum habuerit, p̃ omnia arboris tabulata disponito eius materias, ita tamen ne uitem oneres, sed certa, & robustissima flagella submittas, arbusuinam uitem q̃ putare, tam alligare diligenter oportet, nam in ea fructus maxime uis consistit, diutiusq; perennat, quæ firmis toris & idoneis locis religata est, itaq; omnibus annis conuenit subsequi putationem, ita ut tori renouentur, & uitis per idoneos ramos disponatur.

De Olinetis.

Cap. XVII.

G iij

OLEA Maxime collibus ficis, & argillofis gaudet, at humi-
dis campis, et pinguibus letas frondes sine fructu affert. Melius
autem truncis q̄ plantis oliuetum cōstituitur. Magoni autē pla-
cet ficis locis oliuam, aut mox post æquinoctiū feri, aut ante bru-
mam. Nostræ ætatis agricolæ serè uernum tempus circa Calen-
Maias seruant. Oportet autem scrobē oleæ quoquoersus pedes
quaternos patere, in inum scrobem lapidem glareāq; abicere,
deinde insuper, terram quatuor digitorum inijcere, tum arbus-
culam deponere ita rectā, ut, quod à scrobe extiterit, in mediū
sit, arbusculam autem à tēpestatibus tueri diligenter oportet ad-
miniculando, & terræ, quæ in scrobe reponitur, stercora immi-
scendo. Oleam decet inter sexagenos pedes disponi, ut spatium
in latitudinem crescendi habeat, nā quæ in proceritatem exten-
duntur, euandæ sunt, parumq; fructus ferunt. Optima est olea
liquiniana, pausiā secunda oleo, escæ orchis. Sunt & regiæ, & ra-
dij, quæ neq; specie, neq; oleo sunt tam grata, q̄, quas supra dixi-
mus. Si oleam posueris eo loco, unde quercus effossa est, moriet̃,
ideo quod uermes quidam sunt, qui in radice quercus nascuntur,
& educantur, iſq; maxime semina oleæ consumunt. Si in olea
unus ramus aliquanto cæteris latior est, nisi eum recideris, arbor
tota fiet retorrída. Omnes arbusculas prius q̄ transferantur, ru-
brica notare conuenit, ut cum serentur, easdem cœli partes aspi-
ciant, quas etiam in seminario conspexerant, alioquin frigore,
uel calore laborabunt ab ijs partibus, quas præter cōsuetudinem
sub alio tractu expositas habuerint.

De pomario constituendo.

Cap. XVIII.

PRIVS QVAM pomarium constituas, quàm magnū ha-
bere uoles circummunito maceria, aut fossa, ita ut non solum per-
cori, sed ne homini quidem trāsitus sit, nisi per ostium, dum ado-
lescant semina, nam si prius cacumina manu perfracta, aut à pe-
core prærofa fuerint q̄ adolescant, in perpetuum corrumpuntur.
Generatim autem arbores disponere utilius, maxime ne imbecil-
læ à ualentioribus premantur, quæ nec uiribus, nec magnitudine
sunt pares, neq; pariter crescunt. Terra quæ nitibus apta est, eas-
dem quoq; utilis est arboribus.

De scrobibus faciendis.

Cap. XIX.

ANTE Annum, q̄ pomaria disponere uoles, scrobes fodito, ita sole, pluuiaq; macerabuntur, & quod posueris cito comprehendet. Sed si quo anno scrobes feceris etiam semina ponere uoles, minimum ante duos menses fodito scrobes, postea stramentis eos completo, & incēdito. Quo latiores, potentioresq; scrobes feceris, eo latiores erunt, uberioresq; fructus. Scrobs clibano similis esse debet, imus quā summus patentior, ut laxius radices euagetur, ac minus frigoris hyeme, minusq; aestate uaporis per angustum os terrae admittant. Tum etiā clinosis loci terra, quae in eū congesta est, pluuijs non abluatur. Arbores paribus interuallis serito, ut cum creuerint, spatium habeant, quo ramos extendant, nā si spisse posueris, neq; infra quicq; serere poteris, nec sic ipsae fructuosae erunt, nisi eas interraseris. Itaq; placet inter ordines quadragenos pedes, minimumq; tricenos relinqui uersuris.

Quomodo semina legas.

Cap. XX.

SEMINA lege, ne minus crassa, q̄ manubrium est bidentis, recta, leuia, procera, sine ulceribus, integro libro. Ea bene, & celeriter cōprehendunt. Semina si ex arboribus sumes, de ijs potissimum sumito, quae oībus annis bonos, et uberes ferunt fructus. Obseruabis autē ab humeris, q̄ sunt contra solem orientem, ut eosdē decerpas. Si cū radice plantā posueris, incrementum eius futurū quod & ceteris, quas seueris, arboribus. Arbos insita fructuosior est, q̄ quae insita non est, idest q̄ quae cum ramis, aut plantis ponitur. Prius q̄ arbusculas transferas rubricā, uel alia qualibet resignato, ut ijsdem uentis, quibus ante steterunt, constituas eas, curamq; adhibeto, ut ab superiore, & ficciore, & exiliore in planiore humidiorē, pinguiorē agrum trāsferas. Semina trifurcā maxime ponito. ea extēt supra terrā tribus pedibus. In eodē scrobe, si duas, aut tres arbusculas ponere uoles, curato ne inter se cōtingant, nā ita uermibus interimuntur. Cū semina depones, dextra, ac sinistrali singulis, usq; in imū scrobē fasciculos sarmētorū brachij humani crassitudine deponito, ita ut supra terram paululū extent, per quos aestate paruo labore aquam radicibus subministres. Arbores, aut radicata semina autūno serito circa Idus Octob. Tales, & ramos uere, ante q̄ germinare arbores incipiant, deponito. Sed ne tineae molesta sit seminibus ficulneis, in imum scrobem taleam lentisci, ita ut acumen eius deorsum spectet, obruito.

Quando ficus serenda sit.

Cap. XXI.

FICVM frigoribus ne serito. Loca aprica, calculosa, glareosa interdum & saxosa amat. Eiusmodi agro cito conualescit, si scrobes amplos, & idoneos feceris. Ficorum genera etiam si sapore, & habitu differunt, tamen uno modo, sed dispari differētia agri seruntur. Locis frigidis, & autumnii temporibus aquosis, præcoques serito, ut ante pluuiam fructum deligas. Locis calidis hybernas serotinas serito. At si uoles ficum quamuis non natura seram facere, cum grossuli minuti erunt, fructum decutito. Iterum alterum edet fructum, & in hyemem seram differet maturitatem. Nō nunquam etiā, cum frondere cœperint arbores, cacumina sic acutissimo ferramento summa amputare prodest. Sic firmiores arbores, & feraciores fiunt. Semper proderit simul ac folia agere cœperit ficus, rubricam amurcae diluere, & cum stercore humano ad radicem infundere, ea res efficit uberiores fructum, et sardum si a speciosius, & plenius.

De nucē serenda.

Cap. XXII.

NUCEM græcam serito arcturi signo, uel circa Calen. Feb. quæ pruinam nescit. Agrum calidum, durum, & siccum desyderat, nam in locis diuersis natura, eiusmodi si posueris nucē, protinus putrescet. Ante quā nucē deponas, in aqua mulsā, nec nimis dulci macerato, ita iucundioris saporis fructum, cum adoleuerit, præbebit, & interim melius, atque celerius nascetur. Ternas nucs in trigonum statuito, parsque acutior inferior sit, quia inde radices mittit, nuxque à nucē minime palmo absit, & anceps ad fauoniu spectet. Omnis nux unam radicem mittit, & simplici stylo prorepit. Cum ad scrobis solum radix peruenit, duritia humi coarctata recuratur, & extensa in modum ramorum alias radices emittit. Nucē græcam, & auellanam tarentinam hoc modo facere poteris. In quo scrobe destinaueris nucē in serere, terram minutam in modum semipedis ponito, ibique semen ferulæ repangito. Cum ferula fuerit enata, eam findito, et in medullam eius sine putamine nucē græcam, uel auellanam abscondito, et ita adobruito, hoc ante Cal. Martias facito, uel etiam inter nonas, & Idus Martias. Hoc eodem tempore inglandem, & pineam, et castaneam serere oportet.

De malo punico ferendo.

Cap. XXIII.

MALVM punicum uere usq; in Calen. Apriles recte feritur. Quod si acidum, aut minus dulcem fructum feret, hoc mō emē dabit. Stercore suillo, & humano, & lotio humano ueteri radices rigato, ea res & fertilē arborē reddet, & primitiuos ānos fructum uinosum, postea uero ēt dulcem, & apyrenū facit. Nos exiguum admodū laser cyrenaicū uino diluimus, et ita cacumina arboris summa oblenimus, ea res emēdauit acorem malorū. Mala punica ne rumpant in arbore, remedio sunt lapides tres, si cū seres arborem, ad radicē ipsam collocaueris. At si iam arborē satam habueris, scyllam secundū radices arboris serito. Alio modo cum iam matura mala fuerint, ante q̄ rumpantur, pediculos, qbus pendent, intorqueto. Eo modo seruabuntur etiam anno toto.

De Pyro.

Cap. XXIIII.

PYROS autūno ante brumam serito, ita ut minime dies quæ & uiginti ad brumam supersint, quæ ut sint feraces, cū iam adoleuerint, alte ablaqueato, & iuxta ipsam radicem truncum findito, & in fissuram cinereum pineum tedæ adijcto, & ibi relinquito, deinde obruta ablaqueatione, cinerem supra terrā spargito.

De malis ferendis.

Cap. XXV.

MALA æstina cydonea, sorba, pruna, post mediā hyemē usq; in Idus Feb. serito. Moræ ab idibus Feb. usq; in ægnoctiū uernū recte seres. Siliquā græcā quā qdam κερύτιον uocāt, deinde pscum ante brumā per autūnum serito. Amygdala, si parū feracia erunt, ī pforatā arborem, lapidē adigito. Ita librū arboris inole scere finito. Omnium aut generum ramos circa Cal. Mar. in hortis, ubi, & subacta & stercoreata terra est, p puluinos arearū disponere conuenit. deinde cū creuerint, danda est opa, ut dū teneros ramulos habent, ueluti pampinent, et ad unū stylum primo āno semina redigant, & cū autumnus inæsserit, ante q̄ frigus cacumina adurat, oīa folia decerpere expediet, et ita crassis arundinibus, quæ ab una parte nodos integros habent, quasi pileolos induere, atq; ita à frigore, et gelidijs teneras adhuc uirgas tueari. Post quartū & uigesimū deinde mēsem, siue trāsferre, et disponere in ordinē uoles, seu inserere, satis tutō utrunq; facies.

OMNIS furculus omni arbori inferi potest, si non est ei, cui inferitur, dissimilis cortice, si uero fructum et eodem tpe fert, sine ullo scrupulo optime inferitur. Tria aut genera insitionum anti qui tradiderunt. Vnum, quod resecta, et fissa arbore recipit infer tos furculos. alterum, quod resecta inter librum, et materiem ad mittit semina, quae utraq; genera uerni temporis sunt. Tertium, quod ipsas gemmas, cum exiguo cortice in partem sui delibratam re cipit, quam uocant agricolae emplastrationem. Hoc genus aesta tis est, quarum insitionum rationem cum tradiderimus, à nobis quoque repertam aliam docebimus. Omnes arbores simulatque gemmas age re coeperint, Luna crescente inferito, oliuam autem circa equino ctium uernum usque in Idus Aprilis. Ex qua arbore inferere uoles, et furculos ad insitionem sumpturus es, uideto ut sit tenera, et fe rax, nodisque crebris. Et cum primum germina tumbent de ramu lis anniculis, qui solis ortum spectabunt, et integri erunt, eos le gito. Crassitudine minimi digiti furculi sint bisulci. Arborē, quā inferere uoles, ferra diligenter exeat ea parte, quae maxime ni tida, et sine cicatrice est, dabisque operam, ne librum ledas. Cum deinde truncum recideris, acuto ferramento plagam leuato. de inde cuneum ferreum, uel osseum inter corticem, et materiem, ne minus digitos tres, sed leniter demittito, ne ledas, aut rumpas cor ticem. Postea furculos, quos inferere uoles, falce acuta ab una par te eradito tam alte quam cuneum demisisti, sed ita ne medullam, neue alterius partis corticem ledas. Vbi furculos paratos habue ris, cuneum uellito, statimque furculos demittito in ea foramina, quae cuneo adacti inter corticem, et materiem facta sunt. Ea au tem sine, qua adraferis, furculos demittito ita, ut sex digitis de arbore extent. In una autem arbore duos, aut tres ramulos figi to, dum ne minus quaternum digitorum inter eos sit spatium. Pro arboris magnitudine, et corticis bonitate haec facito. Cum omnes furculos, quos arbor patietur, demiseris, libro ulmi, uel uimine ar borem adstringito, postea paleato luto bene subacto oblinito tota plagam, et spatium, quod est inter furculos usque eo, ut duobus digitis insita extent, supra lutum muscum imponito, et ita alligato, ne pluuia dilabatur. Si pusillam arborē inferere uoles, iuxta terram absindito, ita ut sexpedem à terra extet. Cum deinde absideris,

plagam diligenter leuato, & mediū truncum acuto scalpro modo dice findito, ita ut fissura trium digitorum sit. In eam deinde cuneum quoad patietur, inserito, & furculos ex utraq; parte adraffos demittito, ita ut librum seminis libro arboris equalē facias, cum furculos diligenter aptaueris, cuneū uellito deinde arbore, ut supra dixi, alligato, & oblinito, dein terrā circa arborem aggerato usq; ad ipsum insitum. ea res à uento, & calore maxime tuebitur. Tertium genus insitionis, cum sit subtilissimum, non oī generi idoneum est, & ferè eae recipiunt talem insitionē, quae humidum, succosumq; & ualidum librum habent, sicuti ficus, nā & lactis plurimum remittit, & corticem robustam habet, optime itaq; ea inseritur tali ratioe. Ex qua arbore inferere uoles, in ea quæsito nouellos, & nitidos ramos. in his deinde obseruato gemmam, quae bene apparebit, certamq; spem germinis habebit, eā duobus digitis quadratis circūsignato, ut media gemma sit, & ita acuto scalpello circūadito, delibratoq; diligenter, ne gemmam lēdas. deinde ex qua arbore inferere uoles, in ea nitidissimum rammum eligito, & eiusdē spatij corticem circūadito, & materiē delibrato, & in eā partem, quā nudaueras, gemmā hāc, quam ex altera arbore sumpseras, aptato ita, ut emplastrum circūasē parti conueniat, ubi hēc feceris, circa gemmam bene uināto, ita ne lēdas. deinde cōmissuras, & uincula luto oblinito spatio relicto, qua gemma libere germinet. Materia, quam insēueris, si foliolem, uel superiores ramos habebit, omnia praeādito, neqd sit, quo possit succus euocari, aut cui magis, quā īsito seruiat. Post unum & uigesimum diem soluito emplastrum. Hoc genere etiā optime olea inseritur. Quartum illud genus insitiōis iam docuimus, cum de uitibus disputauimus, itaq; superuacūū est hoc loco repetere iam traditam rationem terebrationis.

Quod omnium generū furculi, omnibus arboribus inferi possit.

Cap. XXVII.

SED cum antiqui negauerint posse omne genus furculorū in oēm arborem inferi, & illā quasi finitionem, qua nos paulo ante uisum sumus, ueluti quandā legem sanxerint, eos tñ furculos posse coalescere, qui sint cortice, ac libro, & fructu cōsimiles ijs aboribus, qbus inserunt, existinauimus errorē huius opinionis discerniendum, tradendāq; posteris rōnem, qua possit omne genus fur-

COLVMELLAE.

culi, omni generi arboris inferi, quod ne longiori exordio legētes fatigemur, unum quasi exemplum subiiciemus, qua similitudine qsq; quod genus uolet omni arbori poterit inferere. Scrobē quoquoquersus pedum quatuor ab arbore oliuæ tam longe fodito, ut extremi rami oleæ possint eam contingere, in scrobem deinde si cū arbusculam deponito, diligentiamq; adhibeto, ut robusta, & nitida fiat. Post triennium, aut quinquēnium, cum iam satis amplum incrementum ceperit, ramum oliuæ, qui uidebitur nitidissimus deflece, & ad crus arboris ficulneæ religa, atq; ita amputatis cæteris ramulis, ea tantum cacumina, quæ inferere uoles, relinquito, tum arborem sic detruncato, plagamq; leuato, & mediam cuneo findito. Cacumina deinde oliuæ sicuti matri inhærent, utraq; parte adradito, & ita fissuræ sic aptato, cuneumq; eximito, & diligenter colligato, nequa ui reuellantur. Sic interposito triennio coalescet ficus oliuæ, & tum demum quarto año, cum bene coierint, uelut propagines ramulos oliuæ à matre rescabis. Hoc modo omne genus in omnem arborem inferitur.

De cythiso.

Cap. XXVIII.

CYTHISVM in agro quamplurimum habere expedit, qđ gallinis, apibus, ouibus, capris quoq; & omni generi pecudum utilissimus est, quod ex eo cito pinguescit, & lactis plurimum præbet ouibus, tum etiam quod octo mensibus uiridi eo pabulo uti, & postea arido possis. Præterea in quolibet agro, quamuis maxime celeriter comprehendit, omnemq; iniuriam sine noxa patitur. Mulieres quidem, si lactis inopia premuntur, cythisum aridum in aquam macerari oportet, cum tota nocte præmaduerit, postero die expressi sucā ternas heminas præmisceri modico uino, atq; ita potandum dari, sic & ipse ualebunt, & pueri abundantia lactis confirmabuntur. Satio autem cythisi uel autumnno circa Idus Octob. uel uere fieri potest. Cum terram bene subegeris, in modum horti areas facto, ibiq; uelut ocymum semen cythisi autumnno serito, plantas deinde uere disponito, ut inter se quoquoquersus quatuor pedum spatio distent. Si semen non habueris, cacumina cythisi forum uere disponito. Stercoratam terram circa aggerato, si pluuia non inæsserit, rigato. XV. proximis diebus, simulac nonam frondem agere ceperit, sarrito. Post triennium deinde cedito, et pecori præbeto. Equo abunde est uiridis pondo. XV. boni pondo.

XX. ceterisq; pecudibus pro portione uirium. Potest autem etiā circa Septembrē ramis feri. Aridum si dabis, exiguum dato, quoniam maiores uires habet, priusq; aqua macerato, & exemptum paleis permisceto. Cythisum, quod aridum facere uoles, circa mēsem Septembris, cum semē eius grandescere incipiet, cedito, paucis deinde horis, dum flaccescat, in sole habeto. deinde in umbra adficcato, & ita condito.

De Salicē, & genista, & arundine. Cap. XXIX.

SALICEM, & genistam crescente luna uere circa Calen. Mar. serito. Salix humida loca desyderat, genista ēt sicca, utraq; tamen circa uineam opportune serūtur, quoniam palmitibus idonea præbent uincula. Arūdo optime seritur, quos alij bulbos, alij oculos uocant. Simulatq; terram bipalio repastinaueris, radicem arundinis acuta falce præsectam impendenti pluuiā disponito. Sunt qui arundines integras sternant, quoniam ex omnibus nodis satē arūdines emittunt, sed serē hoc genus euaniidā, exilemq; & humilem arundinem affert. Melior itaq; satio ē ea, quam prius demonstrauimus. Placet autem omnibus annis simulac arūdinem cecideris, locum alte, & equaliter fodere, atq; ita rigare.

De Viola, & Rosa.

Cap. XXX.

VIOLAM qui facturus est, terram stercoratam, & repastinatam minimum alte pedem in puluinos redigat. Atq; ita plantatas hornotinas scrobiculis pedibus factis ante Cal. Mar. dispositas habeat. Semen autem uiolæ sicut olerū in areis duobus temporibus seritur, uere uel autumno. Colitur autem eo modo, quo & cetera olera, ut runcetur, ut sarriatur, ut interdum etiam rigetur. Rosam fruticibus, ac surculis disponi per sulculos pedales conuenit per idem tempus, quo & uiola. Sed omnibus annis fodiendi ante Calen. Mart. & interpretari oportet. Hoc modo culta multis annis perennat.

FINIS.

TITVLI LIBRI PRIMI.

De præceptis rei rusticæ. Ti. I.	De corte. T. XXII.
De quatuor rebus, quibus agri/ cultura cōsistit. T. II.	De auarijs. T. XXIII.
De aeris pbatōe. T. III.	De colūbarijs. T. XXIIII.
De aqua pbanda. T. IIII.	De turturario. T. XXV.
De qualitate terrarū. T. V.	De turdis. T. XXVI.
De industria, & necessarijs ad rura sentētijs. T. VI.	De gallinis. T. XXVII.
De agri electione, & situ. T. VII.	De paunibus. T. XXVIII.
De edificio. T. VIII.	De phasianis. T. XXIX.
De hybernis, & æstiuis māsiō/ nibus, et panimētis. T. IX.	De anseribus. T. XXX.
De calæ, et arena. T. X.	De pisānis. T. XXXI.
De latericijs parieti/ bus. T. XI.	De fœnili paleario, et ligna/ rio. T. XXXII.
De lumine, & altitudi/ ne. T. XII.	De sterquilinio. T. XXXIII.
De cameris cānicijs. T. XIII.	De locis horti, & pomarij, & sepibus, & ferendi tempo/ re. T. XXXIIII.
De ope albario. T. XIII.	De remedijs horti, uel agri. T. XXXV.
De tectorijs. T. XV.	De area. T. XXXVI.
De uitanda ualle, q̄ pp aquas diligi solet. T. XVI.	De apiū castris. T. XXXVII.
De cisternis, & maltha frigi/ daria. T. XVII.	De uasculis apium forman/ dis. T. XXXVIII.
De cella uinaria. T. XVIII.	De apibus emen/ dis. T. XXXIX.
De horreo. T. XIX.	De balneis. T. XL.
De olei factorio. T. XX.	De malthis calidaria, & frigi/ daria. T. XLI.
De stabulis equorum, & bourn. T. XXI.	De pistrino. T. XLII.
	De instrumentis agre/ stium. T. XLIII.

263

PALLADII RVTILII TAVRI
AEMILIANI VIRI ILLV
STRIS DE RE RVSTICA
LIBER PRIMVS.

De præceptis rei rusticæ.

Titulus. I.

PARS EST prima prudentiæ ipsam, cui præcepturus es, æstimare personā. Neq; enim formator agricolæ debet artibus, & eloquentia rhetores æmulari, quod pleriq; fecere, quidum diserte rusticis loquuntur, affecti sunt, ut eorum doctrina nec à disertissimis qdem possit intelligi. Sed nos recidamus præfatiōis moram, ne, quos reprehendimus, imitemur. Dicendum autē nobis est (si diuina fauerint) de omni agricultura, et pascuis, et edificijs rusticis, secundū fabricandi magistros, eorumq; inuentionibus, & omni genere corū, quæ uel facere, uel nutrire oportet agricolam rōne uoluptatis, et usus fructus, suis tñ temporibus p uniuersa distinctis sanē in primis hoc seruare constitui, ut eo mense, quo ponenda sunt singula, cum sua omni exequar disciplina.

De quatuor rebus, quibus agricultura consistit.

T. II.

PRIMO igitur eligendi, et bene colendi agri ratio quatuor rebus cōstat aere, aqua, terra, industria. Ex his tria naturalia, unum facultatis, & uoluntatis. Naturæ est, quod in primis spectare oportet, ut eis locis, quæ colere destinabis, aer sit salutaris, & clemēs, aqua salubris, & facilis, uel ibi nascens, uel adducta, uel imbre collecta, terra uero fœcunda, & situ commoda.

De aeris probatione.

T. III.

AERIS igitur salubritatem declarant loca ab infimis uallibus libera, & nebularum noctibus absoluta, & habitatorū cōsiderata corpuscula, si eis color sanus, capitis firma synceritas, in offensum lumen oculorum, purus auditus, et si fauces cōmeatum liquidæ uocis exercent. Hoc genere benignitas aeris approbat. His autem contraria noxium cœli illius spiritum consententur.

De aqua probanda.

T. IIII.

Pallad.

H

AQVAE uero salubritas sic agnosatur. Primum ne à lacu-
nis, aut palude ducatur, ne de metallis originem sumat, sed sit p-
spicui coloris, neq; ullo aut sapore, aut odore uitiatur, nullus illi
limus insidat, frigus tepore suo mulceat, æstatis incendia suo ri-
gore moderetur. Sed quia solet his omnibus ad speciem custoditis
occultiorē noxam tectior seruare natura, ipsam quoq; ex incola-
rum salubritate noscamus, si fauces bibentium puræ sunt, si saluo
capite, in pulmonibus, ac thorace aut nulla est, aut rara causa-
tio. Nam plerūq; has noxas corporis ad inferiorem partem quæ
supra sunt corrupta demittūt ut uitiato capite ad pulmones, uel
stomachum morbi cā decurrat, tunc culpandus aer potius inue-
nitur. Deinde si uēter, aut uiscera, uel latera, uel renes nullo do-
lore, aut inflatiōe uexentur, si uitia nulla uesicæ sunt. Hæc, atq;
his similia si apud incolas pro maiori parte constare uideris, nec
de aere aliquid, nec de fontibus suspiceris.

De qualitate terrarum.

T. V.

IN Terris uero quæreda fœcunditas. Ne alba, & nuda sit gle-
ba, ne macer sabulo sine admistione terreni, ne creta sola, ne areæ
ne squallentes, ne ieiuna glarea, ne aurosi pulueris lapidosa ma-
cies, ne falsa, uel amara, ne uliginosa terra, ne tofus arenosus, atq;
ieiunus, ne uallis nimis opaca, & solida. Sed gleba putris, & fe-
rè nigra, et ad tegendam se graminis sui crate sufficiens, aut mi-
sti coloris, quæ & si rara sit, tñ pinguis soli adiunctione glutine-
tur. Quæ protulerit nec scabra sint, nec retorrída, nec succi natu-
ralis egentia ferat. Quod frumentis dandis utile signū est, ebu-
lum, iuncum, calamum, gramen, trifolium non macrum, rubos pin-
gues, pruna syluestria. Color nanq; non magnopere querendus
est, sed pinguedo, atq; dulcedo. Pinguem sic agnoscas. Glebam
paruulam dulci aqua cōspergis, et subigis, si glutinosa est, et ad-
hæret, constat illi inesse pinguedinem. Item scrobe effossa, & re-
pleta, si superauerit terra, pinguis est, si defuerit, exilis, si conue-
nerit æquata, mediocris. Dulcedo autem cognoscit, si ex ea par-
te agri, quæ magis displicet, glebam fictili uase dulci aqua mader-
factam, iudiciō saporis explores. Vineis quoq; utilem p hæc signa
cognoscas. Si coloris, & corporis rari aliquatenus, atq; resoluti
est. Si uirgulta, quæ protulit, læuia, nitida, pœra, fœcunda sunt,
ut pyros syluestres, prunos, rubos, ceteraq; huiusmodi, neque in-

torta, neq; sterilia, neq; macra exilitate languētia. Situs uero terrarum neq; planus, ut stagnet, neq; præruptus, ut defluat, neq; obrutus, ut in inuim deiecta ualle subsidat, neq; arduus, ut tempestates immodice sentiat, & calores. Sed ex his omnibus utilis semper est equata mediocritas, & uel campus apertior, & humorem pluuium cliuo fallente subducens, uel collis molliter p[er] latera inclinata deductus, uel uallis cum quadam moderatiōe, & aeris laxitate submissa, uel mons alterius culminis defensio obiectu, & à molestioribus uentis aliquo liber auxilio, uel sublimis asper, sed nemorosus, & herbidus. Sed cum sint genera terrarum plurima, ut pinguis, aut macra, spissa, uel rara, sicca, uel humida, & ex his pleraq; uitiosa, tñ propter seminum differentiam sæpe necessariam maxime, sicut supra dixi, eligendus est pinguis, ac resolutus ager, qui minimum laborem poscit, & fructum maximum reddit. Secundi meriti est spissus, qui labore quidem maximo, tamen adnota respondet. Illud uero deterrimum genus est, quod erit siccum simul, & spissum, & macrum, uel frigidum, qui ager pestiferi more fugiendus est.

De industria, & necessarijs ad rura sententijs.

T. VI.

SED ubi hæc, quæ naturalia sunt, neque humana ope curari possunt diligentius æstimaueris, exequi te conuenit partem, quæ restat industriæ. Cuius hæc erit cura uel maxima, ut has, quas subieci, ex omni opere rustico in primis debeas tenere sententias. Præsentia domini promeētus est agri. Color terræ non magnopere desyderetur, quia bonitatis incertus est auctor. Genera omnium sirculorum, uel frugum præclara, sed terris tuis experta committe. In nouo enim genere seminum, ante experimentum, non est spes tota ponenda. Locis humidis semina citius, q̃ siccis degenerant, quare subinde succurrat electio. Ferrarij, lignarij, doliorū, cuparumq; factores necessario habendi sunt, ne à labore solēni rusticos causa desyderandæ urbis auertat. Locis frigidis à meridie uineta ponant, calidis à septentrione, temperatis ab oriente, uel (si necesse sit) occidente. Operarum rō unum modum tenere non potest in tanta diuersitate terrarū, & ideo soli, & prouinciæ cōsuetudo facile ostendit, qui numerus unāquanq; rē faciat, siue in sirculis, siue in omni genere satorū. Quæ florent cōstat nō eē tangenda. Bene eligi serenda non possunt, nisi hoc officiū prius eli-

H ij

gens assumat. In rebus agrestibus maxime officia iuuenum congruunt, imperia seniorum. In vitibus putandis tria consideranda sunt, fructuum spes, successura materies, locus qui seruet, ac reuocet. Vitem si maturius putes, plura sarmenta, si serius, fructus plurimos consequeris. De locis deterimis sicut arbores, ita vites conuenit ad meliora transferre. Post bonā uindemiam strictius, post exiguam latius puta. In omni opere inferendi, putandi, ac recidendi duris, et acutis utere ferramentis. In uite, uel arbore q̄ facienda sunt, perage ante apertidē floris, & gēmae. In uineis aratro prætermissa, fossor emendet. Locis calidis, siccis, apriis p̄cipinandum non est, cum magis uitis optet operiri. Et ubi uineas uulturnus exurit, aut flatus aliquis regionis inimicus, uitem te gamus straminibus uel aliunde quæsitis. Ramus latus, uiridis, & sterilis in media olea absidendus est, uelut totius arboris inimicus. Sterilitas, & pestilētia æquo modo fugiendæ sunt. In p̄stinato solo inter nouellas vites, omnino nihil est conferendum. Græci iubent exæptis caulibus, tertio anno quæ libebit iniungere. Omnia legumina græcis auctoribus, feri iubentur in sicca terra, faba tātūmodo in humida debet spargi. Domino, uel colono cōfinia possidenti, qui fundum, uel agrum suum locat, dānis suis, ac litibus studet. In agro periclitantur interiora, nisi colātur extrema. Omne triticum in solo uliginoso post tertiam sationem in genus siliginis, commutatur. Tria mala æque nocent, sterilitas, morbus, uicius. Qui terram sterilem uineis occupat, & laboribus suis, & sumptibus est inimicus. Campi largius uinū, colles nobilius ferunt. Aquilo uites sibi obiectas fecundat, auster nobilitat. Ita in arbitrio nostro est, utrū plus habeamus, an melius. Necēssitas feriis caret. Quāuis tēperatis agris ferendum sit, tñ si siccitas longa est, semina locata tutius in agris, q̄ in horreis seruabuntur. Viæ malitia æque & uoluptati, & utilitati aduersa est. Qui agrum colit, grauē tributis creditorem patitur, cui sine spe absolutionis astrictus est. Qui arando crudum solū inter sulcos relinquit, suis fructibus derogat terræ ubertatem infamat. Fecundior est culta exiguitas, q̄ magnitudo neglecta. Nigras uites oīno repudies, nisi in puincijs, in q̄bus eius generis, quo acinaticum fieri cōsuevit. Longius amminiculū uitis incremēta p̄duat. Tenerā, & uiridē uitem ferri acie ne recidas. Omnis incisura sarmenti auertatur à gēma, ne eā stilla, quæ fluere consuevit,

extinguat. Pro macie, uel soliditate uitiū nutriēda sarmenta pu-
tator iniungat. Terra profunda (quod græci asserunt) oleæ gran-
des arbores efficiat, fructus minores, & aquatos, ac seros, magisq̃
amurcæ proximos. Aer oleas tepidus inuat, et uentus mediocris
sine ui, & horrore perflabilis. Vitis, quæ ad ingūm colitur, p̃ æta-
tem ad hoc perducenda est, ut locis molestioribus quatuor pedi-
bus à terra, placidioribus uero septem summitas eius insurgat.
Hortus, qui cælo clementi subiacet, et fontano humore percurrit
propè est, ut liber sit, & nullam serendi disciplinā requirat. Sub-
ligatio acerbis uinis facienda est, qñ excutiendi, aut rumpendi a-
ni nulla formido est. Ligatura in uitis locū debet mutare, ne
unum semper assiduitas cōterat uinculorū. Fossorem si apertus ui-
tis oculus uiderit, cecabitur spes magna uindemiæ, & ideo, dum
est clausus, fodiatur. Terræ altitudinem cum fœcunditate, si ad
frumenta, duobus pedibus explora, quatuor uero, si ad arbuta,
uel uites. Vitis nouella, ut facile incrementum culta consequitur,
ita interitum celerem, si negligatur, incurrit. Modum tene æsti-
matis facultatibus tuis in assumptione culturæ, ne superatis uiri-
bus excedente mensura turpiter deferas, qđ arroganter assumis.
Semina plusquam annicula esse non debent, ne uetustate corru-
pta non prodeant. Frumentum collis quidem grano robustius,
sed mēsuræ minus refundet. Omnia, quæ serunt, crescente luna,
& diebus tepidis sunt serenda, nam tepor euocat, frigus inclu-
dit. Si tibi ager est syluis inutilibus tectus, ita eum diuide, ut lo-
ca pingua puras reddas nouales, loca sterilia syluis tecta eē pa-
tiaris, quia illa naturali ubertate respondent, hæc beneficio lætā-
tur incendiij. Sed sic urēda distingues, ut ad incensum agrū post
quinquenniū reuertaris, ita efficies, ut equaliter uel sterilis gle-
ba cum fœcunda cōtendat. Græci iubent oliuam, cum plantat,
& legitur, à mundis pueris, atq; uirginibus operandum, credo
recordati arbori huic esse præsulē castitatem. Nomina frumentorū
superfluū est præcipere, quæ aut loco subinde, aut ætate mu-
tantur. Hoc satis est, ut eligamus p̃cipua in ea regione, quā colim-
us, uel exploremus aduecta. Lupinus, & uicia pabularis, si ui-
rides succidantur, & statim supra sectas eorū radices aref, stercor-
is similitudine agros fœcundant, quæ si exaruerint ante q̃ pro-
fandas, in his terræ succus aufertur. Ager aquosus plus stercoris
querit, siccus minus. Calidis, maritimis, siccis, apriis, campestri-

bus locis omne opus vinearum maturius inchoetur, frigidis, mediterraneis, humidis, opacis, montanis locis tardius, quod non solum de mensibus, aut diebus dixerim, sed et de horis operandi. Omne opus rusticum, cum fieri præcipitur, neque cito est, si ante quindecim dies, neque tarde, si post quindecim fiat. Frumenta omnia maxime letantur patenti campo, et soluto, et ad solem reclinui. Spissa, et cretosa, et humida terra bene far, et triticum nutrit, ordeum agro soluto delectatur, et sicco, nam in luto so sparsum morit. Trimestris satio locis frigidis, et niuosis conuenit, ubi qualitas æstatis humecta est, ceteris raro respondet euentu. Semē trimestre locis tepidis melius respondebit, si serat autumno. Si necessitas coget in salsa terra aliquid opari, extremo autūno plantanda est, uel cōserenda, ut malitia eius hybernis imbribus eluatur. Aliquid et terræ dulcis, uel arenæ fluuiialis subiiciendum est, si illi uirgulta committimus. Seminarium mediocri terra instituire debemus, ut ad meliorem quæ sata fuerint transferantur. Lapides, qui insuper sunt, hyeme rigent, æstate seruescunt, ideo satis arbutis, et uitibus nocent. Terra, quæ circa arbores mouetur, ita est uicibus permutanda, ut ei, quæ in summo fuerat, ima succedat. In letandis arboribus crates faciemus, terram prius trunco admonentes, et mox letamen, ut sic opus naturæ beneficio alternante cumulet. Agri præfulem non ex dilectis, et tenere eductis seruulis ponas, quia fiducia præteriti amoris impunitatem culpæ præsentis expectat.

De agri electione, uel situ.

T.VII.

IN Eligendo agro, uel emendo considerare debebis, ne bonum naturalis fecunditatis colentiū deprauauerit inertia, et in deteriores furculos uber soli seracis expenderit, quod quāuis emendari possit insitione melior, tñ harum rerum sine culpa melior usus est, qui cum spe corrigendi serus euentus. In seminibus ergo frumentorum præsens emendatio poterit esse. In uineis maxime considerandum, atque uitandum est, quod plerique fecerunt studēdo famæ tñ, et latitudini pastinorum semina uitium statuantes, uel sterilia, uel saporis indigni, quod grandi tibi labore constabit, ut corrigas, si agrum cōpares uitij talibus occupatum. Positio ipsius agri, qui eligendus est, ea sit, in frigidis princijs orienti, aut meridiano lateri ager esse debet oppositus, ne alicuius magni montis obiectu,

his duabus partibus exclusis algore rigescat, aut p partē septentrionis remoto, aut per occidentis in uesperā sole dilato. In calidis uero puincijs, pars potius septentrionis optanda est, quæ & utilitati, & uoluptati, & saluti æqua bonitate respōdeat. Si uicinus ē fluminis, ubi statuimus fabricæ sedē parare eius debemus explorare naturā, q̄a plerūq; quod exhalat inimicū est, à quo (si talis sit) cōueniet refugere cōditorē. Palus tñ omni modo uitanda est, præcipue quæ ab austro est, uel occidente, & ficari cōsueuit æstate ppter pestilentia, uel animalia inimica, quæ generat.

De edificio.

T.VIII.

AEDIFICIUM pro agri merito, & pro fortuna domini oportet institui. Quod plerūq; immodicæ sumptū difficilius ē sustinere, q̄ condere. Ita igit̃ æstimanda est eius magnitudo, ut si aliquis casus incurrerit, ex agro, in quo est, unius anni, aut ut multum biennij pensione reparet. Ipsius aut̃ p̄torij situs sit loco aliquatenus erectiore, & siciore, q̄ cætera, & ppter iniuriā fundamentorū, & ut lato fruatur aspectu. Fundamenta aut̃ hoc modo ponenda sunt, ut latiora sint ex utraq; parte semipedis spatio, q̄ parietis insup̄struendi corpus increſcet. Si lapis, uel toſus occurrat, facilis causa est collocandi, in quo sculpi tantum fundamenti forma debebit unius pedis altitudine, uel duorū. Et si solida, uel conſtricta inuenietur argilla quinta, uel sexta pars altitudinis eius, quæ supra terram futura est, fundamentis deputetur, quod si terra laxior fuerit, modo maioris altitudinis obruantur, donec munda sine ruderum suspitione occurrat argilla. Quæ si omnino desit, quartam merſiſſe ſufficiet. Studendum præterea ut hortis, & pomarijs cingi possit, aut pratis. Sed totus fabricæ tractus unius lateris longitudine, in quo frons erit, meridianā partem respiciat in primo angulo exapiens ortum solis hyberni, & paululum ab occidente auertatur hyemali. Ita proueniet, ut per hyemem sole illustretur, & calores eius æstate non sentiat.

De hybernis, & æstiuis mansionibus, & paumentis. T.IX.

FORMA tñ debet esse eiusmodi, ut ad habitationē brēuiter collectas & æſtati, & hyemi præbeat mansiones. Quæ hyemi parant̃ ita sint cōſtitutæ, ut possit eas hyberni solis totus p̄p̄modū cursus hilarare. In his paumēta opportuna eē debebūt.

H iij

PALLADI.

in fabricis planis earum obseruandum est, ut equalis, & solida contignatio fiat, ne gradus ambulantium tremorem fabricæ titubantis excutiat. Deinde ut axes quernæ cū æsculeis non miscantur. Nam quercus humore concepto, cum se cœperit siccare, torquebitur, & rimas in pavimento faciet, æsculus autem sine uitio durat. Sed si quercus suppetente æsculus desit, subtiliter quercus siccetur, & transversus, atq; directus duplex ponatur ordo tabularum clavis frequētibus fixus. De cæro, aut sago, aut farno diutissime tabulata durabunt, si stratis super paleis, uel filice humor calis nusq; ad tabulati corpus accedat. Tunc super statamina bis rudus. i. saxi contusi duas partes, & cum una calis tēperatæ constitues. Hoc cum ad sex digitorū crassitudinē feceris, & regula exploraueris equale, si loca hyemalia sunt, tale pavimentū de bebis imponere, in quo uel nudis pedibus stantes ministri hyeme non rigeſcant. Inducto itaq; rudere, uel testaceo pavimento, cōgestos, & calcatos spisse carbones cum sabulone, & fauilla, et calce permiscēs, & huius impēsē crassitudinē sex uncis in bebis imponi, quod exequatum nigra pavimēta formabit, & si qua fundentur ex poculis, uelociter rapta desurgent. Sed si æstinæ mansiones sunt, orientē solstitialem, & partē septentriōis aspiciant, & uel testaceum (sicut supra diximus) accipiant pavimentum, uel marmora, uel tesseras, uel scutulas, qbus equale reddatur angulis, lateribusq; coniunctis. Si hæc deerunt, supra marmor tusum cernatur, aut arena cum calce inducta leuigetur.

De calce, & arena.

T.X.

PRAETEREA Scire est necessarium construenti, quæ calis, & arene natura sit utilis. Arenæ ergo fossiæ genera sunt tria. Nigra, cana, rassa. Omnium præcipue rassa melior, meritiſequentis est cana. Tertium locum nigra possidet. Ex ijs, quæ cōpressa manu edit stridores, erit utilis fabricanti. Item si pāno, uel linteo candidæ uestis inspersa, et excussa nihil maculæ reliquerit, aut sordis, egregia est. Sed si fossilis arena non fuerit, de fluminibus, aut glarea, aut littore colligetur. Marina arena tardius siccatur, & ideo non continue, sed intermissis temporibus construenda est, ne opus onerata corrumpat, camerarum quoq; tectoria falso humore dissoluit. Nam fossiles arene cémentiſ parietibus, & cameris celeri siccitate utiles sunt, melioresq; si statim, cum

effosse sunt, calci misceantur, nam diutino sole, aut pruina, aut imbre uanesunt. Fluviales tectorijs magis poterunt convenire. Sed si uti necesse sit maris arena, erit commodum prius eam lactina humoris dulcis immergi, ut vitium salis aquis suavis elota deponat. Calcem quoque ex albo saxo duro, uel tiburtino, aut columbino fluviali coquemus, aut rubro, aut spongia, aut marmore. Postremo quæ erit ex spisso, & duro saxo structuris convenit, ex fistuloso uero, aut molliori lapide tectorijs adhibetur utilius. In duabus arenæ partibus calcis una miscenda est. In fluviali uero arena si tertiâ partem testæ cretæ addideris, operum soliditas mira præstabitur.

De lateritijs parietibus.

T.XI.

QVOD Si latericios parietes in prætorio facere uolueris, illud servare debebis, ut perfectis parietibus, in summitate quæ trabibus subiacebit, structura testacea cum coronis prominentibus fiat sexquipedali altitudine, ut si corruptæ tegulæ aut imbrices fuerint, parietem non possint stillicidia penetrare per pluviâ. Deinde providendum est, ut siccis, & asperatis parietibus latericijs inducatur tectorium, quod humidis, ac leuibus adherere non poterit, & ideo tertio eos prius debebis obducere, ut tectorium sine corruptione suscipiant.

De lumine, & altitudine.

T.XII.

IN PRIMIS studendum est in agresti fabrica, ut multa lux clarescat. deinde ut partes temporibus diuisas, sicut supra dixi congruis cœli regionibus offeramus, idest æstivas septentrioni, hybernas meridiano, uernas & autumnales orienti. Mensura uero hæc seruanda est in triclinijs, atque cubiculis, ut quanta latitudo, & longitudo fuerit, in unum computetur, & eius medietas in altitudinem conferatur.

De cameris cannicijs.

T.XIII.

CAMERAS in agrestibus edificijs ex ea materia utilius erit formare, quæ facile inuenietur in uilla. Itaque aut tabulis faciemus, aut cannis, hoc genere. Asseres ligni galliæ, uel cupressi directos & æquales constituemus in eo loco, ubi camera facienda est, ita ordinatos, ut inter se sesquipedalis mensura sit uacua. Tunc eos

PALLADII.

cathenis ligneis ex iunipero, aut olina, aut buxo, aut cupresso factis ad cōtignationē suspēdemus, & binas inter eos pticas dirigemus tomiaibus alligatas. Postea palustrē cannā, uel hāc crassiorē, quæ in usu est, contusam, facta & strictim iuncta crate subnectimus, & per omne spatium cū ipsis asseribus, & perticis alligamus. Dehinc primo impensa punicea induemus, & trulla æquabimus, ut inter se cannarum membra constringat. Post arena, & calce cœquabimus. Tertio tusi marmoris puluerē mistum cum calce ducemus, & poliemus ad summum nitorem.

De opere albario.

T.XIIII.

OPVS quoq; albarium sæpe delectat, cui calcem debebimus adhibere, cum multo tempore fuerit macerata, ergo ut utilē probes, ascia calcem quasi lignum dolabis. Si nusquam acies eius offenderit, & si quod ascie adheret, fuerit molle, atq; viscosum, cōstat albarijs operibus conuenire.

De tectorijs.

T.XV.

PARIETVM uero tectura sic fiet fortis, & nitida. Prima trullis frequentetur inductio. Cum sicari cœperit, iterum inducatur, ac tertio. Post hæc tria coria ex marmoreo grano cooperiat ad trullam. Quæ inductio ante tādīn subigenda est, ut rutrum, quo calx subigitur, mundum leuemus. Hæc quoq; marmoris grani inductio cum sicari cœperit, aliud coriū subtilius oportet imponi, sic & soliditatem custodiet, & nitorem.

De uitanda ualle.

T.XVI.

VITANDVM est autē, quod pleriq; fecerunt aquæ causa, uillas in infimis uallibus mergere, & paucorū dierum uoluptatem præferre habitatorum saluti. Quod etiam magis metuemus, si puincia, quā colimus, de morbis æstate suspecta est. Cui si fons desit, aut puteus, aternas construere conueniet, quibus omnium condnā possit aqua tectorum. Fiunt autem hoc modo.

De aternis, & maltha frigidaria.

T.XVII.

SIGNINIS parietibus magnitudo ea, cui delectaris, et suffis, construatur lōgior magis q̄ latior. Huius solum alto rudere

foli datum relicto fusoris loco testacei pavimenti superfusione leuigetur. Hoc pavimentum omni cura cedendum est ad nitorem, & lardo pingui decocto assidue perfricandum. Quod ubi deducto humore siccatum est, ne rimis in aliqua parte findat, etiam parietes simili corio uelentur obducti, & ita post diuturnam, & solidam siccitatem, aquae praebeatur hospitium. Anguillas sanè, piscesq; fluuiales mitti in his, passiq; conueniet, ut horum natatu aqua stans agilitatem currentis imitef. Sed si aliquando in quo cunq; loco pavimenti, uel parietis tectura succumbat, hoc genus malthae adhibebimus, ut humor in exitum nitens possit includi. Rimas, & Lacunas cisternarum, & piscinas, uel puteos sarciemus hoc genere, & si humor per saxa manabit, picis liquidæ quantum uolueris, & tantundem sumes unguinis, quod uocamus axungiam, uel seuum. Tunc in olla utrunq; miscebis, et coques donec spumet, deinde ab igne remouebis. Cum fuerit eadem refrigerata permixtio, calcem minutim super adicies, et ad unum corpus omnia mista reuocabis. Cumq; uelut strigmentum feceris, inferes locis corruptis, ac manantibus, & pressum summa densitate calcabis. Salutare erit aquas illuc per tubos fictiles duci, & opertis immeare cisternis. Nam coelestis aqua ad bibendum omnibus antefertur, ut & si fluens adhiberi possit, quæ salubris non est, lanacris debeat, & hortorum uacare cultura.

De cella uinaria.

T. XVIII.

C A E L L A M uinariã septentrioni debemus hñe oppositam frigidã, uel obscurã proximã longe à balneis, stabulis, furno, sterquilinijs, cisternis, aquis, & ceteris odoris horrèdi, ita instructã ne cessarijs, ut non uincat à fructu, sic aut dispositã, ut basilicæ ipsius forma calcatoriũ loco habeat altiore cõstructũ. Ad quod inter duos lacus, quod ad excipienda uina hinc inde depressi sint, gradibus tribus ferè, aut quatuor ascendat. Ex his lacubus canales structi uel tubi fictiles circa extremos parietes currat, & subiectis lateri suo dolijs per uianos meatus manantia uina defundat. Si copia maior est, medium spatium cupis deputabit, quas ne ambulacra prebeant, basellis altioribus ipositas, uel supra obruta dolia possumus collocare spatio inter se largiore distantes, ut (si res exigat) curatustrasitus possit admitti. Quod si cupis locum suum deputabimus, is locus ad calcatoriũ similitudinẽ podijs breuib, et testaceo pavimẽ

to solidetur, ut etiam si ignorata se cupa diffuderit, lacu subdito exapiantur non peritura uina, quæ fluxerint.

De Horreis.

T.XIX.

SITVS horreorū quī ipsam septentrionis desyderet partem, & superior, & longe ab omni humore, & latamine, et stabulis ponendus est, frigidus, uentosus, et siccus, cui prouidendū structuræ diligentia ne rimis possit abrumpi. Solū igitur oē bipedis sternatur, uel minoribus laterculis, quos suffuso testaceo pauimento debemus imprimere. Tūc diuisas cellas (si magnus sperabit seminum modus) grano cuiq; tribuimus, & si terræ paupies minora p̄mittit, uel craticijs podijs erunt discernēda granaria, uel uimīneis uasculis redditus tennes colligemus, sed factis granarijs amurca luto mista parietes linunt, cui aridi oleastri, uel oliuæ folia p̄ paleis adiungunt, quo tectorio siccato rursus amurca respergitur, q̄ ubi siccata fuerit, frumenta cōdenf. Hæc res gurgulionibus, et cæteris noxijs aialibus inimica est. Aliq coriādri folia frumentis miscent ad seruandū profutura. Nihil tñ diu custodiendis frumentis cōmodius erit, q̄ si ex areis in alterū locum uicinum transfusa refrigerentur aliquantis diebus, atq; ita horreis inferant. Negat Columella uentilanda esse frumenta, quia magis miscent animalia totis acernis, quæ si non moueant, in summitate intra mensurā palmi subsistent, & hoc uelut corrupto corio cætera illæsa durabunt. Afferit idem noxia animalia ultra prædictam mensurā non posse generari. Herba coniza sicca (ut græci afferūt) substrata frumentis addit ætati. Ab horreis tñ auster debet eē auersus.

De olei factorio.

T.XX.

OLEARIS cella meridianis sit obiecta partibus, & cōtra frigus munita, ut illi per specularia debeat lumen admitti. Ita & operas, quæ hyeme futuræ sunt, nullus algor impedit, & oleum, cū p̄metur, adiutum teporibus, frigore nō ualebit astringi. Trapetis, & rotulis, & p̄lo nata est forma, quā cōsuetudo dictauit. Receptacula olei semp munda sint, ne nouos sapores infecta ueteri rancore corrumpant. At si quis maiori diligentie studet, subiectis hinc inde cuniculis pauimenta suspēdat, & ignē suggerat fornacæ succensa. Ita purus calor, olei cellam sine fumi nido re uaporabit, quo sæpe infectum, colore corrūpitur, & sapore.

De stabulis equorum, uel boum.

T. XXI.

STABVLA equorum, uel boum meridianas quidem plagas respiciant, non tamen egeant septentrionis luminibus, quae per hyemem clausa nihil noceant, per aestatem patefacta refrigerent. Ipsa stabula, propter ungulas animalium, ab omni humore suspensa sint. Boves nitidiores fient, si focum proxime habeant, et ignis lumen intendant. Octo pedes ad spatium standi singulis boum paribus abundat, et in porrectione. XV. Planae roboreae supponantur stationibus equorum cum stramine, ut iacentibus molle sit, stantibus durum.

De corte.

T. XXII.

CORS ad meridiem pateat, et obiecta sit soli, quo facilius hyeme aliquem teporem concipiat propterea, quae insunt animalia, quibus etiam ad aestatis temperandum calorem porticus furcis asseribus, et fronde formari debent, quae uel scandulis, uel (si copia suppetit) tegulis, uel si facilius, et sine impensa placuerit, tegentur caryabus, aut genistis.

De auarijs.

T. XXIII.

CIRCA parietes cortis extremos auaria facienda sunt, quia sterus animum maxime necessarium est agriculturae, excepto anserum latamine, quod satis omnibus inimicum est. Sed habitacula ceterarum animarum maxime necessaria sunt.

De columbarijs.

T. XXIIII.

COLVMBARIVM uero potest acipe sublimis una turricula, in praetorio constituta lenigatis, ac dealbatis parietibus, in quibus a quatuor partibus (sicut mos est) fenestrellae breuissimae fient, ut colubas solas ad introitum, exitumque permittat. Nidi figurentur interius. A mustellis tutae fient, si inter eas frutex uirgosus sine folijs asper, uel uetus sparteae prouiciatur, quae animalia calcant, ut eam secreto non uidentibus alijs unus attulerit, non pereunt. Et neque locum deserunt, si per omnes fenestras aliquid de stranguinati hominis loro, aut uinculo, aut sine suspendas. Inducunt alias, si cumino pascantur assidue, uel setosi hirci alarum balsami liquore tangerent. Foetus frequentant, si ordeum torrefactum, uel fabam, uel herbum, sepe consumant. Triginta autem columbis uol

lantibus diurni tres sextarij tritici sufficient, aut creturæ, ita ut herbum foetus gratia mensibus præbeamus hybernis. Rutæ ramulos pluribus locis oportet contra animalia inimica suspēdere.

De Turturibus.

T.XXV.

SED Columbarij cellæ duo subiecta cubacula fiant. Vñ breue, & propè obscurum, quo turtures claudi possint, quos nutrire facillimum est. Nam nihil expetunt, nisi ut æstate, qua sola maxime pinguescant, triticum, uel milium mulsæ maceratum semper accipiāt. Semodius unus diurnus centum uiginti turturibus suffiat. Aqua sanè eis frequenter mundior debet offerri.

De Turdis.

T.XXVI.

ALIUD uero cubiculum turdos nutriat, qui si alieno tempore saginentur, & uoluptatem cibi, & reditum maximum præstant paratati beneficium ministrante luxuria. Sit autem locus mundus, & lucidus, & undiq; leuigatus. Transuersæ in hoc perticæ figunt, quibus possint post inclusum uolatum sedere. Rami et uirides sæpe mutantur. Caricæ tunse mistis pollinibus largissime præbeantur. Myrti etiam, si facultas est, lentisci, oleastri, æderæ, arbuti semina interdum ad excludenda fastidia, & maxime aqua munda præbeatur. Claudantur illesi, & recenter capti mistis aliquibus ante nutritis, quorum societate ad capiendos cibos pavidam nouæ captiuitatis mœstitudinem consolentur.

De Gallinis.

T.XXVII.

GALLINAS educare nulla mulier nescit, quæ modo uideatur industria. Hoc de his præcepisse sufficiat, ut fumo, puluere utantur, & cinere. Sint præcipue nigrae, aut flauæ coloris, sed albæ uidentur. Vinacæ abo sterile scunt, ordeo semicocto, & parere sæpe coguntur, & reddunt oua maiora. Duobus cyathis ordeï bene pasatur una gallina, quæ sit uaga. Supponēda sunt his semper oua numero impari luna crescente à decima usque in quintamdecimam. Pituita his nasci solet, quæ alba pellicula linguam uestit extremam. Hæc leuiter unguibus uellitur, & locus cinere tangitur, & allio trito plaga mundata conspergitur. Itē allij mica trita cum oleo faucibus inseritur. Staphisagria etiam prodest, si cibis misceatur assidue. Si amarum lupinum comedat,

sub oculis illis grana ipsa procedant, quæ nisi acu leuiter apertis pelliculis auferantur, extinguunt. Oculos portulacæ succo forinsecus, & mulieris lacte curemus, uel hammoniaco sale, cui mel, & cininum æquale miscentur. Pediculos earum perimit staphisagria, & torrefactum cininum pari pondere, & pariter tinsa cum uino, & amarilupini aqua, si penetret secreta pennarum.

De Pauonibus.

T. XXVIII.

PAVONES nutrire facillimum est, nisi fures, aut animalia inimica formides, qui plerumque per agros uagantes sponte se pascunt, pullosque educunt, et altissimas uespere arbores petunt. Vna uero his cura debet, ut incubantes per agrum fœminas, quæ hoc passim faciunt, à uulpe custodias. Ideo in insulis brenibus meliori sorte nutriunt. Vni masculo fœminæ quinque sufficiunt. Masculi oua, & pullos suos psequuntur uelut alienigenas prius quam illis cristarum nascatur insigne. Ab idibus Febr. calere incipiunt. Faba leuiter torrefacta in libidinem prouocant, si eis quinto quoque die tepida præbeat. Sex cyathi uni sufficiunt. Cupidinem coeundi masculus confitetur, quoties circa se amictum caudæ gemmantis incuruat, & singularum capita oculata pennarum locis suis exerit cum stridore procurrans. Si oua pauonum gallinis supponantur, excusatæ matres ab incubatione tribus uicibus per annum fœtus edunt. Primus partus quinque, secundus quatuor, tertius trium, uel duorum esse consuevit. Sed electæ (si hoc placuerit) nutrices gallinæ sint, quæ à primo incremento lunæ non diebus habeant nouem oua supposita, quinque pauonina, & cætera sui generis. Decima die oua omnia gallinacea subtrahant, & alia inter gallinacea totidē recentia supponant quot ablata sunt, ut trigesima luna, hoc est expletis triginta diebus, possint cum pauoninis ouis aperiri. Oua aut pauonum, quæ gallinæ subiecta sunt, sepe manu conuertant, quia hoc ipsa facere uix ualebit. Vnam partem oui notabis, ut te subinde conuertisse cognoscas. Maiores tamē gallinas oportet eliger, nam minoribus pauciora suppones. Natos aut pullos, si ad unam transferre à pluribus uelis, dicit Columella unum nutria uiginti quinque sufficere. Mihi uero, ut bene educi possint, uidentur quidam satis esse. Primis diebus far ordeï conspersum uino, pulvis dabit, uel undecumque cocta pulticula, & refrigerata. Postea adiacet porrum consum, uel caseus recens, sed expressus, nam serum

pullis nocet. Locustæ etiam pedibus ablatis præbentur. Ita pas-
cendi sunt usq; ad sextum mensem. Deinde ordem poteris præ-
bere solēniter. Trigesimo quinto tamen die postquam nati sunt,
ēt in agrū tuto eici possunt comitante nutrice, pascendi, cuius
singultu reuocant ad uillam. Pituitas uero, & cruditates ijs re-
medijs submouebis, quibus gallina curat. Maximum illis pericu-
lum est, cū incipit crista pducī, nam patiuntur langores infantū
similitudine, cū illis tumentes ginginas denticuli apire nituntur.

De Phasianis.

T.XXIX.

IN Phasianis nutriendis hoc seruandum est, ut nouelli ad cre-
andos fœtus parent, idest qui anno superiore sunt editi. Veteres
non fœcundi esse non possunt. Ineunt fœminas mense Martio, uel
Aprili. Duabus unus masculus sufficiat, quia ceteras aues salaci-
tate non æquat. Semel in anno fœtus creant. Viginti serè ouis pa-
riēdi ordo concludit. Gallinæ his melius incubabunt, ita ut quin-
decim phasianina oua nutrix una copiat, & cetera sui gene-
ris supponant. In supponendo de luna, & diebus, quæ sunt in
alijs dicta, seruent. Trigesimus dies maturos pullos in lumē emit-
tet. Sed per quindecim dies discocto, ac refrigerato leuiter ordeī
farre pascent, cui uini imber aspergit. Post, triticum fractum præ-
bebis & locustas, & oua formicæ. Sanè ab aquæ prohibeantur
accessu, ne eos pituita cōcludat. Quod si pituitam patient phas-
iani, allio cum picæ liquida trito rostra eorum debebis assiduus
perfricare, uel uitium sicut gallinis fieri consuevit, auferre. Sagi-
nandi hæc ratio est, ut unius modij triticæ farina in breuissimas
offulas redacta clauso phasiano per. XXX. dies ministrata suffi-
ciat. Vel si ordeacæ farina præbere uolueris, unius, & semis
modij farina per prædictos dies saginam replebit. Obseruan-
dum sanè est, ut offulæ ipsæ oleo leuigentur asperso, & ita inse-
rantur faucibus, ne sub infima linguae parte mergantur. Quod si
euenerit, statim pereunt. Illud quoq; magnopere curemus, ne præ-
beatur noua alimenta, nisi digestis alijs, quia eos facillime onus
cibi hærentis extinguit.

De anseribus.

T.XXX.

ANSER sanè nec sine herba, nec sine aqua facile sustinetur.
Lois confitis inimicus est, quia sata & morsu lædit, & stercore,
pullos

pullos præstat, & plumas, quas & autumnò uellamus, & uere. Vni masculo tres fœminæ sufficiant. Si desit fluuius, lacuna formetur. Si herba nō suppetit, trifolium, fœnū græcum, agrestia in tyba, lactuculas feremus alimento. Albi fœcidiore sunt, uarij, uel fisci minus, quia de agresti genere ad domesticum trāsierūt. Incubant à Calen. Martij usq; ad æstiuum solstitium. Plus parient, si gallinis oua illarum supponantur. Extremum partū matribus iam uacaturis educare permittimus, pariturae ad haram perducantur. Cum semel hoc feceris, consuetudinem sponte retinebunt. Gallinis sicut pannonina ēt anseris oua supponas. Sed anserina oua ne noceant, suppositis subiiciatur urtica. Parui primis decem diebus intus pascendi sunt, postea sereno eos poterimus educere, ubi urtica nō fuerit, cuius aculeos reformidant. Quatuor mensibus bene saginant, nam melius pinguescunt in tenera etate. Polenta dabit in die ter. Large uagandi licentia prohibetur, loco obscuro claudentur, & calido, sic maiores ēt secundo mense pinguescunt. Nā paruuli sæpe die trigesimo moriunt. Saginant uero melius, si ad satietatem milium pbeamus infusum. Inter anserū cibaria legumen omne porrigi potest, excepto eruo. Cauendum est ēt, ne pulli eorū setas glutiant. Græci saginandis anseribus polentæ duas partes, & fursuris quatuor aqua calida temperant, & ingerunt pro appetentis uoluptate sumenda, tribus per diem uicibus potu adiuant. Media quoq; nocte aquam ministrant, peractis uero. XXX. diebus si ut iecur his tenerescat optabis, tunfas caricas, & aqua maceratas in offas uolutabis exiguas, & per dies uiginti continuos ministrabis anseribus.

De piscinis.

T. XXXI.

HIS ordinatis cetera exequenda sunt. Nam piscinæ duæ uel solo impressæ, uel cæso lapide circa uillam esse debebunt, quas facile est aut fonte, aut imbre suppleri, ut una ex his usui sit pecoribus, uel anibus aquaticis. Alia madefaciat uirgas, & coria, & lupinos, & si qua rusticitas consuevit infundere.

De fœnili paleario, lignario.

T. XXXII.

FOENI, palearum, ligni, cannarum repositiōes nil refert in qua parte fiant, dummodo sicce sint, atq; perflabiles, & lōge remoueantur à uilla propter casum surripientis incendiij.

Pallad.

I

STERCORVM congestio locum suum tenere debet, qui abundet humore, & propter foetoris horrenda à pratorij conuertatur aspectu. Humor abundans hoc præstabit stercore, ut si qua insunt spinarum semina putrescant. Stercus asinorum primum est maxime hortis, deinde ouillum, & caprinum, & iumentorum, porcinum uero pessimum, canes optimi. Sed columbinum feruidissimum, cætarumque auium satis utile est, excepto palustriū. Stercus, quod anno requieverit, segetibus utile est, nec herbas creat. Si uetustius sit, minus proderit. Pratis uero recentia stercorea proficiunt ad uber herbarum. Et maris purgamēta, si aquis dulcibus eluantur, mista reliquis uicem stercoreis exhibebunt. Et limus, quē scaturiens aqua, uel fluij incrementa respuerint.

De locis horti, et pomarij, et sepibus, et serēdi tpe. T. XXXIIII

HORTI, & pomaria domui proxima esse debent. Hortus sit sterquilinio maxime subiectus, cuius succo spōte foecundet. Ab area longe situs sit, nam puluerem palearum patitur inimicum. Felix positio est, cui leniter inclinata planities cursus aquæ fluentis per spatia discreta derinat. Si fons desit, aut imprimendus est puteus, aut si nequeas hoc, piscina superius construenda est, ut illic linc aquas pluuia conferente hortus per æstiuos rigetur ardores. Si hac omni facultate carueris, semper altius tribus, uel quatuor pedibus ad pastini similitudinem fodies hortulum, qui sic cultus negligat siccitates. Sed huic quamuis contra necessitatem mista stercore quælibet terra conueniat, tamen hæc genera sunt in electione uitanda, creta, quam argillā dicimus, atque rubrica. Illud quoque custodies in hortis, quos humoris natura non adiuvat, ut diuidas per partes, & hyeme ad meridiem, æstate ad septentrionem spatia colenda cōuertas. Debent et horti esse clausi, sed munitiōis multa sunt genera. Alij luto inter formas clauso, parietes figuratos ex lateribus imitantur. Quibus copia suppetit, maceris as luto, & lapide exant. Plerique sine luto congesta in ordinem saxa cōponunt. Nonnulli fossis spatia colēda præangunt, quod uitandū est, quia horto subducit humores, nisi forte locus palustris colatur. Alij spinarū plantas, et semina in munitione disponunt. Sed melius erit rubi semina, et spinæ, quæ rubus caninus uocat,

matura colligere, & cū farina erui ex aqua macerata miscere, si-
 nes dehinc sparteos ueteres hoc genere mistionis sic inducere, ut
 intra fines semina recepta seruent usq; ad uerni tēporis initia.
 Tunc ubi sepes futura est, duos sulcos tribus à se pedibus separa-
 tos sesquipedis altitudine faciemus, & per utrosq; fines cū semi-
 nibus obruemus leui terra. Ita trigesima die pcedūt sentes, quos
 teneros amminiculis opus est adiuvare, quibus inter se sentes per
 spatia uacua relicta iunguntur. Partes sanè horti sic diuidendæ
 sunt, ut eæ, in quibus autūno seminabit, uerno tpe pastinentur,
 quas seminibus uere complebimus, autumnī tempore debemus
 effodere. Ita utraq; pastinatio decoquetur beneficio aloris, aut
 solis. Areæ faciendæ sunt angustiores, & longæ, idest duodecim
 pedum lōgitudine, & sex latitudine, ut sint ppter spatia utrinq;
 purganda diuise. Margines uero earum locis humidis, uel irri-
 guis duobus pedibus erigant, sicis uno extulisse sufficiet. Inter
 areas (si humor consueuit effluere) spatia altiora ipsis areis esse de-
 bebunt, ut facilius ingrediat aream de supiore parte humor ad-
 missus, & ubi sitientem saturauerit, in alias possit exclusus auer-
 ti. Serendi tempora licet per menses certa signemus, tñ secundum
 loci, & cœli naturam unusquisq; custodiat. Frigidis locis autum-
 nalis satio celerior fiat, uerna uero tardior. Calidis autem regio-
 nibus, & autūnalis serior fieri potest, & uerna maturior. Quæ-
 cunq; serēda sunt, cum luna crescit, seminent, quæ secanda sunt,
 uel legenda, cum minuitur.

De remedijs horti, uel agri.

T. XXXV.

CONTRA nebulas, & rubiginem paleas, & purgamenta
 pluribus locis p hortū disposita simul omnia, cū nebulas uideris
 instare, cōbures. Contra grandinem multa dicunt. Panno roseo
 mola cooperit. Item cruentæ secures contra cœlū minaciter leuā-
 tur. Item omne horti spatiū alba uite pāngitur. Vel noctua pen-
 nis patentibus extensa suffigit. Vel ferramenta, qbus operādum
 est, sepo ungunt ursino. Aliq urfi adipem cum oleo tustum reser-
 uant, & falces hoc, cū putaturi sunt, ungunt. Sed hoc in occulto
 debet esse remediū, ut nullus putator intelligat. Cuius uis tanta
 esse phibet, ut neq; gelu, neq; nebula, neq; alio malo possit nocē-
 ri. Interest ēt ut res pfanata non ualeat. Contra culices, et lima-
 cēs uel amurcam recentē, uel ex cameris fuliginē spargimus. Cō-

tra formicas, si in horto habent foramen, cor noctuæ admoneamus, si foris ueniunt, omne horti spatium cinere, aut cretæ candore signemus. Contra erucas semina, quæ spargenda sunt, semper uinæ succo madefiant, uel erucarum sanguine. Cicer intra olera propter multa portenta serendum est. Aliqui cinerem de fico super erucas spargunt. Item squillam uel in horto serunt, uel certe suspēdunt. Aliqui mulierem menstruantem nusquam cinctam, solutis capillis, nudis pedibus, contra erucas, et cetera hortum faciunt circumire. Aliqui flumiales caneros pluribus locis intra hortum clauis figunt. Contra animalia, quæ uitibus nocent, cantarides, quas in rosas inuenire consueuimus, oleo mersas resolui patieris in tabe, et cum putandæ sunt uites, hoc oleo falces putatorias perunges. Extinguntur cimices amurca, et felle bubulo lectis, aut locis punctis, uel folijs ederae tritis ex oleo, uel incensis sanguisugis. Ut olera animalia ista non generent, in corio testudinis omnia semina, quæ sparsurus es, sicca, uel mentam locis pluribus maxime inter caules sere, hoc præstare fertur eruum aliquatulum satum, præcipue ubi radices, et rapa nascuntur. Vel acre acetum succo insquam mistum, fertur olerum pulices necare, si spargas. Campas fertur euincere, qui susticulos alij sine capitibus per horti omne spatium comburens nidorem locis pluribus excitauit. Si contra easdem uitibus uoluerimus consulere, allio trito falces putatorie feruntur ungenda. Nasci quoque prohibentur, si circa arborum, uel uitium crura bitumen, et sulfur incendas. Vel si ablatas de horto uicino campas excoquas aqua, et per horti tui spatia uniuersa diffundas. Ne cantarides uitibus noceant, in cote, qua falces acuntur, ipse sunt conterenda. Democritus asserit, neque arboribus, neque satis quibuslibet noceri posse à quibuscunque bestijs, si flumiales caneros plurimos, uel marinos, quos greci τρυφους nominant, non minus quam decem fictili uasculo in aqua missos tegas, et sub dio statuas, ut decem diebus sole uaporentur. Postea quæcumque illæsa uolueris esse, ea aqua perfundas, et octonis diebus peractis hoc repetas, donec solide, quæ optaueris adolescant. Formicæ abiges, si origano, et sulfure tritis foramen asperges. Hoc et apibus nocet. Item cochlearum uacuastestas si uisseris, et eo cinere foramen inculcas. Culices galbano infuso fugantur, aut sulfure. Pulices amurca per pavementum frequenter aspersa, uel cimini no agresti cum aqua trito, uel si cucumeris agrestis semen aqua

resolutum sepe infundes, uel aquam lupinorū psilotri austeritati
 bus iunctam. Mures si amurcam spissam patina infuderis, & in
 domo nocte posueris, adhærebunt. Item necabuntur, si helleboro
 nigro caseum, uel panem, uel adipem, uel polentam permisceas,
 & offeras. Et agrestis cucumeris, & colocynthidis suffusio sic no-
 cebit. Aduersus mures agrestes Apuleius asserit semina bubulo
 felle maceranda ante, quā spargas. Nonnulli rhododaphnis folijs
 aditus eorum claudunt, qui ros his, dum in exitu nituntur, inte-
 reunt. Talphas græci hoc genere persequuntur. Nucem perforari
 iubent, uel aliquod pomi genus soliditatis eiusdem. Ibi paleas,
 & ceram cum sulfure sufficienter includi. Tunc omnes paruulos
 aditus, & reliqua spiramenta talparum diligenter obstrui, unū
 foramen, quod amplum sit reservari, in cuius aditu nucem intus
 incensam sic poni, ut ab una parte flatus possit accipere, quos ab
 alia parte diffundat. Sic impletis fumo cuniculis talpas uel fuge-
 re potius, uel necari. Mures rusticos, si querneō cinere aditus eorū
 satures, attactu frequenti scabies occupabit, ac perimet. Serpen-
 tes propē omni austeritate fugantur, & nocentes spiritus innocē-
 tia fumī graue olentis exagitat. Vramus galbanum, uel cerui
 cornua, radices lilij, capræ ungulas. Hoc genere monstra noxia
 prohibentur. Opinio græcorū est, si nubes locustarum repente sur-
 rexerint, latentibus intra tecta cunctis hominibus eā posse transi-
 re, quod si inobservantes homines sub aere deprehendant, nulli
 fructuum noceri, si continuo omnes ad tecta confugiant. Pelli ē
 dicunt amari lupini, uel agrestis cucumeris aqua decocta, si mu-
 riæ mista fundatur. Existimant aliqui locustas, uel scorpiones fuga-
 ri posse, si aliqui ex eis urantur in medio. Campas nonnulli ficul-
 neo cinere persequuntur, si permanserint, urina bubula, et amur-
 ca equaliter mista conferueant, & ubi refrixerint, olera omnia
 hoc imbre consperge. πρᾶσιον δ' ας græci uocant animalia, quæ
 solēt hortis nocere, ergo uentriculum uerneis statim occisi plenū
 sordibus suis spatium, quo abundant, leuiter debebis operire. Post
 biduum reperiēs ibi animalia ipsa congesta. Hoc cum bis, uel ter-
 tio feceris, genus omne, quod nocēbit, extingues. Grandini cre-
 ditur obuiare, si quis crocodili pellem, uel hienæ, uel marini uiru-
 li per spatia possessionis circumferat, & in uilla, aut cortis suspē-
 dat ingressu, cum malum uiderit imminere. Item si palustrem te-
 studinem dextra manu supinam ferens uineas perambulet, &

reuerſus eodem modo ſic illā ponat in terra, & glebas dorſi eius obijciat curuaturæ, ne poſſit inerti, ſed ſupina permaneat. Hoc facto fertur ſpatium ſic deſenſum nubes inimica tranſcurrere. Nonnulli, ubi inſtare malum uiderint, oblato ſpeculo imaginē nubis accipiunt, & hoc remedio nubē (ſeu ut ſibi obiecta diſplicet, ſeu tanq̃ geminata alteri cedat) auertunt. Item uituli marini pellis in medio uinearum loco uni ſuperiecta uiticulæ credit̃ cōtra imminens malum totius uineæ membra uestiſſe. Omnia ſemina horſti, uel agri feruntur ab omnibus malis, ac monſtris tuta ſeruari, ſi agreſtis cucumeris tritis radiabus ante macerentur. Item equæ caluaria, ſed non uirginis intra hortum ponenda eſt, uel etiā aſinæ. Creduntur enim ſua præſentia fecundare, quæ ſpectant.

De area.

T. XXXVI.

AREA longe à uilla eſſe nō debet, & propter exportandi facilitatem, & ut fraus minor timeat̃ domini, uel procuratoris uicinitate ſuſpecta. Sit aut̃ uel ſtrata ſilicæ, uel ſaxo montis exaſa, uel ſub ipſo trituræ tpe ungulis pecor̃, & aquæ ammiſtione ſolida, clauſa deinde, & robuſtis munita cancellis ppter armenta, quæ, cum teritur, inducimur. Sit circa hāc locus alter planus, & purus, in quē frumenta tranſfuſa refrigerent̃, & horreis inferant̃, quæ res in eor̃ durabilitate p̃ficiet. Fiat deinde undecunq; proximum tectum, maxime in humidis regionibus, ſub quo propter imbres ſubitos frumenta (ſi neceſſitas coegerit) raptim, uel munda, uel ſemitrita ponant̃. Sit autem area loco ſublimi, & undecunq; perſtabili, longe tamen ab hortis, uineis, atq; pometis. Nā ſicut radiabus uirgultor̃ proſunt letamen, & paleæ, ita inſidentes frondibus eas perforant, atq; arere compellunt.

De apium caſtris.

T. XXXVII.

APIBUS ſtationē non longe à domini ædibus in horti parte ſecreta, & aprica, & à uentis remota, & calidiore locare debemus, quæ in quadratam conſtituta menſuram fures, & acceſſus hominū, pecudumq; ſubmoueant. Sit abundans floribus, quos in herbis, uel in frutiabus, uel in arboribus procuret industria. Herbas nutriat, origanum, thymum, ſerpyllum, ſatureiam, meliſphyllum, uiolas agreſtes, affodillum, citraginem, amaracū, hyacinthum, qui iris, uel gladiolus dicitur ſimilitudine foliorū, nati

cissum, crocum, cæterasq; herbas suauissimi odoris, & floris. In fruticibus uero sint rosæ, lilia, fabæ, rosmarinus, ederæ. In arboribus Ziziphus, amygdalus, persicus, pyrus, pomiferaq; arbores, quibus nulla amaritudo respondet flore, uel succo. Syluestria uero glandifera robora terebinthus, lentiscus, cædrus, tilia, ilex minor, & cinus, sed taxi remoueant inimicæ. Primi saporis mellathymi succus effundit. Secundi meriti, timbra, serpyllum, uel origanum. Tertijs meriti, rosmarinus, & satireia. Cætera, ut arbutus, & olera saporem rustici mellis efficiunt. Sint autem arbores à septentrionali parte dispositæ. Frutices, atq; uirgulta ordines suos sub maceris exequantur. Herbas deinde in plano post frutices conferemus. Fons, uel riuus huc conueniat otiosus, qui humiles transeundo formet lacunas, quas operiant rara, & transuersa uirgulta, sedes tutas apibus præbitura, cum sitient. Sed ab his apium castris longe sint omnia odoris horrendi, balneæ, stabula, coque fusoria. Fugabimus præterea animalia, quæ sunt apibus inimicæ, lacertos, blattas, & his similia. Aues etiam pannis, & crepitaculis terreamus. Purus custos frequens, & castus accedat, habens noua aluearia præparata, quibus excipiat examinum rudis inuentus. Vite odor cæni, & cancer adustus, & locus, qui ad humanam uocem falsa imitatione respondet. Absint & herbe timallus, helleborum, taphia, absinthium, cucumis agrestis, et ois amaritudo conficiendæ aduersa dulcedini.

De uasculis apium formandis.

T. XXXVIII.

ALUEARIA meliora sunt, quæ cortex formabit raptus ex subere, quia non transmittunt uim frigoris, aut caloris. Possunt tamen et ex ferulis fieri, si hæc desint, salignis uiminibus fabricentur, uel ligno cauatae arboris, aut tabulis more cupæ. Fictilia deterrima sunt, quæ et hyeme gelantur, et æstate seruescunt. Sed inter ea loca, quæ muniri debere præcipimus, podia ternis alta pedibus fabricentur inducenda testaceo, et albario ope lenigata propter lacertarum, cæterorumq; animalium noxam, quibus est moris irreperere, & supra hæc podia aluearia collocentur, ita ut non possint imbre penetrari, spatiosis inter se patetibus segregata. Angustus tamen aditus admittat exanina propter frigoris, et caloris iniuriam. Sanè uentis frigidioribus altus paries resistat, qui locum possit defensis sedibus apricari.

PALLADII.

Fe. Aditus omnes soli opponantur hyberno, qui in uno corpore duo, uel tres esse debebunt ea magnitudine, quæ apes formâ non possit excedere. Sic enim noxijs animalibus ingressu resistetur angusto, uel si apes obsidere uoluerint exeuntes, alio ubi non fuerint, utentur egressu.

De apibus emendis.

T.XXXIX.

A PES Si emendæ sunt, prouideamus ut plena aluearia cõparentur, quâ rem uel inspectio, uel murmuris magnitudo uel frequentia mōstrat cõmeantis, ac remeantis examinis, & ex uicina potius q̃ ex longinqua regiõne, ne aeris nouitate tententur. Si uero longius aduehendæ sunt, collo nocte portent, nec collocare, nec aperire aluearia nisi uel pere instante debemus. Speculemur deinde per tridui, ne omne iannas suas egrediatur examē. Hoc .n. signo fugam meditantur assumere. Contra hæc & cætera suo unūquodq; mense reuidebimus. Tñ creduntur non fugere, si sterius primogeniti uituli adlinimus oribus uasculorum.

De balneis.

T.XL.

NON alienū est, si aquæ copia potiat, patrēfamilias de structura balnei cogitare. Quæ res & uoluptati plurimū confert, & saluti. Itaq; balneū constituemus in ea parte, qua calor futurus est loco ab humore suspenso, ne id uligo fornacibus uicina refrigeret. Lūmina ei dabimus à pte meridiana, & occidentis hybernis, ut tota die solis inuetur, & illustret aspectu. Suspēsuras uero cellarū sic facies, Areā primo bipedis sternis, inclinata sit tñ stratura ad fornacem, ut si pilā miseris, intro stare nō possit, sed ad fornacem recurrat. Sic eueniet, ut flāma altum petēdo, cellas faciat plus calere. Supra hanc straturam pilæ laterculis argilla subacta, & capillo constructæ fiant distātes à se spatio pedis unus, & semissis, altæ pedibus binis semis. Super has pilas bipedæ constituantur binæ in altum, atq; his supfundantur testacea pauimenta, & tunc, si copia est, marmora collocent. Miliariū uero plūben, cui ærea patina subest, iter foliorū spatia forinsecus statuemus fornacē subiecta, ad quod miliariū fistula frigidaria dirigatur, et ab hoc ad solium similis magnitudinis fistula pædat, quæ tñ calidæ ducat interius, quantum fistula illi frigidi liquoris intulerit. Cellæ aut sic disponantur, ut quadræ non sint, sed uerbi

gratia, si XV. pedibus longæ fuerint. X. latæ sint, fortius. n. ual-
por inter angusta luctabitur. Solioꝝ forma pro uniuscuiusq; uo-
luntate fundetur. Piscinales cellæ in æstiuis balneis à septentrio-
ne lumen accipiant, in hyemalibus à meridie. Si fieri potest, ita
constituantur balneæ, ut oīs earum per hortos decurrat eluuiēs.
Camerae in balneis si signinae fiant, fortiores sunt. Quæ uero de
tabulis fiunt, uirgis ferreis trāsuerfis, & ferreis arcibus sustinen-
tur. Sed si tabulas nolis imponere, sup arcus, ac uirgas, bipedas
constituēs ferreis anchoris colligatas capillo inter se, atq; argilla
subacta coherentes, & ita impensam testaceam subter inducis.
deinde albarij operis nitore decorabis. Possumus etiā, si compen-
dio studemus, hyberna ædificia balneis imponere, hinc & habi-
tationi teporem submittimus, & fundamenta lucramur.

De malthis calidaria, & frigidaria.

T.XLI.

SCIRE conuenit, qm̄ de balneis loquimur, quæ sunt malthæ ca-
lidaria, uel frigidaria, ut siqñ in solijs sassa sunt opera, possit re-
pente succurri. Calidaria compositio talis est. Picem durā, cerā
albam ponderibus æquis, stupā picis liquidæ totius ponderis di-
midia partem, testā minutā, florem calis omnia simul mista in
pila contundes, & iuncturis curabis inferere. Aliter. Ammo-
niacū remissum, ficum, stupam, picē liquidam tundis pilo, et iū-
cturas oblinis. Aliter. Ammoniacū, & sulfur utrunq; resolu-
tum line, uel infunde iuncturis. Item picē duram, cerā albam, et
ammoniacum super remissum, simul iuncturis adline, & cante-
re cuncta p̄curre. Item florem calis cum oleo mistum iuncturis il-
line, & caue ne mox aqua mittat̄. Aliter. Sanguini taurino,
et oleo florē calis admisce, et rimas cōiunctionis obduato. Item
ficū et picē durā, & ostrei testas ficas simul tundes. His oībus iū-
cturas diligenter adlines. Itē malthæ frigidaria, sanguinē bubu-
lum, florē calis, scoriā ferri, pilo uniuersa cōtundes, & æroti in-
star efficies, et curabis adlinire. Itē seuū liquefactū cribellato cine-
ri admistum frigida aquæ iter rimas labenti, si allinat̄, obsistet.

De pistrino.

T.XLII.

SI Aquæ copia est, fusura balnearum debent pistrina susape-
re, ut ibi formatis aquarijs molis sine animalium, uel hominū la-
bore frumenta frangantur.

INSTRUMENTA uero hæc, quæ ruri neccessaria sunt, præparemus. Aratra simplicia, uel si plana regio permittit, aurita, quibus possint contra stationes humoris hyberni, sata celsiore sulco attolli. Bidentes dolabras, falces putatorias, quibus in arbore utamur, & uite. Item messorias, uel fœnarias, ligones, lupos. i. ferrulas manubriatas minores, maioresq; ad mensuram cubiti, quibus facile est, quod per ferram fieri non potest, ressecado trunco arboris, aut uitis interseri, acus, per quas in pastinis sarmenta merguntur, falces à tergo acutas, atq; lunatas, cultellos item curuos minores, per quos nouellis arboribus surculi aridi, aut extantes facilius amputentur. Item falciculas breuissimas tribulatas, quibus filicem solemus abscindere, ferrulas minores, uangas, rûcones, quibus uepreta persequimur, secores simplices, uel dolabratas, sarcinolos uel simplices, uel bicornes, uel asias in auersa parte referentes rastros. Item cauterer, castratoria ferramēta, atq; tonsoria, uel quæ ad aliud solent pertinere medianam. Tunicas uero pelliceas, cum cucullis, & ocreas, manicasq; de pellibus, quæ uel in syluis, uel in uepribus rustico operi, & uenatorio possint esse cōes. Expletis istis, quæ pertinent ad generale præceptum, nunc operas suas singulis mensibus explicabimus, & à mense Ianuario faciemus initium.

TITVLI MENSIS IANVARIII.

De ablaqueandis uitibus.	T.	I.
De pratis abstinēdis in locis macris.	T.	II.
De profundendis agris, & iungendis bobus, uel arandi disciplina.	T.	III.
De ordeo gallatico ferendo.	T.	IIII.
De ciœrcula ferenda cum disciplina sua.	T.	V.
De uicia ferenda non ad pabulum secanda, sed ad semina redigenda cum disciplina sua.	T.	VI.
De fœno græco ferēdo legēdi seminis cā cū disciplina sua.	T.	7.
De eruo ferendo.	T.	VIII.
De surriēdis frumētis, et leguminibus cū disciplinis suis.	T.	IX.
De pastinandi generibus, & scrobibus uitium.	T.	X.
De tabulis uinearum.	T.	XI.
De mensura pastini Italica.	T.	XII.

De solo, & cælo, & loco pangendis vineis cōgruenti, & ea, q̄
illuc pertinet disciplina. T. XIII.

De hortis, in eodē de lactuca serēda cū disciplina sua, itē nastur/
tio, similiter & eruca, itē caulibus, allio, & ulpico. T. xiiij.

De pomis, in eo de sorbo, de amygdalo. T. XV.

De nuce inglande cū disciplinis suis, de alijs pomis, quorū disci/
plina suis mensibus continetur. T. XVI.

De signandis animalibus, & lardi, & pernarum confectiōe, et
echini, & rapis. T. XVII.

De oleo myrtino. T. XVIII.

De uino myrtite. T. XIX.

De oleo laurino. T. XX.

De lentisano oleo. T. XXI.

De gallinarum partu. T. XXII.

De cædenda materie. T. XXIII.

De Horis. T. XXIIII.

PALLADII RVTILII TAVRI
AEMILIANI VIRI ILLV
STRIS DE RE RVSTICA
LIBER SECVNDVS.

De ablaqueandis vitibus. T. Primus.

ANVARIO Mense locis temperatis abla/
queandæ sunt vites, quod Itali excodicare ap/
pellant, idest circa vitis radicem dolabra terrā
diligenter aperire, & purgatis omnibus velut
lacus efficere, ut solis teporibus, & imbribus
promocentur.

De pratis abstinendis in locis macris. T. II.

APRICIS, aut macris, aut aridis locis prata iam purgan/
da sunt, & à pecore vindicanda,

De prosandendis agris, & iungendis bobus, vel arandi disci/
plina. T. III.

PINGVES, & siccā agri psandi, & apparari iam possunt.
Sed boues melius collo q̄ capite iunguntur, quos, ubi ad uersuram

IANVARIVS.

uenerint, arator retineat, & iugum propellat, ut eorū colla refrigerent. Sulcus autem in arationibus longior, q̄ centum uiginti pedum esse non debet. Seruandū uero est, ne inter sulcos nō mota terra relinquat. Glebæ omnes dolabris dissipandæ sunt. Sed æqualiter terram motam esse cognoscis, si transuersam per sulcos p̄ticam mittas. Quæ res sæpius facta bubulcos ab hac negligētia submouebit. Obseruādum est, ne lutosus ager aref, aut (quod sæpe fit) post longas siccitates leui imbre p̄fusus. Nam terra, quæ lutosā tractatur in primordio, fertur toto anno non posse tractari. Quæ aut supra leniter infusa est, & subter sicca, si tunc aref, asseritur p̄ triēnium sterilis fieri. Et iō mediocriter infusus ager, ut nec lutosus, nec aridus sit, p̄sandi debet. Si collis est, transuersus p̄ latera sulcē. Quæ forma tunc seruanda est, cū semen accipiet.

De ordeo gallatico serendo.

T.III.

SI CLEMENS fuerit hyems, ordeum gallaticum, qđ graue, & candidum est, circa idus ianuarias seramus locis temperatis. Octo modis iugerum complebitur.

De Cicercula serenda.

T.V.

CICERCULA hoc mense seritur loco leto, cœlo humido. Tres modij iugerum complent. Sed hoc genus seminis raro respondet, quia decipitur austro, uel siccitate dum floret, quod tūc propè necesse est euenire.

De uicia serenda cum disciplina sua.

T.VI.

HOC Mense ultimo colligendi seminis causa non pabuli secādi uicia seritur. Iugæ sex modij occupant. Serēda est in terra p̄sassa post horam secundam, uel tertiam, cum ros esse desierit, quē ferre non potest. Sed statim cooperienda est ante noctem. Nam si nuda manserit, noctis humore corrumpitur. Obseruandum est ne ante uigesimam quintam lunam seratur, quia sic satam limaes persequuntur.

De fœno græco serendo.

T.VII.

FOENVM Græcum in Italia colligendi seminis causa, mēse Ianuario ultimo circa februiarias Calendas serimus. Sex modij iugero sufficiunt. Arandum est spisse, sed non alte. Nā si plus

quatuor digitis obruatur, difficile nascitur. Icarco quidam minime aratris profassa prius terra seminant, & sarculis statim fata cooperiunt.

De riuo ferendo.

T.VIII.

ERVVM feri & hoc mense nouissimo potest loco sicco, et macro. In iugero quinq; modi seruntur.

De sarriendis frumentis, & leguminibus.

T.IX.

HOC Mense serenis, & sicis diebus, dum geliadium non est, sunt sarculanda frumenta. Quod opus plerique negant fieri debere, quia radice eorum detegantur, aut incidantur, & necentur frigore subsecuto. Mihi autem uidetur herbosus locis tantum esse faciendum. Sed triticum, & far sarritur quatuor foliorum, ordeum quinq; faba, & legumina, cum supra terram quatuor digitis fuerint. Lupinus uero, qui unam radicem habet, si sarculatur, extinguitur, quod nec desiderat, quia herbas praeter auxilium cultoris affligit. Faba autem si bis sarculatur, proficiet, & multum fructum, & maximum asferet, ut ad mensuram modi complendi fresa prope modum sit integra respondeat. Si siccasse getes sarculaueris, aliquid contra rubiginem prestitisti, maxime si ordeum siccum sarrietur.

De pastinandi generibus, & scrobibus uitium.

T. X.

PASTINVM fieri nunc tempus est. Quod fit tribus generibus, aut terra in totum fossa, aut sulcis, aut scrobibus. Terra tota debet effodi, ubi ager immundus est, ut syluestribus truncis, & radiabus filiis, uel herbarum noxiarum spatia liberentur. Vbi autem munda sunt nouales, scrobibus pastinemus, aut sulcis, sed sulcis melius erit, quia humorem in tota spatia pastinata transmittunt. Fiunt ergo sulci tanta longitudine, quantum destinaueris tabulae, latitudine pedum duorum & semis, uel trium, ita ut iuncti duo fossores designatum lineam spatium bidentibus persequantur altitudine trium, uel duorum & semis pedum. Deinde si per homines uinea colenda est, tamen crudi soli relinquimus, & sic alter sulcus imprimitur. Si uero aranda sunt uinea, quinq; uel sex pedum spatia, quae non sunt fodienda, in medio relinquimus. Quod si scrobes fieri placeat, faciemus tribus pedibus altas, duobus semis latas, tribus longas, sine fossoribus colantur uineta, seu bubus, eadem spatia, quae

TANVARIVS.

inter sulcos sunt dicta, seruare debemus. Ultra uero tres pedes altius fodiēda scrobes non sunt, ne laborent frigore sarmenta, quæ pangimus. Latera scrobibus equaliter incisa sint, ne obliqua uitis sanietur alte nitentibus ferramentis cum fossor incumbet. Pastini uero quod oē uersabitur, trium uel duorum senus pedum altitudine terra uniuersa fodietur, in quo erit diligentia, ne crudū solū, fraude occulta, fossor includat. Quam rem subinde custos uirga, in qua prædictæ altitudinis modus designatus est, per spatia, quæ fodiuntur, exploret. Radices omnes, et purgamenta, maxime rubi, et filias in summum regeri faciat. Quæ cura in omni positionis genere, et ubique seruanda est.

De tabulis uinearum.

T. XI.

TABVLAS aut pro domini uoluntate, uel loci ratione faciemus, siue integrum iugerum continentes, seu medium, seu quartanariam tabulā, quæ quartam iugeri partem quadrata cōficiet.

De mensura pastini.

T. XII.

MENSURA uero pastini hæc est, ut in tabula quadrata iugerali, centeni octogeni pedes per singula latera dirigantur, qui in se multiplicati trecentas uiginti quatuor decem pedas quadratas per spatium omne cōplebunt, secundum hunc numerum omnia, quæ uolueris pastinare, discuties. Decem et octo enim decem pedes, decies et octies supputatæ, trecentas uiginti quatuor explebunt. Quo exemplo doceberis in maiore agro, uel minore mensuram.

De solo, et cælo, et loco pangendis uineis congruenti, et ea, quæ illuc pertinet, disciplina.

T. XIII.

SED solum uineis ponendis nec spissum sit nimis, nec resolutū, propius tamen resolutum, nec exile, nec letissimum, tamen lato proximū, nec campestre, nec præceps, sed potius edito campo, nec siccum, nec uliginosum, modicæ tamen rosidum, nec falsum, nec amarum, quod uitium sapore corrupto uina contristat. Cælum mediocris qualitatis tepidum tamen magis quæ frigidum, siccū potius quæ nimis imbridum. Sed ante omnia uitis procellas, uentosque formidat. Ad pastinādum rudes agros potius eligamus, uel maxime syluestres. Ultima conditio est eius loci, in quo fuerunt uetusta uineta. Quod si necessitas coegerit, prius multis arationibus

exercetur, ut oblitis radiabus prioris vineæ, & omni earum carie, & squallore depulso, novella vitis tutius possit iduā. Tosus, & alia duriora, ubi gelu relaxatur, & solibus, pulcherrimas vineas ferunt refrigeratis æstate radiabus, et humore detento. Sed & soluta glareæ, & calculosus ager, & mobiles lapides (si tamē hæc omnia glebis se pinguibus miscuerint) & silex, cui terra superposita est, quia frigidus est, & humoris tenax, radices æstate sitire non patitur. Item loca, ad quæ de cacuminibus terra decurrit, vel ualles, quas fluminum saturabit aggestio, sed hoc in ijs locis, quæ gelu, & nebulis infecta esse non possunt. Argillosa terra comoda est, argilla aut sola graviter inimica, & cetera, quæ in generalibus dixi. Nā locus, qui misera uirgulta produxerit, vel uliginosus, vel salsus, vel amarus, vel siticulosus, & aridus reprobatur. Niger sabulo, & rubens utilis est, sed cui fortis terra permixta est. Carbunculus, nisi stercore, macras vineas reddit. In rubrica difficiliter comprehendunt, quis postea nutriant. Sed hoc genus terræ operibus inimicum est, quia paruo humore nimis madescit, & paruo sole nimis durescit. At maxime utile solū est, quod inter omnes nimietates temperamentum tenebit, & raro proximum, quod denso fuerit. Plagam cæli vinea spectare debet locis frigidis meridianā, calidis septentrionalem, tepidis orientem, si tñ austros, vel euros regio non habeat inimicos. Quod si hoc est vitium, melius in aquilonem, vel fauonem uineta dirigimus. Sed locus, qui pastinādus est, prius impedimentis, & omnibus elisis liberetur arboribus, ne post calcatu assiduo terra effossa solidetur. Si campus est, duobus semis pedibus pastinetur, si cliuus, tribus, collis pruptus quatuor, ne citius terra decurrat, uallis uero duobus pedibus. Sed ager uliginosus, quod humores altius fossus eruat sicut rauēnatis soli, non amplius quod in pedē semis effodiat. Illud experimētis assiduis cōprehendi, uites melius puenire, si uel statim fossæ terræ, uel nō longe ante pangant, cum tumor pastini nō dum repetita soliditate subedit. Hæc quoque in faciēdis sulis, & scrobibus approbavi, maxime ubi mediocris est terra.

De hortis, in eo de lactuca nasturtio, eruca, caulibus, allio, et ulpico.

T. XIII.

MENSE Ianuario lactuca serenda est, uel Decēbri, ut planta eius Februario trāsferatur. Itemque Februario feritur, ut possit

I A N V A R I V S .

Aprili Mense transferri. Sed certum est eam toto anno bene feri, si locus sit letus, stercoratus, irriguus. Ante q̄ pangatur, radices eius reficemus equaliter, & liquido fimo linamus, uel quæ iam pactæ sunt, nudatæ letamen accipiant. Amant solum subactum, pingue, humidum, stercoratum. Inter has herba manu euellenda est, non sarculo. Latior sit, si rara ponat, uel cum producere incipiet caulem, eo leuiter inciso gleba premat, aut testa. Candidæ fieri putant, si fluminis arena, uel litoris frequenter spargat in medias, & collectis ipsæ folijs alligent. Si uitio loci, uel temporis, uel seminis cito lactuca durescit, planta eius auulsa, et denuo posita teneritudinem cōsequetur. Item multis seminibus condita nascetur, si caprini stercoreis bacam subula subtiliter excanaueris, & in ea semen lactucæ, nasturtij, ocymij, erucæ, radices immiseris, & tunc inuolutam fimo bacam terra optime culta breui scrobe demerseris. Raphanus nitif in radicē, cætera semina in summo, lactuca pariter mergente, profiliunt, singulorū sapore seruato. Alij hoc ita assequuntur. Auulsa lactucæ folia carpunt, quæ radicibus iuncta sunt, & in eisdē gradibus sarculo punctis pter raphanum semina supradicta deponunt, ac fimo adliniunt. Sic obruta iterum lactuca prædictorū seminum caulibus ambietur. Lactuca dicta est, quod abundantia lactis exuheret. Hoc mense nasturtium cōstat, & omni tpe esse ponendum, loco quali placebit, & cælo, finium nō desyderat, humorem quamuis diligat, tamē deesse non curat. Si cum lactuca seratur, nasci fertur egregie. Et nunc, & mensibus, qbus uolueris, & locis, erucam, serere nil moreris. Hoc etiam mense caules, & toto anno feri possunt, sed melius alijs, quibus ascriptum est. Hoc etiam mense allium, & ulpium bene feritur, sed allio alba terra proficiet.

De pomis, in eo de sorbo amygdalo, nucē inglande, & cæteris pomis.
T. XV.

M E N S E Ianuario, Februario, & Martio locis frigidis, calidis uero octobri, & nouembri sorba feruntur egregie, ita ut maturata in seminario ipsa poma pāgant. Ego expertus sum multas arbores ex pomis sponte pgenitas, & in crescendo, & in ferēdo extitisse felices. Plantas ēt si quis ponere uoluerit, habebit arbitrium, dūmodo calidis locis mense Nouembri, tēperatis Ianuario, uel februario, frigidis martio inclinante disponat. Amat loca humida,

mida, montana, & frigidis proxima, & solum pinguiſſimum, cuius indicium certiffimum facit, ſi frequens ubicunq; naſcatur. Planta eſt transferenda robuſtior, ſcrobein deſyderat altiore, & ſpatia lōgiora, ut (quod illi maxime prodeſt) à uentis frequētibus agitata grandefcat. Si uermes patietur infeſtos, qui in ea ruſi, ac piloſi ſolēt medullæ interna ſectari, aliquos ex his ſine arboris iniuria detractos uicino crememus incendio. Credunt hoc genere uel fugere, uel perire. Si minus ferre cōperit, tedæ cuneus eius radicibus inſeratur, uel circa partem ultimam foſſa facta, cumulo ingeſti cineris adæquetur. Menſe Aprili ſorba inſeruntur in ſe, in cydoneo, in ſpina alba, uel trunco, uel corticē, ſorba ſeruantur hoc genere. Lecta duriora, ac poſita, ubi mteſcere cōperint, ſcētilibus uſq; ad plenum claudantur uræolis, gypſo deſuper tectis, & bipedanea ſcrobe loco ſiccō ſub ſole merguntur ore puerſo, & deſuper ſpiſſius terra calcatur. Item ſecta per partes ſiccantur in ſole, & ſeruantur in uasculis in hybernūm. Cum uoluerimus uti, aqua ſeruēti macerata reuiſcunt ſapore incundo. Aliqui cum pediculis ſuis uiridia lecta ſuſpēdunt locis opacis, et ſiccis. Item ex ſorbis maturis ſicut ex pyris uinum fieri traditur, & acetum. Alij ſorba in ſapa aſſerunt diu poſſe ſeruari.

De amygdalo.

AMYGDALVS ſeritur Ianuario, & februario, item locis calidis octobri, & nouembri, ſemine, & plantis, quæ de maiori radice tolluntur. Sed in hoc genere arboris nihil utiliſſe, q̃ ſeminarium facere. Fodiemus ergo altam pede uno ſemis aream, in qua obruemus amygdala nō amplius quatuor digitis, ita ut acumina ſigamus in terra ſpatio inter ſe binorum pedum ſeparata. Amant agrum durum, ſiccum, calculoſum, cœlum calidiſſimum, & quia mature florere conſueuerunt, ita ſtatuendæ ſunt, ut arbores ad meridiem ſpectent. Cum in ſeminario adoleuerint, relictis ibi quæ ſpatio ſufficiant plantis, alias trāſferemus menſe Februario. Sed ipſa amygdala ad ponēdum & noua legamus, & grandia, quæ ante q̃ ponamus pridie mulſa aqua, ita ut ne nimis maceremus, ne germen extinguitur ex multo melle mordacitas. Alij prius ſimo liquido per triduum nuceſ eas macerant. Deinde die, & nocte eſſe patiuntur in mulſa, ſed quæ ſuſpicionē tantum poſſit habere dulcedinis. Cum in ſeminario amygdala di-

Pallad.

K

122
 sponimus, si siccitas intercesserit, ter in mense rigemus, & herbis
 nascentibus circūfodiendo sepe purgemus. Terra seminary leta
 men debet habere admistum. Spatia inter arbores viginti, aut
 vigintiquinq; pedum dedisse sufficiat. Putande sunt nouēbri mē
 se, ut superflua, & arida, & densa tollamus. Seruāda sunt à pe
 core, quia si rodantur, amarescunt. Circūfodi nō debent quoties
 florent, quia inde flos eius excutitur. In uetustate plus affert. Si
 ferax non est, tedae cuneum terebrata radice mergamus, uel silicē
 sic inferamus, ut libro tegente claudatur. Locis frigidis, ubi me
 tus est de pruina, Martialis dicit hoc remedio subueniri. Ante q̄
 florent radices nudant, & albi lapides minutissimi misti are
 nis congerunt, & ubi iam tempus uidebitur, ut debeant germi
 nare, effossi iterum lapides submouentur. Teneras nūces amygdala
 lus creabit (ut dicit) si ante florē radiibus ablaqueatis per dies
 aliquot calida aqua ingeratur. Ex amaris dulces fiunt, si circū
 fossi stipite tribus digitis à radice fiat cauerna, per quam noxiū
 desudet humorem, uel medius truncus terebret, & cuneus ligni
 melle oblitus imprimatur, uel si circa radices suillū stercus affun
 das. Amygdala ad legendum maturitatem fatent, cum fuerint
 spoliata corticibus. Hæc sine cura hominis seruantur in lōgum.
 Si difficulter coriū dimittent, paleis obruta continuo relaxabūt.
 Item decoriata, si aqua marina lauemus, aut salsa, & candida
 fiunt, & plurimum durant. Mense decembri, uel ianuario circa
 idus amygdalus inseritur, locis uero frigidis & Februario. Si tñ
 furculos condias ante q̄ germinant, utiles sunt, qui de summita
 te sumuntur. Inseruntur & sub cortice, & in trunco. Inseruntur
 in se, & in persico. Græci asserunt nasci amygdala scripta, si ap
 ta testa nucleum sanum tollas, & in eo quodlibet scribas, & ite
 rum luto, & porcino stercore in uolutum reponas.

De nucē inglande.

T. XVI.

NUCEM inglādem seremus extremo Ianuario, uel Februa
 rio. Amat loca montana humida, & frigida, plerunq; lapidosa.
 Potest tñ & locis temperatis iuuante humore nutriri. Serēda est
 nucibus suis eo more, quo & amygdala seruntur, & hisdem mē
 sibus. Sed quas nouembri mense disponis, aliquatenus in sole sic
 cabis, ut exiccetur noxiū uirus humoris. Quas uero mēse Ianua
 rio, uel Februario positurus es, aqua simpliā pridie macerabis.

Ponemus autem trāsuerſas, ut latus iſeſt carina ipſa ſigatur in terra. Cacumen ipſum, cū ponimus nuſcem, in aquilonis partem dirigemus. Lapis ſubter, uel teſta ponēda eſt, ut radicem nō ſimplicet, ſed reſpercūſſa reſpergat. Latior fiet, ſi ſæpius transferatur. In frigidis locis bima, in calidis trima transferri debet. Radices plantarum (ſicut in alijs arboribus ſolemus) in hoc genere reſecare non debes. Fimo bubulo ima planta tingenda eſt, ſed melius cinis aſpergatur in ſcrobibus, ne calore ſtercoris aduratur, nā cinis credit̃ uel corticis teneritudinem procurare, uel fructum denſitatem aſſerre. Altis ſcrobibus delectatur pro arboris magnitudine, & deſyderat interualla maiora, quia ſtillidijſ foliorū ſuorū proximis, uel ſui generis nocēbit arboribus. Debet aliquādo circumſodi, ne cana fiat uitio ſenectutis, quæ ſi uitietur canalis longus à ſummo trunco ad imum debet excudi, ſic beneficio ſolis, & uenti dureſcunt, quæ in putredinem tranſibant. Si dura nux erit, uel nodosa, cortex circumcidendus erit, ut uitium mali deducat humoris. Alij radicem ſumma p̃adunt. Alij terebratæ radia palum de buxo imprimunt, uel cuprinum clauum, uel ferreum. Si tarentinam facere uolueris, ſolam nucis carnem lana propter fornicas obuolutam in ſeminario debebis obruere. Si ferentem iam in hoc genus uelis mutare, lixiuo per annum continuū ter rigabis in menſe. Cortex in nuce dimiſſus, maturitatis indiū eſt, qualis debet & poni. Noces ſeruantur uel paleis obrutæ, uel arena, uel ſolis ſuis aridis, uel arca ex ligno ſuo facta incluſæ, uel cœpis miſtæ, quibus hanc uiuiffitudinem reddunt, ut eis acredinem tollant. Martialis aſſerit & expertum ſe ait, uirides noces tantum liberis putaminibus ſuis melle demergi, & poſt annum uirides eſſe, & ipſum mel ita medicabile fieri, ut ex eo facta potio arterias curet, & fauces. Inſerit̃, ut pleriq; aſſerunt, menſe Februario in arbuto, ſed melius in trunco, ut alijs, & in pruno, & in ſe.

De alijs pomis, quæ maxime p̃ alios menſes ſeruntur.

HOC Menſe tuberes inſeruntur cydoneo. Nunc locis temperatis perſicorum oſſa ponuntur. Et inſeritur eadem perſicus in ſe, in amygdalo, & in pruno, ſed pruno armenia inſeremus, & præcoqua. Nunc etiam prunus inſerenda eſt ante, quam gumminet, in ſe, & in perſico. Et cerasus opportune inſeretur agreſtis.

K ij

IANVARIVS.

De signandis animalibus, & lardi, & pernarum confectioe,
& chini, & rapis. T.XVII.

HOC Mense (sicut Columella dicit) maturi agni, & animalia omnia minora, atq; maiora, charactere signentur. Hoc tempore lardi, echini falsi, raporum condiendorum, & pernarum iusta confectio est.

De oleo myrtino.

T.XVIII.

HOC Mense ex bacis myrti oleum conficies hoc modo. Vnā foliorum per olei libram unā mittes, & per uncias. X. vini ueteris stiptici heminam, & cum oleo bullire facies. Icarco autem uino respergentur folia, ne frigrantur ante, q̄ decoquantur.

De uino myrtite.

T.XIX.

ITEM Eisdem bacis uinum myrtite sic facies. In uini ueteris sextarijs urbiis. X. mittis grana myrti confracta sextarios urbiicos. III. quæ sint decem & nouem diebus infusa. Postea expressis myrti granis colabis, & in eo uino medium croci scrupulum, & folij unum scrupulum mittis, et ex mellis optimi decem libris omnia temperabis.

De oleo laurino.

T.XX.

ITEM Ex lauri bacis oleum conficietur hoc modo. Lauri bacis quamplurimas, & maturitate turgentes in aqua calida bullire facies, & ubi diu ferbuerint, olei quod ex se dimiserint, supernatantis undam pennis leuiter cogentibus in uasu transfundes.

De oleo lentiscino.

T.XXI.

LENTISCINI etiam olei matura confectio est, quæ sit taliter. Grana matura lentisci quamplurima colligis et una die, ac nocte supra se acernata esse patieris. Deinde sportam granis eisdem plenā cuiusq; uasculo superponis, & calida adiecta calcabis & exprimes. Tunc ex eo humore, qui defluerit, supernatās oleum lentiscinum sicut laurinum colligetur. Memento autem (ne rigore possit astringi) aquam calidam sepe suffundere.

De gallinarum portu.

T. XXII.

GALLINARUM partus fecunditatem repetit hoc mēse post
brumalē quietem, et incipiunt ad educādos pullos oua supponi.

De cādenda materie.

T. XXIII.

HOC etiam mēse cādenda materia est ad fabricam, cum lu-
na decrescit, & ridicæ, uel pali faciendi.

De horis.

T. XXIII.

HIC mensis in horarum spatio cum decembri mēse cōuenit,
quarum sic mensura colligitur.

Hora	I.	pedes	XXIX.
Hora	II.	pedes	XIX.
Hora	III.	pedes	XV.
Hora	IIII.	pedes	XII.
Hora	V.	pedes	X.
Hora	VI.	pedes	IX.
Hora	VII.	pedes	X.
Hora	VIII.	pedes	XII.
Hora	IX.	pedes	XV.
Hora	X.	pedes	XIX.
Hora	XI.	pedes	XXIX.

T I T V L I M E N S I S F E B R V A R I I .

De pratis seruandis, & letamine saturandis.

T. I.

De prosindendis collibus.

T. II.

De satione trimestri.

T. III.

De serēda lenticula cū disciplina sua, itē de cicercula.

T. IIII.

De serendo cannabo.

T. V.

De agris medicæ parandis.

T. VI.

De eruo serendo.

T. VII.

De curandis uitibus, & arboribus, & ordeo gallatico se-
rendo.

T. VIII.

De ponendis uineis pastino, uel scrobibus, aut sulcis, & omni,
quæ illuc pertinet, disciplina.

T. IX.

K iij

De arbutinis vitibus, & plantis arborum vitiferarum.	T. X.
De vineis provincialibus.	T. XI.
De putandis vineis cōtibus altis, uel humilibus.	T. XII.
De putatione arbuti.	T. XIII.
De provincialibus vineis putandis.	T. XIII.
De nouella uitis putatione.	T. XV.
De propaginibus.	T. XVI.
De infitionibus.	T. XVII.
De instituendis oliuetis.	T. XVIII.
De pomiferis, et spatijs earū generale p̄ceptum.	T. XIX.
De fodiendis, palandis, & ligandis vineis, uel latandis arboribus, & plantis circūfodiendis.	T. XX.
De rosis, lilijs, croco, uiolis conferendis.	T. XXI.
De lini semine ferendo.	T. XXII.
De cannetis, & asparagis, & plantis salicū, & genestæ, et seminarijs myrti, & lauri.	T. XXIII.
De hortis, in eo de sepibus, de lactuca, carduo, nasturtio, coriandro, papauere, allio, ulpico, de satureia cum disciplina sua, itē de cepullis similiter, de aneto, sinapi, de caulibus cum disciplina sua, de asparagis, de malua, menta, fœniculo, pastinaca, anela, cærefolio, beta, porro cum disciplina sua, inula, & colocasys cimino, & aniso.	T. XXIII.
De pomis, & primo de pyro, de malo, cydoneo, filiqua, moro, auellana, mixta cum disciplinis suis.	T. XXV.
De educatione porcorum.	T. XXVI.
De uino myrtite aliter.	T. XXVII.
De uite thyriaca.	T. XXVIII.
De uua sine granis.	T. XXIX.
De uite nimis lachrymosa.	T. XXX.
De myrtitis alia confectio secundum grecos.	T. XXXI.
Vt propomata sponte nascantur.	T. XXXII.
Vt uitis botryones uarios ferat.	T. XXXIII.
De horis.	T. XXXIII.

284

PALLADII RVTILII TAVRI
AEMILIANI VIRI ILLV
STRIS DE RE RVSTICA
LIBER TERTIVS.

De pratis seruandis, & letamine saturandis.

T. I.

EBRVARIO Mense locis tempatis pra
ta incipient custodiri, q̄ prius (si macra sunt)
sp̄arso letamine saturentur, quod euacuum
est luna crescēte. Quanto recentius fuerit,
tanto plus nutriendis herbis ualebit, quod a
superiori parte fundetur, ut succus eius per to
tum possit elabi.

De prosandendis collibus.

T. II.

LOCIS tepidis, aut si clemens tempus, & siccum fuerit, col
les pingues uel hoc mense prosande.

De satione trimestri.

T. III.

HOC Mense ferendum omne trimestrium genus.

De ferenda lenticula, item cicercula.

T. IIII.

HOC etiam mense lenticulam seres solo tenui, & resoluto, uel
etiam pingui, sed sicco maxime, quia luxuria, & humore corrū
pitur, usq; ad duodecimam lunam bene seminatur, quæ, ut cito
exeat, atq; grandescat, prius cum fimi ariditate miscenda est,
atq; ubi ita requieuerit quatuor, aut quinque diebus, tunc spargi
tur. Iugerum modij unius semen implebit. Hoc etiam mense ci
cercula seritur, loco, & modo, quo ante descripsi.

De ferendo cannabo.

T. V.

HOC Mense ultimo cannabum seris terra pingui stercorata,
rigua, uel plana, atq; humida, & altius subacta. In uno pede
quadrato sex eiusdem seminis grana ponuntur.

De agris medicæ parandis.

T. VI.

NUNC ager, qui accepturus est medicam, de cuius natura,
cū erit serēda, dicemus, iterādus est, et purgatis lapidibus, dili

K iij

FEBRVARIVS.

genter occidendus. Et circa Martias Calē. subacto sicut in hortis solo, formadē sunt arēe latē pedibus decem lōgē pedibus quin quaginta, ita ut eis aqua ministretur, et facile possint ex utraq; parte runcari. Tunc iniecto antiquo stercore in Aprilem mēsem referuentur paratē.

De eruo serendo.

T.VII.

HOC Mense toto eruū adhuc seri pōt, q̄a martio serendū non est, ne pastu suo pecoribus nocēat, & boues reddat insanos.

De procurandis vitibus, & arboribus, & ordeo gallatico serendo.

T.VIII.

NUNC pomis, & vitibus uetus urina si affundat, & nūero fructuum prestat, & formē, cui pderit, ut amurcam miscēamus insulsam maxime in oleis. Sed hoc frigidioribus diebus ante q̄ serior incipiat. Etia nunc ordeum gallaticum, qd̄ graue, & candidum est, seretur locis frigidis circa Martias Calendas.

De ponendis uineis pastino, uel scrobibus, aut sulcis, & omni, quē illuc pertinet, disciplina.

T.IX.

HOC mense oīa genera pastinati soli, seu sulci, seu scrobes vitibus compleant. Natura aut uitis cælum omne, solumq; sustētat, si genera cōuenienter aptent. Plano igit loco statues uitē, cuius genus nebulas sustinet, & pruinas, collibus, qd̄ siccitatem durat, et uentos. Pingui agro graciles, atq; infœcundas, macroferaces, & solidas, denso ualidas, atq; frōdosas, frigido, et nebuloso, q̄ hyemem celeri maturitate pueniunt, aut q̄ duris acinis inter caligines securius florent uentoso stabiles, & tenaces, calido grani tenerioris, & humidi, sicco eas, quē pluias ferre non pnt, & ne multa dicamus, eligenda sunt genera, quē p̄fessione uitioꝝ suoz contraria loca diligunt ijs, in qbus durare non poterunt. Placida sanē regio, et serena tuto genus omne suscipiet. Vitiū genera numerare non attinet, sed notum est maiores uinas pulchrę speciei, grani callosi, & siccioris ad mensam, feracissimas uero, & cutis tenerioris, & sapore nobiles, & maxime quē citius deflorescunt, uindemijs esse seruandas. Loca naturam prorsq; vitibus mutant. Sole amine ubiq; sint, uinū pulcherrimum reddunt. Calidū statum potius q̄ frigidū sustinebunt. De

pingui ad macrum transire nō pnt, nisi sterus adiuuerit. Hæc duo genera sunt, maior & minor. Sed minor melius deflorescit. et citius, internodijs minoribus, et grano breuiore. Si arbori applicetur, pinguem terrā, si colatur in ordines, mediocrē desiderat. Imbres contemnit, & uentos, nā maior sepe uitiatur in flore. Sunt & apianæ pāpne. Satis est genera ista dixisse. Industrius uir pbata deligat, & terris talibus mandet, q̄ imitari eas possint, uñ sumūtur. Sic merita sua quæq; seruabit. Sed uitem, uel arborē melius erit de exili ad pingue transferre, nā si à pingui terra ad solum exile transierint, utiles esse non poterunt. Eligenda sunt sarmenta, q̄ pangimus de uite media, neq; de summa, neq; de infima qnq; uel sex gemmarū spatio, à ueteri pædētia, quia non facile degenerant, quæ de locis talibus transferuntur. Sumantur aut de uite fœcunda, neq; putemus brachia esse fertilia, quæ uuas singulas, aut binas pducunt, sed q̄ multa ubertate curuatur, nā pōt ferax uitis feraciores in se habere materias. Erit & hoc signum fertilitatis, si de duro aliquo loco fructum citabit, si foetu impleuerit ramulos ex ima pte surgentes. Sed hoc signis positus per uindemias est notandum. Ad pangendum nouellus palmes debet eligi duri in se nihil habens, & ueteris sarmenti, quia hoc putrescente sepe corrumpitur. Summa flagella repudiemus, ac surculos, qui licet bono loco nati sint, tamen feracitate caruerunt. Pampinarius, qui de duro nascitur, etiam si attulerit fructus, pro frugifero non est ponendus, in suo enim loco fœcundatur à matre, translatus uero tenet sterilitatis uitium, quod nascendi conditione suscepit. Caput sarmenti, cum deponitur, torquendum non est, nec aliquo modo uexandū, nec demersa penitus fœcundiore parte, quod sterili proximū est, supra terram relinquatur. deinde quoniā ipsa tortura uexatio est, et pars ea, de qua radix futura pæsumitur, iniuriæ nulli subiicienda ē, cum qua contendere cogatur, ante q̄ teneat. Ponendæ sunt uites placidis diebus, ac tepidis. Curādūq; ne sarmenta sole urantur, aut ueto, sed uel statim ponant, uel obruta reseruent. Hoc mense, ac deinceps toto uere uinea ponenda est regionibus frigidis pruinosis pinguib; campis, & humidis provincijs. Sit aut mensura sarmenti cubitus unus. Vbi pinguis est natura terrarū, maiora inter uites spatia relinquemus, ubi exilis, angusta. Nōnulli itaq; in ijs uitibus, quas toto solo pastinato disponunt, ter

nos pedes inter singulas uites quoquoersus dimittunt. Sed hoc genere diuisionis in ingerali tabula pāgen^t triamilliaticenta uicena uina sarmenta. Quod si duos semis pedes inter uites relinqui placuerit, in eadem tabula ponentur uites quatuor millia septingentæquinquaginta tres. Sed ad ponendum utemur hoc ordine. Lineam seruatis ijs spatijs, quæ placuerit custodire, candidis signis, uel quibuscunq; notabimus, tunc tensa per tabulæ lineam, in eis locis furculos, uel calamos figemus, ubi unaquæq; uitis uentura est. Ita spatium totius tabulæ furculis complebitur ad numerū uitium futurarum, atq; is qui pācturus est, pīcta circa furculos sarmenta sine ullo errore deponet. Præterea non est uno genere uitiū omne pastinum cōserendum, ne ānus iniquus generi spem uindemiæ totius extinguat. Et iō quatuor, aut qnq; eximij generis sarmenta pangemus, sed maxime expediet genera tabulatim disponi, & decimanis diuidi, nisi deterreat operis difficultas, quod si est uetus uinea, singulorū generum furculis tabulatim poterimus inserere, & facile hoc genus colendi, qđ est pulchrum, atq; utile cōsequemur. Ita & maturitatis, et floris tēpora, quæ in uite diuersa sunt, suis temporibus opportunius obtinere poterimus. Nec paruo cōstabit, si legatur maturitas cum acerbitate, dispendium, cū unius tempestiuam uindemiam seq, sit permista cruditate uitosum, & alterius seras maturitates expectare damnificū. Huic cōmodo adiūctur, quod pro generū diuersitate per gradus accedente uindemia minor operarum numerus eam poterit expedire, & generatim cōdere, ac melius puros saponores sine luctamine alterius generis unaquæq; uina seruare. Hoc si diffiale uidebitur, nō alias simul cōseras, q̄ quæ & sapore, & flore, et maturitate cōueniunt. Sed hæc in pastinis, uel sulcis ratio erit, in scrobibus uero p angulos. II. sarmenta deponis. Sed (ut asserit Columella) uinacem stercori mistam simul sparges, et si exile solū fuerit, pingue terrā scrobi inferes, uel aliunde portatā. Cū uero plantā, uel malleolū disponimus, modice humido solo, sed potius arido, q̄ lutofo duabus gēmis supra terrā relictis sarmēta pōemus obliqua, et sic facilius cōprehēdēt.

De arbusiinis uitibus, & plantis arborum uitiferarum. T. X.

Q V O D si arbusium te habere delectat, plantā generosæ uitis prius in seminario nutrire debebis, ut inde radicata transfe-

rat^{us} ad scrobem, cui arbor iniuncta est. Seminariū uero dicimus
 æque fossam tabulam pedū duorū semis altitudine. In hac, quā
 pro numero ponendarum uitium, uel qualiūcūq; plantarum
 protendis, aut cōtrahis, breuissimo spatio distantia inter se sar/
 menta depones si uallis, aut humectus est campus, trium gēma/
 rū exceptis minutis, quas habebit inferius, & ubi conualuerint,
 hinc post biēniū radicatae uites, uel arbusculas transferas, quas
 cū depones in scrobe, ad singulas materias rediges putatis oibus
 quæ scabra sunt, curtatis ēt radicibus, si quas potueris inuenire
 uexatas. In scrobe aut ad arbustum faciēdum duas radicatae ui/
 tes deponis, hoc seruans, ne se in radice contingant, sed lapides
 quiniū propē librariū medios in utrāq; constitues, & ipsas uites
 ad scrobis latera discreta cōiunges. Mago asserit, scrobē nō pri/
 mo anno esse cōplendam, sed subinde cōequandā, quæ res uitem
 faciet altius fundare radices, sed hoc aridis provincijs forte cōue/
 niet, humidis aut sata putrescent recepto humore, nisi statim ter/
 ra cumuletur. Sed arbusta q̄ faciet, plantas arborū de his gene/
 ribus ponat, si agro suppetit abundantia, opulo, ulmo, fraxino
 in mōtanis, & asperis, in qbus ulmus minus leta est. Has etiā
 Columella dicit, seminario debere nutriri. Mihi uidet^{ur}, qđ nulla
 provinā sit, quæ nō ex his quācūq; sponte producat. Plantas
 ēt maiores de locis quibuscūq; trāslatas, uel eorū generū trūcos
 radictos hoc tpe circa scrobē uitis oportere cōstitui. Sed si ager
 frumētarius fuerit, ubi arbusta disponis, quadragenos pedes in/
 ter arbores relinq; ut feri possit, in exili aut uicenos. In scrobe ue/
 ro uitis ab arbore sua sesquipedis spatio distare debet. Nā uitis
 multū subiecta arbori, incrementō arboris opprime^{tur}. Caueis ēt
 muniēda est aduersum pecoris appetētis iniurias, et arbori suæ
 ptinus alligāda. Est et aliud de trāsferēda ex arbusto uite com/
 pendiu. Fit ex uimine parua corbicula, q̄ mēsurā pedis, uel ali/
 q̄to minus arani spatio possit amplecti. Hæc ad arborē, cui uitis
 inheret, fer^{retur}, et in fundi media parte ptundit^{ur}, quo sarmentū uir/
 gā possit admittere. Inducto itaq; sarmentō uitis eius, de qua trās/
 ferre disponis, corbicula ipsa ex aliqua arboris parte suspēdit^{ur}, et
 uina terra replet^{ur}, ut sarmentū terra possit includi, qđ sarmentū
 prius intorque^{tur}. Ita exacto anni tpe spatio, sarmentū, qđ clau/
 sum est, radices creabit intra prædictam corbiculā. Tunc sub fun/
 do corbis inasum radictū sarmentum cū ipsa corbe portabitur.

FEBRVARIVS.

ad locum, quem vitibus arbutinis destinabis implere, ibiq; ob-
ruetur circa arboris maritade radices. Hoc genere quantum vo-
lueris numerum vitium transeres sine ambiguitateprehendendi.

De vineis provincialibus.

T.XI.

VINEAE in provinciis multis generibus sunt. Sed optimū
genus ē, ubi vitis velut arbutula stat breui crure fundata. Hæc
primo calamo innatur, donec solidetur, sed altior sesquipede eē
non debet, ubi robusta fuerit, sola consistet. Aliud genus est, in
quo annis pluribus circa dispositis ipsa vitis per cannas sarmentis
ligatis in orbiculos flectitur se sequentes. Vltimæ positionis vi-
tis est, quæ per terram proiecta discumbit. Hæ omnes & scrobis
bus ponuntur, & sulcis.

De putandis vineis communibus altis, vel humilibus. T.XII.

HOC Mense locis frigidis aliquatenus, & temperatis vitium
iusta putatio est. Sed ubi multæ sunt vineæ, diuidantur, et pars
earū, quæ septentrionem respiciet, uerno putetur, alia pars aduer-
sa, clementioribus plagis recidatur autūno. Sed in putatiōe sem-
per nitamur, ut vitis fiat in crure robustior, ne ue debili viticulæ
duo duramenta seruemus. Auferenda sunt lata, intorta, debi-
lia, malis locis nata sarmenta. Focaneus etiā, qui inter duo bras-
chia medius nascitur debet abradi, qui si pinguitudine sua bra-
chium, quodcunque proximum debilitauerit, illi deāso ipse suc-
cedat. Erit tamen optimi putatoris, inferius sarmentum, quod
bono loco natum fuerit, reparandæ vitis causa semper tueri, &
ad unā, vel duas gemmas relinquere. In locis clementioribus al-
tius vitē licebit expandere, in exilibus, aut æstuosis, aut de cliui-
bus, aut pæcellosis humilior est habēda. Locis pinguibus singulis
brachijs vitium bina flagella dimitte. Sed erit sapiētis æstimare
uim vitis. Nā q̄ altius tollit, et fœcūda est, plus q̄ octo palmites
hēre nō debet, ita ut cōseruemus semp in inferiore parte custodē.
Circā crus qcqd nascit, amputandum est, si nō desyderet vinea
renocari. Quod si truncus vitis, sole, aut pluuijs, aut noxijs aīali-
bus ē cauatus, purgamus qcqd est mortuū, plagasq; eas amurca
linimus, et terra, qd proderit aduersum p̄dicta. Cortex etiā reci-
sus, et pendens à vite tollat, q̄ res minorem fecē reddit in uino,

Muscus radatur ubicunq; repertus. Sed plagæ, quas in duro uitis accipiet, obliquæ, & rotundæ esse debebunt. De cæsis, sicut supra dixi, male natis omnibus, & ueteribus, nouellos, & fructuarios serua. Ungues etiam custodum siccos, et annotinos recide, et oia, quæ uetera, uel scabra reperies. Illæ, quæ altius coluntur, ut in ingo, uel pergula, ubi quatuor pedibus supra terram leuata steterint, quaterna brachia habeant. Si macra uitis erit, in singulis brachijs singula flagella dimittimus, si pinguis, bina. Sed prouidendum, ne in ima parte sint sarmenta, quæ seruas. Quod cum sit, uitis tanquam si fulgure tangatur, arescit. Relinquenda sunt sarmenta neq; circa durum, neque in summo, quia hæc uelut pampinaria minus afferunt, illa uitem nimietate fœtus onerant, & longius ducunt. Quare in medio loco seruanda sunt, quæ tuemur. Plaga nõ iuxta gemmam, sed aliquanto superius fiat, & aueratur à gemma propter lachrymam defluentem.

Deputatione arbusi.

T. XIII.

VITIS, quæ in arbore collocatur, prima eius materia ad secundam, uel tertiam gemmam præcidatur. Deinde omnibus annis aliquid per ramos crescere subinde patiamur, unam materiã semper ad cacumen arboris dirigentes. Sed qui fructum uolunt maximum, materias plures per ramos submittunt, qui uinum melius, sarmenta in cacumen extendunt. Fortioribus ramis arborum plures materiæ, debilioribus imponenda sunt pauciores. Putandi autem ratio talis est, ut & uetera sarmenta, quibus primi anni fructus pepedit, oia recidant, & noua arcuatis capreolis, et ramulis inutilibus dimittantur. Sed prouidendum est, oibus annis uitæ resolui, ac religari, quia refrigeratur. Ita formandi sunt rami arborum uitiferarum, ne alter sub alterius linea dirigatur, sed loco pingui ulmus à terra octo pedibus, gracili uero septem sine ramo relinquenda est. In solo rosido, & nebuloso rami arboris uitiferæ in orientem, & occidentem putatione dirigantur, ut latera uacua solis radijs membra totius uitis ostendant. Agendum est autem, ut uitis spissa non sit in arbore, et deficientibus primis arboribus substituenda sunt aliæ. In loco clinoso humiliter rami arborum seruandi sunt, in plano, & uliginoso altius. Palmites ad arborem non duro uimine ligentur, ne eos uinculum recidat, aut atterat. Hoc autem noueris, quia palmes quod extra li-

FEBRVARIVS.

gatur ampendens habuerit, fructum induet, quod infra ligaturam, materiae sequentis anni deputabit.

De provincialibus uineis putandis.

T. XIII.

VITES, quas provinciali more uelut arbusculas stare dixi, si instituere uelis, ramos à quatuor partibus his relinques, et in eis brachijs sarmenta pro uitis possibilitate seruabis. Vites autē, quae cannis in orbem cinguntur, sic putentur, quemadmodum eae, quae nituntur ridicis, aut palis. Illae uero, quae sine amminiculis iacēt quod pro sola indigentia faciendum est, uel necessitate prouinciae, primo anno duas gemmas, deinde plures habebunt. Sed huius generis uinea strictius est putanda.

De nouellae uitis putatione.

T. XV.

NOVELLAM uitē Columella dicit à primo anno ad unā materiam esse formandam, nec recidendam totam, sicut Italiae cōsuetudo est. Anno secundo expleto, quia uel intereant uites in totum recise, uel infocunda sarmenta producant, quae amputato capite uelut pampinaria de duro coguntur exire, quare iuxta ipsam commissuram ueteris sarmenti unam, uel duas gemmas censemus relinquendas, quod est merito in uiticula fortiore seruandum, & sanè exapiendam calamis nouellam, uel exiguis palis, ut tertio anno robustiores possit accipere. Nam quadrima nouella, ubi letum solum est, tres materias merito nutrire cogetur. Statim post putationem sarmenta decisa à uineis, & rubi, & impedimentum fossoris omne tollatur.

De propaginibus.

T. XVI.

HOC Etiam mense propagandae sunt uites, sed uetus, et exesa uinea, cuius duramenta longe processerunt, ut Columella dicit, mergis melius reparabitur, q̄ si infossione totius corporis obruatur, quod agricolis certum est displicere. Mergum dicimus quoties uelut arcus supra terram relinquitur alia parte uitis infossa. Nā (ut ait Columella) cum totae stratae sunt, plurimis radiabus totius corporis fatigantur. Mergi uero post biennium reciduntur in ea parte, quae supra est, & in loco iustas uites relinquunt. Sed (ut agricolae asserunt) post biennium si recidas, plerumq; infirmas habent radices, & repente simul pereunt.

De insitionibus.

T. XVII.

HOC Mense calidis, & apriis locis optime celebrat insitio, quæ sit tribus generibus. Sed ex his duo nunc fieri possunt, tertium reservatur ætati. Sunt autem genera inferendi hæc aut sub cortice, aut in trunco, aut emplastro. Inferemus ergo sic. Arborem, uel ramum in loco, qui nitidus est, & sine cicatrice, serra reuidemus non leso cortice. Post ferraturam plagam ferramentis acutis nitidamus. Inde quasi cuneum tenuem ferreum, uel osseum maxime leoninum inter corticem, & lignum tribus propè digitis consideranter deponimus, ne corticis fascia dissipetur, & in eum modum subducto cuneo, statim surculum mergimus una parte deorsum salua medulla, & corticis partis alterius, qui supra arborem fex, uel octo digitis emineat. Duos, uel tres, uel plures surculos per trunci qualitate constituimus, quaternis digitis, uel amplius inter eos spatium relinquimus, tunc iunco, aut ulmo, aut uimine stringimus, & supra lutum musco tectum ponemus, ac ligabimus, ut quatuor digitis super lutum possit surculus eminere. Plerosque delectat strictum primo sectæ arboris truncum uinculis arctioribus in medio findere, et ibi surculos ex utraque parte rasos in modum cunei, ut integra sit medulla demergere præmissis ante cuneolo, quo subducto depositus surculus redeunte in plagam materia possit astringi. Sed hoc utrumque genus uernum est, et fit crescente luna, ubi incipit gemma arborum turgescere. Surculi autem, qui inferendi sunt, sint nouelli, fertiles, nodosi, de nouo nati, ab orientali arboris parte deorsi, crassitudine digiti minoris, bifurci, uel trifurci, gemmis pluribus uberati. Si arborem minorem desiderabis inferere, in qua sine dubio meliora incrementa proueniunt, circa terram secato, & quod melius est, surculos inter lignum, corticemque depone, tunc stringe. Quidam rasum ex utraque parte surculum conuenientem soliditati arboris inferendæ sic in medio deponunt, ut cortex surculi undique cortici arboris reddatur equalis. Sed in nouella arbore terra mota usque ad ipsum insitum colligatur, quæ res eam à uento, & calore defendet. Mihi asseruit diligens agricola, omne insitum sine dubio comprehendere, si depositis surculis uiscum non temperatum in ipsa plaga pariter mergamus, quasi glutino quodam succos materie utriusque misturum. De emplastratione suo mense dicemus. Quartum genus Columella sic

retulit. Gallica terebra usq; ad medullam arborem perforadam, plaga interius leuiter inclinata. Ibi educto omni scobe, uitem, uel ramum ad modum foraminis impressi delibratum, succidum tamen, & humentem stricte imprimi una, aut duabus gemmis foris relictis. Tunc argilla, & musco locum diligenter opiri. Ita & uites in ulmo inferi posse commissas. Hispanus qdam mihi hoc genus nouae insitionis ostendit, quod ex persico se afferebat expertum. Salicis ramum brachij crassitudine, solidum, longum cubitis duobus, aut amplius terebrari iussit in medio, et plantam persici in eodem loco, in quo consistit, spoliatam ramis omnibus solo capite relicto, per ipsum saligni manubry foramen induci, tunc eundem salicis ramum terrae capite utroq; demerso, in arcus similitudinem debere curuari, foramen luto, musco, uinculis stringi, anno deinde exempto, ubi infra medullam salicis caput plantae sic cohaeserit, ut unitas sit ex duobus mista corporibus, plantam subter inadi, atq; transferri, & aggerari terram, quae arcum salicis cum persici cacumine possit opire, hinc persici poma sine ossibus nasci, sed hoc locis humidis conuenire, uel riguis, & salices aquationibus adiunandas, ut & natura ligni uigeat, quae delectatur humore, & supfluentem copiam succi germinibus ministret alienis.

De instituendis oliuetis.

T. XVIII.

HOC Mense locis temperatis instituemus oliueta, quae uel pastinis conferenda sunt, ut extremas circa decimanum tabulas angant, uel suum locum tenebunt. Si ponuntur in pastino, radicate plantae decisis capitibus, & brachijs, & intruncum redactae usq; ad mensuram cubiti unius & palmi in fermento terrae fossae defigantur, locum palo antea deprimente ordeï grana subteriaantur, & amputetur usq; quicquid putridi inuentum fuerit, aut arenitis, & tunc amputata capita luto ueleno, & musco, ulmeis uinculis, uel tenacibus quibuscunq; constricta. Sed maximum beneficium est, ut proficiat incremento, si rubrica partes notentur, quibus obuersae steterunt, & contra eas simili ratione ponantur. Sint à se discretæ pedibus quindecim, uel uiginti. Omnis subinde circa eas herba uellatur, & quoties imber se infuderit, breuissimis, ac frequentissimis fossionibus sollicitentur. Et subinde ducta à trunco terra, atq; permista in aliquanto altiores cumulos congeratur. Quod si oliuetum suo loco facere uolueris, hæc genera
terrarium

terrarum sequeris. Terram, cui mista sit glarea, aut cretam sabu-
lonis coniunctione resolutam, aut pinguem sabulonem, aut ter-
ram naturæ densioris, & humidæ. Creta figuli omnino repudiã
da est, & uliginosa, et in qua semper hñor assistit, et sabulo macer,
& nuda glarea. Quãvis. n. comprehendat, nō conualescat. Pōt
feri & ubi arbutus, aut ilex steterat. Nam cærrus, & æsculus ex-
rifa radices noxias relinquit, quarum virus oleam necat. Locis
æstuosis septentrionali colle, frigidis meridiano gaudet. Medys
clinis delectatur. Neq; inum locum, neq; arduū patitur, magis
modicos clinos diligit, sicut est regio sabina, uel bætica. Bacarū
genus numerosum est, & plurimum uocabuloꝝ, sicut pausia, Or-
chis, Radius, Sergia, Liania, Cominia, & cæteræ, quas nomi-
nare nō attinet. Pausia tñ oleum, quod reddit, dum uiride ē, op-
timum est, sed cito uetustate corrumpit. Optimum Liania dat,
plurimum Sergia. Sed de his hæc generaliter præcipisse sufficiet
maiores bacas obo, minores oleo pfuturas. Si frumentarius ager
est, quem cōserimus oliueto, quadragenis inter se pedibus distet,
si macer, uicenis quinis. Melius faciendus, si ordines in fauoniū di-
rigamus. Cum deponetur, in scrobes siccas cōstituant quaternis
pedibus fossas. Glarea ē, ubi lapides defuerint, misceat, & ster-
cus. Si clausus locus est, modice supra terram, quæ ponunt, emi-
neant. Si pecora formidant, altiores trunci esse debebunt. In sic-
cis uero provincijs cū pluviæ defunt, rigare cōueniet. Si puincia
indiget oliuetis, & nō est unde planta sumat seminariū facien-
dum tñ, idest tabula effossa, sicut superius dixi, ut ibi (sicut Colu-
mella dicit) rami ferra inasi in modum sesquipedalem deponan-
tur. Inde post quinquēniū poterit ualida planta transferri, et
locis frigidis hoc mense plantari. Scio plerosq; quod facilius, atq;
utilius est, radices olearum, quæ in syluis plerunq; sunt, aut in
locis desertis, in cubitalem mensuram reasas, aut in seminario, si
placuerit, aut in oliueto solere disponere, & admistione sterco-
ris adiunare. Quare pueniet, ut ex unius arboris radicibus nu-
merosa planta nascatur.

De pomiferis, & spatijs earū generale præceptum. T. XIX.

ETIAM pomiferas arbores possumus in pastinis à septētrio-
nali regione disponere, de quibus sigillatim dicemus, quæ specia-
liter sunt tenenda, nam pomis eadem conuenit terra, q̄ uitibus.

Pallad.

L

Scrobes autem maiores facies, ut materiae profit, & fructui. Si pomarium facies, inter ordines tricenos pedes relinques. Plantas statues radicatae, quod est melius, sed seruabis, ne cacumina aut manu fracta, aut erosa non crescant. Vnūquenq; ordinem suo generi deputabis, ne infirmæ à ualentioribus opprimantur. Platas similiter notabimus, ut ipsis, quibus steterant cardinibus, opponamus. De cliuo sicco, & exili, in planum, pinguem, et humidum trāseremus. Si truncos ponere uolueris, supra terram propè tribus pedibus erigantur. Vbi duas in una scrobe plantas deponis, cauendum est, ne se contingant, nam uermibus interibunt. Sed (ut Columnella dicit) feraciores sunt, quæ seminibus, hoc est nucibus suis, quæ plantis ponuntur, aut ramis. Vbi regio siccior est, aquationibus adiuentur.

De fodiendis, palandis, & ligandis uitis, uel letandis arboribus. T.XX.

N V N C locis maritimis, & calidis fodiendæ sunt uites, uel (si hæc provinciae consuetudo est) exarandæ, & in eisdem locis palandæ, aut ligandæ sunt uinæ prius, quæ gemma procedat, cuius concussione, uel attritu incurritur grande dispendium. Nunc oleæ, cæteræq; arbores letamen accipiunt decrescente luna. Sufficiet autem maiori arbori uehes una, minori media, ita ut subducta à radiabus terra, et fimo permixta, reuocetur. Tēpore hoc siquæ sunt in seminarijs plantæ, circūfodiendæ sunt, & amputandi eis rami superflui, uel radiculæ, quas circa in superiore parte miserunt.

De rosis, lilijs, croco, uiolis conserendis. T.XXI.

H O C Mense rosaria cōseremus, quæ sulco breuissimo, aut scrobibus ponenda sunt, uel uirgultis, uel et semine. Semina autem rosarum non putemus medios flosculos esse aurei coloris, quos rosæ ferunt, sed bacas nutriunt, quas in breuissimi pyri similitudinem plenas seminibus post uindemiam reddunt maturas, quarum tñ maturitas ex colore fusco, & mollitie poterit estimari. Siqua et sunt antiqua rosaria, hoc tempore circūfodiuntur sarculis, uel dolabris, & ariditas uniuersa recidit. Nunc et quæ rara sunt, possunt ducta uirgarum propagine reparari. Si rosam tēperius hñre uolueris, duobus palmis ab ea in gyrum fodies, & aqua calida bis rigabis in die. Nunc et liliorū bulbos ponemus, uel lilia ante

habita sarriemus summa diligentia, ne oculos circa radicē nascētes, & minores bulbulos faciemus, q̄ à matre subtrahēti, atq; in alios digesti ordines noua lilieta formabūt. Itē uiolearum plātæ, & croi bulbi ferendi sunt, uel subtiliter (si fuerāt ante) fodiendi.

De lini semine ferendo.

T. XXII.

HOC Mense aliqui lini semen læto solo in iugerum. X. modios spargunt, & lina consequuntur exilia.

De cannetis, & asparagis, & plantis salicum, & genestæ, & seminarijs myrti, & lauri.

T. XXIII.

TEMPORE hoc cāneta ponēda sunt factis breuissimis scrobibus, & oculis cannarum per singulas scrobes obrutis, qui seminis spatio inter se distare debebunt. Si calidæ, & siccæ prouinciæ studemus, ualles humidæ, uel irriguæ opus ē deputare cannetis. Si frigida regio est, locis medijs instituuntur, sed succo uillarum subditis. Inter hæc asparagorū etiam semina spargere possumus, ut mista nascantur, quia & asparagi coluntur, & incendantur eo more, quo cannæ. Sed si sunt antiqua canneta, hoc tempore sarriuntur, reisis, quæ in radice purganda sunt, idest putribus male porrectis, & si qua gignendi oculos nō habebunt. Nūc salicis plantas, & omnium generū, quæ arbusculo applicandæ sunt, uel genestas (ubi deerunt) obruemus. Ex bacis etiā myrti, et lauri seminaria faciemus, uel si fuerant, excolemus.

De hortis.

T. XXIII.

CIRCA Idus februarias sepes hortorum ex congesto in funibus spinarū semine faciendæ sunt, sicut dictum est, cū de minimine loqueremur hortorum. Item græci dicunt de crassa rubi uirga fieri debere particulas, & palmaribus scrobibus obrui, & quotidiē (donec frondeant) fossione, & rigatione nutriri. Hoc mense lactuca seritur, ut possit aprili mense transferri. Itē carduus seritur, & nasturtiū, & coriandrum, & papauer, sicut mēse nouēbri, & alliū, & ulpicum. Nunc satireia seritur pingui agro nō stercorato, sed aprico, uel melius mari proximo, et cū cepullis mista seminatur. Hoc ēt mense cepullas seris, sed constat & uere, et autumnō esse seminandas. Si semen eius seueris, in caput crescit, & minus reddit in semine. Si capitulum ponas, ipsum macescit,

L ij

FEBRVARIVS.

& multum semen educat. Terram cepæ desyderant pinguem ue
 hementer subactam, irriguam, stercoratā. Ibi areas faciemus om
 nibus herbis, & radice purgatas, Seremus placido, et sereno die
 maxime austro, uel euro flantibus. Si minuyente luna serant, te
 nues, & acriores proueniunt, si crescente, robustæ, & saporis hu
 mecti. Rarius sunt ponendæ, runcandæ, ac sarculandæ sunt sepi
 us. Si capita uoluerimus his esse maiora, folia omnia debemus
 auferre, & sic succus ad inferiora cogetur. De quibus uero semi
 na colligenda sunt, inuent amminiculis, ubi caulē cœperint ex
 citare. Cum niger color seminis fuerit, præferunt maturitatis in
 diuina. Vellendi sunt thalli adhuc semisica cū semine, & sic in so
 le siccandi. Hoc mense anetū seres locis frigidis. Omnem cœli sta
 tum patitur, sed tepidiore lætatur. Rigeť, si se imber abstineat,
 seratur rarius. Aliq semen eius nō obruunt, opinantes q̄ a nulla
 aue tangat. Nunc & sinapi serere possumus. Hoc ē mense cau
 les seremus, q̄ et toto anno feri possunt, solum pingue, & satis sub
 actum diligunt, argillam, & glareā timent, sabulone, et arenis
 nō delectantur, nisi perennis unda succurrat. Omnem cœli statū
 caulis patitur, frigidū magis. Cōtra austrum positi citius ferunt,
 contra septētrionē serius. Sed hic caulis & sapore, & robore uin
 cit. Clinis delectatur, & ideo ponēdæ sunt plantæ per puluinos
 arearū. Gaudet stercore, & sarculatione. Rarius positus cōuale
 scit. Celerius coquit uirore seruato, si dum est trium, uel quatuor
 foliorū nitrum tritum cribello desuper spargas, ut speciem pruina
 canentis imitetur. Columella dicit plantarū radices alga mari
 na inuoluendas seruādæ uiriditatis cā fimo simul adherēte. Po
 nendæ sunt plantæ maioris incrementi, q̄a licet serius cōprehen
 dant, fortiores fient. Si hyems est, tepido iā die, si æstas, cum sol in
 uesperam declinat, planta pangēda est. Vastior fiet, si terra ope
 riatur assidue. Semen brassicæ uetustū mutat in rapa. Hoc mē
 se post Idus spōgias asparagorū uel nouas formare incipiemus ex
 semine, uel antiquas ponemus. Mihi ē illud utile uidet, ac dili
 gens, ut asparagi agrestis radices plurimas in unū locū cōgera
 mus cultum, uel certe saxosum, quæ statim fructum dent ex loco,
 qui aliud nil alebat, & has annis oībus incendamus in scopis,
 ut fructus frequentior surgat, & fortior. Hoc aut genus est sapo
 re incundius. Nūc ē malua feri potest. Mentam quoq; sere plan
 tis, uel radiabus loco bumido, uel circa aquas. Apricum solum

nec pingue, nec stercoratum desyderat. Hoc mēse fœniculum ser-
res loco aprico, & modicæ saxoso, seritur primo uere. Pastinaca
& semine ponetur, & plantis loco pingui, soluto altius pastina-
to, rarā statues, ut robur accipiat. Canela ē tunc seritur, & co-
latur eo more, quo allium, uel cœpulla. Nunc cere folium laeas fri-
gidis post Idus seratur, desyderat agrum letum, humidum, ster-
coratum. Hoc mense betā seremus, quāuis possit et tota æstate ser-
minari. Amat agrū putrem, humidum, letum. Transferēda est
quatuor, aut quinque foliorū radiabus fimo recenti oblitis. Amat
frequenter effodi, & multo stercore saturari. Hoc mense porrus se-
rendus, quem si sectilem uelis, post duos menses, q̄ satus est, pote-
ris desecare manentem in areis suis, quāuis asserat Columella ē tunc
sectium diutius duraturum, melioremq̄, si transferat, & quo-
ties secabitur, aqua inuetur, et stercore. Si capitatum facere uelis,
quod uere seueris, octobri mense transferre debebis. Serendus est
loco lato, & maxime campestri, area plana pastinata alte, &
diu subacta, & stercorata. Si sectium uelis, spissius, si capitātū,
rarius seris. Sarculo frequentandus est, & herbis liberandus. Cū
digiti crassitudinē habuerit, à media parte præcis folijs, & trū-
catis radiabus transferatur, oblitus fimo liquido quaternis, uel
quinis digitis separet. Cum radices aget, modicæ cōprehenden-
dus, & alleuandus est sarculo, ut suspēsus à terra quod spatij ua-
cium subter inuenerit, capitis uastitate cogat implere. Itē plu-
ra semina in unum ligata si deposueris, grandis porrus nascet
ex omnibus. Item si capiti eius rapæ semen immittas sine ferro,
& pangas, multum fertur increscere, melius si frequenter hoc fa-
cias. Hoc mēse inula seritur, quo canneta ponunt. Seritur oculis
sicut calami, quos abscondere, & terra leuiter debemus obruere,
terra fossa, & subacta, exatatis ad lineā puluinis, q̄bus eius oculi
los oportet infodere, trium pedū inter se spatium separantur. Hoc
mense colocasiæ bulbos ponemus. Amant humidum locum, pin-
guem, maxime irriguū. Circa fontes letantur, & riuos, nec de so-
li qualitate curant, si ppetuo foueantur humore. Frondere propē
semper possunt, si tanquā atrata tegumentis defendantur à frigo-
re. Hoc mense animum, & anisum seritur loco bene subacto, &
cui letamen admisceas. Quod satum est, herbis purget assidue.

De pomis, & primo de pyro.

T. XXV.

L iij

FEBRVARIVS.

PLANTAS pyrorū mēse Februario locis frigidis ponemus, calidis uero nouembri, sed mēse nouēbri pyra locis tepidis conserenda sunt, ut solo inuentur irriguo, ita & florem plurimum preferent, & magnitudinē pomi turgentis acquirent. Nasci tamen tali solo maxime diligunt, quale uinetis diximus conuenire, sed leto solo & ualidas arbores, & fructus plurimos consequemur. Lapidosi generis pyra uitium mutare creduntur, si terris molli- bus conserant. Sed pyrum plantis serere pp̄ tardus enētus est, tñ qbus hoc placuit, ut semina generosa nihil sibi de agresti aspe- ritate permisceāt, plantas bimas, aut trimas eo more, quo olea ponuntur, radicatās magnis scrobibus ponant, supra terram tri- bus altas, uel quatuor pedibus, quarū decisa cacumina argilla mista muscus debet operire. Nam siq; pyrorū semen aspergat, na- si qdem necesse est, originē suam resouente natura, cuius eterni- tati nulla tarditas pōt asferre fastidium, sed homini hoc expecta- re longinquū est, cū & serō ueniant, & de generis nobilitate de- cedant. Melius ergo hoc mēse nouembri fiet, ut pyrorū plantas radicatās seramus agrestiū, subactis bñ scrobibus, ut cū phēder- rint, inserant. Hoc aut̄ interest, qđ q plantis suis seruntur, dul- cedinem, ac teneritatem seruant, diu tñ seruata non durant, in- sita uero moram temporis sustinebunt. Spatia inter pyros trigin- ta pedum mensura discernat. Genus hoc arboris (ut proficiat) frequēti humore, et assiduīs fossionibus est colēdum usq; adeo ut tempore, quo florere consuevit, nihil perditura credatur de flore prolato, si eam tunc fossor adinuerit. Multum proficis, si interiet- tō anno quale libet letamen adiungas, sed bubulum spissa, & graua poma generare fertur. Aliqui cinerem miscent, credentes hinc contrahi pomis argutos sapes. Generum uarietates ex- qui supernacuum puto, cum in ponēdis, uel excolendis nulla sit distantia. Si languida arbor est pyri, uel ablaqueata radicem te- rebras, & ibi ligneum palum de primis, uel in trunco similiter terebrato ex tēda cuneū figis, uel si hoc desit, ex quercu. Vermes eius arboris & nati necātur, & nasci prohibentur, radicibus fel- le taurino frequenter infusis. Item feces uini ueteris recentes, si ra- diabus affundantur per triduum, diutius arbores in floribus la- borare nō faciunt. Si lapidosa pyrus ē, ab extremis radiabus ter- ram priorem leuabis, & secernes omnes lapillos, quibus diligen- ter remotis alteram terram cribro cretam in loco eius infundis,

sed hoc proderit, si rigare non cessas. Mense Februario, & Martio prius inseritur more, quo dictum est, cum de insitione loqueremur, sub cortice, & in trunco. Inseritur autem pyro agresti, malo, ut nonnulli, amygdalo, & spino, ut Virgilius, orno, et fraxino, cydonio, ut aliqui, & punico, sed fisso ligno. Surculus pyri, qui inseritur ante solstitium, anniculus esse debet, et prius quam figatur, folijs, & omni tenera parte priuari, post solstitium vero eum figis, qui summum germen inclusit. Pyrus omni genere inseritur. Condienda sunt pyra ita, die plaudo decrescante luna à vigesima secunda usque in octavam. Eadem poma sicca, & manu lecta ab hora secunda in quintam, vel à septima in decimam, à caducis diligenter electa integra, & prope dura, & aliquanto viridia in picato vase clauduntur, quod operculo tegitur, & deorsum os eius inclinatur, atque breui scrobe obruitur in eo loco, circa quem perennis aqua decurrit. Item quæ dura sunt, in carne, & cute, prius in acervo posita, ubi se mollire coeperint, in vas fictile bene coctum, picatumque ponuntur, & operculo superueniente gypsantur. Vas breui scrobe demergitur in eo loco, qui quotidie sole tangatur. Plurimi pyra obruta inter paleas, aut frumenta seruantur. Alij statim lecta cum tenacibus suis picatis uræis condiderunt, et oribus vasculorum gypso, vel picæ clausis ipsa sub diuo obruta sabulone texerunt. Alij pyra, quæ se non contingerent, in melle seruantur. Item pyra diuisa, & purgata granis, in sole siccantur. Aliqui aquam falsam, cum coeperit undare calefacta, dispumant, & ei postquam frigida pyra seruanda demergunt. Tunc exempta post tempus exiguum condunt uræo, & eius lito ore conseruant, vel nocte, et die in frigida salsa manere patiuntur, post in aqua pura biduo macerant, deinde in sapa, vel passo, vel dulci uino mersa custodiunt.

Vinum pyri, & acetum.

VINVM de pyris fit, si contusa, & sacco rarissimo condita poderibus comprimantur, aut prælo. Hyeme durat, sed prima æstat æstate. Acetum sic fit de pyris. Pyra syluestria, vel asperi generis matura in cumulo reseruantur per triduum. Deinde mittuntur in vasculo, cui fontana, aut pluuialis aqua miscetur, & optum vas per XXX. dies relinquitur, ac subinde quantum sublatum fuerit acetum ad usum, tantum redditur aquæ ad reparationem.

L iij

FEBRVARIVS.

Liquamen ex pyris.

LIQVAMEN de pyris castimoniale sic fiet. Pyra maturis-
sima cum sale calcantur integra. Vbi carnes eorū fuerint resolutae,
uel in cupellis, uel in uasculis fictilibus picatis condiuntur. Post
mensem tertium suspensae eae carnes liquorem dimittunt saporis
iucundi, sed caloris albiduli. Circa hoc illud proderit, ut tempo-
re, quo saliantur, pro aliqua parte uina nigella permisceas.

De malo.

MENSE Februario, & Martio mala seramus, si calida, &
sicca regio est, octobri, & nouēbri. Eorū plura sunt genera, q̄ nu-
merare superfluum est. Amant pingue, ac letum solum, et cui hu-
morem non tam rigatio, q̄ natura suppeditet. Et si in arena, uel
argilla sit, rigationibus adiungetur. Mōtanis locis debent ad me-
ridiem uersa cōstitui. Et frigido solo proueniunt, si cœli tepor ad-
iūuerit, nec in asperis, & humectis sedē recusant. Macrū, & ari-
dum solū poma uermiculosa effiāt, et caduca. Serunt omni ge-
nere, sicut pyri, neq; exarari, neq; effodi desyderāt. Icarco eis ma-
gis prata cōueniunt. Stercus ouillum tm̄ non exigunt quidē, sed
libenter assumunt, uel si cineris pulueres misceantur. Amāt mo-
destas rigationes. Putatio illis apta est, sed maxime ut arida, et
male nata tollantur. Citius senescit hēc arbor, & in senectute de-
generat. Si caduca sunt poma, fissae radia lapis iniectus poma
retinebit, lacertae uiridis felle si tangantur cacumina, non putre-
scit. Vermes eius suillo stercore misto humanae urinae, aut felle bu-
bulo extinguunt, q̄ si plures circa arborē sunt, aereo scalp̄o semel
rasi nō ultra nascuntur, si ea loca, unde rasi sunt, bubulū stercus
obducant. Si spissa poma ramos onerabūt, interlegēda sunt quaeq;
uitiosa, ut alimentum ceteris succus equiparet, & generosis abū-
dantiā ministret, quā numerosa uilitate perdebat. Malus omni
generi inseri pōt, quo pyrus. Mense februario, martio, & alijs, q̄
bus pyrus inseritur in malo, in pyro, in spino, pruno, sorbo, psico,
platano, populo, salice. Diligenter legenda sunt mala, quae uolu-
mus custodire. Ea in locis obscuris, ubi uentus non sit, stramentis
prius in crate subiectis in cumulos secreta disponimus, q̄ cumuli
frequenti diuisione separentur. Aliq̄ diuersa dixerunt, uel singu-
la in uasculis fictilibus picatis, atq; oblitis claudi, uel argilla in-

nolui, uel solos pediculos creta adlini, uel in tabulis substrata palea disponi, & stramentis de superiore parte cooperiri. Mala rotunda, quæ orbiculata dicunt, sine cura toto anno seruare se possunt. Alij in puteo, uel in aſterna mergunt uasa fœtilia, quibus diligenter picatis, & clausis mala cōmittuntur. Alij ex arbore mala illæsa ſumpſerunt, & pediculis eorū picæ ſeruenti merſis ſupra tabulatum per ordinem diſponunt, nucum folijs ſubter expoſitis. Pleriq; ſcobem populi, uel abietis inter mala diſfundunt. Cōſtat mala ſic ponēda, ut pediculorū partes deorſum facias, neq; ante, q̄ uſui neceſſaria uideantur eſſe, contingas. Vinum & acetum ſit ex malis, ſicut ex pyris ante præcepi. Cydonijs ſerendis pleriq; tēpora diuerſa dixerunt, tamen mihi uſu compertum eſt in Italia circa urbem menſe februario, uel inchoante martio plantas cydoniorum radicatas in paſtinato ſolo tenuiſſe adeo feliciter, ut ſæpe ſequentis anni fruge gauderent, ſi poſita maioris ſtatus fuiſſent. Locis ſiccis, & calidis extremo octobri, uel nouembri inchoante ponantur. Amant cydonij locum frigidum, humectū. Si in tepido ſtatuuntur, opus eſt illis rigatione ſuccurri. Ferunt tñ ſtatū mediocris ſitus, inter naturam frigoris, & caloris, & in planis, & in declinibus proueniunt, tñ magis inclinata, & denexa deſyderant. Serunt aliqui cacuminibus, & talea, ſed tardus eſt in utroq; prouentus. Ita ponendæ ſunt largæ arbores cydonij, ne alterā quatiente uento ſtilliadium tangat alterius. Dum minor eſt, uel qñ ponitur, iunetur ſtercore, maior uero cinere, uel cretæ puluere ſemel toto anno radiabus miſſo. Poma in his & cito matura, & maioris incrementi aſſiduus humor efficiet. Rigandæ ſunt, quoties cœleſtis negatur infuſio, & circūfodiendæ locis calidis octobri menſe, & nouembri, frigidis uero februario, uel martio. Niſi. n. circūfodiantur aſſidue, aut ſteriles efficiuntur, aut earum poma degenerant. Putandæ ſunt, ſicut probani, & à uitioſis oībus liberandæ. Si arbor ægra eſt, amurcæ aquæ equaliter miſta radiabus debet aſſundi, aut calx uiua temperata cū creta, uel reſina locularis picæ liquidæ miſta trunco arboris adlini, uel ablaqueatæ arbori circa radices imparis nūeri poma cydonia p magnitudine eius ponenda, & obruenda firmantur, quod annis ſingulis factum caſtodiet à uitijs, ſed arboris lōgæ derogabit ætati. Menſe februario cydonia inferuntur melius in trunco, q̄ in cortice. Recipiunt in ſe ſurculos propè omnis generis punia, ſorbi,

FEBRUARIUS.

omnium malorum, quæ meliora producant. Inferuntur autē no-
uelle arbores, quibus succus est in cortice, si maior est, circa radicē
melius inferetur, ubi cortex & lignū beneficio soli adherentis hu-
mescit. Legenda sunt matura cydonia, quæ hoc more servantur,
uel inter binas tegulas posita, si luto ex omni parte claudantur,
uel si defruto incoquantur, aut passō. Alij quæ maiora sunt, fici fo-
lys inuoluta custodiunt. Alij tñ locis siccis reponunt, à quibus uen-
tus excluditur. Alij canna, uel ebore in quatuor partes diuisa sub
latis omnibus, quæ in medio sunt, in uase fictili melle obruunt.
Alij in melle sic integra dimittunt. In quo genere condiēdi satis
matura deligunt. Alij milio obruunt, uel paleis separata demer-
gunt. Alij plenis uino optimo uasculis mittunt, uel uini, et defru-
ti ad seruanda cydonia, æquum corpus efficiunt. Alij dolijs mu-
sti mergunt, atq; ita claudūt, quod odoratum reddit et uinum.
alij in patina noua sicco gypso obruunt separata cydonia.

Siliqua.

SILIQVA Februario mense seritur, & Nouembri & semi-
ne, & plantis, amat loca maritima, calida, sicca, campestria. Ta-
men (ut ego expertus sum) in locis calidis fecundior fiet, si adiu-
uetur humore, pōt & taleis poni. Scrobem desyderat largiorē.
Inferi ēt posse mense Februario credunt aliq in pruno, uel amyg-
dalo. Siliquæ servantur diutissime, si expandantur in cratibus.

Morus.

AMICA est morus, & uitis. Mori nascuntur ex semine, sed
& poma, & uirgulta degenerāt. Serenda est taleis, uel cacumi-
nibus, melius autē taleis sesquipedalibus, ex utraq; parte leuiga-
tis, ac fimo oblitis. Cum locum palo ante fecerimus, imergimus,
ac tegimus cinere terris admisto, nō amplius q̄ quatuor digitis
operimus. Seremus à medio februario, & toto martio, locis uero
calidioribus octobri postremo, uel nouēbris initio, sed uerno ma-
xime die nono Calendarū aprilium. Amant loca calida, sabulo-
sa, et plerūq; maritima. In toso, uel argilla uix cōprehendūt. Hu-
mor assiduus moris pdesse nō credi, fossionibus letat, et sterco-
re. Putria in his, et arida post trienniū sunt putanda. Plantā si
robustā, transeres mē se octobri, uel nouembri, si tenerā, februa-
rio, et martio. Scrobes desyderant altiores, internalla maiora, ne

altera umbris p̄matur alterius. Feracem, letioremq; arborē mori fieri aliq tradiderūt, si p̄forato hinc inde trunco singulos cuneos inferamus terebinthi hinc, inde lentisci. Circa octobris Calē. morus ablaqueāda est, & radiabus eius uini ueteris recētissima fœces infundēdæ. Inseritur aut in fico, et in se tñ sub cortice. Vltimo insita comprehendit, sed parturit magnæ infelicitatis augumēta.

Auellana.

A V E L L A N A E ponēdæ sunt nuābus suis, nō amplius supra terra ducēda est, q̄ crassitudine digitorū duorum. Plantis tñ, & sobole exptus sum melius puenire. Mense februario, seu planta, seu semē expōit, gaudēt loco macro, humido, frigido, et sabuloso. Mēse Iulio circa nonas auellana matura ē, locis tñ calidis.

Mixa.

N V N C seruntur mixa ex nucleis in aliquo uase positis, donec plantæ induant firmitatem, cælo tepido, terra soluta, humore moderato. Inseruntur mense Martio sorbis, uel spinis.

De pomis aliorum mensum.

E T I A M nunc tuberes seruntur, & inseruntur, & ossa dura cinorū, uel plantæ eiusdem generis ponunt, & transferunt, & inseri possunt, & mespilus inferet, & ossa ponentur prunorū. Ficus etiam locis temperatis nunc poni potest, & sorbus hoc etiam mense feri, & amygdali semina in areis obrui, & locis temperatis nunc inseri mense inchoante, frigidis uero exeūte, conditis tñ furculis ante q̄ germinent. Et pistaciæ planta uel nūc statui, aut inseri potest, & castanearum semina spargi. Nucēs quoq; inglādes etiam nunc seminarijs recondi, & ipsum genus inseri, et frigidis, & humectis locis nunc poterunt pineta seminari.

De educatione porcorum.

T. XXVI.

N V N C uerres maxime fœminas inire debebunt. Legēdi sunt uasti, & ampli corporis, sed rotundi potius q̄ longi, uentre, & clunibus magnis, rostro breui, æruicæ glandulis spissa, libidinosi, anniculi, qui usque ad quadrimos inire fœminas possunt. Scrofas uero longi lateris debemus eligere, & quibus ad sustinēdum fœturæ onus magnus se uenter effundat, cætera uerribus similes. Sed in regionibus frigidis densi, & nigri pili, in tepidis qualesc

FEBRVARIVS.

cunq; prouenerint. Fœmina ad creandum, usq; in annos septem partus onera gestare sufficiet, ad cōapiēdum, annicula debet incipere. Quarto exempto mense pariunt, ubi quintus incipiet. Incipiunt aut̃ sicut dixi) mēse Februario, ut solidioribus herbis nati, & stipula succedente pascant̃. Vbi facultas est transigendi, uēditis qui subinde nati sunt, celerior matribus fœtura reparat̃. Genus hoc omnibus locis haberi pōt, melius tñ agris palustribus q̃ siccis, præcipue ubi arborū fructuosarum sylua suppetit, quæ subinde maturis fructibus alterna per annum mutatione succurrat. Maxime locis graminosis, & cannarum, uel iunci radice nutriuntur. Sed deficientibus alimētis p̃ hyemē nōnunquā præbenda sunt pabula glandis castaneæ, uel frugum uilia excrementa ceterarum, uerno magis cū lactent nouella uirentia, quæ porcis solent nocere. Neq; gregatim claudēdæ sunt porcæ more aliarum pecudum, sed haras sub porticiabus faciemus, quibus mater unaquæq; claudatur, & alumnū gregem tutior ipsa defendat à frigore. Quæ haræ à superiori parte detectæ sint, ut libere numerū pastor exploret, & oppressis à matre fœtibus sæpe subueniat subtrahendo. Curabit aut̃ ut fœtus proprios cum unaquaq; procludat. Plus uero q̃ octo (sicut Columella dicit) nutrire non debet. Mihi uero utilius probatur experto, porcæ, cui pabula suppetūt, ut plurimum sex nutrire debere, q̃a licet plures possit educare, tñ frequentiore numero succ̃ta deficiet. In porcis etiam illud est commodum, quod immissi uineis necdū turgentibus, uel exacta uindemia gramine persecuto diligentiam fossoris imitantur.

De uino myrtite aliter.

T. XXVII.

IN Huius mensis initio aliter myrtite sic facies. Mittis uini ueteris decem sextarios in lagena, et bacarum myrti libras. V. miscebis. Cum. XX. & duorū dierum spatium confusa transegerint, p quos uas quotidie cōuenit agitari, tunc palmea sporta colabis, et p̃dictis. X. sextarijs, mellis optimi fortiter triti pōdo. V. miscebis.

De uite thyriacæ.

T. XXVIII.

THYRIACAM uitem sic facies, cuius iste p̃fectus est, ut uinum eius, uel acētū, uel uua, uel sarmentorū cinis proficiat contra morsus omnium bestiarum. Fit autem sic. Sarmentū, quod pangendum est, trium digitorū spatium in ima parte findatur, &

sublata medulla ad eius uitę thyriacę medicamen addat. Tunc terrę mandet uinculo diligenter astrictũ. Aliqui eadę sarmenta iam medicamine satiata intra squillę bulbũ recondunt, et terris prædicta rōne committũt. Aliqui antidoti eius affusione radices uitis insundunt. Sanę sarmentum, si de hac uite sumat ad trāsferendum, potentiã materni medicaminis non tenebit. Oportebit autem thyriacę infusione assidua, uim sucı senescentis iterare.

De uua sine feminibus.

T.XXIX.

EST Pulchra spēs uuę, quę granis interioribus caret. Hinc efficitur, ut summa incunditate sine impedimento sorberi possit, uelut unum omnium corpus uuę. Fit autę gręcis auctōribus hac ratione per artem succedente natura. Sarmentum, quod obruendum est, q̃tum latebit in terra, tñ findere debemus, & medulla omni sublata, ac diligenter exscalpta, membra iterum diuise partis adunare, et uinculo constricta deponere. Vinculum tñ papyro asserunt esse faciendum, & sic in humida terra esse ponendum. Diligentius quidam sarmentum reuinctum quantum excisum est, intra squillę bulbũ demergunt, cuius beneficio asserunt fata omnia comprehendere posse facilius. Alij tempore, quo uites putant, sarmentum fructiferum putatę uitis in ipsa uite, quā possunt de alto sublata medulla excuant non diuisum, & calamo affixo alligant, ne possit inuerti. Tunc ὄσον κυρηναϊκόν quod gręci sic appellant, in excavata parte suffundunt, ex aqua prius ad sapę pinguedinem resolutum, & hoc transactis octōnis diebus semper renouant, donec uitis germina nouella pcedant. Et in granatis malis fieri hoc posse firmatur à gręcis, & in cerasis opus est experiri.

De uite nimis lachrymosa.

T.XXX.

VITES, quę lachrymarum nimietate tabescunt, & deplorādo uim roboris sui auertunt à fructu, trunco earum lacerato gręci sinum fieri iubent. Si hoc minus proderit, radicũ robur pingue rescindi, ut asserat medicinā uulnus impressum, tunc insulsa amurca ad medietatem decocta, & refrigerata plagę exciso perlinetur, & sub hac acētum acre fundatur.

Myrtitis alia confectio apud gręcos.

T.XXXI.

FEBRVARIVS.

GRAECI item Myrtite sic præcipiunt temperari Myrti bacas maturas in umbra siccatas, & postea tufas uncias octo mittis in linteis, & suspendis in uino, & uas cooperies, ac linibis, et cū plurimis diebus sic fuerit, auferes, & uteris. Aliqui myrti bacas sine pluuia collectas maturas ex locis siccioribus calcāt, uel exprimunt, & uino miscent. **VIII.** cotularum mensuram p amphoram uini, quod uinum medianæ quoq; proderit, ubi stiptias est utendum, stomachum solidare titubantem solet, reiectiones sanguinis inhibere, fluorem uētris astringere, limū dissintericæ passionis medicabiliter asperare.

Vt propomota sponte nascantur.

T. XXXII.

CONDITVM uel absynthiatum, uel rosatum, uel uiolatum procedere sponte fertur ex uitibus (ut natura suscipiat, quod procurare suenit industria) si sarmenta in uas aliquod semipletum supradictis potionibus mersa seruentur, & uinam terram si mul resoluas ad lixiuij modum, donec oculi sarmentorum nitantur exire, tunc eadem sarmenta gemmantia in quo uolueris loco, uitium cætarum more deponas.

Vt botryones uarij nascantur.

T. XXXIII.

VT Vitis botryones et albos asferre possit, et nigros, græci sic fieri debere iusserūt. Si uiciæ sunt uites nigra, et alba, cū putant, sarmenta utriusq; inter se diuisa sic iunges, ut medios utriusq; generis oculos æquando reddere possis unitati, tūc papyro ligabis stricto, et molli, atq; humida terra curabis adlinire, et iteriectis ternis diebus adaquare, donec germen nouæ frondis erumpat. Hinc exempto tpe, si libuerit, genus efficiēs per plura sarmenta.

De horis.

T. XXXIIII.

HIC Mensis in horarum mensura cum Nouembri mense concordat, quas hac numeri ratione colligimus.

Hora	I.	pedes	XXVII.
Hora	II.	pedes	XVII.
Hora	III.	pedes	XIII.
Hora	IIII.	pedes	X.
Hora	V.	pedes	VIII.

Hora	VI.	pedes	VII.
Hora	VII.	pedes	VIII.
Hora	VIII.	pedes	X.
Hora	IX.	pedes	XIII.
Hora	X.	pedes	XVII.
Hora	XI.	pedes	XXVII.

TITVLIMENSIS MARTII.

- De putandis uineis, & inferēdis, et pāgēdis uitibus. T. I.
- De pratis purgādis in locis frigidis, et p̄sindēdis agris. T. II.
- De panico, & milio serendo cum disciplina. T. III.
- De acere serendo cum ordine suo. T. IIII.
- De cannabo. T. V.
- De cicera. T. VI.
- De nouellis puluerandis, & fodiendis, uitibus palandis, ac ligandis, & ueteranis uineis restituendis, & agris, & leuissis. T. VII.
- De oleis amurca saginandis, & cetera earum cura, item de seminarijs, & rosarijs faciendis, uel colendis, & sarriendis frumentis. T. VIII.
- De hortis, in eo de carduis cum disciplina, de ulpico, allio, & cepulla, cinela, aneto, sinapi, caulibus, maluis, amoracea, origano. Lactuca, beta, porro, cappari, colocasys, satireia, nasturtio, intybis, raphanis, de melonibus, & cucumere cum disciplina sua, item de asparagis, & spongys eorū, similiter & ruta, & coriandro cum disciplina sua, & cucurbita similiter, & blito, item de aniso, & amino. T. IX.
- De pomis, in eo de malo punico cum disciplina, & uini sui confectiōe, de citreo similiter, de mespilo, & de fico cum disciplina suis, & alijs pomis, quorum disciplina suis mensibus continetur. T. X.
- De comparandis bobus, & tauris, ac uacis. T. XI.
- De domandis bobus. T. XII.
- De equis, equabus, & pullis, & etate eorum. T. XIII.
- De mulino genere, & asinis. T. XIII
- De apibus. T. XV.
- De horis. T. XVI.

PALLADII RVTILII TAVRI
AEMILIANI VIRI ILLV
STRIS DE RE RVSTICA
LIBER QVARTVS.

De putandis uineis, & inferendis, & pangendis uitibus. T.I.

ARTIO Mēse locis frigidis putatio uinea
rum celebratur, de qua abunde februario men
se locuti sumus, usq; quo incipit gemma esse su
specta. Nūc oportet uineas inferere, cum uites
non aquato, sed spisso humore lachrymabunt.
Seruabimus ergo, ut truncus, qui inseritur, sol
lidus sit, & alimento humoris exuberet, neq; ulla uetustate, aut
iniuria laceratus arescat. Tunc de iſe uiti ſirculi, qui inferendi
sunt, sint solidi, rotundi, gemmis spissis, et pluribus oculati. Tres
tamen oculi in infitione ſufficiant. Radendum est ergo ſarmentū
ad mensuram digitorum duorū, ut ab una parte sit cortex. Ali
qui non patiuntur nudare medullam, sed leuiter radunt, ut inci
ſura ſenſim poſſit in acumen exire, & ut corticata pars cortici no
uæ matris aptetur. Infimus oculus ita inſigendus eſt, ut trunco
innectus adhæreat, qui oculus exteriorem partem debet aſpicere,
uinculo ſaliciſ, inſuſo & paleato luto deſuper alligari, tegumen
to quoq; aliquo à uentis, & à ſole deſendi, ne hi quatiant, hic
adurat. Vbi calor temporis cœperit, ligaturæ ipſi pinnicillo circa
ueſperam tenuis debet frequenter humor aſſindi, ut hoc alimen
to contra uim cœli torrentis animetur. Cum ergo germen rupe
rit, et aliquod cœperit incrementum, calami adiutorio debet an
necti, ne motus aliquis fragilem proceſſetis ſarmenti quaſſet et a
tem. Vbi ſolidius quantumcunq; proceſſerit, uincula oportet ab
ſcindi, ne adoleſcentia molliſſimi germinis nodo duræ conſtri
ctionis angatur. Aliqui infra terram ſemipedis ſpatio effoſſæ ui
ti ſirculos inferunt, & beneficio congeſtionis accumulāt, ut hoc
quoq; nouis ſarmentis præter nutriciſ alimenta ſubueniat. Non
nulli circa terras melius aſſerunt inferendum, q̃a in altiori diffi
lius comprehendunt. Uſque ad idus, uel æquinoctium uites locis
frigidis pangendæ ſunt, ſeu paſtinato, ſeu ſulco, ſeu ſcrobibus,
more, quo dictum eſt.

De pratis

De pratis purgādis in locis frigidis, et p̄sāndendis agris. T. II.

N V N C locis frigidis prata purganda, atq; seruanda sunt. Locis gelidis colles pingues, & agros uliginosos profindere, atque exarare conueniet. Vernacta etiam, quæ Ianuario mense sunt facta, repetere.

De panico, & milio serendo cum ordine suo. T. III.

CALIDIS, & siccis regionibus panicū seremus, & miliū, leuem, & solutam terram desyderant. Nec in sabulone solū, sed in arena quoq; proueniunt, dummodo cælo humido, & solo serantur irriguo, quia siccum, et argillosum agrū reformidant. Herbis liberent assidue, quinq; sextarijs spatium ingeri cōplebitur.

De cicere serendo cum ordine suo. T. IIII.

N V N C cicer utrunq; serere debemus loco letissimo, cælo humido, macerandum est pridie, ut possit citius nasci. Ingerum tribus modijs conferetur. Cicer grande nasci grā dicunt, si infundatur aqua tepida pridie, amare etiam loca maritima temperius prouenire, si seratur autumnō.

De cannabo. T. V.

H O C etiam mense cannabum serimus usq; in æquinoctium uernum hac ratione, qua in februario disputatum est.

De cicera. T. VI.

N V N C cicera seritur, quæ distat à cicercula solo colore, quo sordet, & nigrior est, primo sulco, uel secundo, solo lato. Ingerum quatuor, uel tribus, uel etiam duobus modijs implebimus.

De nouellis puluerandis, & fodiendis, uitibus palandis, ac ligandis. T. VII.

H O C mense nouella uinea incipit puluerari, quod nunc, ac deinceps per oēs Calendas usq; ad octobres faciendum est, non solum propter herbas, sed ne tenera adhuc semina, solidata terra constringat. Graminum radices, quæ plurimum uitibus nocēt, extirpandæ sunt. Nunc locis frigidis uinearū fossio celebrāda est, et palādæ, atq; ligandæ sunt uites, sed nouellā mollibus uinculis

Pallad.

M

alligemus, quia eam tenerā uinula duriora p̄adunt. Palus ma
ioribus uitis solidus, minoribus ponat̄ exilis. Propter umbræ
molestiā statuat̄ ab aquilone, et plaga frigida spatio quatuor di
gitoꝝ, uel semipedis remotus à uite, ut possit ex oī pte arcūfodi.

Vt uetus uinea reparetur.

VINEAS ueteres nūc aliqui à terra altius truncant studen
tes reparationi, sed uitiosum est. Nam plerūq; uastior plaga sole
putrescit, & roribus, quare hoc genere reparet̄. Prius ablaquea
bitur altius, donec eius nodus appareat. deinde infra terram su
pra nodum recidet̄, ut operta, de frigore & sole nil timeat. Hoc
faciendum est, si optimi generis uitis sit, & alte posita, alioquin
generosis melius erit inserenda sarmenti. Omnia supradicta lo
cis calidis primo mēse, frigidis uero post idus ipsius exequemur.

Aegras uites refouere.

AEGRAS uites, uel quibus fructus arescit, arcūfodies, et uri
nam ueterem suffundes. Item cinerem sarmenti, uel querā aceto
mistum subijce, aut inasas circa terrā letamine refoueto, & qua
germinant fortiora dimitte.

Lesas bidente curare.

CVM uitis bidente lēdit̄, aut ferro, plagam, si terrā iūcta est,
adline stercore ouillo, uel caprino, tunc terra mista arcūfossa li
gare curato. Si in radice lesa ē, opiens liq̄dum letamē admisce.

De oleis amurca signādis, et cetera earum cura. T. VIII.

NUNC oleis laborantibus arcū radices insulsa amurca fun
detur. Maximis arboribus (quod Columella dicit) sex congū, me
diocribus, quatuor, ceteris pro aestimatione sufficiunt. Alij pale
as fabæ binos per maiorem arborē qualos. Alij ueteris urinæ hu
mane trunco quantum satis uidet̄ affundunt, & arbori morta
rium statim faciunt, maxime locis sicis trunco ante coopto. Oleū
sterilem terebra gallica pforabis. Tunc duos frugiferae arboris ab
australi parte ramos eiusdem magnitudinis tollis, & stricte in fo
ramen utrūq; conuicias, uel lapidem, uel pini, uel querā palos, et
absisso eo, quod superabit, luto paleato curabis. oculere. Sed si
sine fruge luxuriant, olea stri palum radiabus eius insige. Nunc

etiam quibus moris est, frumenta iterum sarrire conveniet. Nunc locis frigidis seminaria, quæ februario mense dicta sunt, bacarum, & seminum fiunt, & rosaria in mensis initio percolantur.

De hortis.

T.IX.

NUNC horti optime sumunt cultionis initia. Mense martio carduus seritur. Terram stercoreatam, & solutam diligit, quâvis in pingui possit melius provenire. Et hoc illi contra talpas prodest, si pangatur in solido, ne terra ab inimicis animalibus facilius perforetur. Serendi sunt cardui luna crescente in area iam parata semina spatio semipedis discreta. Cauendum est, ne semina inuersa ponantur, nam debiles incuruos, & duros creabunt. Non alte imprimenda sunt, sed tribus digitis comprehensa mergantur, donec ad primos articulos terra perueniat. Tunc leniter operiatur, & herbis liberentur assidue, donec plantaria solidentur, & rigetur, si æstus interuenit. Si cacumina seminum confringas, spinis carebunt. Item si semina eorum madefeceris per triduum laurino oleo, uel nardino, uel opobalsamo, uel succo rosæ, uel masticiæ, & postea siccata deprefferis eiusdem saporis orientur, cuius unguentum semina cõbiberunt. Singulis sanè annis à codice auferendæ sunt plantæ, ut nec matres fatigent, & soboles per alia spatia digeratur, cum aliqua tamen radicis parte uellendæ sunt. Quos reseruabis ad semina colligenda, liberatos omnibus pullis testa supregere debebis, aut cortice. Nam solent semina sole, uel imbribus interire. Contra talpas prodest catos frequenter habere in medijs carduetis. Mustellas habent plerique mansuetas. Aliqui foramina earum rubrica, & succo agrestis cucumeris impleuerunt. Nonnulli iuxta cubilia talparum plures cauernas aperiunt, ut illæ territæ fugiant solis admissu. Plerique laqueos in aditu earum fetis pendentibus ponunt. Hoc etiam mense ulpicum bene, & allium seremus, & æpullas, & cinelam locis frigidis, et anetum. Nunc & sinapis, & caules optime seruntur, uel plantantur, & malua seritur, & armoracæa, & origani planta trāsferatur. Lactuca, et beta, & porrus, & capparis feri possunt, et colocasia, et satireia, & nasturium. Intyba etiam, et raphanos nunc aliqui serunt, quibus utantur æstate. Nunc melones serendi rari. Distent inter se semina pedibus duobus locis subactis, uel palstinatis, maxime arenis. Semina eius mulso, et lacte per triduum

M ij

maceranda sunt, & tunc iam siccata ponenda, hinc suaves effici-
 entur. Odorati aut sunt, si eorum semina multis diebus inter ros
 se folia sicca mergantur. Nunc & cucumeres seminantur rare sul-
 cis factis altitudine sesquipedali, latitudine pedum trium. Inter
 sulcos. VIII. pedum spatium crudum relinquant, ubi possint uas-
 gari. Herbis iuuantur, ideo sarculo, & runcatione non indigent.
 Semina si ouillo lacte, & mulso maceres, dulces nascentur, & can-
 didi. Longi, & teneri fiunt, si aquam in patenti uasculo sub eis
 ponas duobus palmis inferiorem, ad quam festinando tales efficien-
 tur. Sine semine nascentur, si prius eorum semina oleo sabino pun-
 gantur, & herba ea, quae culex dicitur, trita confricentur. Aliqui
 florem cucumeris cum uiticulae suae capite cannae inserunt, cui pri-
 us omnes nodos perforauerint, ibi cucumis nascetur in nimiam lon-
 gitudinem, tensus. Oleum sic metuit ut si iuxta posueris, uelut ha-
 mus plicetur. Quoties tonat, uelut timore perterritus conuertitur.
 Si eius florem sicut in sua uite est, in forma fictili clauseris, ac li-
 gaueris, qualem uultum forma uel hominis, uel animalis habuerit
 talem cucumis figuram praestabit. Haec omnia Gargilius Mar-
 tialis asseruit. Columella dicit, loco aprico, & stercoroso si rubos
 habeamus, aut ferulas, post autumnii equinoctium, his iuxta ter-
 ram reas, & excavatis ligneo stylo, inter medullas letamen im-
 mittamus, & cucumeris semen addamus, hinc nasci fructus, qui
 possint & inter frigora non necari. Hoc mense asparagos seremus
 circa apriles Calen. pingui loco, humido, subacto, ita ut minori-
 bus fossulis, ad lineam directis bina, aut terna grana semipedis
 spatium discreta ponant. Dehinc stercore solum tegat, & herbae
 subinde uellantur, uel per hyemen supra stramina iaciantur primo
 uere tollenda. Hinc post triennium nascentur asparagi. Sed expe-
 ditior ratio est, si asparagorum spongas ponas, quae cito fructum mi-
 nistrent. Haec sic fiunt. Semina asparagi quanta tribus digitis com-
 prehendere possis, post idus februarias pingui, & stercorato solo
 in singulis fossis ponis, et leniter obruis. His coeuntibus radix con-
 nexa nascetur, quae appellatur spogia. Sed & haec moras habet.
 Nam per biennium in seminario suo est stercore, & assidua run-
 catione nutrienda. Deinde post equinoctium autumni transferet,
 & uere asparagum dabit. Haec erit utilius comparare, quam longa
 expectatio nutrire. Eas tamen, in sulcis disponemus, si loca sicca
 sunt inter medios sulcos, si humida, in summitate sulcorum. Hu-

mor spongas asparagorum transitu suo debet tñ rigare, nō sistere. Asparagum, quē primo protulerint, confringere debemus, nō auellere, ne adhuc inualidam moueamus spongiā. Ceteris annis auellendus est, ut oculos suae germinationis aperiat, quia si deinceps refringas, loca, quae fecunda esse cōsueuerunt, remanēt te asparagi radice claudēt. Ministrabunt aut uere, & autumno reseruabis eū, de quo sumpturus es semina, postea scopas eius incendes, tūc circa hyemem spōgis adiacēs stercus, & cinerē. Hoc mense ruta serit̃ locis apriis solius cineris insperione contēta. Loca desyderat altiora, unde humor elabitur. Si ponas semina eius adhuc clausa folliculis, singulatim manu debebis affigere. Si iam minuta sunt sparsa iactabis, & rastro obducta cooperies. Caulēs eius, q̃ inclusis seminibus nati fuerint, fortiores erunt, sed serō nascēntur. Ramuli eius cū aliqua corticis parte conuulsi uerno tpe pro plātis tenebūt. Tota uero trāslata morietur. Nonnulli ramulos eius pertusae fabae inserunt, uel bulbo, atq; ita obruunt alieno uigore seruandos. Prosequuntur ēt maledictis, & maxime in terra soluti lateris ponunt, quod prodesse certissimū est. Sed (ut asserunt) melius furtina proueniet. Sub fici arboris umbra libentius acquiescat. Nō effodi herba, sed optat auelli. Immunda mulieris formidat attactū. Ab hoc mense usq; in octobrē totum coriandrū seritur. Amat terrā pingue, sed & macro solo nascitur. Semen melius putatur, quod uetustius fuerit, delectatur humore. Satū bñ, cum olere quocunq; nascetur. Hoc mense cucurbita ferenda est. Amat solū pingue, humidū, stercuratum, solutū. Hoc in cucurbitis insigne est, q̃ lōgas pariūt, & exiles semina, quae in earū ceruice nascunt, quae in uentre fuerāt, cucurbitas faciūt crassiores, q̃ in fundo, latas, si inuersis cacuminibus obruant. Vbi adolescere cōpint, amminiculis adiuuent. Quae seruant ad semina, usq; ad hyemē in sua uite dependeāt, deinde sublata in sole ponant, aut fumo, aliter semina putrefacta depereunt. Hoc mense blitus seritur solo qualicūq; sed culto. Oulus hoc neq; runcandū est, neq; sarculandū. Cum semel natū fuerit, ipsum se per multa secula seminis sui deiectione reparabit ut ēt si uelis, uix possit aboleri. Nūc ēt serpyllum seritur plantis, & semine, sed uetustate meliori. Lētius frondebit, si iuxta pisanam, uel lacum, uel putei margines conserat. Anisum quoq; et aminū nunc bene serit. Locis letioribus melius puenit, itemq; ceteris, si humore inueat, & stercore.

M iij

MARTIVS.

De pomis, & malo punico.

T.X.

LOCIS temperatis mense martio, uel aprili mala punica seremus, calidis uero, & siccis nouembri. Amat hæc arbor solū cretosum, macilētum, sed in pingui ēt prouenit. Regio illi ē apta, quæ calida est. Serit plantis de matrum radice deuulsis. Sed quāuis multis generibus seratur, melius tamen ramus eius cubitalis incisus manubry crassitudine, & capite utroq; acuta falce lenigatus scrobi uelut obliquus immergitur, prius tñ porcino stercore & in capite, & in parte, quæ ima est, oblinatur, uel in crudo solo malleo cogatur ad inferiora defigi. Melius proueniet, si ponēdus ramus gemmata iam matre sumatur. Sed qui in scrobe deponit, si tres lapillos in ipsa radice constituat, prouidebit, ne poma findantur. Curandum ne uirgulta inuersa deponas. Creduntur acida fieri, si rigentur assidue, nam siccitas in his & suauitatem præstat, & copiā, cuius tñ nimietati aliquid debet humoris opponi. Circūfodi autumno debet, & uerno. Si acida nascent, modicum laseris cum uino tritum p̄ summa arboris cacumina oportet infundi, uel ablaqueatis radicibus tedæ clauus insigi. Alij algam marinam obruunt ad radices, cui nonnulli sterces miscēt asininum, atq; porcinum, si florem non continet, urinam ueterē cum pari mensura aquæ temperabis, & per annum in radicibus infundes. Vni arbori amphora ingesta sufficiet, uel amurcā mitis insulsam, uel algam radicibus iunges, & bis rigabis in mēse, uel arboris florentis truncum plumbeo circulo debebis includere, uel corio anguis inuoluere. Si crepant poma, lapidem in media arboris radice supponis, uel squillā circa arborem seris. Et si, dū pendunt poma, tenacibus, sicut in arbore habentur, intorseris, in totum annum sine corruptione seruabis. Si uermibus laborant, tangis radices felle bubulo, & continuo moriuntur, aut clauo æneo si uermes eosdem purges, difficile nascentur, uel asini urina stercorei admista porcino uermibus obuiabit. Cinis cū lixurio circa puniā truncum frequenter insusus, læta, & fructuosa reddit arbusta. Afferit Martialis candida in his grana fieri, si argillæ, & cretæ, quartam partem gypsi misceas, & toto triēnio hoc genus terre radicibus eius adiūgas. Idem dicit miræ magnitudinis fieri, si olla fictilis obruatur circa arborem punici, & in ea ramus cum flore claudatur, ut resileat ligatus ad palum. Tunc coopta

olla cōtra aquæ muniatur incursus. Autumno patefacta suæ magnitudinis poma redhibebit. Multa in punico ipse asserit poma procedere, si titimalli, & portulacæ succus æqualiter mistus ante q̄ germinet, trunco arboris adlinatur. Inseri posse affirmat, de ramorum connexionē, ut medulla utrinq; diuisa se iungat. In se tantum inseri potest circa apriles Calendas Mense Martio ultimo. Sed secto trunco furculus recentissimus statim debet inseri, ne mora exiguum, qui inest, siccat humorem. Punica mala seruantur, si picatis pediculis ordinata suspendas. Aliter. Lecta integra in aqua marina, uel muria feruente mergatur, ut combibant. Post triiduum sole siccentur, ut sub dio nocte non maneant, post in loco frigido suspendantur. Cum uolueris uti, aqua dulci pridie macerabis. Feruntur hæc pomis recentibus emulari. Item si tactu inuicem separata paleis obruantur. Item fossa fit longa, & cortex eiusdem magnitudinis paratur, cui mala acutis furculis suis affiguntur. Tūc inuersus cortex supra fossam ponitur, ut mala sine terræ tactu subterpendentia ab humore defendat. Item si induant argilla, & ea siccata loco frigido pendeant. Item si seriola sub dio obruatur, quæ habeat arenas usq; ad medium, & mala cū tenacibus lecta imprimantur cannis singulis, uel sambuci uirgulis, & ita separata in arenis figantur, ut ipsa quatuor digitis emineant ab arena. Hoc & sub tecto in scrobe bipedanea fieri potest, & utilius est ad seruandum, si cum ramo longiore tollantur. Aliter. In seriola, cui ad medium aqua mittat, suspenduntur mala, ne humorem tangant, & seria claudis, ne uentus irrumpat. Item in dolio intra ordem sic ordinant, ne se inuicem tangant, & dolium desup operitur. Vinum de malis granatis conficies hoc mō. Grana matura purgata diligenter in palmea fisciella mittis, & in coclea exprimis, & lente coques usq; ad medietatē, cū refrixerit, picatis & gypsatis uasculis claudes. Aliqui succum nō excoquunt, sed singulis sextarijs, libras mellis singulas miscent, & in prædictis uasculis ponunt, & custodiunt.

De Citreo.

MENSE martio citri arbor quatuor modis seritur, semine, ramo, talea, claua. Amat terrā rarioris naturæ, cælū calidum, humoremq; cōtinuū. Si granis uelis serere, ita facies. Terrā in duos pedes fodies, cinerem miscebis, breues areas facies, ut utrinq; per

MARTIVS.

canales aqua discurrat. In his areis palmarem scrobem manibus aperies, & tria grana deorsum uerso acumine iuncta cōstitues, & obruta quotidie rigabis. Citius p̄cedent, si beneficio aquæ tepentis utaris. Natis germinibus semper proxima herba runcet. Potest hinc trima plāta transferri. Si ramū uelis ponere nō amplius sesquipede debebis immergere, ne putrescat. Claua feri cōmodius est, quæ sit manubrij crassitudine, lōgitudine cubitali ex utraq; parte lenigata, nodis, & aculeis reāsis, sed integra summitate gemmarum, p̄ quas spes futuri germinis intumescat. Diligentiores et fino bubulo adlinunt utrinq; quod summum ē, uel marina alga uestiunt, uel argilla subacta, partis utriusq; extrema cooperiunt, atq; ita in pastinato solo deponunt. Talea et gracilior, & breuior esse pōt, quæ similiter ut claua mergeat. Sed talea palmis duobus superfit, claua omnis obruitur. In spatio non desyderat interualla maiora. Alijs arboribus non debet annecti. Calidis locis, sed irriguis, & maritimis maxime gaudet, quibus humor exundat. Sed si quis hoc genus, ut in regione frigida nutriatur, extorquet, loco uel parietibus munito, uel in meridiana partem uerso disponat hāc arborem. Sed hybernis mensibus tectum stramine uellet agresti. Vbi æstas resulserit, aeri arbor nuda, & secura reddatur. Talea, sine claua eius calidissimis regionibus, & per autūnum ponitur. Frigidissimis iulio, & augusto positas, et quotidianis rigatiōibus animatas, ipse usq; ad poma, & magna incrementa perduxit. Citreum iuuari credit, si cucurbitæ uicinis locis serantur, quarū uites et combustæ utilē atrī arboribus cinere inpræbent. Gaudent assidua fossione, hinc proueniunt poma maiora. Nisi quæ arida sunt, rarissime debemus abscondere. Inseritur mense aprili locis calidis, maio frigidis, nō sub cortice, sed fissis truncis circa ipsas radices. Inseritur & pyro, ut quidam uolunt, & moro, sed insiti surculi qualo desup omnino muniendi sunt, uel fictili uasculo. Afferit Martialis apud Assyrios pomis hanc arborem nō carere. Quod ego in Sardinia, & in territorio neapolitano in fundis meis cōperi, quibus solum, & cœlū tepidum est, & humor exundans, p̄ gradus quosdam sibi semper poma succedere cū maturis se acerba substituant, acerborum uero ætatem florentia cōsequantur, orbem quendā cōtinuæ fecunditatis sibi ministrante natura. Feruntur acres medullas mutare dulcibus, si per tridnū aqua mulsa semina ponenda macerentur,

uel ouillo lacte, quod præstat. Aliqui mense februario truncum obliquo foramine ab imo terebrant, ita ut altera parte non exe-
at, ex hoc humorem fluere permittunt, donec poma formentur,
tunc foramen luto replent, sic quod est medium fieri dulcæ confir-
mant. Citreum et in arbore potest per totum annum propemodū
custodiri. Melius si uasculis quibuscūq; claudat. Si uelis legere,
atq; seruare, nocte luna latente debetis cū ramis foliatis carpere,
& secreta disponere. Alij singula uasis singulis claudunt, uel gy-
pso adlimunt, & opaco loco ordinata custodiunt. Pleriq; in ce-
dri scobe, uel in straminibus minutis, uel in paleis tecta seruāt.

Mespilum.

MESPILA locis calidis maxime gaudent, sed irriguis ta-
men, frigidis quoq; proueniunt, magis sabulone pingui, aut gla-
reosa terra, cui arena permixta est, uel argilla cum saxis. Serēda
est taleis mense martio, uel nouembri, sed solo stercoreato, & sub-
actō, ita ut utrunq; caput taleæ sterco obducatur. Sunt eius incre-
menta tardissima. Amat putari, atque circumfodi, & parco hu-
more inter siccitates sæpe resoueri. Seritur & semine, sed in lon-
giorem speratur ætatem. Si uermibus occupatur, stylo æreo puri-
gandi sunt, et amurca, uel humana uetere urina, uel uina calce
profundendi, sed parcius propter arboris noxam, uel aqua deco-
cti lupini. Si putatur, hinc arbor sterilis fieri. Fimur, & cinis ui-
tium simul, si radicibus infundantur, fertilem reddunt. Si formi-
cæ molestæ sunt, rubrica cum aceto, & cinere temperata necabū-
tur. Si poma labuntur, frustum de eius radice præcisum in media
trunci parte figatur. Inseritur mense februario in se, & in pyro,
& in malo. Surculus tamen eius ex arbore media debet assumi,
nam de summitatibus uitiosus est. In tronco fissō inferenda est,
nam corticis macies ieiuna nil nutrit. Mespila ad seruandum le-
guntur necdum mitia, quæ et in arbore diu durabunt, uel in ur-
ceolis picatis, uel in ordinem suspensa, uel ut quidam, pusca, uel
sapa condita. Die serena legantur, ac media, & palis obruan-
tur discreta, ne ea uicissim tactus afficiat. Vel cum pediculis le-
cta semimatura, & salsa aqua per dies quinq; macerata, postea
sæpe infundatur, ut enatent. Seruant & melle, sed si minus ma-
tura collegeris.

MARTIVS.

De ficu.

CALIDIS locis fici planta radicata nouēbri mense, tēpera-
tis, februario, frigidis melius martio, uel aprili ponēda est. Si *ta-*
leam, uel *cacumen* ponas, ultimo aprili, cum ei se uiridior *succus*
infuderit. Plantæ in scrobe depositæ lapides substituēdi sunt, ad
radicem fimo terra miscēda est. Si loca frigida sunt, plantarū
cacumina diuisis canne internodijs defendant à frigore. Si *cacu-*
men uelis ponere, trisulcum ranium binum, uel trinum ab au-
strali parte decidas, & sic obrues, ut diuisa *cacumina* terra inter-
iacente uelut tres surculos reddant. Taleā sic ponemus, ut cetera,
cui leuiter ab infima parte diuisæ lapidē mergemus in sisso.
Ego mense Februario ultimo, uel martio in Italia plantas gran-
des ficoꝝ per pastinatum solum disposui, & eo anno poma pepe-
rere supra comprehendendi felicitatem, uelut tributa reddētes.
Legendæ sunt plantæ, in qbus frequens nodus extuberat. Steri-
les creduntur, quæ nitidæ sunt, & oculos suos per longa interno-
dia distulerunt. Si plantā fici prius nutrias in seminario, & ma-
turam transferas in scrobē, poma generosiora pducet. Aliq mul-
tum prodesse confirmant, si plantā fici diuiso squillæ bulbo inter-
sitam, strictamq; uinculis collocemus. Scrobes amat altas, inter-
ualla maiora, terræ genus durum, & gracile, & siccum p utili sa-
pore pomorū. Prouenit & petrosis, atq; asperis, tñ potest locis p-
pè omnibus feri. Quæ in montanis, & frigidis locis nascuntur,
quia minus lactis habent, ad siccitatē durare non possunt. Vsus
illis in uiridi est, melioris magnitudinis, et saporis arguti. Quæ
nascuntur in campis, & locis calidis & pinguioribus sunt, et in sic-
citate durabiles. Si genera numerare uelimus, imensum est, suffi-
at, quod omnibus æqua cultura est. Illa distantia est, q in cari-
cis melius alba seruat. In locis nimie frigidis præcoquas fici se-
ramus, quæ cito ueniant, ut ante imbres genus hoc possit occurrere,
calidis uero, & æstuosis eas, quæ serò maturant. Gaudet assi-
dua fossione. Per autumnum proderit, si stercois admoneas, præci-
pue de auarijs. Reuidenda sunt in ea, quæ aut putria, aut male
nata repereris, & ea rōne putanda est, ut inclinata per latera
possit expandi. In locis humectis fici saporis obtusi est, cui circū-
cis contra hoc radiabus aliqtus cinis deoet affundi. Aliq inter-
ficarias caprifici arborē serunt, ut non sit neesse p singulas arbor

res pro remedio eadem poma suspendi. Mēse Iunio circa solstitiū. caprificandæ sunt arbores sic, idest suspendendi grossi ex caprifico, lino uelut fersa pertusi. Si hoc desit, abrotani uirga suspenditur, aut callum, quod in ulmeis folijs inuenitur, aut arietina cornua circa radices arboris obruuntur, uel truncus arboris, quo loco turget, sacrificandus est, ut possit humor effluere. Ne uermes patiatur, ramum terebinthi, uel lētisā, taleā cum plantis sic acumine ponemus inuerso. Vnānis ereis tollendi sunt uermes ex fico. Alij amurcā, alij ueterē urinam ablaqueatis radiabus miscent. Alij bitumen, & oleum, aut solā calcem uinā latebris uermium linunt. Si formicæ molestæ sunt, rubrica, butyro, & picē liqda mista circa truncum debet induci. Alij coracinū piscē cōtra formicas in arbore suspendendum esse confirmant. Si fructus suos uelut ægra projiciet, alij rubrica, aut amurca insulsa mista aqua arborem liniunt, uel cancrum fluuialem cum ramo rutæ suspendunt, uel algam marinam, uel fascem lupinorū, uel radia terebratæ cuneum figunt, uel securi arboris corium sæpe pscindunt, cum folia incipiunt producere sic, ut fructum multum, & pingue ferant, in principio germinis cacumina summa decutimus, uel illud tantum cacumen, quod ex arboris medietate procedit.

Si maturam ficum uis serotinā facere, incipiētes grossos decute, cum illis fabæ fuerit magnitudo. Vt ficus cito maturet, succo cepæ longioris cū oleo, & pipere misto unge poma, qñ grossi incipiunt subrubere. Aprili mense ficū debemus inserere inter corticem, uel si nouellæ arbores sunt, fisso ligno, quod statim operiendum est, et ligandū, ne uentus introeat. Melius cōprehendunt, si circa terrā reisa inserantur arbuta. Aliqui & iunio mēse inserunt. Surculus legendus est anniculus, inutilis. n. creditur maioris, uel minoris ætatis. Inoculari ficus locis siccis aprili, humidis melius iunio mediante poterit, Octobri mense locis tepidis. Pro pagari ficus ramis pōt. Inseritur autem in caprifico, in moro, in platano, et oculis, et surculis. Ficus uirides seruari possunt uel in melle ordinatæ, ne se inuicē tāgant, uel singulæ intra uiridē cucurbitā clausæ, locis unicuiq; canatis, et itē tessera, quæ secat, inclusis, suspensa ea cucurbita ubi nō sit ignis, uel fumus. Alij misas ficus recentes minus maturas in nouo uase fictili lectas cū pediculis, & à se separatas recludunt, et in dolio uini pleno uas natare pmittūt. Martialis dicit, caricas p genera multa seruari,

MARTIVS.

cum ratio una sufficiat. Ergo hoc genere, quo campania tota custodit, seruare debemus, in cratibus ficus expanditur usque ad meridiem, & adhuc mollis in qualum refunditur. Tunc calefacto furno ad panis coquendi modum suppositis tribus lapidibus, ne ardeat qualus includitur, & clauso furno ubi discocta ficus fuerit, sicut est calida interpositis folijs suis in uas fictile conditur bene percitum densius pressa, et operculo diligenter obducitur. Si pluujs abundantibus crates non possis expandere, sub tecto eas ita ponis, ut semipede erigantur a terra, & eas ad uicem solis cinis calidus subiectus uaporet, & subinde ficus, sicut est diuisa, uertatur, ut ficornum coria siccantur & pulpæ, tunc duplicata in astellis seruentur, aut loculis. Alij maturas mediocriter ficas, & diuisas in cratibus expandunt toto sole siccandas & recipiunt eas nocte sub tecto. Nunc ficulnea cacumina obruuntur utiliter, cum tumescunt, ut plantas faciant, si earum copia non abundat. Ut et uarios fructus una ficus exhibeat, ramos duos nigrae, & albæ arborum inter se ita uinculo stringis, ac torques, ut germina miscere cogantur, sic obruti, et stercoreati, et humoribus inti, ubi pdire cœpint, germinantes oculos aliqua iter se annexione cōglutina. Tunc germē adunatum pturiet duos colores, quos unitate diuidat, diuisione cōiungat.

De pomis aliorum mensium.

NUNC & pyrus, uel malus inferi, ac feri potest, & cydonia, & prunus inseritur, & sorba ponuntur, & morus, nono Calendarum aprilium die & inseruntur pistacia, et locis frigidis pini semen aspergitur.

De bobus, tauris, & uacis.

T.XI.

HOC mense cōparandi sunt boues, qui tñ siue de nostris capiuntur armentis, siue emantur, iccirco nunc cōparabuntur utilius, quia necdum sagina tēpis pleni aut calare possunt fallaciā uēditoris, & uitia sua, aut repugnādo domiturae cōtumacē pleni roboris exercere fidutiā. Hæc tñ signa spectanda sunt in bobus, seu de nro, seu de alieno grege fuerint cōparadi, ut sint boues nouelli, quadratis, et gradibus mēbris, et solidi corporis, musculis, ac toris ubiq; surgētib; magnis auribus, latæ frōtis, et crispæ, labris oculisq; nigratibus, cornibus robustis, ac sine curuaturæ prauitate lunatis, patulis naribus, et resimis, cernicæ torosa, atq; compacta pa-

learibus largis, et circa genna fluentibus, pectore grandi, armis
 uastis, uentre nō paruo, porrectis lateribus latis lumbis, dorso re
 cto, & plano, cruribus solidis nervosis, et breuibus, ungulis ma
 gnis, caudis lōgis, ac setosis, pilo totius corporis denso, ac breui,
 rubei maxime coloris, aut fusi. Melius aut boues de uicinis loīs
 comparabimus, qui nulla soli, aut aeris uarietate tentent. Aut
 si hoc deest, de loīs similibus ad similia trāferamus. Illud ante
 uniuersa curandū est, ut uiribus ad trahendū cōparentur equa
 les, ne ualētioris robur alteri procuret exitiū. In moribus hęc cō
 syderanda sunt. Sint arguti, māsuēti, timentes hortamen clamo
 ris, ac uerberis, abi appetentes. Sed si regionis rō patitur, nullus
 melior abus est, q̄ uiride pabulum. Vbi uero deest, eo ordine mi
 nistret, quo pabuli copia, & laboris coget accessio. Nunc tauros
 quoq; (quibus cordi est armenta construere) comparabit, aut his
 signis a tenera etate summittet. Vt sint alti, atq; ingentibus mē
 bris, etatis mediæ, & magis q̄ iuuetute minor est, q̄ quæ declinet
 in seniū. Torua facie, paruis cornibus, torosa, uastaq; cernice, uen
 tre substricto. Vacas ēt nunc maxime parabimus. Sed eligemus
 forma altissima, corporis lōgi, uteri capax, et magni, alta frōte,
 oculis nigris, et grādibus, pulchris cornibus, & p̄cipue nigris,
 aure setosa, palaribus, et caudis maximis, ungulis breuibus &
 cruribus nigris, & paruis, etatis maxime trimæ, q̄a usq; ad de
 cēniū fœtura ex his p̄cedet utilior. Nec ante etatē trimā tauros
 his oportet admitti. Sed erit studiū diligētis amotis senioribus,
 nouellas subinde cōducere, et steriles aratro, ac laboribus deputa
 re. Græci asserūt, si mares creare uelis, sinistrū tauri in coitu ligā
 dū esse testiculū, si fœminas, dextrum, tñ tauros diu ante abstine
 dos, ut cū tēpus est, acrius in cās dilati feruoris incumbant. Sed
 his armentis hyeme maritima, & aprica loca, estate opaca pare
 mis, ac frigida, mōtana maxime, q̄a melius frutetis, et his herba
 internascente saturant, q̄uis circa fluuios recte, p̄pter amœna lo
 ca, pascant, fœtura tñ aquis tepidioribus adiunat, unde magis
 utilius habent, ubi pluuialis aqua repentes format lacunas. To
 lerat tñ frigus hoc armenti genus, & potest facile hybernare sub
 dio, quibus tñ septa fieri p̄pter iniuriā grauidarū conuenit la
 xiora. Stabula uero utilia sunt strata saxo, aut glareis, aut are
 nis, deuexa aliquatenus, ut humor possit elabi, parti meridianæ
 obuersa p̄pter flatus glaciales, q̄bus aliq; resistere debet obiectus.

De domandis bobus.

T.XII.

HOC Mense ultimo domandi sunt trimi boues, quia post quinquennium bene domari non possunt etatis repugnante duritia. Capti ergo statim domentur, qui quidem prius, cum teneri fuerint, frequenti manus attractione mansuescant. Sed stabulū noui boues largioribus spatijs habere debebunt, ut & ante stabulū loca nullis concludantur angustijs, & producti non aliqua uidentur offensa. In ipso uero stabulo asseres transuersi à terra septem pedibus alti configantur, ad quos boues ligentur indomiti. Tunc eligis absolutam tempestatibus, & impedimentis omnibus diem, qua capti perducantur ad stabulum, quorum si nimia fuerit asperitas, uno die, ac nocte inter uincula mitigentur ieiunijs, tunc appellationibus blandis, & illecebris oblatorum ciborum non à latere, neq; à tergo, sed à fronte accedēs bubulcus admulceat, naresq; & terga pertractet, mero subinde conspergens, hac tamen cautione, ne aliquem calce contingat, aut cornu, quod uitium, si in primordijs effectui sibi cēssisse senserit, obtinebit. Tunc mitigatis, os, & palatum salibus fricabis, & in gulam demitte præsulsi adipis librales offas, & uini sextarios singulos cornu infundente per fauces, quæ res intra triduum totius senilitæ irā resoluet. Aliqui eos inter se iungunt, ac docent onera tentare leuiora, & quod utile est, si arationi parant, subactō prius solo exercendi sunt, ut nouus labor tenera adhuc colla non quasset. Expeditior autem ratio est domandi, ut asperum bouem mansuetō, & ualido boui coniūgas, quo ostendente facile ad omnia cogetur officia. Si post domituram decumbit in sulco, non afficiatur igne, uel uerbere, sed potius, cum decumbit, pedes eius ita ligentur uinculis, ut nō possit progredi, aut stare, uel pasā. Quo factō siti, ac fame lassatus carebit hoc uitio.

De equis, equabus, & pullis.

T.XIII.

HOC Mense saginati, ac pasti ante admissarij generosis equabus admittendi sunt, & repletis fœminis, itē ad stabula colligendi. Neq; tñ equalē numerū omnibus debemus adhibere, sed æstigmati uiribus uniuscuiusq; admissarij, submittenda sunt pauca, uel numerosa cōiugia, quæ res efficiet admissarios nō parua ætate durare. Inueni tñ equo, & uiribus, formaq; cōstanti non am-

plius q̄ duodecim, uel quaterdecim debemus admittere, ceteris pro qualitate uirium suarum. Sed in admissario quatuor spectanda sunt, forma, color, meritū, pulchritudo. In forma hoc sequemur, uastum corpus, & solidum, robori cōueniens altitudo, latus longissimum, maximi, & rotundi clunes, pectus late patens, & corpus omne musculorū densitate nodosum, pes siccus, & solidus, et cornu concavo, altius calciatus. Pulchritudinis partes hæ sunt, ut sit exiguum caput, & sicum, pelle p̄p̄modum solis ossibus adherente. Aures breues, & argutæ, oculi magni, nares patulæ, coma, & cauda p̄fusior, ungulae solida, & fixa rotunditas. Colores hi præcipui Badius, aureus, albinus, rufus, mureus, æruius, gilbus, scutulatus, albus, guttatus, candidissimus, niger, presus. Sequētis meriti, uariis cū pulchritudine, nigro, uel albino, uel badio mistus, canus cum quouis colore, spumens, maculosus, murinus, obscurior. Sed in admissarijs præcipue legamus clari, & unius coloris, ceteri uero despicendi, nisi magnitudo meritorū culpam coloris excuset. Eadem in equabus cōsideranda sunt, maxime ut sint longi, et magni uentris, et corporis, sed hoc in generosis seruetur armentis. Ceteræ passim toto anno inter pascua, dimissis secū maribus impleant. Equarū natura est, partum spatio duodecimi mensis absoluerē. Illud in admissarijs seruādū est, ut medijs aliquibus spatijs separent, propter noxā furoris alterni, sed his armentis pascua legamus pinguiissima, hyeme aprica, frigida, et opaca provideamus æstate, nec adeo mollibus locis nata, ut unguarū firmitas de asperitate nil sentiat. Si equa mare pati noluerit, trita squilla naturalia eius infecta libidinē contabunt. Deinde gruidæ nō urgeant, nec famē, uel frigus tolerant, nec inter se loci cōprimant angustijs. Generosas equas & q̄ masculos nutriūt, alternis annis submittere debebimus, ut pullis puri, & copiosi lactis robur infundant, ceteræ passim replendæ. Aetas incipiētis admissarij q̄nti anni initio eē debet. Fœminare ete et bima cōcipiet, q̄a post decēniū iners ex ea soboles, et tarda nascetur. Pulli equarū nati manu tangendi nō sunt, quia eos tactus lēdit assiduus, quantum rō patitur, defendantur à frigore. In pullis pro ætatis merito ea sunt cōsideranda, quæ signum bonæ indolis monstrant, quæ in patribus, uel matribus spectanda præcipi, dabit et hilaritas, et alacritas, agilitasq; documētū. Nunc domandi sunt pulli, ubi tempus bimæ ætatis exæsserint.

MARTIVS.

Consideranda sunt magna, longa, musculoſa, & arguta corpora, teſticularum pares, & exigui, & cetera, q̄ in patribus dicta ſunt. Mores, ut uel ex ſumma quiete facile cōtēnt, uel ex incitata feſtinatione nō difficile teneant. Aetatis cōſideratio talis ē. Bimo & ſex menſium dentes mediū ſuperiores cadunt. Quadrimo canini mutant. Inſra ſextū annū molares ſuperiores cadunt. Sexto anno quos primo mutauit, exæquat. Septimo anno oēs dentes eius explent. Latent ab hinc ætatis notæ, ſed prouectioribus t̄p̄a canari incipiunt, ſuperalia caneſcere, dentes plerūq; prominere. Hoc menſe oīa quadrupedia maxime equos caſtrare debemus.

De mulis, & aſinis.

T. XIII.

SI QVEM mulorū genus creare delectat, equam magni corporis, ſolidis offibus, & forma egregia debet eligere. In qua non uelocitatē, ſed robur exquirat. Aetas à quadrima uſq; in decennē huic admiſſuræ iuſta cōueniet. Si aſinus equā faſtidit admiſſus, oſenſam prius aſinā) donec coeundi uoluptas ſolietetur) adhibemus, qua ſubducta, equā libido incitata nō ſpernet, et raptus illecebris generis ſui in permiſſionē conſentiet alieni. Si morſu fures lædit obiectas, aliquatenus labore miteſcat. Creantur ex equa & aſino, uel onagro & equa. Sed generoſius nullū eſt huiusmodi animal, q̄ quod aſino creante naſcetur. Vtiles tñ admiſſarij naſcentur ex onagro et aſina. Qui poſt in ſobole ſecutura agilitatē fortitudinemq; reſtituant. Admiſſarius tñ aſinus ſit h̄mōi, corpore amplo, ſolido, musculoſo, ſtriſtis, et fortibus mēbris, nigri, uel murini maxime coloris, aut rubei. Qui tñ ſi diſcolores pilos in palpebris, aut auribus geret, colorē ſobolis plerūq; uariabit. Minor trimo, maior decenni nō debet admitti. Annicula mula debet à m̄re depelli, et p̄ mōtes aſpos paſci, ut itineris laborē ī tenera ætate ſolidata cōtēnat. Minor uero aſellus maxie agro neceſſarius ē, q̄ & laborē tolerat, et negligentia, p̄p̄modū nō reſuſat.

De apibus.

T. XV.

HOC menſe maxime apibus ſolet morbus incūbere, nam poſt hyberna ieiunia titimalli, et ulmi amaris floribus, q̄ prius naſcuntur, auidius appetitis ſolutionē uentris incurrunt, & pereunt, ni ſi affueris uelocitate remedij. Præbebis ergo mali granati cū uino amineo, grana cōtrita, uel uinæ paſſæ cū rore ſyriaco & aſtero uino,

uino, uel simul omnia lenigata, & incocta uino aspero. Quæ
deinde in ligneis canalibus refrigerata ponantur. Itē rosmarinus
aqua mulsa decoctus congelat, et in imbrice ponit succus huius
modi. Quod si horridæ uidentur, atq; cōtractæ torpere silentio,
& mortuarum corpora frequēter efferre, canalibus ex canna fa-
ctis mel cum gallæ puluere, uel siccæ rosæ coctum debebis infun-
dere. Illud ante omnia expediet, ut putres partes fauor, uel uar-
cias ceras, quas aliquo casu examen ad paucitatem redactū nō
ualebit implere, semp readas acutissimis ferramentis subtiliter,
ne mota alia pars fauor cogat apes domicalia cōcussa deserere.
Noct apibus plerunq; felicitas sua. Nā si nimis floribus annus
exuberat, dum solā curam gerēdi mellis exercet, de prole nil cogi-
tant. Cuius omīssa reparatiōe populus idē labore cōfectus extin-
guis, totius gentis exitio. Itaq; cū mellis nimietatem uideris ex
florū grandi & cōtinua messe defluere, interiectis ternis diebus
clauso foramine nō eas patiāris exire. Ita ad generandā sobolē
conferent. Nūc circa Calē. Apriles curadi sunt aluei, ut oīa pur-
gamenta tollant, & sordes, quas tēpus cōtraxit hybernū, & uer-
miculi, & tineæ, et araneæ, qbus corrūpitur usus fauor, et papi-
liones, q uermiculos stercore suo faciunt nasa. Tunc fumus incen-
si, & sici bubulister coris adhibeat, qui aptus est apium saluti.
Quæ purgatio frequēter usq; in autūni tempora celebret. Hæc
oīa, ceteraq; effiaes castus, & sobrius, & alienus à balneis, uel
à abis acribus, et odoris immundi, atq; omnibus salsamentis.

De horis.

T.XVI.

HIC Mensis ad deprehendendas horas consentit Octobri.

Hora	I.	pedes	XXV.
Hora	II.	pedes	XV.
Hora	III.	pedes	XI.
Hora	IIII.	pedes	VIII.
Hora	V.	pedes	VI.
Hora	VI.	pedes	V.
Hora	VII.	pedes	VI.
Hora	VIII.	pedes	VIII.
Hora	IX.	pedes	XI.
Hora	X.	pedes	XV.
Hora	XI.	pedes	XXV.
	Pallad.		N

TITVLII MENSIS APRILIS.

De medica serenda, & disciplina eius.

T. I.

De inferenda olea, uel oleastro, de uineis, & seminarijs fodien-
dis, & inferendis uitibus, & agris humidis, & pinguibus p
sändendis.

T. II.

De hortis, in eo de caulibus, item de apio, de atriplicæ, de ocymo
cum disaplinis suis, item de melone, cucumere, porro, cappar
ri, serpyllo, colocasia, lactuæ, beta, æpullis, coriandro, inty
bis, cucurbitis, ac menta.

T. III.

De zizipho cum disaiplina sua, & de alijs pomis, quorum suis
mensibus disaiplina descripta est.

T. IIII.

De oleo uiolacæo, & uino.

T. V.

De armentis, in eo de uitulis nutriendis, de tonsuris, & signatur
ris.

T. VI.

De apibus, in eo de uestigandis apibus, & purgandis aluea
rijs.

T. VII.

De horis.

T. VIII.

PALLADII RVTILII TAVRI ÆMILIANI VIRI ILLV STRIS DE RERVITCA LIBER QVINTVS.

De medica serenda, & disciplina eius.

T. I.

PRILI Mense in areis, quas ante (sicut di
ximus) preparasti, medica serenda est. Quæ se
mel seritur, decem annis permanet, ita ut quat
ter, uel sexies possit per annum reidi. Agrum
stercorat, macra animalia reficit, curat ægota.
Iugerum eius toto anno tribus equis abunde
sufficit. Singuli cyathi seminis occupant locum latum pedibus
quinque, longum pedibus decem. Sed mox ligneis rastellis obru
antur iacta semina, quia sole citius comburuntur. Post sationem
ferro locum tangi non licet, sed rastris ligneis frequenter herba
mundetur, ne teneram medicam premat. Prima messis eius tar
dius fiet, ut aliquantum semen excutiat. Cæteræ uero messes q̄ uo
lueris cito peragantur, & iumentis præbeantur. Sed primo par

cius præbenda est nouitas pabuli, inflat enim, & multū sanguinem creat. Vbi seueris, sæpius riga. Post paucos dies, cum fruticare coeperit, omnes alias herbas runcato, ita & sexies per annū metis, & annis decem poterit manere continuus.

De inferenda olea.

T.II.

N V N C locis temperatis oliua inferatur, quæ inferit inter corticem more pomorū, sicut supradictum est, sed ut oleastro inferas, contra illud quod ex oliueto insito, & casu incenso renascit oleaster infelix, sic providendum est. Positis prius oleastri brachijs in scrobe, in qua disponemus inferere, scrobes ita replebimus, ut mediae uacue sint. Cum comprehenderit oleaster, inferemus in infimo, uel insitum ponemus, & insitionem propè infra terram nutriemus. Deinde sicut adolescit, terram subinde colligimus. Ita commissura in profundo latente, quisquis urit, aut cedit, oliuæ locū non aufert pullulandi, quæ & apertam redeundi felicitatem de olea, & occultam ualendi feracitatē de oleastri cōnexionē retinebit. Aliqui oleas in radiabus inserūt, & ubi comprehēderint, cum aliqua parte radiis auellunt, & transferunt more plantarum. Græci oleas ab octauo Calendarum aprilii die, usq; in tertium nonarum iulij inferi debere præcipiunt, ita ut locis frigidis ferius, calidis maturius inferant. Locis frigidissimis nūc uinearū fossio ante idus peragēda est, & si qua de martio mense restabāt. Vites quoq; inferimus. Seminaria, quæ sunt ante facta, herbis liberentur, & leuiter arcufodiant. Nūc locis mediocriter siccis milium serimus, & panicū. Hoc mense pingues campi, & agri, quod diu aquā tenent, profandantur post idus, cum & omnes herbas protulerint, & earum semina non dum maturitate firmata sint.

De hortis.

T.III.

H O C etiam mense ultimo, & propè uere transacto brassicam ferere possumus, quæ cauli seruiet, quia cymæ tēpus amisit. Nūc apium bene seritur locis calidis, & frigidis terra quali uolueris, dumodo ibi sit humor assiduus, quamuis nasci, si necesse fuerit, & in siccitate nō deneget. Et propè omnibus mensibus, à primo uere usq; ad autumnum seratur extremum. Ex ipsius genere est hiposelinon durius tñ, & austerius, & helioselinon molli folio, & caule tenero, quod nascit in lacunis, et petroselinon maxime.

N ij

APRILIS.

locis asperis. Hæc omnia genera possunt habere diligētes. Apios maiores facies, si semen quantum tribus digitis cōprehēdi potest, linteolo clausis rariore, & breui fossa obrueris. Ita oīum seminum germin capitis unius soliditate necesse. Crispi fiunt, si semina ante tundant, uel si sup areas nascentes aliqua pōdera uoluntentur, aut pedibus proculcentur enata. Apij semina uetustiora citius nascuntur, quæ nouella sunt, serius. Hoc mense atriplicem seremus, si rigare poterimus, & iulio, & cæteris usq; ad autumnum, mensibus. Amat assiduo humore satiari. Semen statim, cū spargitur, obruendum est, herbæ ei subinde uellantur. Transferrī necessarium non est, cū bene seritur, tñ potest melius adolescere, si spatio rariore pangatur, & inuetur succo letaminis, & humoris. Ferro tñ resindendum semper est, quia ita pullulare non cessat. Nūc ocymum seritur, cito nasci dicitur, si statim, cum seueris, aqua calida perfundas. Rem mirant de ocymo Martialis affirmat, qd modo purpureos, modo albos flores, modo roseos pariat, & si ex eo semine frequēter seratur, modo in serpyllum modo, in sisimbrium mutetur. Hoc ēt mense melones, & cucumeres seruntur, & porrus, & in primordio capparīs, & serpyllum, & colocasie plantaria ponemus, & lactucas, & betas, & æpulas, & coriandrum seremus, & intyba secunda satione, quibus utamur æstate, & cucurbitas, & mentam, radice uel planta.

De Zizipho cum disciplina sua.

T.IIIII.

LOCIS calidis aprili mense Ziziphū conseremus, frigidis uero maio, uel iunio. Amat loca calida, aprica. Seritur ossibus, et stipite, & planta. Crescit tardissime. Sed si plantam ponis, martio magis in terra molli, si ossibus seras, in scrobe palmari, ita ut terrena grana p scrobem cacuminibus ponantur inuersis. Quibus in imo, & in summo affundatur letamen, et cinis, et herbis adnascentibus manu planta liberetur erumpens. Cū pollicis soliditati similis fuerit, trāsferatur in locū pastinatum, uel in scrobem. Terram diligit non nimis letam, sed proximam tenui, atq; ieiunæ. Per hyemem prodest illi, ut circa codicē lapidum cumulus aggeretur, qui æstate debet auferri. Si arbor hæc tristis est, ferrea strigili subrasa hilarior fiet, uel si finium bubulum radicibus modicæ, & frequenter affundas. Zizipha collecta matura in longo uase fictili seruantur oblito, et loco sicciore cōposito, uel recenter lecta

poma si guttis uini ueteris perfundas, efficitur, ne ea rugarum de-
formet attractio. Seruantur etiam densa cum ramis suis, aut frō/
de sua inuoluta, atq; suspensa.

De pomis aliorum mensium.

T.V.

HOC etiam mense locis tēperatis mala granata ponuntur, ea
ratione, qua dictum est, & inserunt. Nam circa Cal. Maias per
ficus inoculari potest, quo more emplastratur ficus, sicut diximus
cū de insitione loqueremur. Hoc mense calidis locis citri arbor in-
seritur, sicut supra memorauimus. Nūc locis frigidis fici plantaria di-
sponemus, seruantes eam, quæ supradicta est, disciplinam. Nunc
ē ficus debemus inserere in ligno, uel sub cortice, sicut ante præce-
pi, & eam locis ficis inoculari. Nunc planta palmarum, quam
cephalonem uocamus, locis apriis, & calidis est ponenda. Hoc
mense sorbum poterimus inserere in se, in cydonio, in spina alba.

De oleo, & uino uiolaceo.

T.VI.

TOT uiolæ uncias infundas, quot olei libras miseris, et diebus
XL. sub dio habere debebis. Violæ purgatæ, ut de rore nihil ha-
beant. libras quinque uini ueteris. X. sextarijs debebis infundere,
& post. XXX. dies. X. mellis ponderibus temperare.

De armentis.

T.VII.

HOC mense uituli nasci solent, quorum matres abundātia pa-
buli inuentur, ut sufficere possint tributo laboris, & lactis. Ipsi
aut uitulis tostū, molitumq; miliū cū lacte misceat saluati mo-
re præbendū. Nunc locis calidis tondeantur oues, & serotini fœ-
tus hoc mense signentur. Nunc ē prima est admissura, quæ exel-
lit arietum, ut agnos iam maturos hybernū tempus inueniat.

De apibus.

T.VIII.

HOC Mense locis apriis apes quæremus, sed loca mellifica in-
dicant apes, si circa fontes frequentissime pascantur, nam si raro-
res uidebuntur, in his locis mellificari utiliter non potest, quod si
frequentes aquantur, ubi sint examina earum, hoc genere possu-
mus inuenire. Ac primo q̄ longe sint, exploremus, aut proxime
rubricam liquidam breui uasculo infusam geramus, & obser-
uemus fontes, aut aquas uianas, tunc dorsa apum bibentium.

N iij

tangamus illo liquore tincta festucula, atq; ibidem moremur. Si cito reuerſe fuerint, quas tinximus, hospitia earum proxima esse noſcemus, si tarde ſpatio longiore ſummota, quod pro mora temporis æſtimamus. Ad proxima facile uenies, ad longinqua hoc genere perducere. Cannæ unum internodium cum ſuis recidas articulis, et in latere aperies, ibi mel exiguum, uel defrutum mittes, & iuxta fontem pones, cum ad eum conuenerint apes, atque ingreſſe fuerint poſt odorem, foramen pollicis claudis appoſito, & unam tantum patieris exire, cuius fugam perſequere, ea tibi partem demonſtrat hoſpitiij, cum ipſam cœperis non uidere, alteram continuo dimittes, & ſequeris, ita ſingulæ ſubinde dimiſſæ te facient uſq; ad locum examinis peruenire. Aliqui mellis breuiſſimum circa aquam uasculum ponunt, de quo cum apes aquam deguſtauerit, ad commune pabulum pergens, alias exhibebit. Quarum frequentiam ſubinde creſcentem, notata reuolantium parte uſq; ad examina perſequeris. Quod ſi ē examen in ſpelunca reconditum, fumo eijcietur, et cum exierit, eris ſonitu territum in fruticæ, uel in aliqua ſyluæ ſe parte ſuſpendet, & ita admoto uasculo recapietur. Si uero in cauæ arboris ramo fuerit, acutiſſima ſerra idem ramus ſupra, infraq; deciſus, & munda ueste cooptus poterit auferri, & inter aluearia collocari. Veſtigant aut mane, ut tota dies ſufficiat ad ſequendum, nam ueſpere peracto opere ad aquam plerunq; non redeunt. Vaſa autem, quibus recipiuntur, perfricanda ſunt citreagine, uel herbis ſuanibus, et conſpergenda imbre mellis exigui, quod ſi uerno fiat, & circa fontes aluearia ſic tincta ponantur, locis, quibus apum frequentia eſt, multitudinē ſibi ſponte conducent, ſi tamen ſeruari a ſuribus poſſunt. Hoc etiam menſe, ſicut ſupra, purganda ſunt aluearia foridibus, & necandi papiliones, qui maxime abūdant florentibus maluis, quos hoc genere interapiemus. Vaſ æneum miliario ſimile, ideſt altum, & anguſtum ueſpere inter aluearia colloceamus, & in fundo eius ponamus lumen accenſum. Illuc papiliones cōuenient, & circa lumen uolitant, & anguſtia uasculi ab igne proxima interire cogentur.

De horis.

T.IX.

HVIVS Menſis horæ, horis menſis ſeptembris æquantur hoc genere.

APRILIS.

308

Hora	I.	pedes	XXIII.
Hora	II.	pedes	XIII.
Hora	III.	pedes	X.
Hora	IIII.	pedes	VII.
Hora	V.	pedes	V.
Hora	VI.	pedes	IIII.
Hora	VII.	pedes	V.
Hora	VIII.	pedes	VII.
Hora	IX.	pedes	X.
Hora	X.	pedes	XIIII.
Hora	XI.	pedes	XXIIII.

TITVLIMENSIS MAII.

De panico, et milio, de florentibus satis, de recidendo feno.	T. I.
De nouella uitis sarmentis relinquendis, & de pampinandis alijs uitibus.	T. II.
De profcindendis, & aperiendis nouis agris.	T. III.
De occandis uitibus arboribusq; & rude cadenda, fodiendis seminarijs, putandis oleis, ac lupino uertendo.	T. IIII.
De hortis, in eo de spatijs, de apio, coriandro, melone, cucurbita, carduo, radice, ruta.	T. V.
De pomis, mali punia, persico emplastrando, citro inferendo, & ficu plantanda, uel inferenda, de zizipho, & palma plantandis.	T. VI.
De armentis, in eo de castrandis bobus.	T. VII.
De tonsuris ouium.	T. VIII.
De caseo faciendo.	T. IX.
De apibus.	T. X.
De pauimentis, & solarijs.	T. XI.
De lateribus faciendis.	T. XII.
De rosato.	T. XIII.
De oleo liliaceo.	T. XIIII.
De oleo roseo.	T. XV.
De rodomelli.	T. XVI.
De rosis uiridibus seruandis.	T. XVII.
De odoris.	T. XVIII.

N iij

PALLADII RVTILII TAVRI
AEMILIANI VIRI ILLV
STRIS DE RE RVSTICA
LIBER SEXTVS.

De panico, & milio, de florētibus satis, de recidēdo fœno. T.I.

AIO Mense loais frigidis, & humectis pan-
cum seremus, & milium mōre, quo dixi. Nūc
omnia prope, quæ sata sunt, florent, neq; tan-
gi à cultore debebunt. Florent autem sic. Fru-
menta, & ordeum, & quæ sunt seminis singu-
laris octo diebus floreant, & deinde per dies

XL. grandescant flore deposito usq; ad maturitatis euentum,
q̄ uero dupliis seminis sunt, sicut faba, pisum, cæteraq; legumi-
na. XL. diebus florent, simulq; grandescunt. Hoc mense in loais
sicis, calidis, sine maritimis fœna recidantur, prius tñ q̄ exare-
scant. Quod si pluuijs infusa fuerint, conuerti ante non debent,
q̄ parseorum summa siccata sit.

De nouellæ uitis sarmentis relinquēdis, & de pampinandis ali-
is uitibus. T.II.

NVNC consyderemus nouellæ uitis sarmenta, quæ protulit,
& ei pauca, & solida relinquamus, & adminiculis firmemus,
donec brachia prolata durescant. Non autem amplius resectæ,
& pullulanti uiticulæ, q̄ duæ, uel tres materiæ relinquuntur, &
alligentur propter iniuriam uenti. Ideo autem tres materias di-
xi debere dimitti, ne dissipātibus uentis nulla remaneat, si in pri-
mordio reliqueris paucores. Hoc mense pampinari conueniet,
sed tunc est opportuna pampinatio, cū teneri rami digitis strin-
gentibus crepabunt sine difficultate carpentis, hæc res uuas effi-
cit pinguiore, & maturitati consulit solis admissu.

De profandendis, & aperiendis nouis agris. T.III.

NVNC quoq; pingues agri, & herbosi profandantur, sed si
agros incultos uolueris aperire, considerabis, siccus, an humidus
sit ager, syluis, aut gramine, frutetis uestitus, aut filicæ. Si humi-
dus erit, fossarū ductibus ex omni parte sicætur. Sed aperte fossæ
notæ sunt, cæcæ uero hoc genere fiunt. Imprimunt sulci per agrum

transuersi altitudine pedū ternū, postea usq; ad medietatē lapidibus minutis replent, aut glarea, & super terra, quā egresseramus, æquatur. Sed fossarū capita unā patentē fossam petant, ad quā declines decurrant, ita & humor deducatur, & agri spatia non peribunt. Si defuerint lapides, sarmētis, uel stramine subiecto cooperiant, uel quibuscunq; uirgultis, sed si nemorosus est, extirpatis, aut raro relictis arboribus excolat. Si lapidosus, per mærias saxorū à turba collectas & purgari poterit, & inde muniari. Iuncus, & gramen, & filices frequenti aratione uincunt. Sed filicem, si sæpe fabam conseras, uel lupinos, & si subinde nascentem mucrone falcis incidas, intra exiguum tempus absumes.

De occandis uitibus arboribusq; & rude cædenda, fodiendis seminarijs, putandis oleis, & lupino uertendo. T.III.

HOC mense arbores, & uites, quæ ablaqueatæ fuerāt, occare, hoc est operire iam conuenit. Nunc ad rudem faciendam sylua cædatur, quando omni fronde uestita est. Cædēdi autem hic modus est, ut optimus operarius in alta sylua modij spatij, medio cris uero tertia minus possit absindere. Nunc & seminaria fodiuntur assidue, & locis prægelidis, & pluuiosis oleæ putantur, & eis muscus abraditur. At si quis lupinum stercorandi agri cæ seminabit, aratro illum nunc debet euertere.

De hortis.

T.V.

HORTORUM spatia, quæ per autumnum seminibus implenda destinantur, aut plantis, nunc conueniet pastinare. Hoc mense apium bene seritur, sicut iam ante dictum est, uel coriandrum, & melones, & cucurbitæ, carduus, & radices, & ruta pangentur. Porri quoq; planta transfertur, ut rigationibus animetur.

De pomis, mali punici, persico emplastrando, citro inferendo, & ficu plantanda, uel inferenda, de zizipho, & palma plantandis. T.VI.

LOCIS CALIDIS nunc mala punica florere incipiunt. Ramus ergo cum flore (sicut Martialis dicit) si obruto circa arborem fictili uase claudatur, & ne resiliat, ligetur ad palū, pro uasculi magnitudine pomum reddit autumnino. Hoc etiam mense locis calidis emplastrari persicus potest. Locis frigidis nunc citri arbor inferitur, & ea, quæ dicta est, disciplina seruetur.

Nunc frigidis locis ziziphum conferemus, & ficum inferimus.
Hoc etiam mense palmae planta disponitur.

De armentis, in eo de castrandis bobus.

T. VII

N V N C castrandi sunt vituli, sicut Mago dicit, tenera aetate, ut fissa ferula testiculi comprimantur, & paulatim confracti resoluantur. Sed hoc luna decrescente uerno, uel autumno fieri debere praecipit. Alij ligato ad machinam vitulo, duabus agustis regulis stagnis, sicut forapibus ipsos nervos apprehendunt, qui graece κρεμαστές dicuntur. His comprehensis tentos testiculos ferro resecant, et ita recidunt, ut aliquid de his capitibus nervorum suorum dimittatur haerere, quae res & sanguinis nimietatem prohibet, & non omnino iuuenos subducto robore virilitatis effeminat. Nec ad mittendum est, quod plerique faciunt, ut statim castratos coire compellant, nam certum est ab eis generari, sed ipsos fluxu sanguinis interire. Vulnere uero castrationis cinere sarmentorum, & spuma linuntur argenti. Castratus abstineatur a potu, & abis pascatur exiguis, & sequenti triduo praebentur ei tenerae arborum summitates, & fruteta mollia, & herbae viridis coma, dulciora saginoris, aut fluminis. Pice etiam liquida misto cinere, & modico oleo post triduum vulnere diligenter ungenda sunt. Sed melius genus castrationis sequens usus inuenit. Alligato enim iuueni, atque deiecto testiculi stricta pelle clauduntur, atque ibi lignea regula premente, deciduntur ignitis securibus, uel dolabris, uel, quod est melius, formato ad hoc ferramento, ut gladii similitudinem teneat. Ita enim circa ipsam regulam ferri acies ardētis imprimuntur, unoque ictu & moram doloris beneficio celeritatis assumunt, & uestis uenis, ac pellibus a fluxu sanguinis strictis, plagam cicatrix quodammodo cum ipso vulnere nata defendit.

De tonsuris ouium.

T. VIII.

L O C I S temperatis nunc ouium celebranda tonsura est. Sed tōsas oues hoc unguine medicemus. Succum decocti lupini, faeces uini ueteris, & amurcam pari mensura miscemus, & in unum corpus omnia redacta curabis adlinire. Post triduum deinde, si mare uicinum est, litori mergantur extremo, si in medys terris pascimus, aqua coelestis cum sale paululum decocta sub dio debet per eorum tonsuram, & uncta membra diluere. Hoc enim modo curatum

pecus toto anno, nec scabrum fieri dicitur, & prolixas lanas creare fertur, ac molles.

De caseo faciendo.

T. IX.

H O C mense caseum coagulabimus syncero lacte coagululis uel agni, uel hœdi uel pellicula, quæ solet pullorum uentribus adherere, uel agrestis cardui floribus, uel lacte ficulno, cui serũ debet omne deduci, ut & ponderibus urgeatur. Vbi solidari cœperit, loco opaco ponatur, aut frigido, & pressus subinde adiectis pro acquirenda soliditate ponderibus, trito, ac torrefacto sale debet aspergi, & iam durior uehementius premi. Post aliquot dies solidata iam formulæ per crates ita statuatur, ne inuicem se unaqueq; contingat. Sit autem loco clauso, & à uentis remoto, ut teneritudinem seruet, atq; pinguedinem. Vitia casei sunt, si aut ficans sit, aut fistulosus, quod eueniet, aut si parum prematur, aut sales nimios accipiat, aut calore solis uratur. In recenti caseo cõficiendo aliqui nucleos uirides pineos terunt, atq; ita misto lacte gelant. Aliqui thymum tritum, & frequenter colatum congelant. Qualẽcunq; etiam saporem uelis, efficere poteris, adiecto, quod elegeris, condimento, seu piperis, seu cuiuscunq; pigmenti.

De apibus.

T. X.

H O C Mense incipiunt augeri examina, & in extremis fauorum partibus maiores creantur apiculæ, quas aliqui reges putant, sed græci eos οἰστροὺς appellant, & necari iubent, quia regem cõcutiunt quiescentis examinis. Nunc papiliones abundant, quos necemus, more, quo dixi.

De pauimentis, et solarijs.

T. XI.

N V N C circa extremum mensem pauimenta in solarijs fiunt, quæ in frigidis regionibus, & ubi pruinæ sunt, glaciæ suspenduntur, & pereunt. Sed si hoc placuerit, sternemus duplices ordines tabularum transuersos, atq; directos, et paleam, uel silicem supra constituemus, et æqualiter æquabimus saxo, quod manum possit implere. Pedaneũ super rudus inducimus, & assiduo ueste densamus, tunc ante, q̃ rudus siccetur, bipedas, quæ per omnia latera canaliculos habeant digitales, iungemus, ita ut calce uina ex oleo temperata, bipedarum canales, q̃ inter se connectendi sunt,

MAIUS.

impleantur, & earum coniunctione rudus omne cooperiatur, nam siccata oīs materia unum corpus efficiet, & nullū transmittet humorem. Postea, sex digitorū testacūm superfundimus, & frequenter uirgis uerberabimus, ne rimis possit aperiri. Tūc testas latiores, uel tabellas qualescūq; marmoreas, aut paginas imprimemus, & hanc constructionem res nulla uitiabit.

De lateribus faciendis.

T.XII.

HOC Mense lateres faciendi sunt ex terra alba, uel creta, uel rubrica. Nam qui aestate fiunt, celeritate feruoris in summa cute siccantur interius humore seruato, quæ res fissuris eos faciet aperiri. Fiunt autem sic. Terra creta diligenter, & omni asperitate purgata mista cum paleis diu macerabitur, & intra formam lateri similem deprimitur. Tunc ad siccandum relicta, subinde uersabitur ad solis aspectum. Sint uero lateres longitudine pedum duorum, latitudine unius, altitudine quatuor unciarum.

De rosato.

T.XIII.

Q Vinq; libras rosæ pridie purgatæ, in uini ueteris. X. sextarios mergis, et post. xxx. dies. x. dispensati mellis libras adijcies, et uteris

De oleo liliæo.

T.XIIII.

PER olei libras singulas dena lilia curabis insundere, & uas uitreum. XL. diebus locare sub dio.

De oleo roseo.

T.XV.

IN olei libras singulas rosæ purgatæ singulas uncias mittis, et VII. diebus in sole suspendis, & luna.

De rodomelli.

T.XVI.

IN succi rosæ sextarijs singulis libras singulas mellis admiscæs, & diebus. XL. sub sole suspendis.

De rosis uiridibus seruandis.

T.XVII.

ROSAS nō dum patefactas seruabis, si in canna uiridi stante, fissa, recludas ita, ut fissuram coire patiaris, & eo tēpore cannam reidas, quo rosas uirides habere uolueris. Aliqui olla rudiconditas, ac bene munitas sub dio obruunt, ac reseruant.

De Horis.

T.XVIII.

IN Horarum mensuris Maius respondet Augusto.

Hora	I.	pedes	XXIII.
Hora	II.	pedes	XIII.
Hora	III.	pedes	IX.
Hora	IIII.	pedes	VI.
Hora	V.	pedes	IIII.
Hora	VI.	pedes	III.
Hora	VII.	pedes	IIII.
Hora	VIII.	pedes	VI.
Hora	IX.	pedes	IX.
Hora	X.	pedes	XIII.
Hora	XI.	pedes	XXIII.

TITVLI MENSIS I VNII.

De area paranda.	T.I.
De messibus.	T.II.
De agris profandendis, de uineis occandis, fodiendis, uicia, fœno græco, lenticula, faba, lupino colligendis.	T.III.
De hortis, in eo de brassica, apio, betis, radiabus, lactucis, coriandro.	T.IIIII.
De pomis, in eo de flore punia, de pyro, de malo, zizipho, de fico, de emplastratione.	T. V.
De armentis, in eo de castratura, de caseo, de tonsuris.	T.VI.
De apibus, in eo de legendo, & conficiendo melle, uel æra, de seruandis examinibus, & signis eorum, & regibus, de inopia examinum supplenda.	T. VII.
De panimentis, & latere.	T.VIII.
Qualiter fructuum uenturoꝝ experimēta sumantur.	T. IX.
De oleo chamemilleo.	T.X.
De cœnante.	T.XI.
De alicia.	T.XII.
De Horis.	T.XIII.

PALLADII RVTILII TAVRI
AEMILIANI VIRI ILLV
STRIS DE RE RVSTICA
LIBER SEPTIMVS.

De area paranda.

T.I.

VNIO mense area paranda est ad triturā, cuius primo terra radatur, deinde effossa leniter mistis paleis, & amurca equatur insulsa. Quæ res à muribus, & formicis frumenta defendit. Tunc premenda est rotundo lapide, uel columnæ quocunq; fragmento, cuius uolutatio possit eius spatia solidare. Dehinc sole sicætur. Aliqui mundatis areis aquam spargunt, & minuta ibi pecora diu spatari, ac pascuere compellunt. Et cum terra ungulis stricta fuerit, spectant solidam siccitatem.

De messibus.

T.II.

NUNC primo ordeï messis incipitur, q̄ consumanda est ante q̄ grana arefactis spiciis lapsa decurrāt, q̄a nullis, sicut triticum, foliiculis uestiunt. Quinq; modios reddere potest pleni agri opera una messoris experti, mediocris uero tres, ultimū ēt minus. Sed ordeï culmos iacere in agris aliquotulum sinamus, quia fertur hoc more grandescere. Nunc ēt mense postremo locis maritimis, & calidioribus, ac siccis tritici messis abscinditur. Quam paratam esse cognosces, si equaliter spicarū populus maturato rubore flauescat. Pars Galliarū planior hoc compedio utitur ad metendū, & præter hoīum labores unius bouis opera spatium totius messis absūmit. Fit itaq; uehiculum, qd̄ duabus rotis breuib; fert, huius quadrata superficies tabulis munitur, quæ forinsecus reclinæ in summo reddant spatia largiora. Ab eius fronte carpenti breuior est altitudo tabularum. Ibi denticuli plurimi, ac rari ad spicarum mensurā constituuntur in ordinē ad superiorem partem recurui. A tergo uero eiusdem uehicularum duo breuissimi temones figurantur, uelut amites basternarū. Ibi bos capite in uehiculum uerso ingo aptatur, & uinculis, māsuetus sanē, qui non modum cōpulsoris excedat. Hic ubi uehiculū per messes cœpit impellere, oīs spica in carpenti denticulis cōprehensa cumulat abrupis.

ac relictis paleis, altitudinem, uel humilitatem plerumq; bubul-
co moderante, qui sequitur, & ita per paucos itus, ac reditus bre-
ui horarum spatio tota messis impletur. Hoc campestribus locis,
uel equalibus utile est, & ijs, qbus necessaria palea nō habetur.

De agris profundendis, de uineis occandis, fodiendis, uicia, fœ-
no græcorecolligendis.

T. III.

N V N C frigidissimis locis, quæ Maio sunt prætermissa facie-
mus. Agros æque profundemus herbofis, & gelidis partibus. Vi-
neta occabimus. Colligemus uiciā, fœnum græcum rescabimus
ad pabulum. Hoc mense locis frigidis peragēda est leguminum
messis, itaq; lenticulam collectam, cineri mistam, bene seruabi-
mus, uel uasis olearijs, aut salsamentarijs, repletis, statimq; gypsa-
tis. Nunc & faba luna minuente uelletur. Ante lucem sanē, &
ante q̄ luna proædat, excussa, & refrigerata ponatur. Ita gur-
guliones non patietur infestos. Hoc mense lupinus colligitur, &
si placuerit, statim separetur ex area, sed longe ab humore est po-
nendus in horreis. Sic enim diutissime custoditur, maxime si gra-
naria eius afflauerit fœnus assiduus.

De hortis.

T. IIII.

H O C Mense circa solstitium brassicam seremus, quam inchoā-
te transferemus augusto, uel irriguo loco uel pluuiā initiāte ma-
defacto. Apium quoq; bene serere poterimus, betas, & radices,
& lactucas, & coriandrum, si rigemus.

De pomis.

T. V.

H O C etiam mense ramus punici (sicut supra diximus) poterit
intra fictile uasculum claudi, ut ad eius magnitudinem poma re-
stituatur. Nunc pyra, uel mala, ubi ramos multa poma densabunt,
interlegenda sunt quæcunque uitiosa, ut succus, qui ingratis his
posset impendi, ad meliora uertatur. Hoc etiam mense locis frigi-
dis ziziphum serere poterimus. Nunc caprificandæ sunt arbores
fici, sicut in eius narramus disciplina. Aliqui eas et hoc mense
inserunt. Locis frigidis persicus inoculatur, palmæ planta circum-
foditur. Hoc mense, uel iulio celebratur insitio in pomis, q̄ empla-
stratio dicitur. Solis arboribus cōuenit, quibus pinguis succus in

corticē est, ut fias, & oleis, ac similibus, ut Martialis dicit, & pisco. Fit autē sic. Ex novellis ranis, & nitidis, ac feraibus gemmam, quæ bene apparebit sine dubio processura, duobus digitis quadratis circumsignabis, ut ipsa statuatur in medio, & ita subtiliter corticē leuabis acutissimo scalpro, ne gemma ledatur. Itē ex ea arbore, cui uelimus inferere, similiter cum gemma tolletur emplastrum, nitido tamē, atq; uberi loco. Tunc ibi conuenienter astringitur, & pressum circa gemmam uinculis cogitur sine germinis lesione coherere, ut ea, quæ appositæ reddit, locum gemmæ prioris includat, tūc luto superlinis, & liberā gemmā relinques. Ramos superiores eius arboris secabis, ac stirpes, et ab uno & uiginti diebus exactis resolutis uimine uinculoꝝ repies externi seminis gemmā mire in arboris alienæ membra transisse.

De armentis, in eo de castratura, de caseo, de tonsuris. T.VI.

HOC etiā mense uituli recte, ut dictū est ante, castrantur. Nūc et caseum recte conficiamus, et oues in frigida regione tondemus.

De apibus, aluearijs, & reliquis. T.VII.

HOC mense aluearia castrabuntur, quæ matura esse ad mellis reditum signis quam pluribus instruemur. Primū, si plena sunt, apum subtile murmur audimus, nam uacue sedes fauorū, uelut concina ædificia, nocēs, quas acceperint, in mains extollūt. Quare cum murmuris sonus magnus, & raucus est, agnosimus non esse idoneas ad metendum crates fauorum. Item cum fucos à sedibus suis, qui sunt apes maiores, grandi intentione deturbant, matura mella testātur. Castrabuntur autem aluearia matutinis horis, cum torpent apes, nec caloribus asperantur. Fumus admouetur ex galbano, & arido fimo bubulo, quem in pultario factis carbonibus conuenit exatāre. Quod uas ita figuratum sit, ut uelut inuersi infudibuli angusto ore fumum possit emittere, atque ita cædentibus apibus, mella recidentur. Ad examinis pabulum hoc tpe pars fauorū debet quinta dimitti. Sanè putres, ac uitiosi faui de aluearijs auferantur. Nunc mella conficiamus congestis in mundissimum sabanum fauis, ac diligenter expressis. Sed ante quā premamus, partes fauorum corruptas, uel pullos habentes recidemus, nā malo sapore mella corrumpunt. Mel recens paucis diebus aptis uasculis habendū est, atq; in summitate purgandum, donec

donec refrigerato calore musti more deferueat. Nobilius mel erit quod ante expressionem secundam, uelut sponte profluxerit. Hoc etiam mense ceram conficiamus, quæ in uase æneo feruēti aqua pleno minute cōsis fauorum reliquijs mollietur, & deinde in alijs uasculis sine aqua resoluta digeretur in formas. Nunc si mense ultimo, noua egrediuntur examina, custos esse debet attentus, quæ nouellæ apes uagantibus animis inuenture, nisi feruentur, effugiunt. Exeuntia in aditu suo morantur uno aut duobus diebus, quæ statim nouis aluearijs excipiēda sunt. Obseruabit aut custos assiduus usq; in octauam, uel nonam horam, quia post hæc tempora non facile fugere, aut emigrare consueuerunt, quamuis aliæ quæ statim & procedere, et abire non dubitent. Signa futura fuge hæc sunt. Ante biduum, uel triduum acrius tumultuatur, & murmurant. Quod ubi apposita frequēter aure explorat agnouerit, solitior aduersum hæc esse debet. Solent hæc signa et cū pugnatæ sunt, facere. Quarum pugnam cōpesat puluis, aut mulse aquæ imber aspersus. Inest illi ad originis suæ reparandæ concordiam, dulcis auctoritas. Sed cum se agmina sic pacata, in ramo, aut loco quocunq; suspenderit, si unius uberis eductione pendebunt, noris aut unum regem esse uniuersis, aut reconciliatis omnibus manere concordiam. Si uero duo, uel plura ubera suspendens se populus imitatur, & discordes sunt, & tot reges eē, quot uelut ubera uideris, confitentur. Vbi globos apium frequentiores uideris, unctæ manu succo melissophylli, uel apij reges requiras. Sunt aut paulo maiores, & oblongi magis q̄ ceteræ apes, reffioribus cruribus, neq; grandibus pennis, pulchri coloris, & nitidi, leues, sine pilo, nisi forte pleniores, quasi capillum gerunt in uentre, quo tñ non utuntur ad uulnus. Sunt alij fusi, atq; hirsuti, quos oportet extinguere, & pulchriorem relinqui, qui si frequenter uagatur cum examinibus, exectis alis reseruetur, hoc. n. manente nulla discedet. Sed si nulla nascentur examina, duorum, uel trium uasculorum multitudinem in unum cōferre possumus, dulci tñ liquore conspersas apes, atq; inclusas, per triduum tenebimus, apposito cibo mellis, & exigua tantū spiracula relinqueamus in cella. Quod si uelis aluearium, cui per aliquam pestem multitudo subducta est, populi adiectione reparare, cōsiderabis in alijs abundantibus, ceras fauorū, & extremitates, quæ pullos habent, & ubi signum nascituri regis inueneris, cum sobole sua

Pallad.

O

IVNIUS.

recides, & in id aluearium pones. Est autem hoc futuri regis signum. Inter cetera foramina, quæ pullos continent, unum maius, ac longius uelut uber apparet. Sed tunc transferendi sunt, quando erosus cooperculis ad nascendum maturi capita nituntur exerere, nã si immaturos transtuleris, interibunt. Si autẽ se subito leuabit examen, strepitu æris terreatur, aut testulæ, tunc ad aluearium redibit, aut in proxima fronde pendeat, & inde in nouũ uas herbis consuetis, & melle conspersum manu attrahat, aut trulla, et cũ in eo loco regenerit, uespere inter alia collocef.

De pauimentis, & latere.

T.VIII.

HOC etiam mense pauimenta faciemus sub diuo, & lateres more, quo dixi.

Qualiter fructũ uenturoꝝ experimẽta sumant.

T.IX.

GRAECI asserunt Aegyptios hoc more prouentũ futuri cuiusq; seminis experiri. Areã breuẽ loco subactõ, & humido nunc excolunt, & in ea diuisis spatijs oĩa frumenti, uel leguminum semina spargũt. Deinde in ortu caniculæ, q̃ apud Romanos quartodecimo Calendarum augustarũ die tenet, explorant, quæ semina ortum sydus exurat, quæ illaesa custodiat. His abstinet, illa procurant, q̃a indicium noxæ, aut beneficij, per annum futurum generi unicuiq; sydus aridum præsentĩ exitio, uel salute p̃misit.

De oleo chamæmilleo.

T.X.

PER Olei libras singulas chamæmillæ herbæ florentis, aureæ medietatis, proiectis albis folijs, quibus flos ambitur, unciarum singularum pondus infundis, & quadraginta diebus in sole cõstitues.

De cœnante.

T.XI.

SYLVESTRES uas, cum florent, sine rore colligimus, et expandimus in sole, nequid restet humoris, & flos ad excitandum siccior appareatur. Tũc cribello spisso cernimus, ut grana nõ transeant, sed flos solus decidat. Hunc in melle seruamus infuso, & cum diebus. XXX. fuerit conditum, temperamus eo genere, & more, quo rosatum moris est temperare.

IVNIVS.

314

De alicia.

T.XII.

ORDEVM semimaturum, cui adhuc superest aliquid de uis-
rore p manipulos ligabis, & torrebis in furno, ut facile mola possit
frangi, & in modio uno salis aliquantum, dum molitur, mi-
scere curabis, ac seruas.

De horis.

T.XIII.

IVNIVS, ac Iulius horarū sibi aqua spatia contulerunt.

Hora	I.	pedes	XXII.
Hora	II.	pedes	XII.
Hora	III.	pedes	VIII.
Hora	IIII.	pedes	V.
Hora	V.	pedes	III.
Hora	VI.	pedes	II.
Hora	VII.	pedes	III.
Hora	VIII.	pedes	V.
Hora	IX.	pedes	VIII.
Hora	X.	pedes	XII.
Hora	XI.	pedes	XXII.

TITVLI MENSIS IVLII.

De iteradis agris, de messe triticea, de extirpandis nepribus, & fi-
lectis, de arboribus opendis, pulueradis nouellis. T.I.

De hortis, in eo de cepullis, radicibus, atriplicae, ocymo, malua, be-
ta, lactuca, porro, itē naps, et rapis cū disciplina sua. T.II.

De pomis, in eo de emplastratione, de pyro, malo, citreo, ficu, pal-
ma. T.III.

De armentis, & gregibus, in eo de admittendis tauris, et arie-
tibus. T.IIIII.

De extirpando gramine.

T.V.

De uino scyllite.

T.VI.

De hydromelli.

T.VII.

De aceto scyllitico.

T.VIII.

De sinapi.

T.IX.

De horis.

T.X.

O 4

PALLADII RVTILII TAVRI
AEMILIANI VIRI ILLV
STRIS DE RE RVSTICA
LIBER OCTAVVS.

De iterandis agris, de messe triticea, de extirpandis nepribus, et
filicetis, de arboribus operiendis nouellis. T.I.

V L I O Mense agri, qui aprili profassi fue-
rant, circa Calendas iterentur. Nunc locis tem-
peratis tritici messis expletur, more, quo dictum
est, syluestres agri utilissime extirpabuntur, ar-
boribus, atq; uirgultis, cum luna decreseat, de-
sectis radiabus, atq; combustis. Hoc mense ar-
bores, quæ in messe steterant, sectis messibus obruantur aggestio-
ne terrarum propter nimios solis ardores. Opera una. XX. maxi-
mas obruet. Nunc & nouellæ uites mane, & uespere iam calore
deposito effodi debent, & auerso gramine puluerari. Hoc mense
utiliter uel ante caniculares dies filices extirpabis, & caricem.

De hortis.

T.II.

HOC etiam mense cepulas serimus irriguis, ac frigidis locis,
& radicem, & atriplicem, si rigare possumus, & ocimum, mal-
uas, betas, lactucas, & porros rigandos. Hoc mense loco irriguo
napos serimus, & rapa solo putri, & soluto, nec spisso. Locis hu-
midis letantur, & campis. Sed naps in sicco, & propè tenui,
atq; denexo, & sabuloso melior nascit. Loca proprietates utrunq;
semen in alterum mutat. Nam rapa in alio solo p biennium sata mu-
tant in napos, alio uero naps transit in rapum. Subactum solū
stercoratum, uersatumq; coquirunt, quod & ipsis, & segetibus p-
derit, quæ ibi anno eodē seruntur. Iugero raporū quatuor sextar-
um, naps aut quinq; sufficiunt. Si spissa sunt, interuelles aliqua, ut
cetera roborentur. Ut uero semina maiora redigantur, eruta ra-
pa, folijs omnibus purgas, & ad dimidij digiti crassitudinem in
caule succides. Tunc in sulcis diligenter subactis, octonis digitis se-
parata obrues, & iniicies terram, & calcabis, ita magna na-
scentur.

De pomis.

T. III.

HOC etiam mense emplastratio celebrari potest, sicut ante demonstravi, & pyrus, uel malus locis humidis nunc insita me explorante processit. Hoc etiam mense in pomis serotinis, quæ ubertate nimia ramos onerauerunt (sicut prædixi) interlegenda sunt, si qua uitiosa reperiis, ut arboris succum uertamus ad meliorum nutrimenta pomorum. Nunc citri taleam loco irriguo frigidis regionibus me plantasse memini, & quotidianis animasse liquoribus, quæ & nascendo, & asserendo uotum felicitatis equauit. Hoc tempore locis humidis inoculari ficus, & inferi citrius potest. Mense iam medio palmæ planta circumfodi. Nunc locis temperatis, amygdala matura sunt ad legendum.

De armentis.

T. IIII.

HOC tempore maxime tauris submittendæ sunt uaccæ, quæ de æm mensium partus sic poterit maturo uere concludi, & certum est eas post uernam pinguedinem gestientes ueneris amare lasciuiam. Vni tauro quindecim uaccas Columella asserit posse sufficere, curandumque ne cōcipere nequeant nimietate pinguedinis. Si abundantia pabuli est in regione, qua pasamus, potest annis omnibus in fœturam uacca submitti. Si uero indiget hoc genere, alternis temporibus onerandæ sunt, maximeque, si eadē uaccæ alicui operi seruire cōsueuerunt. Hoc mense arietes candidissimi eligendi, & admittendi sunt mollibus lanis, in quibus nō solum corporis candor considerandus est, sed et lingua, quæ, si maculis fuscabitur, uarietatem reddit in sobole. De albo plerumque nascitur coloris alterius. De fuscis nūquam (sicut Columella dicit) potest albus creari. Eligemus arietem altum, procerum uentre pmissō, & lanis candidis tecto, cauda lōgissima, uelleris densi fronte lata, magnis testibus, ætatis primæ, qui tñ usque in octo ānos potest utiliter inire. Fœmina debet bima submitti, quæ usque in quinque nium fœturæ necessaria est, anno septimo deficiat. Eligenda est uasti corporis, & plixi uelleris, ac mollissimi, lanosi, & magni uteri. Sed providendum est in hoc genere, ut pabuli ubertate saturentur, & longe pascat à sentibus, qui & lanā minuunt, et corpus inadunt. Admittendi sunt mense Iulio, ut nati ante hyemē conualescant. Aristoteles asserit, si masculos plures creari uelis, ad

I V L I V S.

missuræ tempore siccos dies, & halitum septentrionis eligendum, & contra eum uentum greges esse pascendos. Si fœminas generari uelis, austri captandos flatus, & in eum pascua dirigenda, ac si ineundas matres, ut mortuarum, uel uitiosarum numerus non inella sobole reparetur. Autumno debiles quæque pretio mutentur, ne eas imbecillas hybernium frigus absorbeat. Aliqui duobus ante mensibus arietes à coitu renocant, ut faciem libidinis augeat dilatio uoluptatis. Quidam coire sine discretione permittunt, ut hoc eis genere per annum totum fœtura non desit.

De extirpando gramine.

T. V.

HOC mense, cum sol cancri tenebit hospitium, luna sexta in capricorni signo posita gramen ablatum græci afferunt nihil de radiabus rediturum. Item si bidentes cyprei fiant, & sanguine tingantur hirano, & post fornacis ardores non aqua, sed eodem sanguine temperentur, per eos erutum gramen extingui.

De uino scyllite.

T. VI.

HOC Mense uinum scyllite sic facimus. Scyllam de montanis, aut maritimis locis sub ortu canicularum lectam procul à sole siccamus. Ex hac in uini ampboram unius libræ mensuram mittimus, inasis ante tamen superfluis, & abiectis folijs, quibus pars extrema uallatur. Quidam uelamina ipsa filo inserta suspēdunt, ut uino infusa mergantur, & non admista seabis post XL. dierum spatium fecta, quæ appensa sunt, auferant. Hoc uini genus tussi resistet, uentrem purgabit, flegma dissoluet, spleneticiis prederit, acumen præstabit oculorum, conatabit digestionis auxilia.

De hydromelli.

T. VII.

INCHOANTIBVS canicularibus diebus aquam puram pridie sumis ex fonte. In tribus aquæ sextarijs unum sextarium non dispumati mellis admiscēs, ac diligenter per carenarias diuisum quinque horarum spatium continuo per inuestes pueros curabis agitare uasa ipsa concutiens. Tunc XL. diebus, ac noctibus patieris esse sub cœlo.

De aceto scyllitico.

T. VIII.

SQVILLAE albæ crudæ proiectis duris, atque extrinsecus
positis omnibus teneram medietatem ad libram, & sex uncias p
minutas partes recides, & in aceti acerrimi duodecim sextarijs
merges. Vas signatum. XL. diebus patieris esse sub sole. Post abie
cta squilla acetum diligentius excolabis, & in bene picato vase
transfundes. Aliud acetum digestionem, et saluti accommodū. Sgllæ
dragmas. VIII. aceti sextarios. XXX. mittis in vasculo, et pipis
unā unā, mēta, et casia aliquantū, & post aliqd tēpus uteris.

De sinapi.

T.IX.

SINAPIS semen admodum sextarij unius & semis redige
re curabis in puluerem, cui mellis pōdo. V. olei. hispani unam li
bram, aceti acris unum sextarium misces, & tritis omnibus dili
genter uteris.

De horis.

T.X.

IULII, & Iunij horas per mensurarium Libra composuit.

Hora	I.	pedes	XXII.
Hora	II.	pedes	XII.
Hora	III.	pedes	VIII.
Hora	IIII.	pedes	V.
Hora	V.	pedes	III.
Hora	VI.	pedes	II.
Hora	VII.	pedes	III.
Hora	VIII.	pedes	V.
Hora	IX.	pedes	VIII.
Hora	X.	pedes	XII.
Hora	XI.	pedes	XXII.

TITVLI MENSIS AVGVSTI.

De agris exilibus arandis, de apparanda vindemia, de occatio
ne vinearum locis frigidis.

T.I.

De exili, & misera vinea reficienda.

T.II.

De pampinandis, & obumbrandis vitibus, & extirpandis ca
retis, atque filicetis.

T.III.

De urendis pascuis.

T.III.

O iij

AUGVSTVS.

De hortis, in eo de rapa, & napo, de radice cum disciplina sua, de pastinaca.	T. V.
De pomis.	T. VI.
De apibus.	T. VII.
De aqua inuenienda.	T. VIII.
De puteis.	T. IX.
De aqua probanda.	T. X.
De aquae ductibus.	T. XI.
De mensuris, & ponderibus fistularum.	T. XII.
De omphacomelli.	T. XIII.
De horis.	T. XIII.

PALLADII RVTILII TAVRI AEMILIANI VIRI ILLV STRIS DE RE RVSTICA LIBER NONVS.

De agris exilibus arandis, de apparanda uindemia, de occatio ne uinearum locis frigidis.	T. I.
---	-------

VGVSTO mense ultimo circa Calendas se
ptembres ager planus, humidus, exilis incipi
at exarari. Nunc maritimis locis uindemiae ap
paratus urgetur. Hoc etiam mense locis frigidis
finis occatio uinearum fit.

De exili, & misera uinea reficienda.	T. II.
--------------------------------------	--------

HOC tpe, si terra exilis in uinea e, & uinea ipsa miserior tres,
uel quatuor lupini modios in iugero spargis, atque ita occabis.
Quod ubi fruticauerit, euertit, & optimu stercus praebet in ui
neis, quia letamen propter uini uitiu no conuenit inferre uinetis.

De pampinandis, & obumbrandis uitibus, & extirpandis care ctis, atq; filicetis.	T. III.
--	---------

NUNC locis frigidis pampinatur, locis uero feruentibus, ac
sicis obumbratur potius uua, ne ui solis areseat, si aut uineae bre
uitas, aut facultas operarum permittit. Hoc etiam mense extir
pare possumus carecta, atq; filiceta.

De urendis pascuis.

N V N C urenda sunt pascua, ut & altoꝝ fruticum festinatio reprimatur ad stirpes, & incensis aridis noua latius succedant.

De hortis.

T.V.

H O C etiam mense ultimo siccis locis rapa, & naps ferenda sunt hac ratione, qua ante dictum est. Hoc mense ultimo, locis siccioribus radices feruntur, quæ hyeme sui usum ministrent. Amant terram pinguem, solutam, & diu subactam, qualem rapa. Tofum, & glaream reformidant. Gaudent cœli statu nebuloso. Serendæ sunt spatys grandibus, & alte fossis. Meliores proveniunt in arenis. Seruntur post nouam pluuiam, nisi possint forte rigari. Quod satum est, statim debet operiri leui sarculo. Iugerum duo sextary, uel ut quidam, quatuor, cum feruntur, implent. Lætamen non est ingerendum, sed potius paleæ, quia inde fungosæ sunt. Suauiores fiunt, si eas aqua salsa frequenter aspergas. Radices fœminini generis putantur, quæ minus acres sunt, & habent folia latiora, & leuia, & cum incanditate uirentia. Ex his ergo semina colligemus. Maiores fieri creduntur, si sublati omnibus folijs, & solo tenui caule dimisso, sæpe terris operiantur. Si ex nimis acra dulcem fieri uelis, semina die, et nocte melle macerabis, aut passo. Raphanum tamen, sicut brassicam, constat esse uitibus inimicum, nam si circa se serantur, natura discordante refugiunt. Hoc etiam mense pastinacis seremus.

De pomis.

T.VI.

E T I A M nunc emplastrantur arbuta. Pyrum nunc plerique inferunt, & locis irriguis arborem citri.

De apibus.

T.VII.

H O C Mense crabrones molesti sunt alucarijs apum, quos persequi, ac necare debemus. Nunc etiã quæ Iulio non excurrimus, exequamur.

De aqua inuenienda.

T.VIII.

NVNC, si deerit aqua, eam quære, ac uestigare debebis, quam taliter poteris inuenire. Ante ortum solis is locus, quibus aqua quærenda est, equaliter pronus mento ad solum depresso iacens in terra spectabis orientem, & in quo loco crissum subtili nebula aerem surgere uidebis, & uelut rorem spargere signo aliquo uianæ stirpis, aut arboris prænotabis. Nam constat sicis locis, ubi hoc fiet, aquam latere, sed terrarum genus confiderabis, ut possis uel de tenuitate, uel de abundantia indicare. Creta tenues, nec optimi saporis uenas creabit. Sabulo solutus exiles, insuauis, limosas, & spatio altiore submersas. Nigra terra humores, & stillicidia non magna ex hybernis imbribus, & liquore collecta, sed saporis egregij. Clarea mediocres, & incertas uenas, sed suauitate præcipuas. Sabulo masculus, & arena, & carbunculus certas, & ubertate copiosos. In saxo rubro bonæ, & abundantes sunt. Sed providendum est, ne inuenta interimas refugiant, & per interuenia dilabantur. Sub radiibus montium, et in saxis, siliabus uberes, frigida, salubres. Locus campestribus falsæ, graues, tepida, insuauis, quarum sapor si optimus fuerit, noueris eas sub terris exordium de monte sumpsisse. Sed in medijs campis montanorum fontium suauitatem consequentur, si umbrantibus tegantur arbutis. Sunt & hæc signa uestigandæ aquæ, quibus tunc credimus, si neq; lacina est, neq; aliquis ibi ex consuetudine humor insidet, aut præterit. Iuncus tenuis, salix, syluatica, alnus, nitex, arundo, edera, cæteraq; si qua humore gignuntur. Locus ergo, ubi supradiçta signa repereris, fodiatur latitudine pedibus tribus, altitudine pedibus quinq; & proxime solis occasum mundum uas ibi æreum, uel plumbeum interius unctum inuersum ponatur in solo ipsius fossionis. Tunc supra fossæ labra crate facta de uirgis, ac frondibus, additaq; terra, spatium omne cooperiatur. Sequenti die aperto loco, si in eodem uase sudores intrinsecus inueniuntur, aut stillæ, aquas ibi esse non dubites. Item si uas figuli siccum, neque coctum eadem ratione ponatur, ac similiter operiatur, altero uero die, si aquarum uena est, in præsentis uas concepto humore soluetur. Item uellus lanæ æque positum, uel coopertum, si tantum colligit humoris, ut alia die fundat expressum, copias inesse testabitur. Item lucerna oleo plena, & accensa, si ibi similiter tecta ponatur, & secundo die inueniatur extincta superantibus alimētis,

aquas idem locus habebit. Item si in eo loco focum feceris, & terra uaporata humidum fumum, nebulosumq; ructauerit, aquas inesse cognosces. His itaq; repertis certa signorum firmante notitia, puteum fodies, & aquæ caput requires. Vel si plura sunt, in unum colliges. Tamen maxime sub radiabus montium in septentrionali parte quæredæ sunt aquæ, quia in his locis magis abundant, utilioresq; nascuntur.

De puteis.

T. IX.

SED In fodiendis puteis cauendum est fossorum periculum, quoniam plerunq; terra, sulfur, alumen, bitumen educit. Quorum spiritus misti anhelitum pestis exhalant, & occupatis statim naribus extorquent animas, nisi quis fugæ sibi uelocitate succurrat. Prius ergo, q̄ descendatur ad intima, in eis locis lucernâ ponis accensam, quæ si extincta non fuerit, periculum non timebis. Si uero extinguetur, cauendus est locus, quem spiritus mortifer occupabit. Quod si alio loco aqua nō potest inueniri, dextra, leuaq; puteos fodiemus, usq; ad aquæ ipsius libramentum, & ab his foramina hinc inde patefacta, uelut nares itus agemus, qua nocens spiritus enaporet, quo factō, latera puteorum structura suscipiat. Fodiendus est autem puteus latitudine octo pedum quo quouersum, ut binos pedes structura concludat, quæ structura uectibus ligneis subinde desetur, & structa sit lapide tofacio, uel filice. Si aqua limosa fuerit, salis admistione corrigatur. Sed dū foditur puteus, si terra non stabit uitio generis dissoluti, aut humore laxabitur, tabulas obijcies directas undiq; & eas trasuersis uectibus sustinebis, ne fodientes ruina concludat.

De aqua probanda.

T. X.

AQVAM uero nouā sic probabis, in uase æneo nitido spargis, & si maculam non fecerit, probabilis indicetur. Item decocta æneo uasculo, si arenam, uel limum non relinquit in fundo, utilis erit. Item si legumina cito ualebit excoquere, uel si colore perlucido carens musco, & omni labe pollutionis aliena. Sed qui in alto sunt putei, perforatis usque ad infimam partem terris ad loca inferiora, possunt uicæ fontis exire, si uallis subiectæ natura permittat.

De aquæ ductibus.

T.XI.

C V M uero ducenda est aqua, ducitur aut forma structili, aut plumbeis fistulis, aut canalibus ligneis, aut fictilibus tubis. Si per formam ducetur solidandus est canal, ne per rimas aqua possit elabi. Cuius magnitudo pro aquæ mensura facienda est. Si per planum ueniet, inter sexagenos, uel centenos pedes sensim reclinetur structura in sesquipedem, ut uim possit habere currendi. Siquis mons interiectus occurrerit, aut per latera eius aquam ducemus obliquam, aut ad aquæ caput spelûcas librabimus, per quarum structuram pueniat. Sed si se uallis interferat, erectas pilas, uel arcus usq; ad aquæ iusta uestigia construemus, aut plumbeis fistulis clausam deijci patiemur, & explicata ualle cõsurgere. Sed quod est salubrius, et utilius, fictilibus tubis cum ducitur, duobus digitis crassi, & ex una parte reddantur angusti, ut palmi spatium unus in alterum possit intrare, quas iuncturas uina calæ oleo subacta debemus illinire. Sed ante q̃ in ijs aquæ cursus admittatur, fauilla per eos mista exiguo liquore decurrat, ut glutinare possit, si qua sunt uitia tuborum. Vltima ratio est plumbeis fistulis ducere, quæ aquas noxias reddunt, nam cerusa plumbo creatur attrito, quæ corporibus nocet humanis. Diligentis erit aquarum receptacula fabricari, ut copiam, uel inops uena procuret.

De mensuris, & ponderibus fistularum.

T. XII.

M E N S V R A uero fistularum plumbo seruetur huiusmodi. Centenaria. X. pedum mille ducentas libras habeat. Octogenaria noningentas. LX. Quinquagenaria similiter. X. pedum pondus sexcenta. Quadragenaria pondo quadringenta. LXXX. Triagenaria pondo tricentasexaginta. Vicenaria pondoducenta. XL. Octonaria pondo nonaginta sex.

De omphacomelli.

T. XIII.

I N uinæ semiacerbæ succi sextarijs sex, mellis triti fortiter duos sextarios debebis ifundere, et sub solis radijs diebus. XL. decoq̃re.

De horis.

T. XIII.

A V G V S T V M maio per solis cursus æquauit.

AUGUSTVS.

319

Hora	I.	pedes	XXIII.
Hora	II.	pedes	XIII.
Hora	III.	pedes	IX.
Hora	IIII.	pedes	VI.
Hora	V.	pedes	IIII.
Hora	VI.	pedes	III.
Hora	VII.	pedes	IIII.
Hora	VIII.	pedes	VI.
Hora	IX.	pedes	IX.
Hora	X.	pedes	XIII.
Hora	XI.	pedes	XXIII.

TITVLI MENSIS SEPTEMBRIS.

De agris pinguibus tertiandis, uel implendis exilibus, de sterco rando.	T.I.
De ferendo tritico, & adoreo in locis frigidis, & opacis.	T.II.
De remedio falsi humoris, de seminum mensuris, & diuersis re/medijs ad sationem pertinentibus.	T.III.
De ferendo ordeo canterino.	T.IIIII.
De lupino ferendo.	T.V.
De piso ferendo.	T.VI.
De sisamo ferendo, et profcindendis agris ad medicam.	T.VII.
De uicia, fæno græco, & farragine ferendis.	T.VIII.
De lupino ferendo, q̄natus enertat, ut loca fœcundet exilia.	T.9.
De pratis nouellis formandis, uel ueteribus excolendis.	T.X.
De uindemia celebranda.	T.XI.
De panico, & milio metendis, et faselo ad escam ferendo, & ap parandis aucupijs.	T.XII.
De hortis, in eodē de papauere, brassica, thymo, origano, cappa ri cū disaplunis suis, itē gith, nasturtio, anetho, radiabus, pastinais, cæresolio, lactuca, betis, coriādris, rapis, et napis.	T.xij.
De pomis, in eo de tubere.	T. XIII.
De pauimentis solariorum, et lateribus.	T.XV.
De diamoro.	T.XVI.
De seruandis uuis.	T.XVII.
De uite, cuius fructus humore putrescit.	T.XVIII.
De horis.	T.XIX.

PALLADII RVTILII TAVRI
AEMILIANI VIRI ILLV
STRIS DE RE RVSTICA
LIBER DECIMVS.

De agris pinguibus tertiandis, uel implendis exilibus, de sterco
rando. T.I.

SEPTEMBRI Mense ager pinguis, et
qui diu tenere consuevit humorem, tertia uice
arabitur, quamuis humido anno possit et an
tea tertiari. Nunc ager humidus, planus, exi
lis, quem primo augusto arari diximus, itera
tur, et feritur. Graues cliui nunc primū arā
di sunt, et ferendi statim circa æquinoctium. Agri nunc sterco
di sunt, sed in colle spissius, in campo rarius, letamina disponen
tur, cum luna minuitur, quæ res, si seruetur, herbis officiet. Vni
iugero asserit Columella. XXIIII. stercoris carpenta sufficere.
In plano uero. XVIII. Sed ydem cumuli tot dissipandi sunt,
quot ea die poterunt exarari, ne stercores exiccata nihil profint.
Euiantur quidem letamina, et qualibet hyemis parte. Sed si
tempore suo eia aliqua ratione non poterunt, ante q̄ seras, mo
re seminis per agros puluerem stercoris sparge, uel caprinum ma
nu proijce, et terram sarculis misce. Nec prodest nimium sterco
rare uno tempore, sed frequenter, et modice. Ager aquosus plus
stercoris, ficcus uero minus requirit. Sed si letaminis copia non
abundat, hoc pro stercore optime cedit, et sabulosis loais cretam,
uel argillam spargas, cretosis ac nimium spissis sabulonem. Hoc
etiam segetibus profiat, et uineas pulcherrimas reddit, nam le
tamen in uineis saporem uini uitiare consuevit.

De serendo tritico, et adoreo in loais frigidis, et opais. T.II.

HOC mēse uliginosis loais, aut exilibus, aut frigidis, aut opa
is circa æquinoctiū triticum, et adorem seretur, dum serenitas
constat, ut radices frumenti ante hyemem conualescant.

De remedio falsi humoris, de seminum mensuris, et diuersis re
medys ad sationem pertinentibus. T.III.

SOLET terra humorē salsum uomere, qui segetes necat. Vbi hoc fit, columbinū stercus, aut cypressi folia oportet inspergere, et ita ut eadē misceant, inarare. Melius tñ oibus remedijs erit, si aquarius sulcus noxiū deducat humorē. In mediocri agri iugero. V. tritiā modios, & adorei totidē conferemus, nā quatuor ager pinguis acipiet. Si modiū quo seret, hyenæ pelle uestieris, et ibi aliquādiu qđ serendū est, esse patieris, sata bñ provenire firmantur. Itē qm̄ quēdā aīalia subterranea sectis radiabus necāt. plerūq; frumenta, cōtra hęc pderit, si herbæ, quæ sedum dicitur, succus aquæ mistus una nocte madescat quæ spargenda sunt semina, uel agrestis cucumeris humor expressus, & eius radix trita, si aqua diluat, & eodem quæ serenda sunt, macerent humore. Aliq, ubi hęc segetes suas perferre senserint, inter initia vitiorū insulsa amurca, uel prædicta aqua sulcos, & aratra perfundūt.

De serendo ordeo canterino.

T. IIII.

NVNC graali solo ordeū serit canterinū modijs. V. p iugerū. Post hoc genus agros cessare patieris, nisi forte letamē aspergas.

De lupino serendo.

T. V.

NVNC, uel maturius aliquāto, lupinus serit in qualicumque terra, uel crudo solo, cui hoc pderit, ut seratur ante, qđ frigus incipiat. Limoso agro non nascitur, cretā reformidat. Amat exilē terram, atq; rubricam. X. modijs iugeri mensura completur.

De pīso serendo.

T. VI.

HOC Mense postremo pisum seremus, terra faali, et soluta, loco tepido, cōlo delectatur humecto. Iugero quatuor modios, uel tres sparsisse sufficiet.

De sisamo serendo, et prosāndendis agris ad medicam. T. VII.

NVNC sisamum seritur putri solo, uel pinguibus arenis, uel terra congestitia. Iugero quatuor, uel sex sextarios senisse conueniet. Hoc mense postremo prima uicē agros prosāndemus, qđ habituri sunt medicam.

De uicia, sceno græco, & farragine serendis. T. VIII.

S E P T E M B E R .

N V N C uiciæ prima satio est, & fœni græci cum pabuli causa feruntur. Viciæ. VII. modij ingerum æque & fœni græci semen implebit. Farrago etiam loco restibili stercoreato seritur ordeï canterini in iugero. X. modios spargimus circa æquinoctium, ut ante hyemem conualescat. Si depasci sapius uelis, usq; in maium mensem eius pastura sufficiat, quod si ex ea semine etiam redigere, usq; ad martias Calendas, & dehinc pecora prohibebis.

De lupino ferendo.

T. IX.

H O C Mense, ut loca fœcundentur exilia, lupinus circa idus seritur. Et ubi creuerit, uertitur uomere, ut putrefiat exsiccus.

D E pratis nouellis formandis, uel ueteribus excolendis. T. X.

N V N C prata si libuerit, possumus nouella formare. Si eligendi facultas est, locum pingue, rosidum, planum, leniter inclinatum, uel huiusmodi uallē deputabimus, ubi humor nec statim præcipitari cogit, nec diu debet inherere. Potest quidē & soluto, & gracili solo prati forma, si riget, imponi. Extirpandus est itaq; locus hoc tpe, et liberandus impedimentis omnibus, uel herbis latioribus, & solidis, atq; uirgultis. Deinde cum frequenter exercitatus fuerit, ac multa aratione resolutus, submotis lapidibus, et glebis ubiq; cōfractis, stercore luna crescēte recēti letamine. Ab ungulis iumentorum summa intentione seruet intactus, præcipue quoties humescit, ne inæquale solū reddant mollibus locis impressa uestigia. Sed si prata uetera muscus obduxerit, abradendus est, & sculptis eiusdē locis fœni spargenda sunt semina, & quā ad necandū muscū prodest, anis sapius ingerendus. Quod si sterilis factus est locus carie, incuria, uetustate, exaret, ac de nouo rursus æquet. Nam prata sterilia plerūq; arare conueniet. Sed in nouo prato rapa cōserere possumus, quorū messe finita, cetera, quæ dicta sunt exequemur. Viciam tñ fœni seminibus mistam post hæc spargemus. Rigari uero ante quā durum solū fecerit, non debet, ne eius cratē minus solidam uis interflui corrumpat humoris.

De uindemia celebranda.

T. XI.

H O C Mense locis tepidis, maritimisq; celebranda uindemia est, frigidis apparanda. In dolis picandis hic modus erit, ut do-
lium

lium ducentorū congiurum. XII. libris picetur. deinde pro mino-
ris aestimatione subducas. Sed maturitatem vindemiae cognosca-
mus hoc genere. Si expressa uina, uinacia, q̄ in acinis celant̄, hoc
est grana, sint fusca, & nonnulla propemodū nigra, quā rē natu-
ralis maturitas facit. Diligētiores optimae ceræ in decē picis libras
unā librā miscent, quæ et odori proficiat, et saporī, et picē lenitate
permulcens frigoribus eā non patit̄ dissilire. Picis tñ gustu explo-
randa dulcedo est, quia sepe uina eius amaritudine nitantur.

De panico, & milio metendis, & faselo ad escam ferendo, et ap-
parandis aucupijs.

T. XII.

N V N C quibusdam locis panicum metetur, & miliū. Tempo-
re hoc faselus ad escam feratur. Nunc in amitibus apparetur au-
cupium, noctuæ, ceteraq; instrumenta capturæ, ut circa Calen-
das exercetur Octobris.

De hortis.

T. XIII.

N V N C papauer seritur locis siccis, et calidis, potest et cū alijs
oleribus seminari. Fertur utilius prouenire, ubi uirgæ, & sarmē-
ta combusta sunt. Tempore hoc brassicam seres utilius, ut plātas
eius nouembri inchoante transponas, de quibus & hyeme olus,
& uere possit cyma produci. Hoc mense spatia hortorum, quæ p-
uernum seminibus impleturus es, alte tribus pedibus pastinare
debebis, et luna decrescēte his sterus inferre. Hoc mense ultimo
thymum seremus, sed melius plantis nascitur, quamuis possit &
semine. Agrum diligit apricum, macrum, maritimum. Nunc cir-
ca æquinoctium seres origanum, stercorari, ac rigari, donec con-
ualescat, appetit. Amat loca aspera, atq; saxosa. Hisdem diebus
seritur capparīs, late serpit, succo suo terris nocet. Serēdum est er-
go, ne pcedat ulterius, arcūueniente fossato, uel luto strūctis pa-
rietibus, solo sicco, & graui, herbas spōte persequitur, floret esta-
te. Sub occasu uergiliarum capparīs arescit. Cith hoc mense ulti-
mo bene seritur. Hoc mense nasturtium seremus, & anethum lo-
cis temperatis, & calidis, & radices locis siccis, & pastinacas, et
cærefolium circa octobres Calendas, & lactucas, & betas, & co-
riandrum, & primis diebus rapa, & napos.

De pomis.

T. XIII.

Pallad.

P

SEPTEMBER.

MENSE septembri circa Calendas octobres, uel februario *tis* beres seremus sobole, uel nucleis, cuius tenera diligenter nutriri debet infantia. Sumatur cum radicibus planta diuulsa, bubulo fino linatur, ac luto, statuatur pingui terra, & subacta subditis conchis, & marina alga, terris magna sui parte condatur. Alij pomis statim grana decussa, & sole siccata, pingui, & propè cribrata terra autumno tria simul ponunt, quæ feruntur in unum coire uirgultum, quod assidua rigatione inuandum est, atq; fossura, quæ solum leuiter scalpens teneritudini robur inducat. Post annum deinde, uel aliquanto tardius quæ fuerit de semine planta transferet, & hoc genere fructus efficiat dulciores. Mense ianuario ultimo, uel februario tubex sirculus mirabiliter proficit cydonio insitus. Inferitur aut malis omnibus, & pyris, & prunis, & calabriæ, melius trunco fisso, quæ cortice, desuper qualo, uel fictili uase munitur repletis usq; propè summitatem sirculis terra subacta, cum stercore. Profunt tuberibus, quæ malis prodesse memorauimus. Tuberes seruantur, si obruantur in milio, uel urceolis picatis, et oblitis.

De pauimentis solariorum, & latere. T. XV.

HOC etiam mense pauimenta in solaris, & lateres faciemus eo more, quo maio mense descripsi.

De diamoro. T. XVI.

SVCCVM mori agrestis paululum facies deferuere. Tunc succum ipsius duas partes, & unam mellis admiscet, & mista curabis ad pinguedinem mellis excoquere.

De seruandis uuis. T. XVII.

VVAS, quas seruare uolumus, legamus illesas, neq; acerbitate rigidas, neq; maturitate defluentes, sed quibus est & granum luce penetrabili splendidum, & tactus cum molli incanditate callosus. Siqua sunt corrupta, uel uitiosa, reseceamus, nec patiamur interesse, quibus inexpugnabilis acerbitas contra blandimenta æstiuæ caloris induruit. Tunc incisos botryonum tenaces calida picæ oportet ambiri, atq; ita in loco sicco, frigido, & obscuro sine luminis irruptione suspendi.

De uite, cuius fructus humore putrescit. T. XVIII.

VITIS, cuius fructus humore putrescit, p latera pampinanda est ante trigesimum vindemie diem, & sola frons illa seruanda est, quæ in summitate posita solem nimium defendit à uertice.

De horis.

T.XIX.

SEPTEMBRIS, & Aprilis dies horis similibus conferuntur.

Hora	I.	pedes	XXIII.
Hora	II.	pedes	XIII.
Hora	III.	pedes	X.
Hora	IIII.	pedes	VII.
Hora	V.	pedes	V.
Hora	VI.	pedes	IIII.
Hora	VII.	pedes	V.
Hora	VIII.	pedes	VII.
Hora	IX.	pedes	X.
Hora	X.	pedes	XIII.
Hora	XI.	pedes	XXIII.

TITVLIMENSIS OCTOBRIS.

De adoro, & tritico, & ordeo canterino, & eruo, & lupino, & piso, & sisamo, & faselo serendis.

T.I.

De lini semine serendo.

T.II.

De notanda uitiū fertilitate, qua puidemus pactioni.

T.III.

De ponendis uineis, uel propagandis, reparandis, putandis, et arbustis.

T.IIIII.

De ablaqueanda nouella.

T.V.

De utilitate propagande nunc uineæ.

T.VI.

De inferendis arboribus, uel uitibus.

T.VII.

De oliuetis instituendis, & colendis, letandis, uel remedys eorū, uel fossis, rinisq; purgandis.

T.VIII.

Remedium, si una compluta est.

T.IX.

De oleo uiridi faciendo, & laurino.

T.X.

De hortis, in eo de intybis, de carduis, de sinapi, malua cū discipulis, item de anetho, cepulla, mēta, pastinaca, thymo, origano, cappari, beta, armoræa, porro transferendo, & ocyano.

T.XI.

P ij

OCTOBER.

De pomis, in eo de palma, pistaceis, cerasis, et alijs pomis, quorū
p menses suos disciplina digesta ē, itē de cōdiēdis pomis. T. xij.

De apibus.

T. XIII.

Quę gręci, uel alijs super uina condienda, curandaq; dixe-
runt.

T. XIII.

De rosato sine rosa.

T. XV.

De uinis pomorum.

T. XVI.

De cōnomelli.

T. XVII.

De defruto, carceno, sapa.

T. XVIII.

De passō.

T. XIX.

De cydonite.

T. XX.

De fermento musteorum seruando.

T. XXI.

De uua passa.

T. XXII.

De horis.

T. XXIII.

PALLADII RUTILII TAVRI AEMILIANI VIRI ILLV- STRIS DE RE RVSTICA LIB. VNDECIMVS.

De adoreo, tritico, ordeo, & eruo, lupino, & piso, & sisamo, &
faselo serendis.

T. I.

OCTOBRI mense adorem seremus, ac tri-
ticum. Iusta satio est à decimo Calendarū nol-
uembrium, usque ad sextum idus decembris re-
gionibus temperatis. Nunc etiam letamen ef-
fertur, ac spargitur. Hoc etiam mense seremus
ordeum, quod dicitur canterinum. Seritur mal-

era, & sicca terra, uel multum pingui. Nā quia hoc semine mal-
cescunt arua, pingui uincitur agro, alteri non habet quod am-
plius nocere possit, cum propter macritatem semen aliud ferre nō
ualeat. Lato agro non est serendum etiam nunc eruum, lupinus,
& pisum, & sisamum. Seremus (ut dixi) sisamum usq; ad idus
octobres, & faselum, tamen terra pingui, ac restibili agro, qua-
tuor modijs iugerum complebimus.

De lini semine serendo.

T. II.

HOC mense lini semen seremus, si placet, quod pro malitia sui serendum non est, nam terræ uber exhaurit. Sed si uelis loco pinguiſſimo, et modicè humido ſereſ in ingero. VIII. modys. Aliq macro ſolo ſpiſſum ſerūt, ita aſſequunt, ut linum ſubtile naſcat.

De notanda uitium fertilitate, quam providebimus panſtioni.

T. III.

NUNC opportuna uindemia eſt, cuius tempore notanda eſt fœcunditas uitium, & notis quibuſcunq; ſignanda, ut ex his ad ponendum ſarmenta poſſimus eligere. Aſſerit autem Columella explorari fœcunditatem uno anno nō poſſe, ſed quatuor, quo numero cognoscitur uera generoſitas ſurculorum.

De ponendis uineis, uel propagandis, reparandis, putandis, et arbuſtis.

T. IIII.

HOC mense poſtremo, ubi calidi, ac ſicci aeris qualitas eſt, ubi exilis, & aridus eſt campus, ubi collis præruptus, aut macer, uites utiliſſime ponuntur, de quibus ſatis mense februario diſputaui. Nunc loas ſiccis, calidis, exilibus, macris, arenofiſ, aridiſ quæcunq; de paſtinis, de uitibus ponendis, putandis, propagandis, reparandis, uel arbuſto faciend, ante dicta ſunt, rectius fiunt, ut contra exilitatem glebæ hybernis imbribus adiuentur. Sic & humorē ſitientibus conferunt, & recifa, uel merſa glacie nō aduſrunt, quia talibus loas pruinarum uiſ, & natura neſatur.

De ablaqueanda nouella.

T. V.

POST Idus Octobris ablaqueanda eſt omnis nouella uinea ſeu in paſtino, ſeu in ſcrobibus, aut ſulcis, ut amputentur radices ſupernacue, quas produxit æſtate, quæ ſi conualuerint, inferiores radices faciunt interire, & ita remanebit uitis in ſummitate ſuſpēſa, quæ reſeam frigori obnoxiam faciet, & calori. Sed hæ radiculæ non ad ſiccum debent readi, ne aut plures inde naſcantur, aut noua plaga corpori uitis impſſa ui ſecuturi alboris uſatur. Reidemus autē relicto digiti ſpatio. Et ſi placida ibi hyems eſt, apertas relinquemus uites, ſi uiolenta, ante decembres Idus operiemus, ſi perfrigida, aliquantum columbini ſtercoris ſub ipſe hyeme circa uiticularum ueſtigia largiemur, quod contra frigus nimium Columella dicit toto faciendum eſſe quinquennio.

P iiij

De utilitate propagandæ nunc vineæ.

T.VI.

HOC tempore icârco locis, quibus dixi, propagatio melior ē, quia firmandis radicibus vitis incumbit, cum proferendi palmitēs, eam cura non permonet.

De arboribus inferendis, uel uitibus.

T.VII.

HOC mense aliqui uites, & arbores locis calidissimis inferere consueverunt.

De oliuetis instituendis, & colendis, uel remedijs eorum, uel oliuis condiendis, uel fossis, rinisq; purgandis.

T.VIII.

NUNC etiam locis calidis, & apriis oliueta instituimus more, uel ordine, quē februario mensis ostendit. Seminaria quoq; olearum locis talibus faciemus hoc tempore, & omnia, quæ ad oleam pertinebunt. Olinas quoq; albas condiemus, sicut postea referetur. Hoc tempore ablaqueandæ sunt arbores oleæ prouincijs siccioribus, ac tepidis, ita ut eis à superiori parte humor possit induci. Omnem sobolem conuelli Columella præcepit, mihi autem uidetur paucas dimitti semper, ac solidas, ex quibus uel in uetustate, matris loco delecta succedat, uel melius nutrita, et aggestæ terræ beneficio, & iam suas habens, radices ad oliuetū faciendum sine cura seminarij transferat arbuscula. Nūc, si suppetit, intermisso triennio stercoranda sunt oliueta locis maxime frigidis. Caprini stercoreis sex libræ uni arbori, uel cineris modij singuli sufficient. Muscus tñ semper radatur arboribus. Et putetur (sicut Columella dicit) octo annorum ætate transacta. Videbimur mihi unoquoq; anno sicca, & infructuosa cum aliqua debilitate nascentia debere recidi. Quod si fructus arbor letos non asferet, terebretur gallica terebra usq; ad medullam foramine impresso, cui oleastri informis talea uehementer arctetur, & ablaqueatæ arbori amurca insulsa, uel uetus urina fundatur. Hoc enim uelut coitu steriles arbores uberantur, quas tñ durate malitia oportebit inferere. Hoc mense fossas, rinisq; purgabimus.

Remedium, si uua compluta est.

T.IX.

GRAECI iubent, si uua nimius imber infuderit, postea quā mustū eius primo ardore feruebit, ut ad alia uascula trāsferat.

Ita ppter naturæ gravitatē remanens aqua subsidet, & trāslatū uinū pure seruabit, relicto qcqd se illi ex imbre miscuerat.

De oleo uiridi faciēdo, & laurino.

T.X.

N V N C oleum uiride faciēmus hoc genere. Oliuam quāreantissimam, cū uaria est, colligis, et si diebus aliquot collegeris, expandis, ne calefiat. Si qua ibi putris, aut sicca est, remoues. Vbi uero compleueris modū factorū, sales tritos, uel non tritos, qd est melius, in oliuam eandē mittis per decem modios, tres salis, & molis primo, & sic salitam in nouis canistris esse patieris, ut per noctem cum salibus, & ducat in se eosdem sapes, ac mane premē incipiat, olei meliorē fluxū redditura, salis sapore cōcepto, canales sanē, & oīa receptacula olei calida aqua prius lauabis, ut nihil de anni prateriti rancore custodiant. Focos ēt non propius admonebis, ne olei saporem fumus inficiat. Nūc mense postremo locis siccis, & calidis ad oleum faciēdum lauri bacas legemus.

De hortis.

T.XI.

MENSE Octobri serenda sunt intyba, quæ hyeme seruiant. Amant humores, & terram solutā. Arenosis, & salis locis, atq; maritimis summa proueniunt. Area his planior appareat, ne radices eorum terra fugiente nudentur. Quatuor foliorum transferantur ad locum stercoratum. Nunc plantæ cardui ponuntur, quas cum ponemus, radices earū summas ferro resecamus, ac fimmo tingimus, ternum pedum spatio separamus incrementi cā, pedali scrobe depositas binas, aut ternas. Cinerē saepe sub hyeme diebus siccis, finumq; miscēbimus. Hoc mense sinapim seremus, terram diligit aratam, & si fieri potest, congestitiam, quamuis ubicunq; nascatur, sarculari debet assidue, ut respergatur puluere, quo fouet, nō minus gaudet humore, de quo semen legere disponis, suo loco eē patieris, qd ad escam parabis, robustius facies trāsfereōdo. In sinapi uetus semen inutile est, uel sationi, uel usui, quod dentibus fractū si intus uiride uidebit, nouū est, si albū fuerit, uetustatē fatetur. Hoc mense malua serenda est, q̄ occurſu hyemis ab incrementi lōgitudine reprimeat. Loco pingui delectat, et humido, gaudet letamine. Transferunt plantæ eius, cū cōpint folia quatuor habere, uel quinq;. Melius comprehendit eius plantā, quæ tenera est, maior enim translata languebit. Sapor illis

P iiij

OCTOBER.

est melior, si non transferantur, sed ne cito erigantur in caulē, in medio earū glebulas constitues, aut lapillos. Rara ponenda est, sarculo delectatur assiduo, sic liberandæ sunt herbis, ne motū sentiant in radice. Si transferendis plantis nondum facias in radice sessiles fient. Nunc ēt locis temperatis, & calidis anethū seremus. Cepullæ serunt etiam hoc mense, uel menta, et pastinaca, thymū, & origanum, & cappar mensis initio. Item betam locis siccioribus, nec non armoraciam seremus, uel transferemus ad culta, ut melior fiat, nā hæc agrestis est raphanus. Nunc porrum uerno satum transferre debemus, ut crescat in capite. Sanè sarculis circūfodiatur assidue, & cōprehensa porri planta uelut tenacibus alleuet, ut inanitas spatij, quæ radiabus suberit, incremēto capitis suppleatur. Ocimum quoq; etiam nunc seremus, quod citius nasci fertur hoc tempore, si aceti imbre leuiter spargatur infusum.

De pomis.

T. XII.

CVI placet curas agere seculorū, de palmis cogitet cōserendis. Hoc igitur mense dactyloꝝ non ueterum, sed nouorū, ac pinguium recentia ossa debebit obruere, terræ cinerem miscere. Si plantam uelit, ponenda est Aprili mense, uel maio. Locis delectatur apriis, & calidis. Fouenda est, ut crescat, humore. Terrā solutā uel sabulonem requirit, ita tñ, ut quando planta deponit, circa eam, uel sub ea pinguis terra fundatur. Annicula transferatur, aut binia Iunio mense, uel Iulio incipiente. Circūfodiatur assidue, ut rigatione cōtinua æstatis uincat ardores. Aquis palmæ aliquatenus salis inuuant, quæ infici debēt salibus, et si tales eas natura nō præbuit. Si ægra est arbor, feces uini ueteris ablaqueate oportet infundi, uel radicum supernacua capillamenta decidui, uel cuneum salis interfossis radiabus premi. Constat aut locum propè nullis utilem fructibus, in quo palmæ sponte nascuntur. Pistacia seruntur autumno, & mense octobri sobole, et nucibus suis. Sed melius ipsa pistacia iuncta ponunt mas, ac fœmina. Marem dicunt, cui sub corio uelut ossei longi uident latere testiculi. Qui diligentius facere uoluerit, pertusos caliculos, & sterco rata terra repletos parabit, & in his pistacia terna cōstituet, ut ex omnibus germen quodcunq; proædat, quod ubi conualuerit planta, hinc facilius transferat mense Februario. Amat locū calidum, sed humidum, & rigatione gaudet, & sole. Inserit tere

binto mense Februario, uel Martio, at alij amygdalo inseri pos-
 se firmarunt. Cerasus amat cœli statum frigidum, solū uero posi-
 tionis humectæ. In tepidis regionibus parua provenit. Calidum
 non pōt sustinere. Montana, uel in collibus cōstituta regione læ-
 tat. Cerasi plantam syluestre transferre debemus mense octobri,
 uel nouembri, & eam primo ianuario, cū comprehendit, inserere.
 Plantaria uero creari possunt, si p̄dictis mensibus spargantur
 poma, quæ summa facilitate nascunt. Ego sic huius arboris facili-
 tatem probavi, ut uirgulta ex ceraso pro amminiculis p uineā
 posita in arborem profiluissē confirmem. Et Ianuario mense feri
 pōt. Inferitur mense Nouembri melius. Vel, si necesse sit, extremo
 ianuario. Alij et octobri inserēda esse dixerunt. Martialis in trū-
 co inseri iubet. Mihi inter corticē, & lignū feliciter semp eue-
 nit. Qui in trunco cōserunt, sicut Martialis dicit, oēm lanuginē
 quæ circa est, auferre debebūt, quæ si remanserit, insitis nocere ma-
 nifestat. In cerasis hoc seruandū est, et in omnibus gummatīs, ut
 tunc inserant, qñ his uel nō ē, uel desinit gūmī effluere. Cerasus
 inserit̄ i se, in pruno, in platano, ut alij in populo. Amat scrobes
 altas, spatia largiora, assiduas fossiones. Putari in ea putria, et
 sicca debebunt, uel quæ densius arctata protulerit, ut rareseat.
 Fimum nō amat, atq; inde degenerat. Cerasa ut sine osse nascan-
 tur, fieri Martialis hoc dicit. Arborē teneram ad duos pedes rei-
 des, et eā usq; ad radicē findes, medullā partis utriusq; ferro cu-
 rabis abradere, & statim utraq; partes in se uinculo stringis, et
 oblinis fimo & summā partem, et laterū diuisuras. Post annum
 cicatrix ducta solidat. Hanc arborem sirculis, qui adhuc fructū
 nō attulerunt, inseris, & ut asserit, ex his sine ossibus poma nascē-
 tur. Si cerasus cōcepto humore putrescit, in trunco foramen acci-
 piat, quo possit educi. Si formicas patit̄, succū portulacæ debebis
 infundere, cum aceti media parte pmistum, uel uini fœibus trun-
 cum arboris florentis adlinire. Si æstu canicularum fatigat̄, triū
 fontium singulos sextarios sumptos post solis occasum radiabus
 arboris iubeamus influere sic, ne remedium luna deprehendat,
 uel herbam symphoniacam circa arboris truncum torquebimus
 in coronam, uel ex ea iuxta imum codicē cubile faciemus. Ce-
 rassa non aliter, q̄ in sole usq; ad rugas siccata seruantur. Mense
 octobri aliqui mali arborem calidis, et siccis regionibus ponunt,
 & cydonia circa nouembres Calēdas, & sorbum, uel amygdala

OCTOBER.

in seminarijs obruunt, & pini semen aspergunt. Hoc mense poma condienda sunt, atq; seruanda eo more, quo in singulorum titulis continetur, uelut quæq; matura processerint.

De apibus.

T.XIII.

HOC etiam mense aluearia castrabuntur more, quo dictum est, quæ tamen oportet inspicere, & si abundantia est, demere, si mediocritas, partem mediam relinquere p hyemis inopiã, si uero sterilitas apparet in cellis, nil prorsus auferre. Mellis uero, et ceteræ superius est demonstrata confectio.

Quæ græci, uel alij super uina condienda, curandaq; dixerunt.

T.XIIII.

NE lecta præterea, quæ græci sua fide media de cõdiendi uini genere disputarunt, demonstrare curauim, q uini naturã tali rõne discernunt, & hanc in eo uolunt esse distantia, ut qd dulcẽ est, grauius dicant, qd albũ, & aliquatenus falsum, cõuenire uescicæ, qd croceo colore blandit, digestionĩ accomodũ, qd albũ, & stipticum pdesse stomacho laxiori. Transmarinũ pallorẽ facere, & tm sanguinẽ non creare. Uuis nigris fieri forte, rubeis suauẽ, albis uero plerũq; mediocre. Incõdiendo ergo uino aliq græcorũ mustum decoctũ ad medietatẽ, uel tertiã partẽ uino adiungunt. Alij græci ita iubent aquã marinam mundã de puro, & quieto mari, quã anno ante cõpleuerint, reseruari, cuius talẽ esse naturã, ut et farsedine, uel amaritudine per hoc tps careat, et odore, & dulcis fiat ætate. Ergo eius octogesimã ptẽ musto admiscet, & gypsi quinquagesimã. Post tertiã deinde diem fortiter commouent, ac pollicent non ætatẽ solum uino, sed splendorẽ quoq; coloris asferre. Oportet aut nona quaq; die uinum moueri, atq; curari, uel si tardius, undecima. Frequens. n. respectus faciet indicare utrum uendenda sit spẽs, an tenenda. Quidã resinæ siccæ tritæ uncias tres dolio imergunt, & pmouent, et uina diuretica sic fieri posse psuadent. Mustum uero, qd per pluuias frequentes leue est, sic curari debere iusserunt, qd pbari gustu ipsius poterit. Omne mustũ decoqui iubent, donec pars eius uigesima possit absumi. Melius quoq; fieri, si centesimã partẽ gypsi adicias. Lacẽ demonij uero eousq; decoquere, donec uini qnta ps pereat, & quarto anno usibus ministrare. Suauẽ uinũ de duro fieri docet, si ordeaçi pollinis cyathos duos simul cũ uino subactos mittas

in uini uasculo, & hora una ibi esse patieris. Aliq̃ feces uini dulcis admiscēt. Aliq̃ addunt glyariz & sicce aliquatū, & utuntur, cum diu uasorū commotione miscuerint. Vinum quoq; inter paucos dies optimi odoris effici, si bacas myrti agrestis mōtanās siccas, & tūsfas mittis in cadū, & decē diebus requiescere patiaris, tunc coles, & utaris. Vitis ē flores arbutinae collectos in umbra siccare curabis. Tunc diligenter tūsfos, & cretos habebis in uasculo nouo, & cum uolueris tribus cadis unā floris mensurā, quā Syri chenicam uocant, adijcies, & superlines dolium, & sexta, uel septima die aperies, & uteris. Vinū fieri ad potandū suauē ita dicunt. Fœniculi, uel satureiæ singulorū congruū modum uino immergi, atq; turbari. Vel fructum, quem duæ nūces pineæ produxerint, torrefactum, & linteo ligatum mitti in uasculo, ac superliniri, et usui esse quinq; diebus exactis. Vinum autē uelut uetus effici de nouello, si amygdala amara, absynthiū, pini frugiferi gumen fœnum græcum simul frangas quantum sufficere estimaris, & pariter tundas, et ex his unum cyathum p amphoram mittas, & magna uina conficies. Si uero senseris peccatura, huic confectiōi aloen, myrrhā, crocomagma singula modis equalibus tūfā, & in puluerē redacta cū melle miscēbis, & uno cyatho unā amphoram condire curabis. Anniculum quoq; uinū ut longam simulare uideat̃ etatem, melliloti unciā unā glyariz & uncias tres, nardi celtici tantūdem, aloes epatici uncias duas, tūdis, & cernis, & in sextarijs quinquaginta coclearia sex reconde, & uas ponis in fumo. In albū colorē uina fusca mutari asserūt, si ex faba lomentū factum uino q̃s adijciat, uel ouorū trium lagenæ infundat alborem, diūq; cōmoneat, sequenti die candidū reperiri, quod si ex asra pisa lomentum adijciatur, eadem die posse mutari. Vitibus quoque hanc esse naturam, ut alba, uel nigra si redigantur in cinerem, uinoq; adijciantur, ei unāquāq; formā sui coloris imponere, ut ex nigra fuscum, candidum uero reddatur ex alba, ea ratione scilicet ut combusti sarmenti cineris modij unius mensura mittat̃ in dolium, quod habebit amphoras. X. et triduo sic relictū post operiet̃, ac lutetur. Albū uel (si ita uisum fuerit) nigrū reperiri quadraginta diebus exactis. Vinum quoq; asserunt ex molli forte sic fieri. Altheæ, hoc est, ibisci folia, uel radices, aut eius caulem tenerū decoctū mitti, aut gypsum, aut cicris cotulas duas, aut cypressi pillulas tres, aut buxi folia q̃tū ma-

OCTOBER.

nus ceperit, aut apij semen, aut cinerem sarmentorum, cui vis flammæ corpus reliquit exile, omni soliditate detracta. Vinum uero eadem die ex austero lymphidum, atque optimum fieri, si grana piperis decem, pistacia viginti adiecto modico uino simul coteras, & in sex uini sextarios mittas, diu omnibus ante comotis, tunc requiescere patiaris, & coles usui mox futurum. Item feculentum statim in lymphidum reddi, si VII. pini nucleos in unum uini sextarium mittas, diuque comoueas, & paululum cessare patiaris, mox sumere puritatem, colarique debere, & in usum referri. Item quod cretensibus oraculum pythij Apollinis monstrasse memoratur, fieri sic candidum, & sumere uetustatis saporem, si squinatos uncias quatuor, aloes epatici uncias quatuor, masticiis optimi unciam unam, cassiæ fistulæ unciam unam, piperis unciam unam, spicæ indicæ semunciam, myrrhæ optimæ unciam unam, thuris masculi non rancidi unciam unam, tundis uniuersa, & in tenuissimum puluerem cribro excutiente deducis. Cum uero mustum ferbuerit, dispumas bis, & omnia uuarum grana, quæ feruor in summum reiecit, expelles. Tunc gypsi triti, atque cribrati tres italicos sextarios mittis in uini amphoras decem prius tamē partem quartam uini condiendi in alia uasa transfundis, & ita gypsum adijcies, & dolium uiridi, ac radicata canna per biduum fortiter agitabis. Tertia uero die ex superscriptis pulueribus quaterna coclearia completa modestius in denas uini amphoras mittis, & uini, sicut superscriptum est, quartam partem, quā alibi diffuderas, superadijcies, & dolium replebis, & item diu agitare curabis, ut specierum uis omne musti corpus inficiat. Tunc operies, atque adlines relicto breui foramine, quo æstuantia uina suspirent. Sed exemptis quadraginta diebus, & hoc spiraculum claudis, & deinde ut libuerit gustas. Illud memento seruare præ cæteris, ut quoties uinum mouetur, inuestis puer hoc, aut aliq̃s satis purus efficiat. Linimentum quoque dolium non gypso, sed sarmentorum cinere debebis inducere. Item uinum, quod salutare contra pestilentiam sit, & stomacho prodest, fieri hoc genere fertur. In optimi musti metreta una ante quam ferueat, tunsis absynthij octo uncias linteo inuolutas demittis, & exactis XL. diebus, curabis auferre. Id uinum refundis lagenis minoribus, & uteris. Nunc condiunt, primo amne musti spumantis egesto, quibus moris est gypso uina medicari. Sed si natura leuius uinum est, et saporis humecti, in congijs centum, duos gypsi

sextarios misisse sufficiet. Quod si uinum nascitur uirtute solidius, medietas abunde prædictis poterit satis esse mensuris.

Rosatum sine rosa fieri.

T.XV.

N V N C rosatum sine rosa facies sic. Folia citri uiridia sparta palmea missa in musti nondum feruentis uase depones, & claudes, & exemptis quadraginta diebus melle addito, ad modum rosati, cum placebit, uteris.

De uinis pomorum.

T.XVI.

HOC Mense, omnia, quæ locis suis leguntur, ex pomis uina conficies.

De ænomelli.

T.XVII.

M V S T V M de maioribus, & egregijs uitibus post. XX. dies q̄ leuatum fuerit ex lacu, quantum uolueris sumis, & ei mellis non dispumati optimi quintam partem prius tritam fortiter donec albescat, admiscæs, & agitabis ex canna radicata uehementer. Mouebis autem sic per dies. XL. continnos, uel, quod est melius, quinquaginta, ita ut cum moueris, mundo linteo tegas, p̄ quod facile confectio æstuabunda suspiret. Post dies aut quinquaginta munda manu purgas quodcunq; supernatabit, & in uasculo gypso diligenter includis, & ad uetustatem reseruas. Melius tñ si in minora, et picata uascula proximo uere transfundas, et gypsata diligenter operias, & in terrena, et frigida cella recondas, uel arenis fluuiialibus, uel eodē solo, uascula ex aliqua parte summergas. Hoc nulla uitiat ætate, si tā diligenter effeceris.

De defruto, carcæno, sapa.

T.XVIII.

N V N C defrutum, carcænum, sapa cōficiet. Cum omnia uno genere conficiantur ex musto, modus his, & uirtutem mutabit, & nomina. Nam defrutum à deferuendo dictum, ubi ad spissitudinem fortiter dispumauerit, effectum est. Carcænū, cum tertia perdita, duæ partes remanserint. Sapa, ubi ad tertias redacta descenderit, quam tamen meliorem facient cydonia simul cocta, et igni supposita ligna ficulnea.

De passo.

T.XIX.

OCTOBER.

PASSVM nunc fiet ante vindemiam, quod Africa suenit uniuersa conficere, pingue, atq; incundum, et quoad conditum, si utaris mellis uicē, ab inflatione te uindicias. Leguntur ergo uuae passae quamplurimae, & in fisciellis clausae iunco factis aliquate- nus rariore contextu, uirgis primo fortiter uerberantur. Deinde ubi unarum corpus uis contusionis exoluerit, cochleae supposita sporta comprimatur. Hinc passum est quicquid effluxerit, & co- ditum uasculo, mellis more, seruatur.

De cydonite.

T.XX.

ABIECTO corio mala cydonia matura in breuissimas, ac tenuissimas particulas recides, & proijcies durum, quod habetur interius. Dehinc in melle decoques, donec ad mensuram medi- am reuertatur, & coquendo piper subtile conspergis. Aliter.

Succa cydoniorum sextarios duos, aceti sextarium unum semis, & mellis duos sextarios misces, & decoques, donec tota permu- stio pinguedinem puri mellis imitetur. Tunc triti piperis, atque Ciniberis binas uncias miscere curabis.

De fermento musteorum seruando.

T.XXI.

EX nouo tritico purgato farriculū facies, & ex musto de subpe- dibus raptō curabis infundere, ita ut modio farris lagenā musti adijcias. deinde sole siccabis, & itē similiter infundis, ac siccas. Hoc cū tertio feceris, panes ex eo breuissimos admodū facies mu- steorū, & in sole siccatos uasculis nouis fictilibus recōdis, & gyp- sas. Pro fermēto, quo tpe āni musteos facere uolueris, hoc uteris.

De uua passa.

T.XXII.

VVAM passam graecam sic facies. Melioris aēni, & dulcis, et lucidi botryones in ipsa uite torquebis, & patieris sponte in areā scere, deinde sublato in umbra suspendis, & uuam constrictam, cum ponis in uasculis, substernis pampinos sicco algore frigētes, & manu comprimis, & ubi uas impleueris, item pampinos ad- dis nihilo minus non calentes, & operculabis, ac statues in lo- co frigido sicco, quem nullus fumus infestet.

De horis.

T.XXIII.

OCTOBER martium similibus umbris sibi fecit equari.

OCTOBER.

328

Hora	I.	pedes	XXV.
Hora	II.	pedes	XV.
Hora	III.	pedes	XI.
Hora	IIII.	pedes	VIII.
Hora	V.	pedes	VI.
Hora	VI.	pedes	V.
Hora	VII.	pedes	VI.
Hora	VIII.	pedes	VIII.
Hora	IX.	pedes	XI.
Hora	X.	pedes	XV.
Hora	XI.	pedes	XXV.

TITVLI MENSIS NOVEMBRIS.

- De satione tritici, farris, ordeï, fabæ cum disciplina sua, de lenticula mature ferenda, de lini semine. T. I.
- De pratis novis instituendis, ponendis vitibus, & propagandis, & circumsodiendis novellis, ac recidendis mergis. T. II.
- De vinea veteri in ingo, vel pergula reparanda. T. III.
- De putandis vitibus, & arboribus locis tepidis, & olinetis, & faciendo oleo. T. IIII.
- De olinetis, ponendis, & curandis agris arboribus, corbis, palis, ridiis faciendis, oleo laurino faciendo. T. V.
- De hortis, in eo de allio ulpico cum disciplinis, de cepullis, et plantis carduorum, de armoracea, & annela. T. VI.
- De pomis, in eo de persico, de pinu, de prunis, de castaneis cum omni disciplina, & pomis aliorum mensium. T. VII.
- De apibus, in eo de mundandis, ac muniendis castris earum. T. VIII.
- Remedium vitibus, quæ sine fruge luxuriant. T. IX.
- Remedium sterili viti. T. X.
- De rosario ex paucis virgulis instituendo. T. XI.
- De uva, quæ usque ad uer reservatur in vite. T. XII.
- De gregibus ouilli generis, et caprini, et pascendi ordine. T. xiiij.
- De glandibus legendis. T. XIII.
- De materie cedenda. T. XV.
- De transferendis arboribus maioris ætatis. T. XVI.
- De oleo faciendo secundum grecos, & emendando. T. XVII.

NOVEMBER.

Oleum liburnico simile.
 Vt oleum sordidum purges.
 De oleo odoris horrendi.
 De oleo ranado curando, & emendando.
 De condiendis oliuis.
 De horis.

T. XVIII.
 T. XIX.
 T. XX.
 T. XXI.
 T. XXII.
 T. XXIII.

PALLADII RVTILII TAVRI AEMILIANI VIRI ILLV STRIS DE RE RVSTICA LIB. DVODECIMVS.

De satione tritici, farris, ordeï, fabæ cū disciplina, & de lenticula
 serenda, & de lini semine. T. I.

NOVEMBRI mense triticum seremus, &
 far satione legitima, ac semente solenni. Ingerū
 utriusq; seminis modijs quinque tenebis. Nūc
 et ordem maturum adhuc seremus. In huius
 principio fabam spargimus, quæ pinguiissimū,
 uel stercoreatum desyderat locum, uel uallem
 quam succus ueniens à summitate, fecundet. Primo seritur, de
 inde profandis, & tunc sulcatur. Occanda est large, ut tegi plu
 rimum possit. Aliqui locis frigidis dicunt in fabæ satione glebas
 non esse frangendas, ut per eas geliadiorum tempore possint ger
 mina obumbrata defendi. Satione eius generis sicut opinio ha
 bet, non fecundatur terra, sed minus leditur. Nam Columella
 dicit, agrum frumentis utiliore probari, qui anno superiore ua
 cuit fuerit, q̄ qui calamos fabæ messis eduxit. Pingue ingerū
 sex modij occupant, mediocre amplius. Spisso bene provenit. Ma
 crum solum, nebulosumq; non patitur. Curandum est præcipue,
 ut luna. XV. seratur, si adhuc ictum solis percussa non sensit.
 Aliqui dicunt quartamdecimam potius eligendam. Sanguine
 caponis græci asserunt fabæ semina macerata herbis aduersanti
 bus non noceri. Aqua pridie infusa citius nasci, nitrata aqua re
 spersa cocturam non habere difficilem. Nunc seritur prima lenti
 cula sicut februario mense narratum est. Hoc etiā toto mense po
 terit lini semen aspergi.

De pratis

De pratis nouis instituendis, ponendis uitibus, & propagadis,
& circumfodiendis nouellis.

T.II.

IN huius maxime mensis principio, possumus instituere noua prata, more, quo dictū est. Hoc ē toto mense locis calidis, & siccis, uel apriis, erit uitiū celebrāda positio. Nūc & ppago iure duces & locis frigidis nouellas uites, & arborū plantas circumfodere, atq; operire cōueniet, & ante idus. Nūc mergis, hoc est p. paginis curuatura post triēniū, q̄ pressa fuerat, reādetur à uite.

De uinea ueteri in ingo, uel pergula reparanda. T.III.

N V N C, ac deinceps uinea uetus, q̄ in ingo est, uel pergula, si robusto, & integro trūco sit, ablaqueata fimo saties, & angustius putata inter quartū, et tertiū pedē à terra uiridissima pte corticis acuto ferramenti mucrone feriat, ac fossa frequētius incutetur. Nā (sicut asserit Columella) ex eo loco germē plerūq; pducit, et ueniente uere fundit materiā, qua uitis reparatur antiqua.

De putadis uitibus, & arboribus locis tēpatis, & reliqs. T.iiij.

N V N C putatio autumnalis celebratur in uitibus, & arboribus, maxime ubi inuitamur tepore puiniæ, & putantur oliueta, & oliua, cū uaria cæperit esse, colligitur, ex qua primū fiet oleum. Nā cum tota nigrescet, quod spei merito posterauit, fundendi ubertate cōpensat. Est utilis olearū putatio, ceterarumq; arborū, si loci patit disciplina, ut decisis cacuminibus, rami fluentes per latera prona fundantur. Quod si regio insolens, & incultodita cōtigerit, agēdum prius toto arboris corpore ab inferiore parte purgato, ut altitudine animalium supergressa, modus transcendatur iniuriæ, & arbor iam spatio suo tuta curetur.

De oliuetis ponēdis, et curadis ægris arboribus, & reliqs. T.V.

N V N C etiam locis calidis, ac siccis regionibus oliueta ponuntur, sicut februario disputatū est. Amat hæc arbor arduo locorū situ mediocriter ab humore suspendi, scalpi assidue, letaminis ubertate pinguescere, feracibus uentis clementer agitari. Hoc ē mēse oleis sterilibus quæ supradicta sunt remedia faciemus. Nūc et corbes, & pali, & ridice bene fieri possunt, etiā nunc locis tēpatis, est laurini olei iusta confectio.

Pallad.

Q

De hortis.

HOC mense allium bene feritur, & ulpicum terra maxime alba fossa, & subacta sine stercore. Sulcos in areis facies, & semina in locis altioribus pones. IIII. digitis separata, neq; altius pressa. Sarculabis frequenter, inde plus crescent. Si capitulum facere volueris, ubi coeperit caulis p̄dire, p̄culca, succus reuertet ad spicas. Fertur si luna sub terris posita feratur, & item sub terris luna latente uellatur, odoris foeditate cariturum. Vel paleis cōdita allia, uel fumo suspēsa durabunt. Nūc & cepulla feri pōt, & carduorum planta disponi, & arimoracea feritur, & canela.

De pomis.

HOC mense locis calidis, ceteris uero ianuario persici ossa in pastinatis areis sunt ponēda, binis à se pedibus separata, ut cū ibi plantae excreuerint, transferantur. Sed ossa ponantur acumine deorsum uerso. Et non amplius, q̄ duobus, aut tribus digitis obruantur. Ossa uero, quae ponēda sunt, aliqui siccata prius paucis diebus cineris nūstione terra soluta in qualis reseruant. Ego uero usq; ad ferendi t̄ps sine ulla cura saepe seruaui. Locis quidē qualibuscunq; proueniunt. Sed & pomis, & frondibus, & durabilitate praecipua sunt, si caelum calidum, solū arenosum, & humidū sortiantur. Frigidis uero, & maxime uentosis nisi obiectu aliquo defendant, intereunt. Dū tenera sūt germina, saepe herbis circumfossa liberentur. Bimam plantā recte trāsferemus scrobe breui. Nec à se longe statuenda sunt, ut inuicē se à calore solis excusent. Ablaqueandae sunt per autumnum, & suis stercoreandae folijs. Putanda persicus in autumnno est, ut arida, & putrida t̄m uirgulta tollantur. Nam siquid uiride reseemus, areasat. Languenti arbori ueteris uini feces, aque mistas oportet infundi. Affirmantibus graecis persicus scripta nascetur, si ossa eius obruas, & post dies. VII. ubi patefieri coeperint, apertis his nucleos tollas, & his annabari, quod libebit inscribas. Mox ligatos simul cū suis ossibus obruas diligentius adherentes. Genera eorū sunt haec, duraīna, praecoqua, persica, armenia. Si haec arbor ardore solis inarescat, frequēti aggestiōe cumuletur. uespertino inuuetur humore, obiectis defendat umbraculis. Iuuat in ea & spoliū serpentis appēdi. Nunc iam cōtra pruinas sterco in

geratur persico, uel feces uini cum aqua permixta, uel, quod magis pdest, aqua, in qua faba decocta est. Si uermes persicus patitur, cinis eos amurcae mistus extinguit, uel bouis urina cum aceti tertia parte confusa. Si poma caduca sunt, nudata radia eius, uel trunco lentis, aut terebinthi cuneus affigitur, uel terebrata, in medio, palus salicis imprimetur. Si poma rugosa creabit, aut putrida, circa inuicem truncum cortex recludatur, et cum inde modicus humor effluxerit, argilla, uel paleato luto plaga retegatur. Magna poma persicus affert, si florenti per triduum, ternos sextarios caprini lactis ingesseris. Contra uitia persici perficit spatium ligatum, uel sparteas suspensa de ramis. Mense ianuario, uel februario locis frigidis, nouembri calidis persicus inseratur, maxime circa terram siccis plenioribus, et prope arboris natis. Nam cacumina uel non tenent, uel diu durare non poterunt. Inseritur in se, in amygdalo, in pruno, sed armenia, uel procoqua prunis, duracina amygdalis melius adherescunt, et tempus etatis acquirunt. Mense aprili, uel maio locis calidis, in Italia uero utroque exeunte, uel iunio persicus inoculari potest, quod emplastrari dicitur, praeparato super truncum, et emplastratis pluribus gemis, more quo dictum est. Persicus rubescat, si platano inserta figatur. Duracina seruatur condita muria, et oximelle, uel detractis ossibus fico, more in sole siccantur, ac pendent. Item saepe uidi detractis ossibus duracina melle condiri, et saporis esse iucundi. Item bene seruantur, si umbilicum pomi gutta pinis calidis oppleueris, ut sic saepe innatare cogantur uase concluso.

De pinu.

PINVS creditur prodesse omnibus, quae sub ea seruntur. Pinum seremus nucleis suis calidis, et siccis regionibus mense octobri, uel nouembri, frigidis, et huiusmodi februario, uel martio. Amat locum gracilem saepe maritimum, inter montes, et saxa uastior, et procerior inuenitur. Ventosis, et humidis, arborum sunt incrementa latiora. Sed siue montes uelis conferere, seu spatia quaecumque, haec huic generi deputabis, quae alteri utilia esse non possunt. Exarabis ergo ea loca diligenter, atque purgabis, et frumenti more semen aspergis, ac leni sarculo curabis operire, nec enim plusquam palmo debet abscondi. Defendenda est tenera arbor a pecore, ne calcetur inualida. Proficiet, si nucleos aqua autem triduum macerabis. Alii qui dicunt fructum pineum translatione mitescere, sed plene hoc

NOVEMBER

modo procurant, ut prius multa semina in caliculis terra, & si mo repletis obruant, quæ ubi præserint, relicto eo, quod solidius est, auferunt alia, ubi iustum cœperit incrementum, trimā plantam cū ipsis caliculis transferunt, quibus fractis in scrobe indulgent radicibus largitatem. Terræ tñ equæ sterco admiscant, facientes straturam alterno ordine subinde crescentem. Servandū est tamen, ut radix eius, quæ una, & directā est, usq; ad summam suam possit integra & illæsa transferri. Putatio nouellas pini arbores tantum promouet (quod expertus sum) ut quæ speraueras incrementa, duplicentur. Noces pineæ, et usq; in hoc tēpus in arbore esse possunt, & maturiores legentur. Prius tamen legendæ sunt, q̄ pateſcant. Nuclei nisi purgati durare non possunt, tamen aliqui in uasis fictilibus nouis, & terra repletis cū testis suis missos asserunt custodiri.

De pruno.

PRUNA si ossibus serantur autumno, mense nouembri, solo putri, & subactō duobus palmis obruantur. Offa eadem ponantur & mense februario. Sed tunc prius lixio sunt maceranda per triduū, ut cito germinare cogantur. Ponuntur & plantis, quas sumemus ex codice mense ianuario exeunte, uel februario circa idus radicibus fimo oblitis. Gaudēt loco lato, & humido, cælo tepido melius proferuntur, tñ queunt & frigidum sustinere. Locis lepidosis, & glareosis si innatur letanine, excusant ne poma caduca, & uermiculosa nascantur. Extirpandæ sunt sordes à radice, exceptis rectioribus, quæ seruabuntur ad plātas. Si lāguida pruni arbor est, amurca cū aqua equaliter tēpata radicibus dēt infundi, uel bubulū lociū solū, uel humanū uetus cū duabus aquæ partibus mistum, uel cineres ex furno, maxime sarmentorū. Si poma decidant, oleastri cuneum terebratæ insige radici. Vermes eius, atq; formicas, rubrica cū pice liquida si adlinatur, extinguet. Sed modestius ppter arboris noxam, ne idē faciat remedium, quod uenenum. Innatur frequenti humore, et assidua fossione. Mense martio extremo, prunus inseritur melius trunco fisso, q̄ cortice, uel mēse ianuario, ante q̄ incipiat gumen lachrymare. Inserit in se, & persicū recipit, uel amygdalū, uel malum, sed eam degenerem reddit, et paruam. Pruna siccantur in sole per crates loco sicciorē disposita. Hæc sunt, q̄ damascena

dicuntur. Alij in aqua marina, uel in muria feruente recenti le-
ta pruna demergunt, & inde sublata, aut in furno tepido faci-
unt, aut in sole siccari.

De castanea.

CASTANEA seritur & plantis, quæ sponte nascuntur, &
semine. Sed quæ plantis seritur, ita ægra est, ut biennio de eius
uita sepe dubites. Serenda est ergo ipsis castaneis, hoc est semini-
bus suis, mense nouembri, & decembri, item februario. Eligendæ
sunt castaneæ ad ponendum recentes, grandes, maturæ. Quas si
nouembri mense seramus, faciem se pntia fructus ipsius præstat.
Si uero februario ponamus, ut usq; tunc durent, ita faciendum
est. In umbra castaneæ sicent expansæ. Tunc in angustum, &
siccum locū trāslatæ cumulū faciunt, & eas oēs fluuialis arena
diligenter operiat. Post dies. XXX. eas remota arena in aquam
frigidam mittis. Quæ sanæ sunt, mergunt, supernatat quæcūq;
uexata est. Itē quas probasti, similiter obrues, & post. XXX. di-
es æque probas. Hoc cū tertio feceris, usq; ad ueris initium, serere
debebis quæ māsierint illibatæ. Aliq in uasculis seruāt arena pa-
riter missa. Amant solū molle, & solutum, non tñ arenosum. In
sabulone proueniunt, sed humecto. Nigra terra illis apta est, &
carbunculus, & tofus diligenter infractus. In spisso agro, & ru-
brica uix prouenit. In argilla, & glarea, non potest nasci. Dili-
git cœli statum frigidum, sed & tepidum non recusat, si humor
assenferit. Delectat cluiis, et opacis regionibus, ac maxime in se-
ptentrionem uersis. Pastinari ergo locus debet, q̄ huic destin af-
arbus to altitudine pedis unius semis, uel duorū. Vel totus, aut sul-
cis in ordinē destinatis, aut certe aratris resolui hinc inde finden-
tibus. Qui fimo satiatus, ac redactus in puluerē, castanearum se-
men accipiat nō amplius pedis dodrāte demersum. Vnicuiq; se-
mini ppter notam surculus debet affigi. Ipsa semina singulis lo-
cis simul terna, uel quina ponant, & inter se quatuor pedū spa-
tio separent. Quibus transferre placuerit, bimas plantas trans-
ferre debebunt. Locus tñ deductoria liquoris accipiat, ne humor
insidens limo germen extinguat. Cui placet, pōt castaneæ in pro-
paginem ducere ima uirgulta, quæ in radice nascunt. Nouū ca-
stanetū circūfodi debet assidue. Mense martio, & septēbri. Incre-
mentū mains acquirit, si putatiōibus adiunet. Castanea inseri-

NOVEMBER.

tur (sicut probauit ipse) sub cortice mense Martio, uel aprili, tamē genere utroq; respondet. Potest & inoculari. Inseritur in se, & in salice, sed ex salice tardius maturat, & fit asperior in sapore. Castaneæ seruantur uel in cratibus dispositæ, uel intra sabulorum, ne inuicem tangerentur immersæ, uel in uasculis fictilibus nouis conditæ, & loco sicciore defossæ, uel inclusæ uirgeis ex fago receptaculis, & lutatæ, ut spiracula non relinquas, uel ordi paleis minutissimis obrutæ, uel palustri ulua figuratis densioribus sportis reclusæ.

De pomis alijs.

HOC Mense locis calidis, ac siccis regionibus agrestium pyrorum plantas ponimus, quas postea possimus inserere, et malorum, uel mali punia, & cydonum, & atrii, et mespili, fici, sorbi, filiquæ, & plantas agrestis cerasi post inserendas, et mori taleas, & amygdali semina, & nuces iuglandes, si in seminarijs (quo dictum est more) pangantur.

De apibus.

T.VIII.

HUIUS mēsis initio apes ex tamarisci floribus, reliquisq; syluestribus mella conficiunt. Quæ auferenda non sunt, quia seruantur hyberno. Eodem mense sordibus liberandi sunt aluei, quia tota hyeme eos mouere, aut aperire non decet. Sed hæc die aprico, tepidoq; facienda sunt, & pennis maxime auium maiorum, quæ habent rigorem, uel aliquo simili omnia interiora mundentur, quo manus non ualebit attingere. Tum rimas omnes, quæ sunt extrinsecus, luto, & fimo bubulo mistis linamus, & insuper generis, uel alijs tegumentis similitudinē porticus imitemur, ut possint à frigore, & tempestate defendi.

Remedium uitibus, quæ sine fruge luxuriant.

T.IX.

LOCIS calidis, & aprijs uites, quæ fructu carent, fronde luxuriant, & pauperiem fœtum cōpensant ubertate foliorum, nunc putare pressius cōueniet, frigidis uero mense februario. Si permanebit hoc uitium, circumfossas arena fluuiiali, uel cinere debebimus aggerare. Quidam lapides inserunt inter flexuosa radicum.

Remedium sterili uiti.

T.X.

HISDEM tēporibus, & locis uitem, quæ sterilis fuerit, græci ita præcipiunt esse curandam. Trunco eius fisso lapidem asserunt includendum, & ibi urinae ueteris humane quatuor cotulas circa truncum debere suffundi, ut ad radices instillatio ipsa descendat. Tunc adiicienda est terra admixta letamine, et circa radices solum omne uertendum.

Derosario ex paucis uirgultis instituendo.

T.XI.

QVAMVIS mense Februario sint conferenda rosaria, tamē locis calidis, apriis, atq; maritimis hoc etiam mense poterimus instituere rosaria. Quæ si indigus plantarū, uolueris ex paucis uirgulis, habere copiosa, quaternorum digitorū surculos gemmantes cum geniculis suis debebis excidere, & in modum propaginis sternere, & stercore, ac rigationibus adiuuare. Vbi anni etatem compleuerint, pedis spatium inter se transferre disiunctos, atq; ita solum, quod huic generi deputabis, implere.

De uua, quæ usq; ad uer reservatur in uite.

T.XII.

GRAECIS asserentibus, ut uuam serues in uite usq; ad ueris initia, circa ipsam uitem, quæ fructu plena est, loco umbroso scrobem fodies, altitudine trium pedum, latitudine duorum, & mittis sabulonem, & ibi calamos figis, in quibus retorques assidue sarmenta fructibus plena, et illesis botryonibus alligabis, ut solum non contingant, & cooperies, ut imber eo penetrare non possit. Itē græcis docentibus uuas in uite, aut poma in arbore si diu seruare uolueris, uasculis clausa fictilibus ab ima parte pertusis diligenter à summo tecta suspende, quamuis poma & gypso cooperta in longam seruantur etatem.

De gregibus ouilli generis, & caprini.

T.XIII.

HOC mense agnorū prima generatio ē. Sed agnus statim natus uberibus maternis adiuuendus est. Manu prius tñ exiguum lactis, in quo spissior est natura, mulgendum, quod pastores colostrā uocant; namq; hoc agnis, nisi auferatur, nocēbit. Ac primo p biduum natus cū matre claudatur. Tunc septis obscuris seruet, & calidis, ita secluso paruulorū grege, matricēs mittatur in pascua. Sufficiet autem prius quā proelegant matricēs mane, & cum saturæ reuertuntur ad uesperam, agnis ubera haurienda permittere.

Q iii

NOVEMBER.

Qui donec firmen^t intra stabulum fursuribus uel medica herba uel (si est copia) farina ordeⁱ pascant^r ingesta, donec conceptum paulisper robur etatis, pascu^m matribus possint h^{er}e commune.

De pascendi ordine.

PASCVA ouillo generi utilia sunt, q^u uel in noualibus, uel in pratis siccioribus ex^{er}antur. Palustria uero noxia sunt, sylue^r stria damno^sa lanatis. Salis t^{er} crebra conspersio, uel pascuis mi^sta, uel canalibus frequ^eter oblata, debet pecoris leuare fastidiu^m, nam per hyemem, si penuria est, foenum, uel palea, uel uicia, uel facili^{or} uictus ulmi seruatis fr^odibus pr^{ae}beat^r, aut fraxini. Aesti^{uis} mensibus pascantur sub lucis initio, cum graminis teneri suaⁿ uitatem roris mistura comendat. Quarta hora calescente potus puri fluminis, aut putei p^{ro}beat^r, aut fontis. Medios solis calores uallis, aut arbor umbrosa declinet. Deinde ubi flexo iam die ardor infringitur, & solum primo imb^{re} uespertini roris humesat, gregem reuocemus ad pascua. Sed canicularibus, & aesti^{uis} diebus ita pascenda sunt oues, ut capita gregis semper auertantur a solis obiectu. Hyeme aut^{em}, uel uere nisi resolutis geliadijs ad pascua prodire non debent, nam pruinosa herba huic generi morbos creabit, ac tunc semel ad aquare suffiaet. Graecas oues, sicut asianas, uel tarentinas moris est potius stabulo nutrire, q^u cap^o, & ptusis tabulis, solum, in quo claudentur, insternere, ut sic turba cubilia, propter iniuriam pretiosi uelleris, humor reddat elatens. Sed tribus, per annum totum, diebus aprico die lotas oues ungere oleo oportebit, & uino. Propter serpentes, qui plerunq^{ue} sub praesepibus latent, caedrum, uel galbanum, uel mulieris capillos, aut ceruina cornua, frequenter uramus.

De capris.

NUNC hirci admittendi sunt, ut foetu^m primi ueris fouere possit exortus. Sed caper eligendus est, cui sub maxillis duae uidentur pendere verruculae. Magni corporis, crassis cruribus, breui, plenaeq^{ue} ceruicis, auribus flexis, & grauib^{us}, paruo capite, nitido, spisso, & longo capillo. Ad inuend^{as} foeminas & ante anniculu^m congruis. Non autem durat ultra sexennium. Capella similis corporis, sed magnis uberibus est eligenda. Noⁿ tam^en ita multa caprae, ut oues una statione claudantur, quam luto, & stercore

carere conueniet. Hædis supra lactis abundantiam, edera, & arbuti, & lentisci cacumina sunt sæpe præbenda. Trimæ educare optime possunt, quod teneriores matres generant transigendū est. Sed ultra. VIII. annos seruandæ non sunt matricæ, quia genus hoc longiore sterile sit ætate.

De glandibus colligendis.

T. XIII.

H O C tpe glandis legendæ, ac seruandæ cura nos exitet, quod opus fœmineis, ac puerilibus opis celebrabit facile more bacar.

De materie cædenda.

T. XV.

N V N C materies ad fabricam cædenda est, cū luna decreſat. Sed arbores, quæ cædentur usq; ad medullam securibus reſas ali quādiu stare patieris, ut per eas partes humor, siquis in uenis cōtinetur, excurrat. Vtiles autem sunt hæ maxime, Abies, quam gallicam uocant, nisi perluatur, leuis, rigida, & in operibus ficis p/enne durabilis. Larix utilissima, ex qua si tabulas suffigas tegulis in fronte, atq; extremitate tector, præsidium contra incendia cōtulisti. Neq; enim flammam recipiunt, aut carbones creare possunt. Quercus durabilis si terrenis operibus obruatur, & aliqua tenus palis. Aesculus edificijs, et ridiis apta materies. Castanea mira soliditate perdurat in agris, & tectis, & operibus cæteris intestinis, cuius solum pondus in uitio est. Fagus in sicco utilis, humore corrūpitur. Populus utraq; & salix, & tilia in sculpturis necessaria. Alnus fabricæ inutilis, sed necessaria, si humidus locus ad accipienda fundamenta palædus est. Vlnus, & fraxinus si siccentur, rigescunt, ante curuabiles, cathenis utiles habentur. Carpinus utilissima. Cupressus egregia. Pinus nisi in siccitate nō durans, cui contra ælerem putredinem comperi in Sardinia hoc genere puideri, ut exisse trabes eius, aut in piscina qualibet anno toto mersæ laterent, post operi futuræ aut arenis obruerentur in litore, ut aggestionem, qua tectæ eēnt alternis æstibus recipro cans fluctus allueret. Cædrus durabilis, nisi humore tangatur. Quæcunq; autem ex parte meridiana cæduntur, utiliores sunt, quæ uero ex septentrionali proæriores, sed facile uitiantur.

De transferendis arboribus maioris ætatis.

T. XVI.

Q v

NOVEMBER.

HOC mense locis siccis calidis, & apricis maiores arbores transferemus truncatis ramis, illæsis radiibus, multo stercore, et rigationibus adiuvandas.

De oleo faciendo secundum græcos, & emendando. T. XVII.

GRAECI in conficiendi olei præceptis ista iusserunt. Tantū legendum esse oliuæ, quantum nocte ueniente possimus exprimere. Molam primo oleo debere leuiter esse suspensam. Offa enim cōfracta sordescunt, quare de solis carnibus sit prima confectio, & de salignis canistros fieri debere uirgultis, quia genus hoc oleum dicitur adiuvare. Nobilius erit, quod sponte defluxerit. Sales deinde, ac nitrum iubent nouo oleo misceri, ut hæc res spissitudinē eius absoluat. Deinde cum amurca subsederit, oleū purū. XXX. diebus exactis, in uitrea uasa transferri. Secundum simili disciplinā fieri, sed mola fortiore quassari.

Oleum liburnico simile.

T. XVIII.

OLEUM primū liburnico simile fieri asserunt græci, si in optimo uiridi oleo inulam siccam, et lauri folia, et cyperum omnia simul tusa, & subtiliter creta permisceas cum salibus torrefactis, ac tritis, & diu oleo iniecta perturbes, dehinc tribus, aut aliquot amplius decursis diebus, cum quieuerit, utaris.

Vt oleum sordidum purges.

T. XIX.

SI Sordet oleum, frictos, & adhuc calentes sales iniici iubent, et diligenter operiri. Ita mundum reddi post tempus exiguum.

De oleo odoris horrendi.

T. XX.

SI Fuerit odoris horrendi, uirides oliuas sine ossibus tundi, & in olei metreta chœnicas duas mitti. Si bacæ defuerint, caules terrerrimos oleæ similiter esse tundendos. Nonnulli utraq; permiscerent adiecto etiam sale. Sed omnia intra linteum clausa suspendunt, atq; ita in uas olei demittunt, postea tribus diebus exactis auferunt, & oleum in alia uasa transfundunt. Quidam mittunt uetustum laterem torrefactum. Pleriq; ordeaceos panes breuiter figuratos, & raro linteo inuolutos mergunt, & novos subinde pmutant, ubi hoc bis, aut tertio fecerint, sales mittunt, & in alia uasa translaturum, per paucos dies subsidere patiuntur. Quod si

aliquod animal forte deciderit, & oleū putredine, ac nidore uitauerit, iubent græci coriandri manipulum in olei metreta suspēdi, atque ita paucis diebus manere. Si nihil de nidore decusserit, mutandū est coriadrū, donec superet hoc uitiū. Sed maxime paderit, post senos dies in uasa munda transferre, melius si acetum ante uexerunt. Quidā fœni græci semen siccum, tritumq; permiscēt, uel incensos oleaginos carbonēs in ipso oleo frequēter extinguunt. Si acerbus odor fuerit, uel excrementa, quæ græci γίγαστα uocant, præcipiunt tusa, & in massam redacta mersari.

De oleo rancido curando.

T. XXI.

OLEVM rancidum græci asserūt sic posse curari. Albam cērā mundo, & optimo oleo resolutā, & adhuc liquentem mitti in oleo iubent. Tunc sales frictos calentes addi, operiri, atq; gypsari. Sic fieri, ut oleum purgef sapore, & odore mutato. Oleum tñ omne in terrenis locis esse seruandū, & eā eius esse naturā, ut sole, uel igne purgef, uel aqua feruētī, si simul misceat in uasculo.

De condiendis oliuis.

T. XXII.

HOC etiam mense oliuas condiemus. Harum genera sunt diuersa. Colymbades oliuæ fiunt sic. Alternis cratibus olinarū puluerium spargis, & mel, & acetum, & sales modice, stratura intercedēte suffundes. Item sternes oliuas supra furculos fœniculi, uel anethi, siue lentisci, & ramulis oliuæ subditis, aceti heminam, & muriam superfundis, & has constructiōes usq; ad uasculi plenitudinem patieris insurgere. Aliter. Electas oliuas muria maturabis, post. XL. dies muriam fundis uniuersam, tunc duas de fruti partes, aceti unam, mentam minute inasam uasculo adijces, & oliuis replebis, ut iusta infusione liquor supernatet. Aliter. Oliuas manu lectas, una nocte integra, in balnei uapore eē patieris tabulæ, uel crati superpositas, mane balneis exemptas, salibus tritis consperges, & uteris, quæ non amplius, q̄. VIII. dies poterūt custodiri. Aliter. Oliuas illasas primo mittis in muria, post dies. XL. leuabis, atq; interades aceto calamo. Et si dulciores habere uolueris, duas sapæ partes, & aceti unam, si aciores, aceti duas, & sapæ unam debebis infundere. Aliter. Passi sextarium unum, cineris bene creti quātum manus utraq; gestabit, uini ueteris unū funiculum, & aliquantū cupressi foliorum.

Q yi

NOVEMBER.

mistis omnibus oliuas infundis, inculcas, & subinde crustam fa-
 ciendo saturabis, donec ad uasculorum summa ora peruenias.
 Aliter. Oliuas, quas iacentes repereris, rugis contrahētibus cri-
 spas colligis, & salibus tritis respersas expandis, donec sole mare-
 scant. Tunc substrato lauro alternas crates bacarum sepius ordi-
 nabis. Tunc defrutum cum satireia fasciculo duabus, aut tribus
 undis feruere patieris. Et postquam tepuerit, supra compositas
 bacas refundes admisto sale paululo, & origani fascie coniecto,
 supra ius omne perfundes. Aliter. Lectas bacas ex arbore sta-
 tim condies, rutam, & petroselinum sternes inter spatia structio-
 nis, & subinde aminati salis aspersione cumulabis. Postremum
 mel, & acetum supfundes. Nouissime optimi olei quantumcūq;
 miscebis. Aliter. Legis oliuas ex arbore nigras, & composi-
 tas muria diluis, tunc ollae adijcis mellis partes duas, uini unā,
 defruti dimidiam, & ubi simul deferbuerint, deponis, ac permo-
 ues, & acetum misces, cum refrixerit, super oliuas origani sur-
 culos sternis, & supra ius omne diffundes. Aliter. Oliuas ma-
 nu lectas cum pediculis aqua spargis tribus diebus, deinde mit-
 tis in muria, & post. XII. dies exemptas in uase adijcis cū mu-
 sti, & aceti equis ponderibus. Et impletū uas ita operies, ut ali-
 qua spiramenta dimittas.

De horis.

T. XXIII.

NOVEMBREM & Februarium ratio temporis per horas
 dierum fecit æquales.

Hora	I.	pedes	XXVII.
Hora	II.	pedes	XVII.
Hora	III.	pedes	XIII.
Hora	IIII.	pedes	X.
Hora	V.	pedes	VIII.
Hora	VI.	pedes	VII.
Hora	VII.	pedes	VIII.
Hora	VIII.	pedes	X.
Hora	IX.	pedes	XIII.
Hora	X.	pedes	XVII.
Hora	XI.	pedes	XXVII.

335

TITVLI MEMSIS DECEMBRIS.

De serendis frumentis, & faba, & lini semine. T.I.

De fodiendis pastinis, & cædenda materie, palis, & ridicis, & oleo laurino, ac myrtino. T.II.

De hortis, in eo de lactuca, allio, ulpico, cepulla, sinapi, & cunela. T.III.

De pomis, in eo de hypomelidibus, & aliorum mensium pomis. T.IIIII.

De rapis condiendis. T.V.

De echinis, & pernis, & lardo saliendo, & animum laqueis disponendis. T.VI.

De horis. T.VII.

PALLADIIVTILII TAVRI
AEMILIANI VIRIILLV
STRIS DE RERVSTICA
LIBER XIII.

De serendis frumentis, faba, & lini semine. T.I.

DECEMBRI mense seruntur frumenta, triticum, far ordeum, quamuis ordeï satio iam se-
d ra sit. Et faba circa septimum Idus feri potest.
Nam post exactam brumam male seminant.
Hoc etiam mense adhuc lini semen spargi poterit, usq; ad. VII. Idus Decembris.

De fodiendis pastinis, & cædenda materie. T.II.

NUNC ad instituendas vites, sed post Idus pastina inchoemus effodere, sicut ante tractatum est. Et materiem bene hoc mense cædemus. Palos quoq; & corbes faciemus, & ridicas. Et locis frigidis oleum faciemus ex lauro, & myrti bacis, atq; lentissimam olei sui confectiōe quassabimus, & vinum myrtite, sicut dictum est ante, retingemus.

De hortis.

T.III.

DECEMBER.

HOC tpe serenda est lactuca, ut planta eius Februario transferatur. Etiam nunc allium, & ulpicū, & cepullæ, & sinapi, & cinela feri poterunt, disciplina, & more, quo ante narratū est.

De pomis.

T. IIII.

HYPOMELIDES poma sunt (ut Martialis asserit) sorbo similia. Mediocri arbore nascuntur, & flore candidulo. Dulcedo huic fructui cum acuto sapore commista est. Seritur mense Decembri nucleis in uasculis positis. Mense autem februario hypomelidis planta, sed pollicis magnitudine robusta transfert breuissimo scrobe, soluta terra, plurimo stercore. Sed munienda est, quia cito arefcit, si radices eius uentus afflauerit. Terram qualemcūq; non respuit. Amat loca tepida, aprica, maritima, & sepe saxosa. Statum rigidū reformidat. Inseri non potest, exigua durat ætate. Poma eius aut in picatis, & munitis urceolis, aut scrobe populi, aut in ollis inter uinas uinaceis obruta seruabuntur.

De rapis condiendis.

T. V.

NUNC rapa in partes minutas rearsa, & leuiter cocta, & tota die diligentius exiccata nequid reseruent humoris, & sinapi ex aceto (sicut moris est) temperato, mergere, & condire curabimus, & repleta uasa claudemus, ac post aliquantos dies gustibus explorata, proferemus usuri. Quam rem ianuario quoq; et nouembri mense poterimus efficere.

De echinis, & pernis, & lardo saliendis, et animum laqueis disponendis.

T. VI.

NUNC etiam quibus litus in fructu est, ubi lunæ inuabit augumentum, quæ omnium clausorum maris animalium, atq; concharum iubet incremento suo membra turgere, echini carnes salibus condire curabunt. Quod solito more conficiatur. Hanc quoq; rem per omnes menses bene faciemus hybernos. Pernas etiam & lardum conficiamus non solū mense hoc, sed omnibus, quos hyemalis algor astringit. Tempore hoc per humiles syluas, & bacis fecunda uirgulta ad turdos, & ceteras aues capiendas laqueos expedire conueniet. Hoc usque in martium mensem tendetur aucupium.

De horis.

T.VII.

DECEMBREM ianuario in horis causa dispar adiunxit,
cum linea simili ille augeatur, iste decreseat.

Hora	I.	pedes	XXIX.
Hora	II.	pedes	XIX.
Hora	III.	pedes	XV.
Hora	IIII.	pedes	XII.
Hora	V.	pedes	X.
Hora	VI.	pedes	IX.
Hora	VII.	pedes	X.
Hora	VIII.	pedes	XII.
Hora	IX.	pedes	XV.
Hora	X.	pedes	XIX.
Hora	XI.	pedes	XXIX.

PALLADI RVTILII TAVRI
AEMILIANI DE INSITIO
NE LIBERAD PASI
PHILVM VIRVM
DOCTISSIMVM.

h ABES aliud indulta fidei testimoniū, pro
usura temporis hoc opus de arte insitiōis adieci.
Sed quod volumina hæc ruris colendi serius, quod
iusseras, scripta sunt, librarij manus se gnior fe-
cit, cuius ego tarditatem nunquam maligne
estimo. Scio enim quo frequenter inclinet ar-
gutia famulorum. Malo operam eius expectare potius, quam timere.
Nescio utrum commune sit dominis, mihi difficile contigit in ser-
uilibus ingenijs inuenire temperiem. Ita sæpissime natura hæc
uitiat commodum si quod est, et miscet optanda contrarijs. Ve-
locitas procurrit in faciēs, se gnities figuram benignitatis imita-
tur, et tantum recedit ab agilitate, quantum recessit à scelere.
Diu tamen apud te pudorem meum distuli, sed hoc quasi bonus

famulus fedi. Verum nescio, si tuum ad has modo minutias incli-
netur ingenium. Grande erit, & par desyderio suo, quod studij
tui quæret affectio. Et licet de his nugis fauorabiliter sentias, ego
meas opes æstimare non differo. Non est magni loci assibus intrin-
secus oculos duxisse per puluerē, quia nescio quomodo notæ sunt
quædam maximarum personarum minuta compendia.

p Asphile ornatus fidei, cui iure fatemur,
Siquid in arcano pectoris umbra tegit,
Bis septem paruos opus agricolare libellos.

Quos manus hæc scripsit, parte silente pedum,
Nec strictos numeris, nec Apollinis amne fluentes,
Sed pura tantum rusticitate rudes,
Commendas, dignaris, amas, & rustica dicta.
Affectu focij sollicitante colis.

Nunc ideo modicum crescens fiducia carmen
Obtulit arbitrio letificanda tuo.

Est nostræ studium non condemnabile musæ,
Urbanum fari rusticitatis opus.

Sub thalami specie felices iungere sylvas,

Vt soboli mistus crescat utrinq; decor.

Connexumq; nemus uestire affinis umbris,

Et gemina partum nobilitare coma.

Fœderibus blandis dulces confundere succos,

Et letum duplici fruge saporis ali.

Quæ quibus hospitium præsent uirgulta docebo,

Quæ sit adoptiuæ arbor onusta comis.

Ipse poli rector, quò lucida sydera currunt,

Quò fixa est tellus, quò fluit unda maris,

Cum posset mistos ramis inducere flores,

Et uaria grauidum pingere fronde nemus,

Dignatus nostros hoc insignire labores,

Naturam fieri sanxit ab arte nouam.

Non segne officium nostræ reor esse camænæ,

Aut operis parui gratia fiet inops.

DE INSITIONIBVS. LIB. XIII. 337

Si uelocis equæ pigro miscetur asello

Ardor, ut in sterilem res cadat acta gradum,

Fœcundumq; genus productus deleat hæres,

Et sibi defectum copia prolis agat,

Cur non arbor inops pinguescat ab hospite gemma,

Et decus externi floris adepta micet?

Inapiam, quicquid ueteres scripsere coloni,

Sacraq; priscorum uerba labore sequar.

Principio multas species industria solers

Protulit, & doctam iussit inire manum.

Nam quæcunq; uirens alienis frondibus arbor

Comitur, his discit credita ferre modis.

Aut noua discreto figuntur germina libro,

Aut aliud summo robore fissa capit,

Aut uirides oculos extremi gemma tumoris

Accipit, & lento stringitur uda sinu.

De uite.

Primus echionij palmes se iungere Bacchi

Novit, & externo tenditur uua mero.

Nexilibus gemmis fœcundos implicat artus.

Vitis, & amplexum pasit adulta genus.

Degenerisq; comæ uestigia mitis inumbrat

Pampinus, & pingui curuat onusta deo.

De oliua.

Robora palladij decorat syluestria rami,

Nobilitat partus baca superba feros.

Fœcundat sterilis pingues oleaster oliuas,

Et quæ non nouit munera, ferre docet.

De pyro.

Germine cana pyrus, niueos haud inuida flores

Commodat, & uarium nectit amore nemus.

Nunc rapit hirsutis horrenda sororibus arma,

Et docet indomitas ponere tela pyros.

Nunc teretem pingui producit acumine malum,

Fraxineasq; nouo flectit honore manus.

Phyllida quin etiam grandi mitescere fructu,

Instituens, dura dat sua membra cuti.

Et steriles spinos, & inertem fœtibus ornum

PALLADI.

Dotat, & ignotum cogit amare decus.
Huius & immissi uertere cydonia rami,
Pomaq; confusus blanda creauit odor.
Castaneæ septos aspro uelamine factus
Exiit, & placido pondere mutat onus.
Messilaq; exarmat pugnaibus horrida membris,
Et mala tranquillo cortice uota premit.
Creditur in libyis sua germina nectere ramis,
Lætaq; puniceo posse decore frui.

De malo punico.

Punica non alios unquam dignata sapes
Mala, nec externis associata comis.
Ipsa suas augent mutato semine gemmas,
Et sibi cognato picta rubore placent.

De pomo.

Insita proceris pergit concrefcere ramis
Et sociam mutat malus amica pyrum.
Seq; feros syluis hortatur linquere mores,
Et partu gaudet nobiliore frui.
Spiniferas prunos, armataq; robora sentes
Lenigat, & pulchris uestit adulta comis.
Exiguam sorbum dulci distendere succo
Noiit, & ad cupidas flectere poma manus.
Stipitibus gaudet nomen mutare salignis,
Et gratum nymphis spargere flore nemus.
Robora thyrsigero platani concordia Baccho
Fœtib; instituit plena rubore nouis.
Illius insolitas miratur persicus umbras,
Populeaq; ferunt candida dona comæ.
Messilus huic paret, lapidosaq; viscera mutans
Tenditur, & nixeo plena liquore rubet.
Pro sudibus fœtis, & pro prægnantibus armis
Castaneæ fuluum dant noua mala decus.

De persico.

Ipsa suos onerat meliori germine ramos
Persicus, & pruno sat sociare genus.
Imponitq; leues in stipite phyllidis umbras,
Et tali disat fortior esse gradu.

De malo cydonio.

Cum præstet cunctis se fulua cydonia pomis,
 Alterius nullo creditur hospitio.
 Roboris externi librum aspernata superbit,
 Sæt tantum nullo crescere posse decus.
 Sed proprijs pandens cognata cubilia ramis
 Stat contenta suum nobilitare bonum.

De mespilo.

Aemula dura pyri despecti mala saporis
 Mespilus admissio germine tuta subit.
 Et geminis sese uiolentior inserit armis,
 Atq; auidas terrent robora sæua manus.

De malo citrio.

Nec non & citrij patiuntur mutua ramæ
 Pignora, quæ grauido cortice morus alit.
 Pomaq; pasturi blando redolentia succo
 Armatis mutant spicula nota pyris.

De prunis.

Pruna suis addunt felicia germina membris,
 Donaq; cognato corpore læta ferunt.
 Exarmat fœtus, sed brachia roboris armat
 Castaneæ prunus iussa tenere larem.

De filiqua.

Affuescunt filiquæ uiridi mollescere succo,
 Et gremio pascunt cætera poma suo.

De ficibus.

Persuadet moris tetrum mutare colorem.
 Ficus, & inuasit dat sua iura comis.
 Se quoq; miratur pingui grandescere succo,
 Et solitum gaudet uincere poma modum.
 Insignes folijs platanos felicia mensis
 Brachia gaudentes uitæ honore comas
 Ingrediens pingui se cortice maxima ficus
 Seruat, & optatos implet adepta sinus.

De moro.

Mutua quin etiam moris commertia ficus
 Præstat, & oblatum robore germen alit.
 Fraxinus huic auide confert sua membra sorori,

PALLADI.

Et metuit fœtus sparsa cruore novos.
Proceras fagos, & poma hirsuta uirentis
Castaneæ, duris aspera mala comis
Inficiens, monstrat piceo nigrescere partu,
Et succo pasat turgida poma nouo.
Obsequitur moris blando terebinthus odore.
Et geminis ueniunt munera mista bonis.

De sorbis.

Sorba suos partus merito maioris honestant
Seminis, & pulchro curua labore nitent.
Hæc arbor spinæ duos micronibus artus.
Exiit, ac libris mitibus arma tegit.
Aurea; annexo miscere cydonia fœtu
Gaudet, & externi dona coloris amat.

De ceraso.

Inseritur lauro cerasus, partuq; coactio
Tingit adoptiuus uirginis ora pudor.
Umbrantes platanos, & iniquam robore prunum
Compellit gemmis pingere membra suis.
Populeasq; nouo distinguit munere frondes,
Sic blandus spargit brachia cana rubor.

De amygdalo.

Phyllis odoratos primæuis floribus artus
Disassi pruni cortice fixa tegit.
Pomaq; permutat uelamine persica misto,
Duriciemq; docet tegminis esse loco.
In modicum tornat filiqua tendente figuram,
Et frondes pulchro ditat odore feras.
Castaneamq; trucem depulsis cogit echinis
Mirari fructus leuia poma sui.

De pistacijs.

Quin & amygdaleos subeunt pistacia ramos
Et debitum maius de breuitate petunt.
Hæc & cognato cingens terebinthus amictu
Nutrit adoptiuus nobilitanda comis.

De castanea.

Flumineam salicem fœcundant ardua membra
Castaneæ, & multo pasta liquore uigent.

De nucæ.

Arbuteas frondes uastæ nucis occupat umbra,
 Pomaq; sub duplici corti tata refert.
 Cetera, quæ solers processu temporis usus
 Exprimet, exemplis instituere nouis.
 Hæc sat erit tenui uersu memorasse poetam,
 Quem iuuat effossi terga mouere soli.
 Carmina tu duros inter formata bidentes
 Aspera, sed miti rusticitate leges.

F I N I S.

Impressum Florentiæ opera & impressa Philippi
 Iuntæ. Anno à natiuitate. D. XV. Su-
 pra mille mense Iulio. Leone
 Decimo Pontificæ.

AA BB abcdefghijklmnopqrstuxyZ & 2R
 ABCDEFGHIKLMNOPQ.

Quaterniones omnes præter Q & B B qui sunt sesterniones.

Handwritten text at the top of the page, including a date "1573" and a reference number "366". The text is written in a cursive script and is partially obscured by a diagonal line.

1573

Imperial Court of the Emperor
Imperial Court of the Emperor
Imperial Court of the Emperor
Imperial Court of the Emperor
Imperial Court of the Emperor

Imperial Court of the Emperor
Imperial Court of the Emperor
Imperial Court of the Emperor
Imperial Court of the Emperor
Imperial Court of the Emperor

Imperial Court of the Emperor
Imperial Court of the Emperor
Imperial Court of the Emperor
Imperial Court of the Emperor
Imperial Court of the Emperor

